



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



QH
45
.041



1739

Allgemeine
Naturgeschichte

für 76586

alle Stände,

von

^{LORENZ}
Professor Oken.

Erster Band.

Mineralogie und Geognosie

bearbeitet von

Dr. F. A. Walchner.

Stuttgart,
Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung.

1839.

Recd 11. 21-25 N. K. F.

U e b e r s i c h t

der

M i n e r a l o g i e.

Einleitung, S. 1.
Eintheilung der Naturgeschichte, 5.
Organische Körper, 8.
Mineralien, 25.

1. Mathematische Eigenschaften, 33.

Unvollkommene Crystalle, 66.

2. Physikalische Eigenschaften, 94.

3. Chemische Eigenschaften, 112.

System, 135.

Erste Classe.

E r d e n , 135.

I. Ordnung.

Kieselerde, 136.

1. Eigenschaft. Quarzartige.

1. Geschlecht. Quarz; Amethyst, Ragnauge,

Chalcodon, Chrysopras, Feuerstein, Hornstein, 141.

Jaspis, Kieselstiefer, Kieselstein, 144.

Dies allg. Naturg. I.

2. S. Opal, 146.

2. S. Demant, 149.

3. S. Bircan, 150.

II. Ordnung.

Ehonerden, 152.

1. S. Ehonedelsteine.

1. S. Korund, Sapphir, Smirgel.

2. S. Smaragd, 154.

3. S. Topas, Physalit, Pyrenit, 155.

4. S. Chrysoberyll, 157.

5. S. Granat, 158.

6. S. Vesuvian (Idocras), 161.

7. S. Dichroit, 162.

8. S. Staurolith, 163.

2. S. Schürle, 164.

1. S. Schürle.

2. S. Urit, 166.

3. S. Epidot, 167.

3. S. Zeolith, 168.

1. S. Zeolith.

2. S. Stilbit, 170.

3. S. Desmin, 170.

4. G. Analcim, 171.

5. G. Ehabast.

6. G. Laumontit, 172.

7. G. Kreuzstein, 173.

8. G. Prehnit, 174.

4. Sip. Glimmer, 175.

1. G. Zwepachiger Glimmer.

2. G. Einachiger Glimmer, 176.

3. G. Chlorit, 177.

4. G. Talc, 178.

5. G. Pinit, 179.

5. Sip. Leucite, 180.

1. G. Leucit.

2. Haupn.

3. Lasurstein, 181.

4. Sodolith, 182.

6. Sip. Skapolithe.

1. G. Skapolith.

2. Nephelin, 183.

3. Chlaskolith, 184.

7. Sip. Wavellit, 185.

1. G. Wavellit.

2. Lazurit.

3. Turck, 186.

4. Umblygonit, 187.

5. Kryptolith.

8. Sip. Feldspath, 187.

1. G. Feldspath.

2. Nepholith, 191.

3. Albit.

4. Periklin, 192.

5. Labrador, 193.

6. Anorthit, 194.

7. Petalit, 195.

8. Oligoklas.

9. Spodumen, 196.

10. Andalusit.

11. Bildstein, 197.

9. Sip. Cyanite, 198.

1. G. Cyanit.

2. Sapphirin, 199.

3. Sillimanit.

10. Sip. Gadolinite, 200.

1. G. Gadolinit.

2. Orthit.

3. Allanit.

4. Urtantalit, 201.

5. Polymignit.

11. Sip. Pechsteine, 202.

1. G. Pechstein.

2. Periklin.

3. Obsidian, 203.

4. Bimsstein, 204.

12. Sip. Diaspore, 205.

1. G. Diaspor.

2. Wörthit.

3. Pyrrargillit.

4. Allöphan, 206.

5. Pyrophyllit.

13. Sip. Thon, 207.

1. G. Thon.

2. Thonstein, 210.

3. Porzellanerde.

4. Cimolite, 211.

5. Collyrit, 212.

6. Steinmark.

7. Bergseife, 213.

8. Wallerde.

9. Bol, 214.

10. Selberde, 215.

III. Ordnung.

Talkerden, 215.

1. Sip. Talc-Edelsteine.

1. G. Spinell.

2. Chrysolith, 217.

2. Sip. Specksteine, 219.

1. G. Talc-Erd-Hydrat.

2. Speckstein, 220.

3. Serpentin, 221.

4. Nitrosmine, 222.

5. Meerschäum, 223.

3. Sip. Magnesite, 223.

1. G. Magnesit.

2. Hydro-Magnesit, 224.

3. Melnikspath, 225.

4. Sip. Boracite, 225.

1. G. Boracit.

2. Hydro-Boracit, 226.

3. **Wagnerit**, 227.
Nephrit.

IV. Ordnung.

Kalkerden, 228.

1. Sip. Kalk.

1. **G. Kalk**.
2. **Aragon**, 237.
3. **Plumbo-Calcit**, 241.
4. **Dolomit**.

2. Sip. Gypse, 244.

1. **G. Gyps**.
2. **Anhydrit**, 248.
3. **Pharmakolith**, 249.

3. Sip. Flußspathe, 251.

1. **G. Flußspath**.
2. **Apatit**, 254.

4. Sip. Hornblendens, 256.

1. **G. Tafelspath**.
2. **Augit**; **Diopsid**, **Sablit**, **Fasf**, **Kalkolith**, **Hedenbergit**, **Diallag**, **Bronzit**, **Hypersthen**, **Almit**.
3. **Hornblende**, 263. **Tremolit**, **Strahlstein**, **Anthophyllit**, **Uraslit**, **Asbest**.

5. Sip. Apophyllite, 270.

1. **G. Apophyllit**.
2. **Olenit**, 271.

6. Sip. Schwerspathe, 272.

1. **G. Baryt**.
2. **Chloasit**, 275.
3. **Witherit**, 276.
4. **Baryto-Calcit**, 277.
5. **Strontianit**, 278.

7. Sip. Titanite, 279.

1. **G. Titanit**.
2. **Pyrochlor**, 280.
3. **Datolith**.
4. **Schwerstein**, 282.

Zweite Classe.

Salze, 283.

I. Ordnung.

Erdsalze.

1. Sip. Alaune.

1. **G. Alaun**.
2. **Alaunstein**, 285.
3. **Aluminit**, 286.

II. Ordnung.

Saugensalze, 287.

1. Sip. Steinsalze.

1. **G. Steinsalz**.
2. **Digestsalz**, 289.
3. **Salmit**.

2. Sip. Soda, 290.

1. **G. Soda**.
2. **Trona**, 291.
3. **Sap-Lüßit**, 292.
4. **Zinkal**, 293.
5. **Sassolin**.

3. Sip. Salpeter, 294.

1. **G. Kalisalpeter**.
2. **Natronsalpeter**, 295.
3. **Kalksalpeter**.
4. **Sip. Glaubersalze**, 296.
1. **G. Glaubersalz**.
2. **Thénardit**, 297.
3. **Glauberit**, 298.
4. **Duplicatsalz**.
5. **Bittersalz**, 299.
6. **Muscagnin**, 300.

III. Ordnung.

Brenzsalze, 300.

1. **G. Honigstein**.
2. **Humboldt**, 301.

IV. Ordnung.

Erzsalze, 302.

1. Sip. Bitriole.

1. **G. Eisenvitriol**.
2. **Schwefelsaures Eisenoryd**, 303.

4. G. Analcim, 171.
5. G. Chabazit.
6. G. Laumontit, 172.
7. G. Kreuzstein, 173.
8. G. Prehnit, 174.
4. Sip. Glimmer, 175.
 1. G. Zwepackiger Glimmer.
 2. G. Einackiger Glimmer, 176.
 3. G. Chlorit, 177.
 4. G. Talc, 178.
 5. G. Pinit, 179.
5. Sip. Leucite, 180.
 1. G. Leucit.
 2. Haupn.
 3. Lasurstein, 181.
 4. Sodalith, 182.
6. Sip. Sapolithe.
 1. G. Sapolith.
 2. Nephelin, 183.
 3. Chiasolith, 184.
7. Sip. Wavellit, 185.
 1. G. Wavellit.
 2. Lazulit.
 3. Türkis, 186.
 4. Amblygonit, 187.
 5. Kryptolith.
8. Sip. Feldspath, 187.
 1. G. Feldspath.
 2. Nepholith, 191.
 3. Albit.
 4. Periklin, 192.
 5. Labrador, 193.
 6. Anorthit, 194.
 7. Petalit, 195.
 8. Oligoklas.
 9. Epidumen, 196.
 10. Andalusit.
 11. Bildstein, 197.
9. Sip. Epanite, 198.
 1. G. Epanit.
 2. Sapphirin, 199.
 3. Silimanit.
10. Sip. Gadolinit, 200.
 1. G. Gadolinit.
 2. Orthit.

3. Allanit.
4. Ottrotantalit, 201.
5. Polymignit.
11. Sip. Pechsteine, 202.
 1. G. Pechstein.
 2. Periklin.
 3. Obsidian, 203.
 4. Bimsstein, 204.
12. Sip. Diaspore, 205.
 1. G. Diaspor.
 2. Wörthit.
 3. Pyrrargillit.
 4. Allophan, 206.
 5. Pyrophyllit.
13. Sip. Thone, 207.
 1. G. Thon.
 2. Thonstein, 210.
 3. Porzellanerde.
 4. Eimosit, 211.
 5. Collyrit, 212.
 6. Steinmark.
 7. Bergseife, 213.
 8. Wallerde.
 9. Bol, 214.
 10. Gelberde, 215.

III. Ordnung.

Talkerden, 215.

1. Sip. Talc-Edelsteine.
 1. G. Spinell.
 2. Chrysolith, 217.
2. Sip. Specksteine, 219.
 1. G. Talcerde-Hydrat.
 2. Speckstein, 220.
 3. Serpentin, 221.
 4. Pilschmin, 222.
 5. Meerschäum, 223.
3. Sip. Magnesite, 223.
 1. G. Magnesit.
 2. Hydro-Magnesit, 224.
 3. Westinspath, 225.
4. Sip. Boracite, 225.
 1. G. Boracit.
 2. Hydro-Boracit, 226.

1. Wagnerit, 227.
Nephrit.

IV. Ordnung.

Kalkerden, 228.

1. Sip. Kalk.

1. G. Kalk.
2. Arragon, 237.
3. Plumbo-Calcit, 241.
4. Dolomit.

2. Sip. Gypse, 244.

1. G. Gyps.
2. Anhydrit, 248.
3. Pharmakolith, 249.

3. Sip. Flußspathe, 251.

1. G. Flußspath.
2. Apatit, 254.

4. Sip. Hornblenden, 256.

1. G. Tafelspath.
2. Augit; Diopsid, Sahlit, Fajsait, Kalkolith, Hebenbergit, Diallag, Bronzit, Hypersthen, Almit.
3. Hornblende, 263. Tremolit, Strahlstein, Anthophyllit, Uralit, Aëbest.

5. Sip. Apophyllite, 270.

1. G. Apophyllit.
2. Ofenit, 271.

6. Sip. Schwefspathe, 272.

1. G. Baryt.
2. Eblestin, 275.
3. Witherit, 276.
4. Baryto-Calcit, 277.
5. Strontianit, 278.

7. Sip. Titanite, 279.

1. G. Titanit.
2. Pyrochlor, 280.
3. Datolith.
4. Schwerstein, 282.

Zweite Classe.

Salze, 283.

I. Ordnung.

Erdsalze.

1. Sip. Alaune.

1. G. Alaun.
2. Alaunklein, 285.
3. Aluminit, 286.

II. Ordnung.

Saugensalze, 287.

1. Sip. Steinsalze.

1. G. Steinsalz.
2. Digestivsalz, 289.
3. Salmiak.

2. Sip. Soda, 290.

1. G. Soda.
2. Trona, 291.
3. Gay-Lüssit, 292.
4. Linal, 293.
5. Cassolin.

3. Sip. Salpeter, 294.

1. G. Kalisalpeter.
2. Natronsalpeter, 295.
3. Kalisalpeter.

4. Sip. Glaubersalze, 296.

1. G. Glaubersalz.
2. Thénardit, 297.
3. Glauberit, 298.
4. Dublieatsalz.
5. Bittersalz, 299.
6. Mascagnin, 300.

III. Ordnung.

Brenzsalze, 300.

1. G. Honigstein.
2. Humboldt, 301.

IV. Ordnung.

Erzsalze, 302.

1. Sip. Vitriole.

1. G. Eisenvitriol.
2. Schwefelsaures Eisenoxyd, 303.

3. Botryogen.
4. Kupfervitriol, 304.
5. Zinkvitriol, 305.

2. Sip. Haloid.

1. G. Eisenhaloid.
2. Eisensalmiak, 306.
3. Kupferhaloid.

Dritte Classe:

B r e n z e.

I. Ordnung.

Erdbrenze.

1. Sip. Schwarzkohlen.
1. G. Anthracit.
2. Steinkohle, 307.
2. Sip. Braunkohlen, 309.
1. G. Braunkohle, Torf.

II. Ordnung.

Harzbrenze, 311.

1. Sip. Schwefel.
1. G. Schwefel.
2. Sip. Harze, 313.
1. G. Bernstein.
2. Retinit, 315.
3. Asphalt.
4. Elaterit, 316.

III. Ordnung.

Fetthbrenze, 317.

1. Sip. Talge.

1. G. Bergtalge.
2. Naphtbalit.
2. Sip. Oele, 318.
1. G. Steinöl.

IV. Ordnung.

Erzbrenze, 319.

1. Sip. Graphite.

1. G. Graphit.

Vierte Classe.

E r z e, 320.

I. Ordnung.

Kalche.

1. Sip. Eisenkalche.

1. G. Magneteisenstein.
2. Chromeisenstein, 322.
3. Titaneisen, 323.
4. Ilmenit.
5. Nigrin, 324.
6. Menaccan.
7. Sferin, 325.
8. Franklinit.
9. Wolfram, 326.
10. Tantalit, 327.
11. Eisenglanz, 328.
12. Brauneisenstein, 331.
13. Ederit, 333.

2. Sip. Mangankalche, 334.

1. G. Weichmanganerz.
2. Braunit, 336.
3. Manganit.
4. Schwarzmanganerz, 337.
5. Psilomelan, 338.
6. Kupfermanganerz, 339.

3. Sip. Zinnkalche, 340.

1. G. Zinnstein.
2. Rutil, 342.
3. Octaedrit, 344.
4. Uranpfeferz.

4. Sip. Antimonkalche, 345.

1. G. Weisanimonerz.
2. Weisarsenikerz, 346.

5. Sip. Kupferkalche.

1. G. Rothkupfererz.
2. Kupferschwärze, 347.
3. Rothzinkerz, 348.

6. Sip. Ocker.

1. G. Polybdänocker.
2. Wolframocker.
3. Antimonocker, 349.
4. Uranocker.

5. Chromocer.
6. Wismuthocer, 350.
7. Kobaltocer.
8. Rennige.

II. Ordnung.

Gefäuerte Erze, 351.

1. Sip. Salinische Eisen- erze.

1. G. Spatheisenstein.
2. Ivait, 354.
3. Hisingerit, 355.
4. Cronstedtit, 356.
5. Pyrosmaht.
6. Grünerde, 357.
7. Kryptolith.
8. Kalken, 358.
9. Grüneisenstein, 359.
10. Bivianit.
11. Würfelerg, 360.
12. Storchit, 361.
13. Triplit.
14. Pittigit, 362.
15. Raseneisenstein.

2. Sip. Salinische Man- ganerze, 364.

1. G. Manganspath.
2. Mangankiesel, 365.

3. Sip. Salinische Cer- erze, 366.

1. G. Cerit.
2. Kohlensaures Ceropydul.
3. Fluor-Cerium, 367.
4. Ytrocercit.

4. Sip. Salinische Zink- erze, 368.

1. G. Zinkspath.
2. Zink-Glaserz, 369.
3. Zinkblüthe.
4. Gahnit (Automolith), 370.

5. Sip. Salinische Blei- erze.

1. G. Weißbleyerg.
2. Vitriolbleyerg, 373.

3. Kupferbleyvitriol, 374.

4. Zernardbleyerg.

5. Kohlenvitriolbley, 375.

6. Kupferbleyspath.

7. Buntbleyerg, 376. Grün- bleyerg.

8. Gelbbleyerg, 378.

9. Rothbleyerg, 380.

10. Bauquelinit, 381.

11. Scheelbleyerg.

12. Vanadinbleyerg, 382.

13. Hornbleyerg.

14. Chlorbley, 383.

15. Bleysgummi; Bleyperde.

6. Sip. Salinische Silber- erze, 384.

1. G. Hornsilber.

2. Iodsilber, 385.

3. Hornquecksilber.

7. Sip. Salinische Kupfer- erze, 386.

1. G. Malachit.

2. Kieselmalachit, 387.

3. Kupfersmaragd, 388.

4. Kupferlasur.

5. Atacamit, 390.

6. Brochantit.

7. Phosphormalachit, 391.

8. Olivenmalachit.

9. Olivenerz, 392.

10. Linsenerz, 393.

11. Euchroit.

12. Strahlerz, 394.

13. Erinit.

14. Kupferglimmer, 395.

15. Kupferkaym.

16. Conducrit, 396.

8. Sip. Salinische Uran- erze u. a.

1. G. Uranglimmer.

2. Kobaltblüthe, 397.

3. Nickelblüthe, 398.

III. Ordnung.

Schwefelerze, 398.

1. Sip. Riese, 399.

1. G. Schwefelkies.

III. Ordn. Secundäres Gebirge, 670.

a. Rinde, artische Brunnen.

b. Juragebirge, 684.

Wälderthön, Corallenfalk, Colenhofer-Schlefer, Böhnerze, Moogenstein, Glas.

c. Triasgebirge, 710.

Reuper, Lettenkohle, Maschafalk, bunter Sandstein.

IV. Ordn. Uebergangs-Gebirge, 731.

1. Kupferschiefer-Gebirge, 732.

2. Steinkohlen-Gebirge, 738.

3. Silurisches Gebirge, 753.

Grauwacken-Gebirge.

4. Cambrisches Gebirge, 763.

Uebergangs-Schiefergebirg.

V. Ordn. Grundgebirge, 768.

Urgebirge.

n. Classe.

Massige Gebirgsbildungen.

I. Ordn. Vulcanisches Gebirge, 777.

Vulcane.

Vulcanische Produkte, 785.

Erhebungs-Kratern, 792.

Solfataren, 797.

Basalte, 805.

Ursache der vulcanischen Erscheinungen, 814.

Erdbrände, 819.

II. Ordn. Plutonisches Gebirge, 820.

Granit, Syenit, Porphyre,

Grünstein, Serpentin.

Lagerstätten der Erze.

Emporhebung der Gebirgsteilen, 839.

Oken's Mineralsystem.

1914-1915

Da der Verfasser nur meine oberen Eintheilungen angenommen hat; so ist es wegen der Uebereinstimmung mit den Pflanzen und Thieren nöthig, daß ich hier die ganze Classification der Mineralien nach meinen Grundsätzen beifüge, welche sich in meiner Naturphilosophie 1809 und meinem Lehrbuch der Naturgeschichte I. 1813 aufgestellt finden, besonders aber in meiner kleinen Schrift: Das natürliche System der Erze. 1809. 4.

Diese Eintheilungen, besonders die Ordnung der Erze in Dryde, Gefärrte, Geschwefelte und Gediegene, sind zwar gegenwärtig in allen Lehrbüchern angenommen, aber ganz principienlos, so daß man nicht mehr erkennt, worauf ich die Gänste oder Familien gegründet habe.

Ich betrachte die Mineralien als Individuen, so wie die Pflanzen und Thiere, mit dem Unterschiede, daß bei ihnen der individuelle Character bloß in ihrer Entstehungsart, in den chemischen Bestandtheilen und den physischen Wirkungen besteht, und nicht in der Gestalt, während bey den andern nicht bloß die chemische Mischung, sondern auch die Gestalt wesentlich ist. Ein Mineral kann zer schlagen und zu Pulver zerstoßen werden: es bleibt dessen ungeachtet dasselbe. Man kann zwar allerdings sagen, das Gefüge ändere sich auch im Staube nicht: allein wenn auch das Gefüge ein Erkennungscharacter ist; so verräth es doch nicht den wesentlichen oder Wirkungscharacter des Individuums, nemlich wie es sich chemisch und physisch verhält, welche Schwere, Härte, Durchsichtigkeit u. dergl. es besitzt.

Wie Pflanzen und Thiere Organe haben und nichts anderes als die Darstellung und Combination dieser Organe sind; so haben auch die Mineralien ihre Organe, nemlich die chemischen Bestandtheile, und sind nichts anderes als die geschmässige Combination derselben. Man muß übrigens diese Bestandtheile nicht maschinenmäßig nehmen, sondern im Gedächtniß behalten, daß verschiedene Bestandtheile für einander vicariiren und mithin Mineralien zusammengehören können, die zum Theil ganz verschiedene Bestandtheile haben. Die Urstoffe, wie Kohlen-, Sauer- und Wasserstoff, sind gleichsam die Gewebe der Mineralien; die

andern Stoffe, wie Metalle, Schwefel, Erden, Laugen und Säuren, sind die anatomischen Systeme, aus welchen die Organe und endlich die Leiber selbst, nemlich die Mineralien, zusammengesetzt werden.

Die chemischen Veränderungen des Erbelements (oder besser, da das Erbelement nicht bloß aus Erden, sondern auch aus Salzen, Inflammabilien und Erzen besteht, *Erde* genannt und die Mineralien *Erden*), so wie seine verschiedenen Combinationen können aber nur durch äußere Einflüsse hervorgebracht werden oder auf genetischem Wege, gleichsam durch die Eltern der Mineralien oder Erden. Sie sind nemlich nichts anderes als Erdenveränderungen, indem es im Wasser, in der Luft und im Aether, als bloß allgemeinen Materien, keine Verschiedenheiten oder keine Individuen gibt. Als aber die Erdmasse sich aus den Urmassen niederschlug, war sie entweder ganz rein, oder erlitt eine Veränderung durch den Einfluß des Wassers, oder der Luft, oder des Feuers: denn diese sind die einzigen Materien, welche um diese Zeit vorhanden waren. Es verbinden oder vermählen sich daher mit dem Erbelemente nur drei andere Elemente, und es kann mithin nur vier Classen von Mineralien oder Erden geben.

a. Entweder ganz reine, worauf weder Wasser, noch Luft, noch Feuer einen Einfluß hatte.

b. Oder solche, welche durch den Einfluß des Wassers Wasser-eigenschaften annahmen;

c. oder aus demselben Grunde Luft-eigenschaften;

d. oder Feuer-eigenschaften.

1) Die ersten sind also solche, welche sowohl im Wasser, als in der Luft und im Feuer unveränderlich sind, mithin die Erden.

2) Die andern nehmen durch das Wasser die Wasserform an, nemlich werden aufgelöst.

3) Die dritten werden durch die Luft luftförmig, indem sie sich mit der Sauerstoffluft verbinden oder verbrennen.

4) Die vierten endlich sind schmelzbar, glänzend und sehr schwer, haben mithin die Eigenschaften des Feuers oder der Wärme, des Lichts und der Schwere.

Die vier Classen der *Erde-Individuen* oder der Mineralien sind mithin:

I. Classe. *Erde-Mineralien* oder reine Erden — Erden.

II. Classe. *Wasser-Mineralien* oder Wasser-Erden — Salze.

III. Classe. *Luft-Mineralien* oder Luft-Erden — Brenze oder Inflammabilien.

IV. Classe. *Feuer-Mineralien* oder Feuer-Erden — Erze.

Das Nächste nun, was auf die Classen wirkt, sind die Classen selbst, wodurch entweder ihr chemischer Character verändert wird oder eine neue Combination entsteht. Es kann daher in jeder Classe nur vier Ordnungen geben.

1. Bey den Erden.

Erste Ordnung. Reine Erden, welche selbst durch Säuren, un-
veränderlich sind → Kies oder Kiesel.

Zweite Ordnung. Salz-Erden, welche durch Säuren und selbst
durch das Wasser verändert werden, indem sie dasselbe einsaugen und
sich kneten lassen — Thone; Sircon-, Vitte-, Thor-, Thon- und Glucin-
oder Berg-Erde.

Dritte Ordnung. Brenz-Erden, welche wie Schwefel oder Fett
aussehen und in der Luft in electriche Blättchen zerfallen — Talk.

Vierte Ordnung. Erz-Erden, welche sich im Feuer verändern
und ähnd werden, gleich vielen Metallkalchen — Kalk; Kalk, Stron-
tian- und Schwer-Erde.

Die nächsten Verbindungen dieser Ordnungen sind nun wieder unter
sich. So verbindet sich Kieselerde mit Thonerde, Talk- und Kalk-
erde; die Thonerde mit Kiesel-, Talk- und Kalkerde; die Talkerde
mit Kiesel-, Thon- und Kalkerde u. s. w. Es gibt daher in jeder Ord-
nung zunächst vier Hüfte; z. B. bey den Kieseln:

1. Hüft. Reine Kiesel.

2. Hüft. Thontiesel.

3. Hüft. Talktiesel.

4. Hüft. Kalktiesel.

Damit sind aber nicht alle Combinationen erschöpft. Die Erden
verbinden sich auch mit den Classen, nemlich mit Salzen oder
Säuren, mit Inflammabilien und mit Erzen, und es gibt daher auch

5. Hüft. Salztiesel,

6. Hüft. Brenztiesel,

7. Hüft. Erztiesel.

Auch damit sind noch nicht alle Combinationen erschöpft. Die Erden
verbinden sich auch rückwärts mit den Elementen, nemlich mit
Wasser, Luft und Feuer, und es gibt daher noch

8. Hüft. Wassertiesel,

9. Hüft. Lufttiesel,

10. Hüft. Feuertiesel.

Mehr Combinationen und mithin mehr Hüfte sind nicht möglich.
Es können sich aber diese Combinationen wieder mit andern verbinden,
wie bei allen chemischen Verbindungen, und dadurch werden Sippschaften
oder Geschlechter und Gattungen entstehen. Was von der Kieselerde
gesagt ist, gilt natürlich auch von den andern Erden und mit Verände-
rungen auch von den andern Classen.

Nach diesen Grundsätzen habe ich folgendes System erhalten. Es
versteht sich von selbst, daß die Einreihung der einzelnen Mineralien
nicht überall getroffen seyn kann.

Als das Muster des reinen Kiesels betrachte ich den Quarz,
als Muster des Thontiesel den Sircon, als Muster des Talk-

kiesels den Smaragd, als Muster des Kalkkiesels den Zencit.

Salzkiesel kann kein anderer seyn als eine Verbindung mit einer Säure, und daher kann nur die Flußpathsäure in Betracht kommen, als welche allein die Kieselerde auflöst; das Muster ist mithin der Topas.

Brenzkiesel muß eine Verbindung von Kieselerde mit Schwefel oder Kohle seyn. Hier bietet sich bloß der Diamant an, welcher alle physischen Eigenschaften des Kiesels hat, aber ganz aus Kohlenstoff besteht. Da alle Erden nur Metall-Drybe sind, und alle Metalle als geschmolzener Kohlenstoff betrachtet werden müssen; so ist der Diamant gleichsam ein doppelter Kohlenstoff, nemlich in Kohle verwandeltes Metall mit den Eigenschaften des Kiesels. Der Diamant wird mit Unrecht zu den Inflammabilien gestellt, indem er nicht verbrennt. Er ist zugleich ein schönes Beispiel, daß man nicht maschinenmäßig nach den chemischen Bestandtheilen verfahren darf.

Der Erzkiesel ist eine Verbindung von Kieselerde und Metall, wie wir sie im Granat haben.

Zum Wasserkiesel gehören die Kiesel-Hydrate, also der Opal und alle ähnlichen verben Mineralien, welche betrachtet werden können als niedergeschlagen aus einer Kieselenechtigkeit, wenn sie gleich das Wasser verloren haben, wie der Feuerstein und Hornstein.

Zu den Luftkieseln muß man die aus glühenden Wasserbläschen niedergeschlagenen Kiesel-Sinter rechnen, wie die aus dem Geysir auf Island, wo unendlich kleine Kieselstäubchen sich aufeinandersetzen und Räumchen mit Luft zwischen sich lassen; daher die Leichtigkeit der Schwimmsteine. Auch Tripel und Volierschiefer muß man betrachten als niedergefallen aus dem Dampfe heißer Quellen oder aus den organischen Reichen, überhaupt die Kiesel-Guhren. Ihre Genese ist daher eigenthümlich, und daher müssen sie als eigene Sippschaft betrachtet werden, obgleich sie die Bestandtheile des Quarzes haben.

Dasselbe gilt von dem durch Feuer geschmolzenen und veränderten Obsidian.

Wir haben also folgende Kiesel-Sänfte:

A. Erdkiesel.

a. Erdkiesel.

1. St. Reiner Kiesel — Quarz.
2. St. Thontiesel — Zircon.
3. St. Talkiesel — Smaragd.
4. St. Kalkiesel — Zencit.

b. Glassenkiesel.

5. St. Salzkiesel — Topas.
6. St. Brenzkiesel — Diamant.
7. St. Erzkiesel — Granat.

B. Elemententiesel.

8. St. Wasserkiesel — Opal.
9. St. Luftpiesel — Sphren.
10. St. Feuerkiesel — Obsidian.

Die Thone, Talle und Kalle gehen nach denselben Gesehen.

Werkwürdiger Weise ist die Salzspsschaft fast immer eine Verbindung mit Boraxsäure, was auch seinen guten Grund hat. Diese Säure ist nemlich diejenige, welche den Salzen vorzugsweise entspricht oder deren Grundlage ist.

2. Salze.

Sam Verständniß dieser Bedeutung der Boraxsäure und zur Classification der Salze überhaupt ist folgende Entwicklung notwendig.

Die Säuren haben nemlich auch eine bestimmte Zahl und gehen ganz nach den Gesehen der andern Mineralien. Es verwandelt sich nemlich jedes Element in eine Säure, und ebenso jede Classe und, wie es scheint, selbst jede Erde.

Bei manchen leuchtet es unmittelbar ein. So wird die Luft durch Oxydation zu Stickstoffsäure oder Salpetersäure, das Brenz zu Schwefelsäure, das Erz zu Arsenikssäure. Es fragt sich nun, welche Säuren man als die Kinder des Wassers und des Feuers oder des Aethers betrachten muß. Alle Verhältnisse sprechen dafür, daß die Kochsalzsäure dem Wasser entspricht, und die Kohlensäure dem Feuer oder dem Aether. Sie ist gasartig, allgemein verbreitet und eine Verbindung des Urstoffes aller festen Körper mit dem Sauerstoff. Die Flußspathsäure löst allein die Kiesel Erde auf, und mag daher als Erdsäure, gleichsam überoxydirte Erde, betrachtet werden. Die Boraxsäure bleibt nun allein übrig für die Classe der Salze — ein Platz, den sie durch ihr sonderbares Auftreten und ihre sonstigen Eigenschaften passend einzunehmen scheint. Wir haben mithin auch die Principien für die sogenannten Mineralsäuren gefunden. Es gibt

A. Elementensäuren.

1. Feuer Säure = Kohlensäure.
2. Luftpäure = Salpetersäure.
3. Wasser Säure = Kochsalzsäure.

B. Mineralsäuren.

4. Erz Säure = Arsenikssäure.
5. Brenz Säure = Schwefelsäure.
6. Salz Säure = Boraxsäure.
7. Erd Säure = Flußspathsäure.

Es scheint mir, man könne die Geschmässigkeit der Säuren noch weiter verfolgen und auch auf ihre Grundlagen ausdehnen, wobei alle Erden in Mitwirkung gezogen werden. Ich versuche folgenden Parallelismus:

1. Kieselrde — Fluor, Flußpathsäure,
2. Thonerde — Brom, Bromsäure.
3. Zinkerde — Jod, Jodsäure.
4. Kalkerde — Cyan, Cyansäure.
5. Salz — Boron, Borsäure.
6. Brenz — Schwefel, Schwefelsäure.
7. Erz — Arsenik, Arseniksäure.
8. Wasser — Chlor, Kochsalzsäure.
9. Luft — Stickstoff, Salpetersäure.
10. Feuer — Kohlenstoff, Kohlenäure.

Auch die Pflanzen- und Thiersäuren sind sämmtlich Kohlenäuren, mit verschiedener Zahl der Bestandtheile, bald rein, bald mit Wasserstoff, bald mit Stickstoff, bald mit beiden verbunden. Diejenigen, welche ein Uebergewicht von Kohlenstoff enthalten, sind Pflanzensäuren; die andern, mit einem Uebergewicht von Wasser- oder Stickstoff, meistens Thiersäuren. Man mag indeß den Parallelismus als einen Versuch betrachten.

A. Unorganische Säuren.	B. Pflanzensäuren. Mehr Kohlen- als Wasserstoff.	C. Thiersäuren. Mehr Wasser- als Kohlenstoff.
a. Erdsäuren.	a. Bloß Kohlen- und Sauerstoff.	a. Bloß Kohlen- und Wasserstoff.
1. Flußpathsäure.	1. Zucker- oder Sauer- Heesäure.	1. Delsäure.
2. Bromsäure.	2. Croconsäure.	2. Butteräure.
3. Jodsäure.	3. Rhodizonsäure.	3. Thransäure.
4. Cyansäure.	4. Honigsteinsäure.	4. Fettsäure, Talg- u. Margarinsäure.
b. Classensäuren.	b. Kohlen- u. Wasser- stoff.	b. Oft auch Stickstoff.
5. Borsäure.	5. Gerbsäure, Humus- säure.	5. Quellsäure, Quellsäure.
6. Schwefels, Selen- u. Phosphorsäure.	6. Bernsteins, Benzoe- u. Opiumsäure.	6. Gallensäure.
7. Arseniksäure.	7. Weid-, Caffee- und Asparaginsäure.	7. Ameisensäure.
c. Elementen- säuren.		
8. Kochsalzsäure.	8. Weinsäure, Trauben- säure.	8. Harn-, Urin- und Mantoisäure.
9. Salpetersäure.	9. Citronens-, Apfel- säure.	9. Milchsäure, Milch- zuckersäure.
10. Kohlenäure.	10. Essigsäure.	10. Blut-(Blau-)säure.

Die Lauge n scheinen sich nach den Elementen zu richten.

1. Erblauge — Lithion.
2. Wasserlauge — Soda, mit Kochsalzsäure.
3. Luftlauge — Pottasche, mit Salpetersäure.
4. Feuerlauge — Ammon, mit Kohlensäure.

Die Salze bestehen größtentheils aus Säuren und Lauge n, und zerfallen nach den Classen in 4 Ordnungen.

1. Ordn. Erbsalze = Mittelsalze.
2. Ordn. Salzsalze = Neutralsalze.
3. Ordn. Brenzsalze = Seifen.
4. Ordn. Erzsalze = Vitriole.

Die Brenze oder Inflammabilien richten sich in ihren Ordnungen ebenfalls nach den Classen. Es gibt

1. Ordn. Erdbrenze — Kohlen.
2. Ordn. Salzbrenze — Fette.
3. Ordn. Brenzbrenze — Harze.
4. Ordn. Erzbrenze — Farben.

Die Erze begreifen in sich die Metalle nebst ihren Verbindungen, und zerfallen wie die andern in 4 Ordnungen.

1. Ordn. Erzerze — Oäer; oxydirte Metalle.
2. Ordn. Salzzerze — Halbe oder Haloide; gesäuerte Metalle.
3. Ordn. Brenzerze — Blenden; geschwefelte Metalle.
4. Ordn. Erzerze — Metalle, gebiegene.

Wir kommen nun an die durchgeführte Classification.

Erste Classe.

Erdb-Mineralien (Erdb-Erden) — Erden.

1. Ordn u n g.

Erdb-Erden — Kiesel. S. 136

Meist glasartige und durchsichtige Mineralien; geben Feuer oder poliren Stahl; unveränderlich in Säuren, Wasser, Luft und Feuer.

A. Mineral- od. Erbkiesel. Reiner Kiesel oder Verbindungen mit andern Mineralstoffen. *)

a. Erbkiesel:

Kieselerde in Verbindung mit andern Erden.

1. Sunst.

Reine Kiesel — Quarze.

1. Quarz, S. 136

*) Die Mineralien ohne Seitenzahl sind nicht beschrieben, weil selten und unwichtig.

Ofens allg. Naturg. I.

a. Bergkrystall, 137

b. Amethyst, 139

c. Gemeiner Quarz, 139.

Fettquarz, Aventurin, Prasem, Siderit, Katzenauge, Stinkquarz, Haferquarz.

2. Eisentiesel, S. 143

2. Sunst.

Thonkiesel — Sircone:

Kieselerde mit Thon- od. Sirconerde.

1. Sircen, 150. Hyacinth, 151

2. Derscheidit.

3. Sunst.

Kalkkiesel — Smaragde:

Kieselerde mit Kalk- od. Glycinerde.

1. Smaragd, 154. Beryll, 154

2. Davidsonit.

3. Euclase.

4. Phenacit.

4. Sunst.

Kalkkiesel — Leucite:

Kieselerde mit Kalkerde od. Pottasche.

1. Leucit, S. 180

2. Glaucolith.

b

b. Stassenkiesel:

Kieselerde mit Säuren, Brenzen
oder Metallen.

5. Sunst.

Salzkiesel — Topase:

Kieselerde mit einer Säure.
Topas, 155. Phosphat, Apatit.

6. Sunst.

Brenzkiesel — Diamanten:
Kieselerde in Kohlenstoff ver-
wandelt.

Diamant, 148

7. Sunst.

Erzkiesel — Granaten:

Kieselerde mit Metallen.

1. Granat, 158. Caneelstein, Grop-
sular, Melanit, Nothosit.

2. Vesuvian, 161

3. Apatit, 262

B. Elementenkiesel.

Kieselerde, mit den 3 artern Ele-
menten verbunden od. dadurch
verändert.

8. Sunst.

Wasserkiesel — Opale:

Kieselerde mit Wasser (Hydrate):

a. Das Wasser verschwunden.

1. Feuerstein, 142

2. Chalcedon, 141. Masma, Helio-
trop, Carneol, Onyx, Spho-
ropas.

3. Jaspis, 146. Achat 145

4. Hornstein, 143

5. Kieselstücker, 148

b. Mit Wasser.

6. Opal, 146. Hyalith, Menilit,
Jaspopal.

Ungewarnt.

Nonstent.

9. Sunst.

Dunstiesel — Gubren:

Kieselerde, aus Wasserdämpfen oder
Infusionstheeren microscopisch
niedergefallen.

1. Trüpel:

2. Vallerstiefer, 302. Kieselstiefer:

3. Kieselstier, 145. Kieselstier.

10. Sunst.

Feuerkiesel — Obsidiane:
durch Hitze veränderte Kiesel.

1. Pechstein, 202

2. Pechstein, 202

3. Obsidian, 203

4. Bimsstein, 204

II. Ordnung.

Salz-Erden — Thone, 187

Thonerde, meist mit Kieselerde
und Eisen, daher gewöhnlich
gefärbt und wenig fäulen ge-
hend; veränderlich in Säuren
und Feuer; gepulvert fäulbar
in Wasser.

A. Mineralien oder Thone:

Thone:

Verbindungen mit andern Mineral-
stoffen.

a. Erd-Thone.

1. Sunst.

Kiesel-Thone — Feldspath:
Thonerde mit Kieselerde
und Laugen.

1. Feldspath, 187

Apacolith, 191.

Albit, 191

Periclin, 192

Labrador, 193

2. Anorthit, 194

3. Petalit, 195

4. Diopsid, 196

5. Epidomen (Feldspar), 198

6. Andalusit, 196

Katobit, 197

Eauverit, 197

Weisit, 198

Triclinit, 198

Porcellanspath.

7. Hohlspath, 184

2. Sunst.

Artze Thone — Sapphir:
Thonerde mit wenig Kiesel-
erde oder Bismut.

1. Korund, 162

a. Sapphir, 163

b. Diamantspath, 183

c. Schmirgel, 183

2. Chrysoberyll, 157

3. Spinell, 198

4. Sillimanit, 198

3. Sunst.

Talk-Thone — Spinelle:
Thonerde mit Talk- u. Kiesel-
erde.

1. Spinell, 215. Saponit.

2. Gubnit (Antomolit), 370

3. Dichroit, 162

4. Sunst.

Kalk-Thone — Epidote:
Thonerde mit Kalk- u. Kiesel-
erde.

1. Epidot, 167. Bist, Bist.

2. Manganepidot, 168

b. Classen-Thone:

5. Sunst.

Salz-Thone — Schiefer,
Thon- und Kieselrde mit etwas
Säure und Metall.

a. Fluspathsäure.

1. Ottocerit, 307
2. Schörl, 164
3. Arinit.

6. Sunst.

Brenz-Thone — Glaussäure:
Thonerde mit etwas Phosphor-
säure.

1. Blauholz (Lazulith), 163
2. Färlis, 189
3. Amblgonit, 187

7. Sunst.

Erz-Thone — Gadolinit:
Thonerde mit Metallen.

1. Kreuzstein (Stannolith), 163
2. Gadolinit, 200
3. Orthit, 200

B. Elementen-Thone.

Thonerde, durch die 3 andern
Elemente verändert; verb.

8. Sunst.

Wasser-Thone — Thonschiefer:
Thon- und Kieselrde mit
Wasser.

1. Werthit, 206
2. Porargillit, 205
3. Alleghan, 206
4. Porphyllit, 206
5. Wehlschiefer, 282
6. Thonschiefer, 206
7. Alanschiefer, 212

9. Sunst.

Luft-Thone — Thonstein:
Thonerde und Kieselrde, an
der Luft verwittert und
flüchtig im Wasser.

1. Töpferthon, 208
2. Töpferstein, 210
3. Porcellanerde, 210
4. Simolit, 211

10. Sunst.

Thon- und Kieselrde, durch Feuer
verändert.

1. Gneithon, 110
2. Wäke (ziemlich so).
3. Klingstein, 491
4. Lave, 785

III. Drögen-Thone.

Brenz-Erden — Talle.

Reistgrün, blätterig oder fäul-
förmig u. ziemlich weich; gehen
selten Feuer; veränderlich in
Flammen und an der Luft, aber
nicht im Wasser und wenig im
Feuer.

A. Mineral- oder Talle.

Talle und Kieselrde mit an-
deren Mineralen.
a. Erdtalle (Erderbindungen).

1. Sunst.

Kieselrde — Glaser:
wenig Talle mit viel Kiesel.

1. Glaser, 175. Leptholith, 176
2. Vinit, 179.
3. Solarit.
4. Margarit.

2. Sunst.

Thontalle — Sapphirine:
Tallerde mit Thon- u. Kieselrde.

1. Sapphirin, 199.
2. Seybertit.

3. Sunst.

Talltalle — Chlorite:
Tallerde mit Kiesel- u. Thonerde.

1. Tall, 178
2. Pyrophyllit.
3. Chlorit, 177
4. Topystein, 179

4. Sunst.

Kalktalle — Augite:
Tallerde mit Kalkerde, Kieselrde
und Eisen.

1. Augit, 256
2. Diopsid, 259
3. Sahlit, 259
4. Fassit, 259
5. Coccilith, 260
6. Fedenbergit, 261
7. Dillag, 260
8. Bronzit, 261
9. Hypersthen, 261

b. **Classentalke:**
 Talkerde mit andern Erden nebst
 Säuren und Metallen.

5. Sunst.

Salzthalke—Hornblend:
 Talkerde mit Kiesel- und Flus-
 spathsäure.

1. Chondroit, 219

2. Grammatit, 264

3. Strahlstein, 265

4. Hornblende.

5. Anthophyllit.

6. Sunst.

Brenzthalke—Asbeste:
 Hornblendartige Fasern, welche wie
 Holz aussehen.
 Asbest, 268. Amianth, Bergleder.
 Bergholz.

7. Sunst.

Erzthalke—Olivine:
 Talk- und Kiesel-erde mit Eisen.

1. Chrysolith, 217. Olivin.

2. Hyalofidrit, 218

B. Elementen-Talke:

Talkerde, durch die drei andern
 Elemente verändert; meist derb.

8. Sunst.

Wasser-Talke—Serpentine:
 Talk- und Kiesel-erde, mit
 Wasser verbunden.

1. Schillerstein (Diatom), Schiller-
 spath (Baite), 261. Tschlunit.
 Pyrosiderit.

2. Microsin, 222. Pyralolith.

3. Nephrit, 227

4. Serpentin, 221

5. Speckstein, 220

6. Meerschäum, 223. Cerolith.

9. Sunst.

Luft-Talke—Steinmarke:

Thon- u. Kiesel-erde, kaum mit
 Talkerde, aber nicht
 knetbar.

1. Bildstein, 197

2. Collyrit, 212

3. Steinmark, 212

4. Bergseife, 213

5. Talkerde, 213

6. Bol, 214

10. Sunst.

Feuer-Talke—Basalte:
 Talkerde mit Kiesel- u. Thonerde,
 durch Feuer verändert.
 Basalt.

IV. O r d n u n g.

Erz-Erden — Kalke.

Erz-Mineralien, veränderlich in
 Säuren und Feuer. Talkerde
 mit etwas Kiesel-erde, oder Aetz-
 erden mit Säuren; meistens
 weiß und weich.

A. Mineral-Kalke

(Erz-Kalke):

Verbindungen der Talkerde mit
 andern Mineralien, auch Borax-
 säure u. Phosphorsäure.

a. Erdkalke:

Verbindungen mit andern Erden;
 schmelzen mit Blasen und werden
 mit Salzsäure zu einer Gallert.

1. Sunst.

Kiesel-Kalke — Lasursteine:

Kalk- u. Kiesel-erde mit Thon-
 erde ohne Wasser,

1. Lasurstein, 181

2. Gyps, 180

3. Cobalith, 182

4. Scapolith, 182

5. Nephelin, 183. Eudialyt.

2. Sunst.

Thon-Kalke — Zeolith, 168

Kalk- u. Kiesel-erde mit Thon-
 erde und Wasser.

1. Fugenstein (Harmonium) 173. Zea-
 gonit, Edingtonit, Carpholith.

2. Pechnit, 174. Brewsterit.

3. Chabasit, 171

4. Raumontit, 172

5. Blätterzeolith (Stilbit), 170

6. Strahlzeolith (Desmin).

7. Amalcin, 171. Epistilbit, Comp-
 tonit, Thompsonit.

8. Mesotop, 168. Colecit, Mesol-
 lith, Natrolith.

3. Sunst.

Talk-Kalke — Stellite:

Kalk- und Talkerde mit Kiesel-erde.

1. Nebelforst.

2. Stellit.

3. Melilith.

4. Humboldtillith.

4. Sunst.

Kalk-Kalke — Tafelspath:

Kalk- u. Kiesel-erde, meist
 mit Wasser.

1. Tafelspath, 156. Pectolith.

2. Apophyllit, 270

3. Olenit, 271

b. **Glassen-Kalke:**
Verbindungen mit Metallen oder
Borax-, Phosphor- und
Flußspathsäure.

5. Sunst.

Salz-Kalke — Boracite:
Boraxsaure Talk- oder Kalkerde.

a. Kalkerde.

1. Boracit, 226

b. Kalkerde.

2. Hydroboracit, 226

2. Datolith, 280. Botryolith, 281
Rhodicit.

6. Sunst.

Brenz-Kalke — Phosphorite:
Flußspathsäure oder phosphorsaure
Erden ohne Wasser.

a. Flußspathsäure
* Thonerde.

1. Eryolith, 187

2. Glusolith.

* Kalkerde.

3. Flußspath.

Herderit.

b. Phosphorsaure
* Kalkerde.

4. Wagnerit, 227

* Kalkerde.

5. Phosphorit, 254. Apatit.

7. Sunst.

Erz-Kalke — Zungsteine:
Kalkerde mit Metallen.

1. Titanit, 279

2. Zungstein, 282

3. Pharmacolith, 249. Holotyp,
(Haidingerit, Diatomes Gyps-
baloid), 250

B. Elementen-Kalke:

Einfache Verbindungen der auflös-
lichen Erden mit Wasser oder mit
Schwefel- u. Kohlensäure.

8. Sunst.

Wasser-Kalke — Wavellite;
Thon- oder Kalkerde mit Wasser:
crystallinische Hydrate.

a. Thonerde.

1. Diaspor, 205. Gibbst.

2. Wavellit, 185. Voganit, Viss-
phan.

b. Kalkerde.

3. Talkhydrat (Hydrophyllit), 219

9. Sunst.

Luft-Kalke — Gypse:
Schwefelsaure Erden.

a. Thonerde.

1. Aluminit, 285

b. Schwererde:

2. Schwerspath, 272

c. Strontianerde.

3. Celestin, 275

d. Kalkerde.

4. Gyps, 246. Anhydrit, 248

10. Sunst.

Feuer-Kalke — Kalksteine:
Kohlensaure Erden.

a. Thonerde.

1. Honigstein, 300

b. Kalkerde.

2. Magnesit, 223. Stobertit, 224

3. Hydromagnesit, 224

c. Schwererde.

4. Witherit, 276

5. Barytochalcit, 277

d. Strontian-Erde.

6. Strontianit, 278

e. Kalkerde.

7. Dolomit, 241

8. Arragonit, 237

9. Kalkstein, 228

10. Kalk-Weinstein.

11. Citronensäurer Kalk.

12. Zucker- oder Sauerklee-saurer
Kalk (in Flechten).

Zweite Classe.

Wasser-Mineralien —

Salze.

Im Wasser auflösliche Körper.

1. Ordnung.

Erdsalze — Mittelsalze.

Säuren mit Erden.

A. Mineralsäure:

a. Erdsäure.

1. Sunst.

Kieselerde: Fluor; Flußspath-
saure.

2. Sunst.

Thonerde: Brom; Bromsaure.

3. Sunst.

Kalkerde: Jod; Jodsaure.

4. Sunst.

Kalkerde: Cyan; Cyansaure.

b. Classensaure.

Erden mit Classen-Säuren.

5. Sunst.

Salzsaure — Boraxsaure.

6. Sunst.
Brenzsaure - Schwefelsaure.
 a. Thonerde - Alaun, 283.
 Soden-Alaun, 285. Ammon-
 Alaun, 284. Talk-Alaun, 285
 b. Talkerde - Bittersalz, 299

7. Sunst.
Erzsaure - Arseniksaure.
 B. Elementensaure.

8. Sunst.
Wassersaure - Kochsalzsaure.
 a. Talkerde; in Salzsoolen u.
 in Mineralwasser.
 b. Schwererde - Terra ponderosa salita.
 c. Strontian-Erde; in Feuerwerken.
 d. Talkerde - Fixer Salmiak;
 in Salzsoolen.
Ehlorkalk zum Bleichen.

9. Sunst.
Luftsaure - Salpetersaure.
 a. Strontian; in Feuerwerken.
 b. Kalt - Raucher-Salpeter, 295.
 10. Sunst.

- Feuersaure - Kohlensaure.**
 Ueberkohlensaure Talkerde; in
 Sauerbrunnen.
Essigsaurer Kalt.

II. Ordnung.

- Salz-Salze - Neutral-Salze.**
 Säuren mit Laugen.

A. Mineralsaure.

1. Sunst.

- Flussspathsaure.**

2. Sunst.

- Bromsaure.**

3. Sunst.

- Jodsaure.**

4. Sunst.

- Evanfsaure.**

5. Sunst.

- Salzsaure - Boraxsaure.**

1. Boraxsaure - Cassolin, 293

2. Boraxsaure Sode - Zinkal
 (Borax), 293

6. Sunst.

- Brenzsaure.**

- a. Schwefelsaure, 296

1. Sode - Glauberit, 298. Glau-
 bersalz, 296. Thénardit, 297

2. Pottasche - Duplicat-Salz
 (Weichrest-Salz, Tartarus vi-
 triolatus), 298

3. Ammon - Mastcagnin, 300
 Scheeles Glaubersalz.

- b. Phosphorsaure.

1. Sode - Verfallsalz.

2. Sode u. Ammon - Harn-
 salz (Sal microcosmicum).

7. Sunst.

- Erzsaure.**

- a. Chromsaure Pottasche;
 als Farbe.

- b. Molybdänsaure Pott-
 asche.

- c. Spießglassaure Pott-
 asche - Antimonium diapho-
 reticum.

- d. Arseniksaure Pottasche -
 Liquor arsenicalis Fowleri.

- B. Elementensaure.

8. Sunst.

- Wassersaure - Kochsalzsaure.**

- a. Sode - Steinsalz, 287

- b. Pottasche - Digestiv-Salz,
 289

- c. Ammon - Salmiak, 289

9. Sunst.

- Luftsaure - Salpetersaure.**

- a. Sode - Raucher-Salpeter, 295.
 Würfel-Salpeter, künstlich.

- b. Pottasche - Kali-Salpeter,
 294.

- c. Ammon - flammender Sal-
 peter.

- d. Weinsäure Pottasche -
 Weinstein-Rahm (Cremor tar-
 tari).

- Pottasche und Ammon - auflös-
 licher Weinstein.

10. Sunst.

- Feuersaure - Kohlensaure.**

1. Sode - Soda, 290. Trona,
 291. Geylssitt, 292

2. Pottasche - Weinssteinsalz
 (Sal tartari).

3. Ammon - Hirschhornsalz.

- Organische Neutral-Salze.**

1. Zucker- oder Sauerklee-
 saure Pottasche - Sauer-
 klee-salz.

- Zuckersaures Ammon.

2. Essigsäure Sode - Terra
 foliata tartari crystallizata.

- Essigsäure Pottasche -
 Terra foliata tartari.

- Essigsäures Ammon.

3. Ameisensäure Pottasche.

III. D r d u n g.

Brenz-, Salze – Seifen.
Auflöslche u. verbrennlche Stoffe.

A. Mineral-, od. Ird.-
seifen.

**Schwefellebern und Laugen-
seifen.**

a. Erdseifen.

1. Sunst.

Riesgl.-Schwefelleber.

2. Sunst.

Thau-Schwefelleber.

3. Sunst.

Talp.-Schwefelleber.

4. Sunst.

Kalk-Schwefelleber
(Hepar sulphuris calcareum).

Kalk-Phosphorleber
(Hepar phosphoria calcareum).

b. Classenseifen.

5. Sunst.

**Salzseifen – Laugen-
Schwefellebern.**

Pottasche – gemeine Schwefel-
leber (Hepar sulphuris).

Ammon-flüchtige Schwefelleber.

6. Sunst.

Brenz-Seifen – Fettseifen:
Fett und Laugen.

a. Soden-Seife – harte Seife
(Fett und Sode).

Venetianische Seife (Baumöl u.
Sode).

b. Pottaschen-Seife – weiche od.
grüne Seife (Talg und Pott-
asche).

c. Ammon-Seife – Linimentum
volatile.

7. Sunst.

Erzseifen – Pflaster:

Verbindungen von Fett u. Metall-
salzen; kaum auflöslch.

Bleypflaster (Emplastrum alachy-
lon); Bleypfah u. Baumöl.

b. Elementenseifen.

8. Sunst.

Wasser-Seifen – Schleime.

a. Pflanzen-Schleime – Salep,
Balwurz, Eibisch, Leinsamen,
Nuttsternchen.

Gummi – arabisches, Rirsch-
gummi, Tragant.

Thierschleim oder Roh; Speichel,
Ragenast.

b. Pflanzen-Gallert – von Lan-
gen: Frucht-Gallert (Dectin).
Thier-Gallert od. Leim – Rirsch-
horn-Gallert, Haufenblase.

c. Pflanzen-Epweiss.

Thier-Epweiss, Eyer.

d. Gerinnbare Lymphe, Blut,
Milch.

e. Harnstoff, Harn.

f. Galle.

9. Sunst.

Luftseifen – Zucker.

a. Holzzucker, Traubenzucker,
Schleimzucker, Syrup, Manna,
Bärenbreck.

b. Milchwucker.

Delzucker, Honig, Methyl.

c. Pflanzenast; Wein, Bier.

10. Sunst.

Feuerseifen – Extracte:
Laugenartige organische, meist bis-
tere und betäubende Stoffe.

* Nicht flüchtige.

1. Bittere.

Alce, Coloquinten, Rhabarber.

Chinin; schwefelsaures, phosphor-
saures, kochsalzsaures, salpeter-
saures.

Chinonin; schwefelsaures, Koch-
salzsaures, salpetersaures.

2. Scharfe.

Piperin, Asperagin, Emetin,
Veratrin.

3. Gifftige.

Morphin im Oplum; schwefel-
saures, salpetersaures, essig-
saures.

Narcotin im Oplum.

Strychnin.

Solanin.

Merocerin aus d. Gockelskörnern.

4. * Flüchtige.

Nicotin aus dem Taback; schwefel-
saures, essigsaures. Conin.

6. Thierische Laugen der Art.
Oborin, Dianin, Crystallin.

IV. D r d u n g.

Erzsalze – Vitriole.

Auflöslche Metall-Salze.

A. Mineral- oder Ird.-
Vitriole.

a. Erdsaur.

1. Sunst.

Flußspathsaur.

2. Sunst.
- Bromsaure.
3. Sunst.
- Jodsaure.
4. Sunst.
- Cyanisaure.
- b. Classensaure.
5. Sunst.
- Salzsaure — Boraxsaure.
6. Sunst.
- Brenzsaure — Schwefelsaure.
- a. Eisen.
1. Grün- oder Eisen-Bitriol, 302
- Schwefelsaures Eisen-Orpd, 303
2. Botryogen, 303. Coquimbis, 304
- b. Braunstein-Bitriol.
- c. Uran-Bitriol, 305
- d. Schwefelsaures Chrom-Kali.
- e. Kobalt-Bitriol, 305.
- f. Blauer oder Kupfer-Bitriol, 304
- g. Weißer oder Zink-Bitriol, 305
7. Sunst
- Ergsaure.
- a. Chromsäure.
- b. Nolyddänssäure.
- c. Osminssäure.
- d. Arsenikssäure — Weißer Arsenit
oder Rattengift.
- B. Elementen-Bitriole.
- a. Sunst.
- Wassersaure — Kochsalzsaure.
- a. Eisen — Liqueur anodinus bestu-
scheffil.
- Eisenhaloid, 306.
- Ammon-Eisenhaloid, 306
- b. Chrom — Chlorchrom.
- c. Osmin — Chlorosminum.
- d. Kupferhaloid, 306
- e. Spießglas — Spießglasbutter.
- f. Zinn — Spiritus fumans libavil.
- g. Quecksilber — Mercurius dulcis
- a. Calomel, Mercurius sublimatus.
9. Sunst.
- Luftsaure — Salpetersaure.
- a. Eisen — Stahl Eisen-Tinctur.
- b. Wismuth — Magisterium bis-
muth.
- c. Quecksilber — Mercurius solubi-
lis Hahnemanni.
- d. Silber — Hllenstein.
10. Sunst.
- Feuersaure — Kohlen-saure.
1. Weinsaures Eisen mit Pottasche
— Globuli martialis s. Tartarus
martiatum.

Apfelsaures Eisen — Apfel-Extract.
Essigsaures Eisen — Tinctura ferri
acetici.

- Blut- oder blausaures Eisen.
2. Essigsaures Kupfer — destillierter
Grünspan.
3. Weinsaures Spießglas — Brech-
weinstein.
4. Essigsaures Blei — Bleizucker.
5. Cyan-Quecksilber.
- Blausäures Quecksilber.
- Knallsaures Quecksilber — Knall-
Quecksilber zu Händhütchen.
6. Knallsaures Silber — Knallsilber.

Dritte Classe.

Luft-Mineralien — Brenze.

1. Ordnung.
- Erd-brenze — Kohlen.
- Verbrennen,
ohne vorher zu schmelzen.
1. Sunst.
- Erdkohlen.
- Steinkohlen, 307
2. Sunst.
- Salzkohlen.
- Schießpulver.
3. Sunst.
- Brenz-kohlen.
- Kohlenblende, 306
4. Sunst.
- Erg-kohlen.
1. Reißbley, 319
2. Pyrrorhit, 220
5. Sunst.
- Wasserkohlen.
- Torf 311
6. Sunst.
- Luft-kohlen.
- Braunkohlen, 309
7. Sunst.
- Feuer-kohlen.
- Holz-kohlen, Holz.
- Stärke, Kleber.
- Faserstoff, Räs.
- II. Ordnung.
- Salzbrenze — Fette.
- Werden flüssig, ehe sie verbren-
nen; verwandeln sich in Säu-
ren und bilden Seifen mit den
Laugen.

1. Sunst.
Erdfette.
Ballrath, Fettwachs, Talg, Stearin,
Olein.

2. Sunst.
Salzfette.
Schmalz, Thran.

3. Sunst.
Brenzsfette.
Butter, Rahm.

4. Sunst.
Erzfette.

Wachs.

5. Sunst.
Wasserfette — Pflanzen-
buttern.
Sacaobutter, Palmöl, Muscatbut-
ter, Lorbeeröl.

6. Sunst.
Luftfette — trocknende Oele.
Leinöl, Ruspöl, Hanföl, Rohnöl.

7. Sunst.
Feuerfette — schmierige
Oele.
Räböl, Baumöl, Mandelöl.

III. D r d n u n g.

Brenzbrenze — Harze.
Spröb und flüßig, riechen stark
und werden weich vor dem Ver-
brennen.

1. Sunst.
Erdfharze.

1. Schwefel, 311
2. Schwefel-Alcohol (Kohlenschwefl).
3. Raufgelb, 449. Realgar, 450
4. Selen; nur in Verbindung mit
Schwefel oder Metallen.
5. Boron; in der Borarsäure.
6. Phosphor.

2. Sunst.
Salzhharze:
Säuren oder Salze mit Schwefel
oder Phosphor.
Chlorschwefel: Chlorkali-Schwefel-
hölzchen; Streich-Räböhölzchen
(mit Phosphor).

3. Sunst.
Brenzharze.
1. Bergtalt (Opocerit), 317
2. Naphthalit, 317
3. Erbspeck, 315
4. Glatzgit, 316
5. Retin-Asphalt, 315
6. Bernstein, 313

7. Fichtenharz, Coleophonium, Co-
pal, Dammar-Harz, Drachen-
blut, Gummilack, Mastix, Sto-
rax, Weihrauch, Benzoe.

8. Federharz.

4. Sunst.
Erzhharze — Balsame:
Harze mit ätherischen Oelen.
Terpenthin, Copaiva-Balsam, Peru-
Tolu-, Mecca-Balsam.

5. Sunst.
Wasserharze — Stink- oder
Gummiharze.
Teufelsbreck, Galbannum, Gummigut-
t, Morrhe, Opium.

6. Sunst.
Luftharze — ätherische Oele.
1. Steinöl, 318
2. Thier.

3. Bernsteinöl, Hirschhornöl (Dip-
pels-Oel).
4. Campher, Zimmetöl, Nägeleindöl.
5. Terpentinöl, Sajeput-, Anis-,
Fenchel-, Fasel-, Rosmarin-,
Sensöl.

7. Sunst.
Feuerharze — Geiste.
1. Weingeist.
2. Aether oder Naphtha, Schwefel-,
Essig-, Salpeter-, Salz-Naph-
tha; Ameisen-Spiritus.

IV. D r d n u n g.

Erzbrenze — Farben.
1. Sunst.
Erdfarben — Flechtenfarben.
Orseille, Persio, Lacmus.

2. Sunst.
Salzfarben — auflöbliche
Wurzeln u. Holzfarben;
Auflöblich in Wasser u. Weingeist.
a. roth: Krapp, Fernambuk.
b. gelb; Wan, Gelbholz.

3. Sunst.
Brenzfarben — harzartige
Wurzeln u. Holzfarben:
Fast nur im Weingeist auflösbar.
a. roth: Alcanna, Sanderloth, Cal-
liatur-Holz, Drachenblut-Roth,
Blauholz-Roth (Sämatin), Lac-
lac.
b. gelb: Curcuma, Rhadabararin.
c. grün: Blattgrün.

4. Sunst.

Erbsenfarb.

glänzen geläutet metallisch.

a. roth: Chisarothe von Bignonichica.

b. gelb: Quercitron.

c. blau: Waid oder Indigo.

5. Sunst.

Wasserfarben — Saftfarben;
auflöslich in Wasser.

a. Stengel-saft — Saftgrün.

b. Frucht-saft — Kermes-saft.

6. Sunst.

Luftfarben — Blütenfarben.

a. roth: Cassio.

b. gelb: Cassian, Olean.

7. Sunst.

Feuerfarben — theiervische
Farben.

Scharlach, Carmin (Scharlach mit
Zinn- und Wasser).

Blutroth, Gallenbraun, Harzgelb.

Vierte Classe.

Feuer: Mineralien —

Erze.

(Vergl. meine Schrift: das na-
türliche System der Erze.
Jena, bei Frommann, 1809. 4.)

h. D r d u n g.

Erz: Erde — Ocher.

A. Erd-Ocher:

Metall-Oxyde, schwerflüchtig u. meist
crystallisirt.

a. Erd-Ocher:

Metall-Oxyde, mit Erden verbunden.

1. Sunst.

Kiesel-Ocher:

Metall-Oxyde mit Kieselerde, ohne
Säuren und Wasser.

a. Eisen.

1. Lignit, 254

2. Wehrst.

b. Cererium.

3. Allanit, 200.

c. Braunstein.

4. Braunsteinfels.

d. Kupfer, 265

5. Diopas, 298

e. Spieglas.

6. Weisspiegelglas: Erz, 245.

f. Zink.

7. Zinkglas, (Zink-Zinkspath),
366

8. Zinnstein.

2. Sunst.

Zinn-Ocher:

Metall-Oxyde mit Zinn-erde.

a. Zinn-erde.

1. Rother Zinn-erdestein, 331

2. Zinn-erde, 320

3. Zinn-Manganerz (Siegen).

4. Zinn-Manganerz, 383

b. Zinn-Oxyde.

4. Zinn-Oxyd.

5. Zinn-Oxyd, 201

c. Zinn-Ocher:

6. Zinn-Oxyd, 201

7. Zinn-Oxyd.

3. Sunst.

Zinn-Ocher:

Metall-Oxyde mit Zinn-erde.

Eisen.

1. Groggerstein (strahlige Grün-
Eisen-erde).

2. Blau-Eisenstein (Crocody-
lit), 357

4. Sunst.

Kalk-Ocher:

Metall-Oxyde mit Kalk-erde.

a. Braunerstein, 334

1. Braunerstein, 336

2. Schwarz-Manganerz (Hans-
mannit), 337

3. Hart-Manganerz (Villome-
lan), 338

b. Zinn-Ocher.

4. Zinn-Ocher, 280

b. Glaser-Ocher:

schwerflüchtige reine Oxyde.

5. Sunst.

Salz-Ocher:

Ocher mit etwas Säure, nicht
gesättigt.

a. Etwas Schwefelsäure.

1. Schwer-Manganerz.

b. Etwas Phosphorsäure.

2. Eisen-Eisen (Wiesenerz), 362

3. Eisen-Manganerz (Stilpno-
siderit — schlackiger Braun-
Eisenstein), 359

4. Zinn-Ocher, 268

c. Weis-Ocher.

5. Kiesel-Weis-Ocher.

6. Zinn-Ocher (eine Grün-Eisen-
erde).

6. Sumpf.

Brenz-Döher:

reine Döher ohne Metallglanz.

a. Tantal.

1. Tantalit, 327

2. Columbit, 328

b. Wolfram.

3. Wolfram, 328

c. Uran.

4. Uran-Döher, 344

d. Titan.

5. Rutil, 342

6. Anatas, 344

e. Zinn.

7. Zinnstein, 340

f. Zink.

8. Roth-Zinkerz, 348

7. Sumpf.

Erz-Döher:

Dryade oder Halbkalke ohne Wasser; mit metastasischem Glanz.

a. Eisen.

1. Eisenglanz, 320

2. Rothblei, 329

3. Magneteisen, 320

4. Sinterkisen (Franklinit), 326

b. Titan.

5. Titan-Eisen, 323

6. Titanit, 323

7. Titan, 324

8. Menaccan (Eisen-Titan) 324

9. Zerin, 325

10. Eriochtonit.

c. Chrom.

11. Chromeisen, 322

d. Kupfer.

12. Rothkupfer, 346. Siegelerz, 347

B. Elementen-Döher:

meist leichtflüchtige Dryde, gewässert oder verwittert.

9. Sumpf.

Wasser-Döher:

Dryde mit Wasser (Hydrate).
1. Nebst Kieselerde.

a. Eisen.

1. Zbranit, 355

2. Gillingit (Gillingit), 355

3. Cronstedt, 356

4. Sidero-Schizolith, 355

5. Stilpnomelan.

b. Cererium.

6. Kiesel-Cererit, 348

2. Ohne Erden.

a. Eisen.

7. Braun-Eisenstein (Glas-
kopf), 331

8. Gelb-Eisenstein.

9. Schist (Eisenglimmer) 333

b. Braunstein.

10. Braun-Braunsteinerz, 334

11. Weich-Manganerz (Pyro-
lusi), 333

12. Manganit, 336

13. Kupfer-Mangan, 339

9. Sumpf.

Luft-Döher - Nutze:

verwitterte Döher schwerflüchtiger
Metalle.

1. Umbra (Eisen), 332

2. Gelberde, 215

3. Braunstein (Mangan).

4. Wolfram-Döher, 348

5. Uran-Döher, 349

6. Chrom-Döher, 349

7. Wasserblei-Döher, 348

8. Kupferschwärze, 347

9. Nisichschwärze.

10. Kobaltschwärze.

11. Kobalt-Döher, 350

10. Sumpf.

Feuer-Döher - Metallblätchen,
Beschläge:

verwitterte Döher leichtflüchtiger
Metalle.

1. Spiesglasweiß, 343

2. Spiesglas-Döher, 349

3. Mennige, 350

4. Bleiglatte.

5. Wismut-Döher, 350

6. Arsenit-Schwärze.

II. D r y a d e n .

Salzerze - Salze (bas).

Gesättigte unlösliche Metalle.

A. Erdhalde.

1. Sumpf.

Kieselhalde - Flußspathsaure.
Fluor-Cererium, 357

2. Sumpf.

Erdhalde - Bromsaure.

3. Sumpf.

Kalkhalde - Jodsaure.

4. Sumpf.

Kalkhalde - Chansaure.

5. Sumpf.

Salzhalde - Boraxsaure.

6. Sunst.
Brenzhalbe — Schwefelsaure.

a. Eisen.

1. Gelb-Eisenerz (Wiso).

b. Kupfer.

2. Brochantit, 390

c. Blei.

3. Caledonit.

4. Kupfer-Bleypitriol, 374

5. Pitriol-Blei, 373

6. Diorylit.

2. Phosphorsaure.

a. Eisen.

7. Grüneisen, 359

8. Triphylin.

9. Eisenblau (Blau-Eisen-Erde, Glaucofiderit).

b. Braunstein.

10. Eisen-Pecherz, 361

c. Cererium.

11. Edwardst.

d. Uran.

12. Uran-Glimmer, 396

e. Kupfer.

13. Phosphor-Kupfererz, 391

14. Sibethenit.

f. Blei.

15. Grünblei, 376. Braunblei. Kusslerit.

7. Sunst.
Erzsaure.

a. Wolframsaure.

1. Wolframblei.

b. Vanadinsaures Blei.

2. Vanadin, 382

c. Chromsaures Blei.

3. Rothblei, 280

4. Melanochroit.

5. Bauguelinit, 381

d. Wasserbleysaure.

6. Gelbblei, 378

e. Arseniksaure.

a. Eisen.

7. Würfelers (Pharmaco-Siderit), 300

8. Scorodit, 361

9. Eisensinter (Witticit), 362

b. Kupfer.

10. Strahlerz (Siderochalcit), 394

11. Zinsenerz (Chalcophacit), 393

12. Erinit.

13. Olivenerz, 392

14. Euchroit, 393

15. Kupferglimmer, 395

16. Kupferschaum, 395

c. Nickel.

17. Nickelblüthe, 398

d. Kobalt.

18. Kobaltblüthe, 397

e. Blei.

19. Arsenitblei, 377

B. Elementenhalbe.

8. Sunst.

Wassersaure — Kochsalzsaure.

a. Kupfer.

1. Salzkupfer, 390

b. Blei.

2. Hornblei, 382

3. Mendipit.

c. Quecksilber.

4. Hornquecksilber, 385

d. Silber.

5. Hornsilber, 384

9. Sunst.

Luftsaure — Salpetersaure.

10. Sunst.

Genersaure.

Kohlensaure.

a. Eisen.

1. Zunderit, 353

2. Eisenspath, 351

3. Dinte (gerbsaures Eisen).

4. Oxalit, 301 (zuckersaures Eisen).

b. Braunstein.

5. Roth-Braunsteinerz, 364

c. Cererium.

6. Hydro-Cererit.

d. Kupfer.

7. Kupferlasur, 388

8. Malachit, 386

e. Blei.

9. Weißblei, 372

10. Bleyerde, 384

11. Phosphinspath, 374

12. Apfelsaures Blei.

f. Sink.

13. Sinkspath, 368. Herrerit.

III. D r b ' n u n g.

Brenz-Erze — Blendes.
Metalle, mit verbrennlichen Stoffen
verbunden, gewöhnlich Schwefel.

A. Irdb-Blendes;

hart, spröde und strengflüssig.

a. Erdb-Blendes.

1. Sunst.

Kiesel-Blenden;
ohne Metallglanz, durchsichtig
und roth.

1. Mangan-Blende (Schwarzerz), 441
2. Zinkblende, 442. Boltzin.
3. Binnober, 448. Lebererz.
Kiolich.
4. Roth-Spießglaserz, 440
5. Rothgülden, Niargyrit, Hepar-
gyrit.

2. Sunst.

Eisen-Blenden — Gelse:
geschwefelte Eisen-Metalle, wie Wolf-
ram, Eisen, Braunkstein und Cere-
rium. Metallisch glänzend, gelb,
sehr hart, spröde und strengflüssig.
Grundlage: geschwefeltes Eisen.

1. Eisenties, 399
Strahltes, 402
Magnetties, 405
2. Kupferties, 412
Bunt-Kupfererz, 415
3. Bunties, 415

3. Sunst.

Zink-Blenden:
geschwefelte Zink-Metalle, wie Za-
nadium, Uran, Titan und
Chrom; künstlich.

4. Sunst.

Kalk-Blenden:
geschwefelte Kalk-Metalle, wie
Wasserbley und Osminum.
Wasserbley (Molybden-Glanz), 429

b. Classen-Blenden.

5. Sunst.

Salz-Blenden:
geschwefelte Salz-Metalle, wie
Kupfer.

1. Kupferglanz, 416
2. Kupfer-Indig, 417
3. Selenkupfer, 418
4. Fahlerz, 423
Kupfer-Fahlerz, 424
Silber-Fahlerz, 425
5. Tennantit.

6. Sunst.

Brenz-Blenden:
geschwefelte Brenz-Metalle, wie
Nickel und Kobalt.

a. Nickel.

1. Haarties, 408
2. Nickelglanz, 412

3. Wismutt-Nickelties (Nickel-Wis-
mutter-Glanz).

b. Kobalt.

4. Kobalties, 411
5. Glanzkobalt, 412

7. Sunst.

Erz-Blenden:
geschwefelte Erz-Metalle, wie Rho-
dium, Iridium, Palladium und
Platin; meist künstlich.
Selen-Palladium? (Zilkerode.)

R. Elementen-Blenden:
Schwefel mit Metallen, welche den
Elementen entsprechen.

8. Sunst.

Wasser-Blenden:
geschwefelte Wasser-Metalle, wie
Spießglas, Blei u. Zinn.

a. Spießglas.

* mit Eisen.

1. Eisen-Spießglaserz (Verthierit),
439

* mit Nickel.

2. Nickel-Spießglaserz (Spießglas-
Nickelties), 412
3. Spießglas-Nickel, 409

* rein.

4. Grau-Spießglaserz, 435
5. Blei-Spießglaserz (Sinkenit),
436

* mit Blei.

6. Federerz, 437
7. Jamesonit, 437
8. Plagionit, 438
9. Spießglas-Bleyerz (Bournonit),
438

b. Blei.

* Selen.

10. Selen-Kupferblei, 428
11. Selenblei, 427

* Schwefel.
rein.

12. Bleiglanz, 426
mit Tellur.
13. Blättererz, 433

9. Sunst.

Luft-Blenden:
Schwefel mit flüchtigen halbedeln
Metallen, wie Zink, Cadmium,
Wismutt u. Arsenit.

a. Wismutt.

* mit Kupfer.

1. Kupfer-Wismutterz, 430.
Kobalterz, 431

- * mit Blei.
2. Blei-Bismutter (Silber-Bismutter), 431
* rein.
 3. Bismutglanz, 480
* mit Tellur.
 4. Tellur-Bismut, 431
 5. Silber-Tellur-Bismut, 482
b. Ursubst.
 6. Arsenkies oder Missickel, 406
Arsenickies, 408
10. Sunst.
 - Gener. Blenden:
 - Schwefel mit edeln Metallen, wie Tellur, Quecksilber, Silber u. Gold.
 - a. Quecksilber.
 3. Selen-Quecksilber.
b. Silber.
 - * Selen.
 4. Selenit (Selen-Kupfer-Silber), 418
 5. Selen-Silber, 428
* Schwefel mit Eisen.
 6. Sternbergit (Eisen-Silber) 420
mit Kupfer.
 7. Silber-Kupferglanz, 419
 8. Polysulfid, 422
mit Spießglas.
 9. Sprödglasserz, 421
mit Spießglas u. Blei.
 10. Schmelzglas, 420
rein.
 11. Silberglanz, 418

IV. Ordnung.

Erz-Erze — Metalle.

Reine Metalle, gediegen oder gefrischt.

A. Erd-Metalle.

a. Erd-Metalle:
strengflüssig u. unedel, d. h. immer oxydirt.

1. Sunst.
Kiesel-Metalle:
kaum frischbar.

1. Tantal.

2. Sunst.

Eisenartige Metalle:
eisenartige Metalle, schwer frischbar.

2. Wolfram.

3. Eisen, 451

Meteor-Eisen, 451

Meteorsteine, 452

Gediegen Eisen, 468

4. Bad oder Braunstein, Mangan.

5. Ceritum.

3. Sunst.

Tell-Metalle.

6. Vanadium.

7. Uran.

8. Titan.

9. Cytom.

4. Sunst.

Kalt-Metalle.

10. Wasserblei (Polybden, Mischung).

11. Nismum, 473

b. Klassen-Metalle:
stengflüssig, aber edel, nehmlich
mischens gediegen.

b. Sunst.

Salz-Metalle:

säuren sich von selbst.

12. Kupfer, 459

Kupfer u. Zink in Kombinationen.

gut, Goldschmelze, Bronze.

Kupfer und Zink in Kombinationen.

Goldschmelze, Similor, Messing.

Kupfer, Zink u. Nickel in Kombinationen.

solong (Argentum, Neusilber).

6. Sunst.

Brenz-Metalle:

Gewicht maßig.

13. Nickel.

14. Kobalt.

7. Sunst.

Erz-Metalle:

sehr schwer, gediegen.

15. Rhodium.

16. Iridium, gediegen, 473

17. Palladium, gediegen, 472

18. Platin, gediegen, 470

B. Elementen-Metalle.

Leicht flüssig.

8. Sunst.

Wasser-Metalle:

Halbedel, sehr leicht flüssig, aber
nicht flüchtig.

19. Spießglas oder Zinnmetall (Antimonium).

Gediegen, 461

Spießglasnickel, 409

20. Zinn.

Zinn u. Zink in Kombinationen.

Zinn u. Blei in Kombinationen, 461

Gediegen, 466

21. Bley, 460
 Gediegen, 460
 Bley u. Spießglas in Drucker-
 schriften.
 Tellurbley, 433

9. Kunst.

Luft-Metalle:

halbedel, leichtflüchtig u. flüchtig.

22. Zink.
 23. Cadmium.
 24. Wismuth.
 Gediegen, 460. Das leichtflü-
 chige Metall ist Wismuth,
 Bley u. Zinn.
 25. Arsenik oder das Gift-Metall.
 Gediegen, 462
 Kupfernickel, 408


Arseniknickel, 409

Speiskobalt, 410

10. Kunst.

Feuer-Metalle:
 ganz edel.

26. Tellur.
 Gediegen, 461
 Weiß-Tellurerz, 434
 Schriftez, 434
 27. Quecksilber.
 Gediegen, 462
 Amalgam, 463
 28. Silber.
 Spießglas-Silber, 466
 Tellursilber, 433
 Gediegen, 464
 29. Gold.
 Gediegen, 467



Allgemeine Naturgeschichte

für alle Stände.

Erster Band.

Mineralogie.

1875-1876

1875-1876

1875-1876

1875-1876

1875-1876

1875-1876

Einleitung.

Die Naturgeschichte hat den Zweck, die einzelnen Dinge auf dem Planeten kennen zu lehren.

Diese Erkenntniß erstreckt sich sowohl auf ihre Entwicklung und Vollendung, als auf ihr Verhältniß unter einander und zum Menschen. Um ein Ding wirklich zu begreifen, muß man nicht bloß seine äußere Gestalt und seine physischen Eigenschaften kennen; sondern auch die einzelnen Theile, woraus es zusammengesetzt ist, sowohl die Organe, als die chemischen Bestandtheile. Aber auch dieses reicht noch nicht zur völligen Einsicht in das Wesen eines Dinges hin. Man muß auch wissen, wie es sich aus den chemischen Stoffen zusammensetzt, wie die mechanischen Theile oder die Organe sich allmählich entwickeln und verbinden, um eine bestimmte Gestalt darzustellen; auch dieses reicht noch nicht hin; man muß auch den Platz bestimmen, welchen sie neben einander nach ihrem Rang einnehmen, wodurch sich von selbst ihre Stellung zum Menschen ergibt, der doch am Ende das Ziel ist, in dem alle Entwicklungen der Natur zusammenlaufen.

Die Gegenstände der Naturgeschichte sind einzelne Dinge auf dem Planeten, nicht allgemeine, wie Wasser, Luft und Aether oder Licht und Wärme, deren Masse zwar den Planeten im Ganzen bilden hilft, aber nicht in einzelne von einander verschiedene Dinge zerfällt. Es gibt nur einerley Wasser, welches den Planeten umgibt; und wenn es Verschiedenheiten zeigt, wie das Meerwasser oder die Mineral-Quellen, so liegen diese nicht im Wasser selbst, sondern in fremden Beymischungen, nemlich in verschiedenen Salzen, welche dem Erd-Element angehören.

Dasselbe gilt von der Luft, welche um die ganze Erde herum einerley ist. Ebenowenig kann man mehrere Arten von Licht oder von Wärme unterscheiden. Diese drey Elemente sind daher allgemeine Materien und Gegenstände anderer Wissenschaften, nemlich der Physik, der Chemie und der Mathematik.

Betrachten wir dagegen das Erd-Element, so finden wir darinn eine plöbliche Abweichung von den vorigen. Unser Planet ist nicht aus einerley festen Massen zusammengesetzt, sondern besteht aus einer großen Menge von Dingen, welche sehr von einander verschieden sind. Wo man auch Luft schöpft oder Wasser, so ist es immer einerley; hebt man aber etwas Bestes auf, so ist es überall etwas anderes: man hat entweder Kiesel-Erde in den Händen, oder Thon-Erde, oder Kalk-Erde, oder ein Salz, Eisen, Kohle u.s.w., kurz es gibt nichts allgemein Erdiges, sondern nur einzelne Bestandtheile desselben, welche auf dem Planeten aus einander liegen. Dadurch ist allein eine Mannfaltigkeit von Dingen, und daher eine Naturgeschichte möglich: denn gäbe es nur eine Erde, wie nur ein Wasser, eine Luft und einen Aether, so könnte sich nur die Chemie, die Physik und die Mathematik damit beschäftigen.

Es liefert daher nur das Erd-Element die Gegenstände für die Naturgeschichte, und diese hat sich mit nichts anderem, als mit seinen Verschiedenheiten zu beschäftigen. Solche irdische Dinge haben aber ihre bestimmten Bestandtheile, ihre bestimmten Eigenschaften und Formen, durch welche sie sich von einander unterscheiden. Aendern sich diese Verhältnisse, so werden sie selbst etwas anderes, und stellen daher ein anderes Ding vor. Sie sind demnach untheilbar, und heißen deshalb Individuen. Die Naturgeschichte hat nur Individuen zu ihrem Gegenstande.

Wenn man ein Thier oder eine Pflanze zerschneidet, so gehen sie zu Grunde, oder wenigstens der abgeschnittene Theil; und wenn dieser auch wieder fortlebt, so wird er doch ein ganz anderer: er bekommt nemlich wieder neue Organe, einen Mund und Fäßkränze, wie bey den Polypen; wieder Eingeweide, Augen u. dergl. bey manchen Wärmern. Abgeschnittene Zweige treiben Wurzeln und werden eine ganze Pflanze, da sie vorher nur ein Theil derselben gewesen.

Es sind aber nicht bloß die organischen Körper untheilbare Dinge oder Individuen, sondern auch die unorganischen Körper. Wenn das Kochsalz chemisch getheilt wird, so zerfällt es in eine Säure und in ein Alkali oder Lauge, verwandelt sich mithin in ganz andere Dinge; ebenso, wenn sein inneres Gefüge verändert wird, nemlich wenn seine Blättchen unter andern Winkeln sich an einander legen, was gar nicht möglich ist, ohne die chemischen Bestandtheile zu ändern. Die mineralischen Körper sind demnach ebenfalls Individuen.

Eintheilung der Naturgeschichte.

Wenn Unterschiede in das Erd-Element kommen sollten, so muß eine Ursache dazu vorhanden seyn. Diese liegt aber außer demselben: denn kein Ding verändert sich durch sich selbst. Neben dem Erdbigen ist aber nichts mehr vorhanden als Wasser, Luft und Aether oder Feuer. Diese drey haben darauf gewirkt und Unterschiede in ihm hervorgebracht. Was aber auf ein anderes mit Erfolg wirkt, theilt demselben etwas von seinen Eigenschaften mit, oder verbindet sich auch wohl ganz damit, und bildet einen neuen Körper, welcher die Eigenschaften von beiden besitzt. Die drey allgemeinen Elemente können sich aber mit dem Erd-Element nur auf dreyerley Art verbinden. Entweder tritt nur ein einziges Element daran, wie Wasser, Luft oder Feuer, und der Körper besteht aus einer bloß zweyfachen Verbindung. Oder es tritt Wasser und Luft zugleich an das Erdbige, wodurch eine dreyfache Verbindung entsteht. Oder endlich es tritt Wasser, Luft und Aether daran, und es bildet sich ein Körper von vierfacher Verbindung.

Durch die zweyfache Verbindung entstehen Mineralien,
durch die dreyfache Pflanzen,
durch die vierfache Thiere.

Um dieses einzusehen, müssen wir zuerst die einzelnen Elemente genauer betrachten.

1. Aether oder Feuer.

Der Aether ist die erste, unendlich dünne und deshalb leichteste Materie, welche den ganzen Weltraum ausfüllt, ist mithin die

Grundmasse, durch deren Verdichtung alle schweren oder wägbaren Materien entstehen. Wenn dieser Aether in die schweren Materien dringt und dieselben ausdehnt, so erscheint er als Wärme. Wenn er umgekehrt sich zwischen zwey verschiedenen schweren Materien befindet, und von denselben polarisirt oder gleichsam electrifizirt wird, so erscheint er als Licht, so wie es durch die Wechselwirkung der Sonne und der Planeten zum Vorschein kommt. Licht und Wärme aber sind in Verbindung mit der feinen Materie des Aethers Feuer. Der Aether erscheint demnach unter drey Zuständen. Einmal als die ursprüngliche Materie oder als Schwere, wodurch er in sich selbst ruht, und nach einem Mittelpunkte oder Centrum strebt, welches sich als Sonne zeigt; dann als Wärme, welche sich auszudehnen strebt, und an den Gränzen des Aethers die Planeten hervorbringt; und endlich als Licht, welches zwischen beiden, nemlich dem Centrum und der Peripherie die Verbindung herstellt, und beide in Thätigkeit erhält.

2. L u f t.

Dieses Element muß als eine Verdichtung des Aethers betrachtet werden, worinn aber die Wärme das Uebergewicht hat. Wir können darinn dreyerley Stoffe unterscheiden, welche durch die drey Thätigkeiten des Aethers bestimmt sind. Hundert Theile bestehen aus 80 Theilen Stickgas, 20 Sauerstoffgas, denen noch ein Theil kohlensaures Gas beygemischt ist. Das erste ist das Leichteste, und kann als entsprechend der Wärme betrachtet werden, das zweyte dem Licht, das dritte der Schwere.

Die Luft ist 800mal leichter als Wasser, und das Feld der Electricität, worinn eigentlich ihre Thätigkeit besteht, deren letzte Wirkung die Oxydation oder die Verbindung des Sauerstoffs mit andern Stoffen, d. h. das Verbrennen, ist; das allgemeine Product dieser Verbindung ist der Regen.

3. W a s s e r.

Dieses Element besteht aus 85 Theilen Sauerstoff und 15 Wasserstoff, welcher wahrscheinlich der Hauptbestandtheil des Stickgases ist. Die Bestandtheile sind mithin im umgekehrten Verhältnisse mit der Luft, nemlich mehr Sauerstoff und weniger

Stickstoff oder Wasserstoff. Jener scheint dem Lichte zu entsprechen; wenigstens ist er unter den schweren Stoffen ebenso der Grund aller Thätigkeit, wie das Licht im Aether. Es ist auch wahrscheinlich etwas Kohlenstoff im Wasser, den man aber noch nicht dargestellt hat. Das Wasser muß demnach als verdichtete Luft betrachtet werden, mit veränderten Bestandtheilen.

Die eigenthümliche Thätigkeit, welche im Wasser vorgeht, ist der chemische Proceß.

4. E r d e.

Das Erd-Element kann betrachtet werden als dasjenige, worinn der Kohlenstoff vorherrscht; wenigstens bestehen die eigentlichen Erden aus Metall mit Sauerstoff verbunden. Die Metalle aber können als geschmolzener Kohlenstoff angesehen werden. In andern erdartigen Körpern, wie in den Salzen und der Steinkohle, und wahrscheinlich auch im Schwefel, ist gewöhnlich noch Wasserstoff enthalten, so daß das Erd-Element ebenfalls aus den drey Grundstoffen besteht, worinn aber der Kohlenstoff die Hauptmasse bildet. Er entspricht ohne Zweifel der Schwere, welche die Festigkeit in den Materien hervorbringt.

Die eigenthümliche Thätigkeit des Erd-Elements äußert sich im Magnetismus oder in der Crystallisation.

Wenn nun das Erdige für sich allein existiert, so ist es in der Regel fest, und hat daher keine Bewegung seiner Bestandtheile, wie Kiesel, Thon, Kalk, Kalk u.s.w. Solch einen Körper, dessen Theile alle gegen einander in derselben Lage oder in beständiger Ruhe bleiben, nennt man todt oder unorganisch, auch Mineral.

Es gibt aber viele Mineralien, welche auch Wasser enthalten, wie die Salze, und dennoch die Lage ihrer Theile nicht ändern oder keine innere Bewegung haben, weil das Wasser selbst vom dem Erdigen überwältigt und darinn fest geworden ist.

Ebenso enthalten Mineralien Luft oder besitzen deren Eigenschaften, sind electrisch und verbrennen durch ihre eigene Hitze, wie die Steinkohle, der Schwefel, die Harze u. dergl., aber auch hier hat die Luft ihre Gestalt verloren, und ist fest geworden.

Endlich gibt es sehr schwere, glänzende und wie geschmolzen aussehende Mineralien, welche mithin die Eigenschaften der Schwere, des Lichts und der Wärme erhalten haben, aber dennoch weder selbst leuchten, noch sich bewegen, und daher unter die todtten Stoffe gerechnet werden müssen, wie die Erze oder Metalle.

Wir sehen hieraus, daß zweyfache Verbindungen der Elemente ebensowenig etwas Lebendiges hervorbringen, als das Erd-Element allein.

Organische Körper.

Betrachten wir eine Pflanze, so besteht sie aus festen oder erdigen Theilen, welche sich bey'm Verbrennen größtentheils als Kohlenstoff zeigen. In diesen erdigen Theilen ist aber Wasser enthalten, und zwar im flüssigen Zustande, welches sich hin und her bewegt, wie die Quellen auf der Erde. Außerdem haben sie Höhlen für die Luft, welche gleichfalls unaufhörlich aus- und einbringt, und die festen Theile electrifizirt und oxybiert, ganz so, wie es die Luft im Freyen thut. Hier sind also die drey Elemente des Planeten mit einander auf eine Weise verbunden, daß jedes seinen Charakter und seine Thätigkeit behält, und dennoch alle drey ein geschlossenes und untheilbares Ganzes bilden. Solch einen geschlossenen Körper, in welchem die Luft weht und oxybiert, in welchem das Wasser fließt und auflöst, in welchem das Erdige beständig sich verändert, sich gestaltet und zerstört, nennt man einen organischen oder lebendigen.

Zu einem Organismus gehören daher mindestens drey Elemente, welche sich so das Gleichgewicht halten, daß keines von dem andern überwältigt wird, das Wasser und Luft nicht ganz fest werden, und das Feste nicht flüssig und lustig wird. Der aus der Wechselwirkung der drey Elemente entspringende Proceß, welcher den magnetischen, electrischen und chemischen in sich vereinigt, heißt Galvanismus, welcher daher als der eigentliche Lebensproceß betrachtet werden muß.

Das erste organische, was mithin auf dem Planeten entsteht, ist die Pflanze, eine dreyfache Verbindung der planetarischen Elemente. Die Pflanze hat ihr Erd-Organ in dem

Zellgewebe, welches ein Haufen von hohlen Erystallen ist, worinn sich das Wasser beständig umbreht, wie ein Wassertropfen auf glühendem Eisen. Ihr Wasser-Organ besteht in den Saftrohren, worinn das Wasser nach allen Seiten strömt, wie in den Flüssen auf dem Planeten. Ihr Luft-Organ endlich besteht in den Spiralgefäßen, welche die Luftröhren für die Pflanze sind.

T h i e r e.

Es ist jetzt nur noch eine Verbindung möglich, daß nehmlich auch der Aether mit seinen Thätigkeiten unverändert in den Organismus der Pflanze aufgenommen wird. Dadurch bekommt er einen eigenen Schwerpunct oder ein Centrum, welches ihn selbstständig macht vom Planeten, so daß er frey schweben kann, wie die Sonne im Weltraum. Er bekommt ferner die Eigenschaften der Wärme, nehmlich die Ausdehnung und Zusammenziehung, oder die selbstständige Bewegung in allen seinen Theilen, kurz ein Bewegungssystem. Endlich erhält er auch die Eigenschaften des Lichts, wodurch das Bewegungssystem in Thätigkeit gesetzt, und der ganze Körper auf einen Mittelpunct bezogen wird.

Solch ein organischer Körper, welcher vom Planeten frey ist, oder ein eigenes Centrum in sich hat, und welcher sich selbstständig bewegen kann, heißt Thier.

Das Erd-Organ des Thiers ist das Gefäßsystem oder vielmehr das Blut, woraus sich die ganze Masse des Leibes bildet und ernährt.

Sein Wasser-Organ ist der Darmcanal, welcher die Speisen verdaut oder auflöst.

Sein Luft-Organ ist die Lunge oder Kieme, wodurch das Blut Luft empfängt und wieder abgibt.

Ebenso gibt es drey Organe für die Schwere, die Wärme und das Licht, nehmlich das Knochen-, Muskel- oder Bewegungssystem und die Nerven, deren höchste Ausbildung sich als Auge oder wirkliches Sichtorgan darstellt.

Unterschied des Organischen vom Unorganischen.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Organischen und Unorganischen liegt in der Verbindung der Elemente in einem

einzelnen Körper. Besteht er nur aus einem oder zweien, so kann keine fortdauernde Thätigkeit in ihm statt finden, und er ist daher todt oder unorganisch. Besteht er aber aus dreien, so treten sie in einen galvanischen Proceß zusammen, dessen gemeinschaftliche Erscheinung wiederholte oder fortdauernde Bewegung, der Charakter des Lebens ist.

Für die Erscheinung gibt es daher nur einen einzigen Unterschied des Organischen und Unorganischen, nemlich die selbstständige und wiederholte Bewegung innerhalb der Gränzen eines Körpers. Wo keine Bewegung wahrzunehmen ist, oder wo sie nur einem fremden Einfluß folgt, z. B. der Schwere, da ist der Körper todt oder unorganisch. Wo sich aber eine Bewegung zeigt, die im Körper selbst und aus seinen eigenen Kräften hervorgeht, den nennen wir lebendig. Organisch ist demnach ein einzelner Körper, welcher sich selbst bewegt; unorganisch ein solcher, welcher in allen seinen Theilen ruht oder nur durch fremden Einfluß bewegt wird.

Es gibt noch eine Menge Unterschiede, die man theils auf die Bestandtheile, theils auf die Form, theils auf die einzelnen Organe u.dgl. gegründet hat.

Allein wenn man auch wirklich dadurch das Unorganische vom Organischen unterscheiden kann; so wird doch damit der Begriff nicht erschöpft und der wesentliche Unterschied nicht herausgehoben. Es ist allerdings wahr, daß die unorganischen Körper meistens aus wenigen Stoffen bestehen und gewöhnlich aus solchen, die in den organischen gar nicht, oder nur in geringerer Menge vorkommen, wie aus den Erden, Salzen, Inflammabilien und Metallen: allein sie bestehen auch aus Kohlenstoff, welcher der Hauptbestandtheil der Pflanzen ist. Manche, wie gewisse Salze, bestehen größtentheils aus Stickstoff, welcher die Grundlage des thierischen Leibes bildet. Und dann beruht ja das Wesentliche des Lebens nicht in der Materie, sondern in der Bewegung und der Verwandlung derselben. Wenn also gleich ein Körper größtentheils Kohlen- oder Stickstoff liefert und daher wahrscheinlich ein Pflanzen- oder Thierkörper ist, so kann man es doch nicht als ein sicheres und noch weniger als ein erschöpfendes Merkmal betrachten.

Was die Gestalt betrifft, so ist sie zwar bey Thieren und Pflanzen bestimmt, wenigstens in den einzelnen Theilen, wie in den Blättern und Blüthen, im Kopfe, Mund u. dgl.; allein es gibt auch viele unorganische Körper, die eine bestimmte Gestalt haben und zwar noch strenger als bey Pflanzen und Thieren, nemlich in den Crystallen. Dagegen ist es richtig, daß man die Gestalten der organischen Wesen immer aus der Kugel- oder Blasenform ableiten oder darauf zurückführen kann, während die unorganischen Formen immer vielerley sind.

Auch die Größe gibt kein hinlängliches Kennzeichen. Zwar können die unorganischen Körper, selbst die Crystalle, eine ganz unbestimmte Größe haben, während sie bey Pflanzen und Thieren nicht leicht ein gewisses Maas überschreitet; indessen ist dieses doch in sehr vielen Fällen so voll Abweichungen, daß auf den Werth dieses Unterschieds nicht viel zu geben ist.

In der Regel ist die Masse der unorganischen Dinge gleichartig und dicht, ohne abgesonderte innere Theile und Höhlen; die organische Masse dagegen ungleichartig und aus verschiedenen Theilen zusammengesetzt, welche überdieß Höhlen und Röhren in sich haben, worinn Flüssigkeiten enthalten sind. Das könnte aber auch bey unorganischen Körpern der Fall seyn und dennoch wären sie nicht lebendig, wenn sich weder ihre Höhlen noch deren Säfte bewegen.

Ein richtigerer Unterschied ist das Wachsthum, welches sich aber schon auf die Bewegung gründet und dieselbe voraussetzt. Unorganische Körper, sagt man, wachsen nicht mehr, wenn sie einmal vollendet sind, oder ihre vollkommene Gestalt erreicht haben; Pflanzen und Thiere dagegen haben schon in der Jugend die Gestalt, welche sie immer behalten werden und dennoch können sie noch größer werden. Was daher wächst, ist organisch, was dagegen stehen bleibt, unorganisch. Wollte man es hier streng nehmen, so würde auch dieser Unterschied nicht viel sagen. Die Crystalle haben auch bey ihrem Anfang schon die bleibende Gestalt, sie wachsen nur viel schneller und sterben dann gleichsam ab, wenn die für ihre Vergrößerung nöthige Masse verwendet ist.

Noch richtiger ist die Art und Weise, wie das Wachsthum geschieht: Man sagt nemlich, bey den unorganischen Körpern

durch Ansehen von außen her, bey den organischen dagegen von innen. Das ist hier allerdings der Fall, sobald sie einmal ihre Gestalt erreicht haben. Bey ihrer ersten Entstehung aber schießen die Theile ebenfalls von Außen an; z. B. das Eyweiß zum Kücheldchen im Ey. Die Embryonen wachsen daher wie die Crystalle, und man könnte sagen, die Crystalle wären Embryonen, welche nachher nicht weiter wachsen. Was daher wächst, nachdem es einmal seine Gestalt vollendet hat, ist wirklich ein organisches Wesen.

Auch eine gute Unterscheidung ist die Aufnahme und Ausscheidung an Stoffen, welche bey organischen Körpern immer Statt findet, bey den unorganischen dagegen nicht; man müßte denn das Einsaugen und Ausdünsten von Wasser, mancher Erden und Salze daher rechnen, was sich aber von diesen organischen Processen dadurch unterscheidet, daß die aufgenommenen und ausgestoßenen Stoffe die nämlichen sind, während sie von den organischen Körpern verändert werden.

Noch richtiger ist die Vermehrung seiner selbst. Alle Pflanzen und Thiere vermehren sich, indem sich ein kleiner Theil von ihnen ablöst und wieder die Gestalt des großen bekommt. Das ist keinem unorganischen Körper möglich.

Inbessen alle diese richtigen Unterschiede beruhen auf der innern Bewegung der Theile, welche mithin immer der wesentliche und einzige Charakter des Organischen bleibt.

Unterschied der Thiere und Pflanzen.

Die Pflanze besteht nur aus den drey planetarischen Elementen und hat daher nur den galvanischen Proceß in ihrem Innern, welcher beständig durch den äußern Einfluß von Schwere, Licht und Wärme unterhalten wird. Sie folgt daher den Gesetzen der Schwere wie die unorganischen Körper, strebt nach dem Mittelpunct des Planeten, und ist deshalb mit dem einen Ende an die Erde gefesselt, während sie mit dem andern dem Licht und der Wärme oder der Sonne folgt. Sie hat daher nur Bewegung ihrer innern flüssigen Theile; die äußern festen aber sind zwischen Erde und Sonne gebannt und können sich daher nicht rühren, außer insofern sie durch diese äußern Einflüsse dazu

angeregt werden. Die Pflanze bewegt sich in der Erde dem Schwerpunct nach und dem Wasser, indem die Wurzel dahin wächst; in der Luft aber nach der Sonne, wohin sich die Blätter und Blüthen wenden. Die Pflanze hat daher nur Bewegung ihrer Eingeweide, aber keine Bewegung der Organe. Sie bewegt sich nur in Folge eines Reizes.

Das Thier dagegen besteht aus allen vier Elementen und trägt daher die ganze Natur in sich, hat mithin einen eigenen Mittel- oder Schwerpunct, ein eigenes Bewegungssystem und das Vermögen, die äußern Dinge wahrzunehmen, oder mit denselben in Verkehr zu treten, wie die gesammte Natur durch das Licht.

Das Thier ist demnach losgetrennt von der Erde und bewegt nicht bloß die Säfte in seinen Eingeweiden, sondern auch seine festen Theile, und zwar nicht, weil es von außen gereizt wird, sondern aus innern Kräften. Es hat zweyerley Bewegung, eine Bewegung der Säfte wie die Pflanzen, und eine der festen Theile oder der Organe, welche ihm eigenthümlich ist. Das Thier ist eine Pflanze, welche ihren Stamm, ihre Aeste, Blätter und Blüthen bewegen kann.

Kurz ausgedrückt kann man sagen: Das Thier bewegt sich ohne Reiz, aus innerer Bestimmung, ohne Einfluß von Außen.

Wenn sich die Pflanzenwurzel bewegt, nemlich weiter wächst, so geschieht es nur, weil die Anwesenheit des Wassers auf sie wirkt und sie größer oder länger macht. Fehlt das Wasser, so kann sie es nicht suchen, sondern vertrocknet und stirbt. Ebenso verhält es sich mit den Blättern und Blüthen. Sie wenden sich dem Lichte nur entgegen, wenn es wirklich auf sie fällt. Im Finstern bleiben sie ruhig an ihrer Stelle und können mithin das Licht nicht suchen, welches nicht auf sie wirkt.

Beim Thiere ist es umgekehrt: es bewegt sich gerade, weil die äußern Dinge nicht auf es wirken. Wenn es Hunger oder Durst hat, so wirkt weder Speise noch Wasser auf es; und gerade dieser Mangel von äußerem Reiz ist die Ursache, warum es sich bewegt, warum es herumläuft, um Speise und Trank zu suchen. Da aber nichts ohne Ursache geschieht, so muß der Reiz

dazu im Thiere selbst liegen. Es bewegt sich mithin ohne äußeren Reiz aus eigener Bestimmung, d. h. willkürlich.

Man muß also sagen: Die Pflanze ist derjenige Organismus, welcher nur innere, aber keine äußere Bewegung hat; Thier derjenige, dem Beides zukommt.

Oder kürzer: die Pflanze bewegt ihre Säfte, das Thier seine Organe.

Wo wir daher außer einem Saftleiter auch noch die Bewegung des Gefäßes selbst wahrnehmen, da sind wir berechtigt, den Körper für ein Thier zu erklären.

Es gibt noch andere Unterschiede, welche von den Bestandtheilen, der Gestalt, der Größe, dem Bau und den Richtungen hergenommen sind.

Die Pflanze besteht allerdings fast ganz aus Kohlenstoff und das Thier dagegen aus Stickstoff; allein deshalb hat man keinen Begriff von denselben, wenn man weiß, woraus sie bestehen. Uebrigens kann man auch aus den Pilzen sehr vielen Stickstoff entwickeln; auch faulen sie mit Gestank, fast wie Fleisch.

Die Gestalt der Pflanzen zeigt immer etwas Unbestimmtes, besonders in der Wurzel und in der Richtung der Aeste, wenn auch gleich nicht in ihrer Stellung. Das kommt aber meist von äußern Hindernissen her, von Steinen in der Erde, vom Wind und Licht in der Luft. Die Thiere stimmen in der Gestalt mehr mit einander überein: denn die Corallen kann man nicht als Einwurf gelten lassen, weil sie nur Anhäufungen von Thieren sind. In der Regel sind die Thiere symmetrisch oder zweyseitig und haben daher paarige Organe. Das ist bey den Pflanzen nicht der Fall, obschon es auch paarige Theile bey Blättern und Zweigen gibt. Symmetrische oder zweytheilige Stämme kommen nicht vor. Die Gestalt der Pflanze beruht auf der Kreis- oder Scheibenform, und sie zeigt ihre Organe in der Lage von Radien, welche von einem Mittelpunkte ausgehen. Es gibt indessen auch solche Thiere, obschon nicht viele, nemlich die Polypen, Quallen und einigermaßen die Meersterne. Der Unterschied der Gestalt ist daher nicht durchgreifend.

Uebrigens sind alle Gestalten der Pflanzen und der Thiere nichts anderes als Verlängerungen und Verzweigungen einer

Nase oder Kugel, welche wieder aus unendlich vielen kleinen Bläschen zusammengesetzt ist.

Die Größe der Thiere ist im Allgemeinen bestimmt und es gibt wohl keines, welches lebenslänglich fortwächse, wie es bey den Pflanzen allerdings der Fall ist; bey den ein- und zweyjährigen ohnehin; aber auch bey den Bäumen, welche jedes Jahr neue Sprossen treiben und sich mithin vergrößern. Die Pflanzen wachsen daher lebenslänglich. Die Thiere aber bleiben stehen.

Alle Pflanzen ernähren sich mittels Einsaugung durch viele feine Oeffnungen; diese Oeffnungen scheinen aber nur physische Poren und keine organischen Mündungen zu seyn; daß man also sagen kann, sie sögen nur ein, wie die Haut der Thiere. Bey diesen ist aber immer eine organische Oeffnung bey Aufnahme der Nahrung vorhanden, welche man Mund nennt. Manche Quallen saugen zwar auch durch viele Oeffnungen ein; sie sind aber immer Mündungen von besondern Canälen, welche zum Magen führen.

Den Pflanzen fehlt der Magen, als der Mittelpunkt, von dem die Ernährung ausgeht; ebenso das Herz, als der Mittelpunkt der Saftbewegung. Sie haben eine Menge Röhren, welche einsaugen wie die Lymphgefäße, und die Säfte bewegen sich nach allen Richtungen, wo eben ein Reiz statt findet. Es gibt daher in der Pflanze kein Organ, welches ein materielles Centrum darstellte, obschon man die Stelle zwischen Stamm und Wurzel als einen solchen Ausgangspunct betrachten kann; jedoch in einem sehr weiten Sinn: denn die Säfte steigen aus der Wurzel durch denselben zu jeder Zeit hinauf in den Stamm.

Die Pflanzen haben überhaupt keine besondern Eingeweide, wie Darm, Milz, Leber, Lunge, Nieren u.dgl., sondern jeder ihrer anatomischen Theile reicht durch den ganzen Stock, und sie sind daher den anatomischen Systemen zu vergleichen, nicht aber besondern Organen, welche in einzelnen Höhlen liegen.

Außer den Eingeweiden hat das Thier noch andere Theile, welche im Bau und in der Substanz verschieden sind, wie die Knochen, Muskeln und Nerven, woraus die äußeren Organe entstehen. Bey der Pflanze kommt nichts der Art vor: auch ihre äußern Organe, wie Rinde, Aeste, Blätter, Blumen, Capseln,

Grundmasse, durch deren Verdichtung alle schweren oder wägbaren Materien entstehen. Wenn dieser Aether in die schweren Materien dringt und dieselben ausdehnt, so erscheint er als Wärme. Wenn er umgekehrt sich zwischen zwey verschiedenen schweren Materien befindet, und von denselben polarisirt oder gleichsam electrifizirt wird, so erscheint er als Licht, so wie es durch die Wechselwirkung der Sonne und der Planeten zum Vorschein kommt. Licht und Wärme aber sind in Verbindung mit der feinen Materie des Aethers Feuer. Der Aether erscheint demnach unter drey Zuständen. Einmal als die ursprüngliche Materie oder als Schwere, wodurch er in sich selbst ruht, und nach einem Mittelpuncte oder Centrum strebt, welches sich als Sonne zeigt; dann als Wärme, welche sich auszudehnen strebt, und an den Gränzen des Aethers die Planeten hervorbringt; und endlich als Licht, welches zwischen beiden, nemlich dem Centrum und der Peripherie die Verbindung herstellt, und beide in Thätigkeit erhält.

2. L u f t.

Dieses Element muß als eine Verdichtung des Aethers betrachtet werden, worinn aber die Wärme das Uebergewicht hat. Wir können darinn dreyerley Stoffe unterscheiden, welche durch die drey Thätigkeiten des Aethers bestimmt sind. Hundert Theile bestehen aus 80 Theilen Stickgas, 20 Sauerstoffgas, denen noch ein Theil kohlensaures Gas beygemischt ist. Das erste ist das Leichteste, und kann als entsprechend der Wärme betrachtet werden, das zweyte dem Licht, das dritte der Schwere.

Die Luft ist 800mal leichter als Wasser, und das Feld der Electricität, worinn eigentlich ihre Thätigkeit besteht, deren letzte Wirkung die Oxydation oder die Verbindung des Sauerstoffs mit andern Stoffen, d. h. das Verbrennen, ist; das allgemeine Product dieser Verbindung ist der Regen.

3. W a s s e r.

Dieses Element besteht aus 85 Theilen Sauerstoff und 15 Wasserstoff, welcher wahrscheinlich der Hauptbestandtheil des Stickgases ist. Die Bestandtheile sind mithin im umgekehrten Verhältnisse mit der Luft, nemlich mehr Sauerstoff und weniger

Stickstoff oder Wasserstoff. Jenen scheint dem Lichte zu entsprechen; wenigstens ist er unter den schweren Stoffen ebenso der Grund aller Thätigkeit, wie das Licht im Aether. Es ist auch wahrscheinlich etwas Kohlenstoff im Wasser, den man aber noch nicht darge stellt hat. Das Wasser muß demnach als verdichtete Luft betrachtet werden, mit veränderten Bestandtheilen.

Die eigenthümliche Thätigkeit, welche im Wasser vorgeht, ist der chemische Proceß.

4. E r d e.

Das Erd-Element kann betrachtet werden als dasjenige, worinn der Kohlenstoff vorherrscht; wenigstens bestehen die eigentlichen Erden aus Metall mit Sauerstoff verbunden. Die Metalle aber können als geschmolzener Kohlenstoff angesehen werden. In andern erdartigen Körpern, wie in den Salzen und der Steinkohle, und wahrscheinlich auch im Schwefel, ist gewöhnlich noch Wasserstoff enthalten, so daß das Erd-Element ebenfalls aus den drey Grundstoffen besteht, worinn aber der Kohlenstoff die Hauptmasse bildet. Er entspricht ohne Zweifel der Schwere, welche die Festigkeit in den Materien hervorbringt,

Die eigenthümliche Thätigkeit des Erd-Elements äußert sich im Magnetismus oder in der Crystallisation.

Wenn nun das Erdige für sich allein existiert, so ist es in der Regel fest, und hat daher keine Bewegung seiner Bestandtheile, wie Kiesel, Thon, Kalk, Kalk u.s.w. Solch einen Körper, dessen Theile alle gegen einander in derselben Lage oder in beständiger Ruhe bleiben, nennt man todt oder unorganisch, auch Mineral.

Es gibt aber viele Mineralien, welche auch Wasser enthalten, wie die Salze, und dennoch die Lage ihrer Theile nicht ändern oder keine innere Bewegung haben, weil das Wasser selbst von dem Erdigen überwältigt und darinn fest geworden ist.

Ebenso enthalten Mineralien Luft oder besitzen deren Eigenschaften, sind electricisch und verbrennen durch ihre eigene Hitze, wie die Steinkohle, der Schwefel, die Harze u. dergl., aber auch hier hat die Luft ihre Gestalt verloren, und ist fest geworden.

Endlich gibt es sehr schwere, glänzende und wie geschmolzen aussehende Mineralien, welche mithin die Eigenschaften der Schwere, des Lichts und der Wärme erhalten haben, aber dennoch weder selbst leuchten, noch sich bewegen, und daher unter die todtten Stoffe gerechnet werden müssen, wie die Erze oder Metalle.

Wir sehen hieraus, daß zweyfache Verbindungen der Elemente ebensowenig etwas Lebendiges hervorbringen, als das Erbelement allein.

Organische Körper.

Betrachten wir eine Pflanze, so besteht sie aus festen oder erdigen Theilen, welche sich bey dem Verbrennen größtentheils als Kohlenstoff zeigen. In diesen erdigen Theilen ist aber Wasser enthalten, und zwar im flüssigen Zustande, welches sich hin und her bewegt, wie die Quellen auf der Erde. Außerdem haben sie Höhlen für die Luft, welche gleichfalls unaufhörlich aus- und einbringt, und die festen Theile electrifizirt und oxydirt, ganz so, wie es die Luft im Freyen thut. Hier sind also die drey Elemente des Planeten mit einander auf eine Weise verbunden, daß jedes seinen Charakter und seine Thätigkeit behält, und dennoch alle drey ein geschlossenes und untheilbares Ganzes bilden. Solch einen geschlossenen Körper, in welchem die Luft weht und oxydirt, in welchem das Wasser fließt und auflöst, in welchem das Erdige beständig sich verändert, sich gestaltet und zerfällt, nennt man einen organischen oder lebendigen.

Zu einem Organismus gehören daher mindestens drey Elemente, welche sich so das Gleichgewicht halten, daß keines von dem ändern überwältigt wird, das Wasser und Luft nicht ganz fest werden, und das Feste nicht flüssig und luftig wird. Der aus der Wechselwirkung der drey Elemente entspringende Proceß, welcher den magnetischen, electrischen und chemischen in sich vereinigt, heißt Galvanismus, welcher daher als der eigentliche Lebensproceß betrachtet werden muß.

Das erste organische, was mithin auf dem Planeten entsteht, ist die Pflanze, eine dreyfache Verbindung der planetarischen Elemente. Die Pflanze hat ihr Erd-Organ in dem

Flüssigkeit, welches ein Haufen von hohlen Crystallen ist, worin
 das Wasser beständig umbreht, wie ein Wassertropfen auf
 glühendem Eisen. Ihr Wasser-Organ besteht in den Saft-
 röhren, worin das Wasser nach allen Seiten strömt, wie in den
 Flüssen auf dem Planeten. Ihr Luft-Organ endlich besteht
 in den Spiralgefäßen, welche die Luftröhren für die Pflanze sind.

T h i e r e.

Es ist jetzt nur noch eine Verbindung möglich, daß nemlich
 auch der Aether mit seinen Thätigkeiten unverändert in den
 Organismus der Pflanze aufgenommen wird. Dadurch bekommt
 er einen eigenen Schwerpunct oder ein Centrum, welches ihn selbst-
 ständig macht vom Planeten, so daß er frey schweben kann, wie die
 Sonne im Weltraum. Er bekommt ferner die Eigenschaften der
 Wärme, nemlich die Ausdehnung und Zusammenziehung, oder
 die selbstständige Bewegung in allen seinen Theilen, kurz ein
 Bewegungssystem. Endlich erhält er auch die Eigenschaften des
 Lichts, wodurch das Bewegungssystem in Thätigkeit gesetzt, und
 der ganze Körper auf einen Mittelpunct bezogen wird.

Solch ein organischer Körper, welcher vom Planeten frey
 ist, oder ein eigenes Centrum in sich hat, und welcher sich selbst-
 ständig bewegen kann, heißt Thier.

Das Erd-Organ des Thiers ist das Gefäßsystem oder
 vielmehr das Blut, woraus sich die ganze Masse des Leibes
 bildet und ernährt.

Sein Wasser-Organ ist der Darmcanal, welcher die
 Speisen verdaut oder auflöst.

Sein Luft-Organ ist die Lunge oder Kieme, wodurch
 das Blut Luft empfängt und wieder abgibt.

Ebenso gibt es drey Organe für die Schwere, die Wärme
 und das Licht, nemlich das Knochen-, Muskel- oder Be-
 wegungs-System und die Nerven, deren höchste Ausbildung sich
 als Auge oder wirkliches Lichtorgan darstellt.

Unterschied des Organischen vom Unorganischen.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Organischen und
 Unorganischen liegt in der Verbindung der Elemente in einem

einzelnen Körper. Besteht er nur aus einem oder zweyen, so kann keine fortdauernde Thätigkeit in ihm statt finden, und er ist daher todt oder unorganisch. Besteht er aber aus dreyen, so treten sie in einen galvanischen Proceß zusammen, dessen gemeinschaftliche Erscheinung wiederholte oder fortdauernde Bewegung, der Charakter des Lebens ist.

Für die Erscheinung gibt es daher nur einen einzigen Unterschied des Organischen und Unorganischen, nemlich die selbstständige und wiederholte Bewegung innerhalb der Grenzen eines Körpers. Wo keine Bewegung wahrzunehmen ist, oder wo sie nur einem fremden Einfluß folgt, z. B. der Schwere, da ist der Körper todt oder unorganisch. Wo sich aber eine Bewegung zeigt, die im Körper selbst und aus seinen eigenen Kräften hervorgeht, den nennen wir lebendig. Organisch ist demnach ein einzelner Körper, welcher sich selbst bewegt; unorganisch ein solcher, welcher in allen seinen Theilen ruht oder nur durch fremden Einfluß bewegt wird.

Es gibt noch eine Menge Unterschiede, die man theils auf die Bestandtheile, theils auf die Form, theils auf die einzelnen Organe u.dgl. gegründet hat.

Allein wenn man auch wirklich dadurch das Unorganische vom Organischen unterscheiden kann; so wird doch damit der Begriff nicht erschöpft und der wesentliche Unterschied nicht herausgehoben. Es ist allerdings wahr, daß die unorganischen Körper meistens aus wenigen Stoffen bestehen und gewöhnlich aus solchen, die in den organischen gar nicht, oder nur in geringerer Menge vorkommen, wie aus den Erden, Salzen, Inflammabilien und Metallen: allein sie bestehen auch aus Kohlenstoff, welcher der Hauptbestandtheil der Pflanzen ist. Manche, wie gewisse Salze, bestehen größtentheils aus Stickstoff, welcher die Grundlage des thierischen Leibes bildet. Und dann beruht ja das Wesentliche des Lebens nicht in der Materie, sondern in der Bewegung und der Verwandlung derselben. Wenn also gleich ein Körper größtentheils Kohlen- oder Stickstoff liefert und daher wahrscheinlich ein Pflanzen- oder Thierkörper ist, so kann man es doch nicht als ein sicheres und noch weniger als ein erschöpfendes Merkmal betrachten.

Was die Gestalt betrifft, so ist sie zwar bey Thieren und Pflanzen bestimmt, wenigstens in den einzelnen Theilen, wie in den Blättern und Blüthen, im Kopfe, Mund u. dgl.; allein es gibt auch viele unorganische Körper, die eine bestimmte Gestalt haben und zwar noch strenger als bey Pflanzen und Thieren, nemlich in den Crystallen. Dagegen ist es richtig, daß man die Gestalten der organischen Wesen immer aus der Kugel- oder Blasenform ableiten oder darauf zurückführen kann, während die unorganischen Formen immer vielerley sind.

Auch die Größe gibt kein hinlängliches Kennzeichen. Zwar können die unorganischen Körper, selbst die Crystalle, eine ganz unbestimmte Größe haben, während sie bey Pflanzen und Thieren nicht leicht ein gewisses Maas überschreitet; indessen ist dieses doch in sehr vielen Fällen so voll Abweichungen, daß auf den Werth dieses Unterschieds nicht viel zu geben ist.

In der Regel ist die Masse der unorganischen Dinge gleichartig und dicht, ohne abgesonderte innere Theile und Höhlen; die organische Masse dagegen ungleichartig und aus verschiedenen Theilen zusammengesetzt, welche überdieß Höhlen und Röhren in sich haben, worinn Flüssigkeiten enthalten sind. Das könnte aber auch bey unorganischen Körpern der Fall seyn und dennoch wären sie nicht lebendig, wenn sich weder ihre Höhlen noch deren Säfte bewegen.

Ein richtigerer Unterschied ist das Wachsthum, welches sich aber schon auf die Bewegung gründet und dieselbe voraussetzt. Unorganische Körper, sagt man, wachsen nicht mehr, wenn sie einmal vollendet sind, oder ihre vollkommene Gestalt erreicht haben; Pflanzen und Thiere dagegen haben schon in der Jugend die Gestalt, welche sie immer behalten werden und dennoch können sie noch größer werden. Was daher wächst, ist organisch, was dagegen stehen bleibt, unorganisch. Wollte man es hier streng nehmen, so würde auch dieser Unterschied nicht viel sagen. Die Crystalle haben auch bey ihrem Anfang schon die bleibende Gestalt, sie wachsen nur viel schneller und sterben dann gleichsam ab, wenn die für ihre Vergrößerung nöthige Masse verwendet ist.

Noch richtiger ist die Art und Weise, wie das Wachsthum geschieht: Man sagt nemlich, bey den unorganischen Körpern

durch Ansehen von außen her, bey den organischen dagegen von innen. Das ist hier allerdings der Fall, sobald sie einmal ihre Gestalt erreicht haben. Bey ihrer ersten Entstehung aber schießen die Theile ebenfalls von Außen an; z. B. das Eyweiß zum Kücheltchen im Ey. Die Embryonen wachsen daher wie die Crystalle, und man könnte sagen, die Crystalle wären Embryonen, welche nachher nicht weiter wachsen. Was daher wächst, nachdem es einmal seine Gestalt vollendet hat, ist wirklich ein organisches Wesen.

Auch eine gute Unterscheidung ist die Aufnahme und Ausscheidung an Stoffen, welche bey organischen Körpern immer Statt findet, bey den unorganischen dagegen nicht; man müßte denn das Einsaugen und Ausdünsten von Wasser, mancher Erden und Salze daher rechnen, was sich aber von diesen organischen Processen dadurch unterscheidet, daß die aufgenommenen und ausgestoßenen Stoffe die nämlichen sind, während sie von den organischen Körpern verändert werden.

Noch richtiger ist die Vermehrung seiner selbst. Alle Pflanzen und Thiere vermehren sich, indem sich ein kleiner Theil von ihnen abißt und wieder die Gestalt des großen bekommt. Das ist keinem unorganischen Körper möglich.

Indessen alle diese richtigen Unterschiede beruhen auf der innern Bewegung der Theile, welche mithin immer der wesentliche und einzige Charakter des Organischen bleibt.

Unterschied der Thiere und Pflanzen.

Die Pflanze besteht nur aus den drey planetarischen Elementen und hat daher nur den galvanischen Proceß in ihrem Innern, welcher beständig durch den äußern Einfluß von Schwere, Licht und Wärme unterhalten wird. Sie folgt daher den Gesetzen der Schwere wie die unorganischen Körper, strebt nach dem Mittelpunct des Planeten, und ist deshalb mit dem einen Ende an die Erde gefesselt, während sie mit dem andern dem Licht und der Wärme oder der Sonne folgt. Sie hat daher nur Bewegung ihrer innern flüssigen Theile; die äußern festen aber sind zwischen Erde und Sonne gebaut und können sich daher nicht röhren, außer insofern sie durch diese äußern Einflüsse dazu

angeregt werden. Die Pflanze bewegt sich in der Erde dem Schwerpunct nach und dem Wasser, indem die Wurzel dahin wächst; in der Luft aber nach der Sonne, wohin sich die Blätter und Blüthen wenden. Die Pflanze hat daher nur Bewegung ihrer Eingeweide, aber keine Bewegung der Organe. Sie bewegt sich nur in Folge eines Reizes.

Das Thier dagegen besteht aus allen vier Elementen und trägt daher die ganze Natur in sich, hat mithin einen eigenen Mittel- oder Schwerpunct, ein eigenes Bewegungssystem und das Vermögen, die äußern Dinge wahrzunehmen, oder mit denselben in Verkehr zu treten, wie die gesammte Natur durch das Licht.

Das Thier ist demnach losgetrennt von der Erde und bewegt nicht bloß die Säfte in seinen Eingeweiden, sondern auch seine festen Theile, und zwar nicht, weil es von außen gereizt wird, sondern aus innern Kräften. Es hat zweyerley Bewegung, eine Bewegung der Säfte wie die Pflanzen, und eine der festen Theile oder der Organe, welche ihm eigenthümlich ist. Das Thier ist eine Pflanze, welche ihren Stamm, ihre Aeste, Blätter und Blüthen bewegen kann.

Kurz ausgedrückt kann man sagen: Das Thier bewegt sich ohne Reiz, aus innerer Bestimmung, ohne Einfluß von Außen.

Wenn sich die Pflanzenwurzel bewegt, nemlich weiter wächst, so geschieht es nur, weil die Anwesenheit des Wassers auf sie wirkt und sie größer oder länger macht. Fehlt das Wasser, so kann sie es nicht suchen, sondern vertrocknet und stirbt. Ebenso verhält es sich mit den Blättern und Blüthen. Sie wenden sich dem Lichte nur entgegen, wenn es wirklich auf sie fällt. Im Finstern bleiben sie ruhig an ihrer Stelle und können mithin das Licht nicht suchen, welches nicht auf sie wirkt.

Beim Thiere ist es umgekehrt: es bewegt sich gerade, weil die äußern Dinge nicht auf es wirken. Wenn es Hunger oder Durst hat, so wirkt weder Speise noch Wasser auf es; und gerade dieser Mangel von äußerem Reiz ist die Ursache, warum es sich bewegt, warum es herumläuft, um Speise und Trank zu suchen. Da aber nichts ohne Ursache geschieht, so muß der Reiz

dazu im Thiere selbst liegen. Es bewegt sich mithin ohne äußern Reiz aus eigener Bestimmung, d. h. willkürlich.

Man muß also sagen: Die Pflanze ist derjenige Organismus, welcher nur innere, aber keine äußere Bewegung hat; Thier derjenige, dem Beides zukommt.

Oder kürzer: die Pflanze bewegt ihre Säfte, das Thier seine Organe.

Wo wir daher außer einem Saftleiter auch noch die Bewegung des Gefäßes selbst wahrnehmen, da sind wir berechtigt, den Körper für ein Thier zu erklären.

Es gibt noch andere Unterschiede, welche von den Bestandtheilen, der Gestalt, der Größe, dem Bau und den Einrichtungen hergenommen sind.

Die Pflanze besteht allerdings fast ganz aus Kohlenstoff und das Thier dagegen aus Stickstoff; allein deshalb hat man keinen Begriff von denselben, wenn man weiß, woraus sie bestehen. Uebrigens kann man auch aus den Pilzen sehr vielen Stickstoff entwickeln; auch faulen sie mit Gestank, fast wie Fleisch.

Die Gestalt der Pflanzen zeigt immer etwas Unbestimmtes, besonders in der Wurzel und in der Richtung der Aeste, wenn auch gleich nicht in ihrer Stellung. Das kommt aber meist von äußern Hindernissen her, von Steinen in der Erde, vom Wind und Licht in der Luft. Die Thiere stimmen in der Gestalt mehr mit einander überein: denn die Corallen kann man nicht als Einwurf gelten lassen, weil sie nur Anhäufungen von Thieren sind. In der Regel sind die Thiere symmetrisch oder zweyseitig und haben daher paarige Organe. Das ist bey den Pflanzen nicht der Fall, obschon es auch paarige Theile bey Blättern und Zweigen gibt. Symmetrische oder zweytheilige Stämme kommen nicht vor. Die Gestalt der Pflanze beruht auf der Kreis- oder Scheibenform, und sie zeigt ihre Organe in der Lage von Radien, welche von einem Mittelpunkte ausgehen. Es gibt indessen auch solche Thiere, obschon nicht viele, nemlich die Polypen, Quallen und einigermaßen die Meersterne. Der Unterschied der Gestalt ist daher nicht durchgreifend.

Uebrigens sind alle Gestalten der Pflanzen und der Thiere nichts anderes als Verlängerungen und Verzweigungen einer

Blase oder Kugel, welche wieder aus unendlich vielen kleinen Bläschen zusammengesetzt ist.

Die Größe der Thiere ist im Allgemeinen bestimmt und es gibt wohl keines, welches lebenslänglich fortwächse, wie es bey den Pflanzen allerdings der Fall ist; bey den ein- und zweyjährigen ohnehin; aber auch bey den Bäumen, welche jedes Jahr neue Sprossen treiben und sich mithin vergrößern. Die Pflanzen wachsen daher lebenslänglich. Die Thiere aber bleiben stehen.

Alle Pflanzen ernähren sich mittels Einsaugung durch viele feine Oeffnungen; diese Oeffnungen scheinen aber nur physische Poren und keine organischen Mündungen zu seyn; daß man also sagen kann, sie äßen nur ein, wie die Haut der Thiere. Bey diesen ist aber immer eine organische Oeffnung bey Aufnahme der Nahrung vorhanden, welche man Mund nennt. Manche Quallen saugen zwar auch durch viele Oeffnungen ein; sie sind aber immer Mündungen von besondern Canälen, welche zum Magen führen.

Den Pflanzen fehlt der Magen, als der Mittelpunkt, von dem die Ernährung ausgeht; ebenso das Herz, als der Mittelpunkt der Saftbewegung. Sie haben eine Menge Röhren, welche einsaugen wie die Lymphgefäße, und die Säfte bewegen sich nach allen Richtungen, wo eben ein Reiz statt findet. Es gibt daher in der Pflanze kein Organ, welches ein materielles Centrum darstellte, obschon man die Stelle zwischen Stamm und Wurzel als einen solchen Ausgangspunct betrachten kann; jedoch in einem sehr weiten Sinn: denn die Säfte steigen aus der Wurzel durch denselben zu jeder Zeit hinauf in den Stamm.

Die Pflanzen haben überhaupt keine besondern Eingeweide, wie Darm, Milz, Leber, Lunge, Nieren u.dgl., sondern jeder ihrer anatomischen Theile reicht durch den ganzen Stock, und sie sind daher den anatomischen Systemen zu vergleichen, nicht aber besondern Organen, welche in einzelnen Höhlen liegen.

Außer den Eingeweiden hat das Thier noch andere Theile, welche im Bau und in der Substanz verschieden sind, wie die Knochen, Muskeln und Nerven, woraus die äußeren Organe entstehen. Bey der Pflanze kommt nichts der Art vor: auch ihre äußern Organe, wie Rinde, Äste, Blätter, Blumen, Capseln,

bestehen aus denselben Geweben, wie das Innere des Leibes. Die Substanz der Pflanze ist daher in allen Theilen gleichartig, bey den Thieren aber sehr ungleichartig, wobey man nicht einmal die Polypen und Quallen auszunehmen nöthig hat.

Die Pflanzen werfen jährlich wesentliche Theile von ihrem Leibe ab, wie die Blätter und Blüthen, und die ausbauernenden bringen sie wieder hervor. So etwas kommt bey den Thieren nicht vor. Es werden zwar allerdings auch Haare, Schuppen und Federn abgeworfen: allein das sind schon halb abgestorbene Theile, welche ihrer Wichtigkeit nach nicht mit den Blüthen verglichen werden können.

Was die Einrichtungen der Pflanzen betrifft, so muß man ihnen allerdings Verdauung, Athmung, Ernährung und Fortpflanzung zuschreiben; diese Prozesse sind aber so wenig von einander verschieden und gehen in so ähnlichen Geweben vor, daß sie bey weitem nicht so in's Auge fallen, wie bey'm Thier. Eigene Organe zu Absonderungen, wie Nieren, oder zum Auswurfe eines Unraths, fehlen gänzlich. Diese Prozesse sind bloß auf die Oberfläche beschränkt und entsprechen der Hautausdünstung.

Das Thier hat eigenthümlich das Knochen-, Muskel- und Nervensystem oder die Organe der Ortsbewegung, der Organenbewegung und der Wahrnehmung der äußern Dinge, nemlich die Empfindung. Etwas, das man Sinnesorgan nennen könnte, kommt bey den Pflanzen nicht vor.

Classification.

Die Verbindung der Elemente kann auf mannfaltige Weise statt finden, sowohl der Menge nach als der Lage, und daher gibt es viele Mineralien, Pflanzen und Thiere.

Diese Verbindungen geschehen aber nothwendig nach bestimmten Gesetzen und die Formen müssen daher in einer bestimmten Zahl vorkommen, obschon die Individuen unendlich seyn können.

Die Summe aller dieser einzelnen Formen in der Natur nennt man Reiche. Es gibt daher nur drei Naturreiche.

- 1) Das Mineralreich;
- 2) das Pflanzenreich;
- 3) das Thierreich.

Alle Verschiedenheiten der Naturalien kommen von den primitiven Verbindungen der Elemente her, oder von den secundären Verbindungen ihrer einzelnen Theile unter einander, überhaupt von der Verbindung derjenigen Dinge, die früher entstanden sind. Alle nachfolgenden Dinge müssen daher durch die vorhergehenden bestimmt werden, und es wird so viele verschiedene Haufen in einem jeden Reiche geben, als Bestimmungsgründe vorhanden sind.

Die Theile aber, woraus ein Naturkörper zusammengesetzt ist, sind seine Organe. Er kann also nur eines, zwey, drey oder vier Organe u.s.w. haben, und in dieser Zahl muß der Unterschied der Körper von einander liegen.

Kennt man daher die Zahl der Organe, so muß man auch die Zahl der Abtheilungen eines jeden Reiches kennen. Entstehen z. B. die Mineralien durch Verbindung der Erde mit dem Wasser, der Luft und dem Feuer, so kann das Mineralreich nur in vier Abtheilungen zerfallen.

Die ersten Abtheilungen eines Reichs nennt man Classen, und es gibt daher so viele Classen, als Organe in einem Reiche möglich sind.

Wenn neue Unterschiede kommen sollen, so müssen sie wieder durch die Verbindung mit den zunächst vorhergehenden Dingen entspringen, also mit den Classen. Diese Abtheilungen der Classen heißen Ordnungen.

In diesen Ordnungen entstehen neue Verbindungen von Bestandtheilen oder Organen, welche sodann Gattungen heißen; die Abtheilungen von diesen Gattungen, welche dann gewöhnlich in Sippen oder Geschlechter und Sottungen zerfallen. Geringere Unterschiede heißen Arten und Abarten.

Wie groß die Zahl der Unterordnung oder Gliederung ist, läßt sich zum Voraus nicht bestimmen; sie scheint aber in den verschiedenen Reichen, Classen und Ordnungen sich zu ändern.

Das Obere oder Frühere ist daher immer das Eintheilungsprinzip des Spätern.

Man hat sich lange im Zweifel befunden und zum Theil darüber gestritten, was man eigentlich unter den Begriff Gattung (*Species*) bringen soll. Im Thierreiche kann hierüber kein
 Den's allg. Naturg. I. 2

Zweifel bestehen. Diejenigen Individuen, welche sich ohne Noth und Zwang zusammenhalten, müssen betrachtet werden als entsprungen aus einer und derselben Stammutter, und sie gehören daher zu einer Gattung, selbst auch wenn ihre Gestalt sehr abweichend wäre, wie es z. B. bey den Hunden und bey manchen Insecten der Fall ist.

Die Gattungen existieren also wirklich in der Natur als Individuen und sind nicht bloße Begriffe, welche durch Verbindung der Eigenschaften von verschiedenen existirenden Dingen entstehen und also ihre Existenz nur in unserem Kopfe haben. Dergleichen ist der Begriff der Geschlechter, Sippschaften u.s.w.

Bey Individuen, welche zu einer Gattung gehören, müssen alle Organe einander wesentlich gleich seyn, d. h. keines kann mehr Organe haben als das andere, auch kann kein Organ in mehr Theile oder Glieder zerfallen, z. B. die Zehen und Zehenglieder, oder bey den Insecten die Ringel des Leibes, die Fühlhörner u.s.w.; endlich darf auch die Gestalt der Theile nicht abweichen, mit Ausnahme der Größe, welches jedoch auch seine Gränzen hat, besonders in denjenigen Fällen, wo eine einmal fertige Gestalt nicht mehr zu wachsen pflegt, wie bey den Insecten.

Sobald solche kleinere Unterschiede vorkommen, welche sich auf die Gestalt und Zahl der Bestandtheile der einzelnen Organe beziehen; so halten sich die Thiere nicht mehr zu einander, sondern bilden besondere Gattungen. Dieses gilt auch von den Farben, wenn sie fix sind, d. h. sich an abgestorbenen Organen befinden, wie an den hornigten Bedeckungen und Flügeln der Insecten, den Schuppen und den Federn.

Gattungen, welche nur in den obengenannten Dingen von einander abweichen, vereinigt man mit einander unter dem Namen Geschlecht (Genus). So gehören Hunde, Fäbse, Wölfe zu einerley Geschlecht; Raben, Eulsen, Tiger, Löwen zu einem andern.

Welche Uebereinstimmung oder Anwesenheit der Organe abrigens erforderlich ist, um ein Geschlecht zu bilden, ist noch nicht ausgemacht und daher ziemlich der Willkühr unterworfen. Als besonderes Geschlecht scheint man nur diejenigen Gattungen

aufstellen zu dürfen, bey welchen die Bestandtheile oder die Glieder eines Organs in der Zahl oder wesentlich in der Form von andern abweichen; wie bey den Zähnen oder Zehen der Säugthiere. Jedoch läßt sich hierüber für alle Classen noch keine Regel aufstellen. Das scheint überhaupt nicht auf dem rückgängigen Wege von den Gattungen an aufwärts möglich zu seyn, sondern nur auf dem absteigenden Wege durch Theilung der Classen, Ordnungen, Zünfte und Sippschaften, sobald einmal die Geseze dieser Gliederung bekannt sind. Für unsern Zweck ist es auch nicht nöthig, die Sache hier strengwissenschaftlich zu verfolgen, da doch nicht alle Geschlechter aufgeführt werden können.

Nach dem Muster des Thierreichs werden auch die Pflanzen und Mineralien in Gattungen, Geschlechter u.s.w. eingetheilt. Da bey ihnen die Organe weniger zahlreich sind, daher auch weniger Wechsel in den Verbindungen möglich und ebendeshalb auch die Zahl der Gattungen geringer ist; so läßt es sich auch gewöhnlich leichter angeben, was zu einer Gattung, zu einem Geschlecht u.s.w. gehört.

Zur Bezeichnung einer Gattung hat Linne zwey Namen eingeführt, nemlich einen für das Geschlecht, welcher ein Hauptwort ist, und einen für die Gattung, welcher ein Beywort ist, oder wenigstens seyn sollte, z. B. die gemeine Rahe, der rothe Hund. Im Deutschen wird auch oft der Genitiv eines Hauptwortes statt des Beywortes gesetzt, wie der Haushund, der Steinmarbler, die Feldlerche u.s.w.

Der Geschlechtsname sollte immer einfach seyn, wie Hund, Rahe, Rind, Maus u.s.w. Namen wie Wallfisch, Ameisenbär, Stachelschwein sind schlecht, nicht bloß, weil sie zusammengesetzt sind, sondern weil sie einen falschen Begriff geben. Die Wallfische sind keine Fische, die Ameisenbären keine Bären, das Stachelschwein kein Schwein u.s.f.

Auch die Namen, worinn das Wort Thier wieder vorkommt, taugen nichts, wie: Murmelthier, Gürtelthier, Schuppenthier u.s.w.; ebensowenig diejenigen, worinn sich die Namen der Ordnungen oder Zünfte wiederholen, wie Fledermaus, Stachelschwein. Wenn viele dergleichen Formen hinter einander folgen; so wird die Sprache schleppend und selbst lächerlich.

Im Deutschen läßt sich dieses jedoch nicht leicht ändern, ob-
 schon es sehr passende Provincialismen gäbe, die eingeführt wer-
 den könnten.“ Das kann aber nur allmählich gelingen. Im
 Lateinischen und Griechischen dagegen hat man es in seiner Ge-
 walt, die Namen nach Belieben zu wählen oder zu formen.
 Wenn man sich über viele schlechte Benennungen in diesen Spra-
 chen zu beklagen hat; so kommt es daher, daß in unserer Zeit
 sich jeder anmaßt, neue Geschlechter aufzustellen, wenn er auch
 nichts von den gelehrten Sprachen versteht. Selbst Ausstopfer,
 Pflanzen- und Insectensammler nehmen sichs heraus, dieses zu
 thun; und daher kommt es, daß man oft zu gleicher Zeit ein
 halb Duzend Namen für ein Geschlecht lesen muß, wovon einer
 barbarischer klingt als der andere.

Die Gattungsnamen sollten immer das Kennzeichen aus-
 drücken, z. B. der große, kleine, bunte, rothe, lange, breite,
 viereckige u.s.w.

Bey den Pflanzen nennt man oft das Geschlecht nach dem
 Namen eines berühmten Mannes, wie Linnda, Aristotelia u.s.w.
 Bey den Thieren sollte man dieses vermeiden, weil sich häufig
 ein unangenehmer Nebengriff daran hängt. Menschennamen
 aber als Gattungsnamen sollte man ganz verwerfen; theils weil
 sie nichts bezeichnen, theils weil es eher eine Unehre als eine
 Ehre andeutet, indem man die Person nicht würdig hält, daß
 ein Geschlecht ihren Namen trage.

Werth der Naturgeschichte.

Der Naturgeschichte ist in diesem Jahrhundert eine Aner-
 kennung geworden, wie nie zuvor, und sie ist zu einem Rang
 emporgestiegen, daß sie sich neben ihren Schwestern nicht mehr
 über Zurücksetzung beklagen kann. Sie hat dabey das beruhig-
 ende Bewußtseyn, daß dieser Rang und dieses Wohlbefinden
 von Dauer seyn werde, weil sie es ihrer eigenen Anstrengung
 verdankt und nicht fremden Künsten, nicht der Unwissenheit der
 Masse, nicht dem Eigennuße der Mächtigen, mithin nicht ihrer
 eigenen Schlaueheit.

Die öffentlichen Anstalten und Unterstützungen der Natur-
 geschichte waren im vorigen Jahrhundert noch ziemlich unbedeu-

tend, und meistens nur das Ergebniß des unaussprechlichen Antreibens und Sammelns der Einzelnen. Betrachten wir jetzt die Sammlungen zu Paris, London, Leyden, Berlin und Wien, so finden wir darin Alles vereinigt und geordnet, was die Welt hervorbringt. Schiffe bloß mit geographischen und naturhistorischen Zwecken wandern beständig um die Erde, um ihre Schätze aufzunehmen und dieselben in Europa zum Besten der Wissenschaft, der Gewerbe und des Landbaus anzulegen. Hunderte von Sammlern durchstreifen alle Welttheile, und Duzende von europäischen Naturforschern haben ihre Residenzen in Africa, Asien und America aufgeschlagen, um das Einsammeln mit Plan zu leiten und im erforderlichen Falle die Beobachtungen sogleich anzustellen. Frankreich und Holland unterhalten immer Naturforscher in ihren Colonien, und bey den Engländern ist die Naturgeschichte bereits ein Theil der Staatsverwaltung und der Diplomatiß geworden. Kaum haben ihre Truppen eine Provinz in Ostindien erobert, so folgt ihnen auf dem Fuße ein Trupp Naturforscher nach, welcher das Land nach allen Richtungen durchstreift und der Regierung den Reichthum des Landes anzeigt, welcher in den Verkehr kommen kann.

Bis vor Kurzem haben die Reize der Naturgeschichte nur einzelne zerstreute Männer angezogen; gegenwärtig versammeln sich aber in allen Ländern Europas jährlich Hunderte, ja Tausende von Menschen aus allen Ständen, um ihr Fest zu geben, ihre Vorzüge zu preisen, und mit vereinigten Kräften dieselben zu erhalten und zu erhöhen. Die Regierungen freuen sich dieser Bewegung, durch welche die Theilnahme und der Geschmack durch alle Classen des Volks verbreitet und zum Gegenstand der allgemeinen Unterhaltung und Beschäftigung gemacht wird. Gewiß eine edle, wahre und ausgiebige Richtung der Welt, welche von vielen schlechten, falschen und leeren Treibereyen ablenken wird.

Die Fortschritte der Mineralogie haben das Bergwesen und die Fabrication wesentlich verbessert, und statt mancher kostspieliger Unternehmungen, womit man sich früher lächerlich und arm gemacht hat, ehrenvolle und nützliche veranlaßt. Man braucht nur an die ehmaligen Gold-, Zinn- und Kohlen-Grabereyen zu denken, wo es nichts als Glimmer, Schöbel und schwarze

Erbschollen gab, und an die sehzige Gewinnung des Salzes und des Platins, sowie an die Betreibung der Bergwerke in America.

Die Botanik, eine liebliche Freundin Allen, welche sich ihr nähern, hat ihre auf der ganzen Erde zerstreuten Zierden in die Gärten Europens verpflanzt und ihre Heilkräfte in die Hände aller Aerzte gelegt. Botanische Gärten blühen nicht bloß in den Residenzen, nicht bloß an den Universitäten; sondern an den meisten Gymnasien und fast in jeder bedeutenden Stadt, wo sie die Plätze der Erholung und der freudigen Belehrung sind.

In einem ähnlichen Verhältnisse haben sich die Sammlungen der Thiere verbreitet. Wenn sie auch der Natur der Sache nach nicht überall vollständig seyn können; so wird man doch selten eine Lehranstalt antreffen, wo sich nicht ein kleiner Vorrath befände; selten eine Stadt, ein Schloß, ja kaum ein größeres Dorf, wo nicht irgend jemand beschäftigt wäre, eine Sammlung von Vögeln, Insecten, Conchylien oder Versteinerungen anzulegen.

Wenn alles dieses keinen andern Nutzen hätte, als die Abhaltung von unedeln Beschäftigungen, so wäre er schon groß genug. Allein es weckt und übt die Beobachtungsgabe, macht, daß der Mensch nicht gedankenlos und von langer Weile geplagt durch die Natur schlendert oder sich Noheiten überläßt; es führt zu neuen Entdeckungen, hebt den Ehrgeiz, gewährt Befriedigung und lehrt die Entdeckungen zum allgemeinen Nutzen anwenden.

Fast noch wichtiger für das Leben ist die Kenntniß der schädlichen Thiere, deren Vertilgung nur durch die Einsicht in ihre Lebensart möglich ist. Die nützlichen finden sich gewissermaßen von selbst, und ihre Behandlung ist seit den ältesten Zeiten bekannt. Wenn sich aber auch die schädlichen ausdrängen, so geschieht es doch gewöhnlich erst, wann der Schaden nicht mehr abzuwenden ist; und nicht selten hat man ganz unschuldige Geschöpfe für die Thäter gehalten, ja sogar solche, welche ihre Feinde sind und sie verzehren. Die Beobachtung der Entwicklungsgeschichte solcher Thiere lehrt allein, gegen wen und wie der Krieg zu führen ist.

Alles dieses ist in der neuern Zeit durch die rastlose Thätig-

keit der Naturforscher erkannt, und sie finden deshalb von allen Seiten so viel Unterstützung, daß sie sich nicht mehr zu beklagen, sondern sich vielmehr zu bedanken haben für die Einsicht und den guten Willen, der ihnen von allen Seiten entgegen kommt.

Die Hauptwerke

über die Naturgeschichte im Allgemeinen sind ungefähr folgende:

Literatur:

- Gronovius, Bibliotheca regni animalis atque lapidel. 1760. 4.
 Cobres, Büchersammlung zur Naturgeschichte. Augsburg, 1781.
 8. 2 Bde.
 Systematisches Verzeichniß aller Schriften, welche die Naturgeschichte betreffen. Halle bey Hendel, 1784. 8.
 Böhmer, Literarisches Handbuch der Naturgeschichte. 1785.
 8. 5 Bde.
 Reuss, Repertorium commentationum a societatibus literariis editarum. Scientia naturalis. Göttingae apud Dieterich. 1802.
 4. 2 Vol.
 Sibig und Rau, Bibliothek der gesammten Naturgeschichte. 1789. 8. 2 Bde.
 Ersch, Literatur der Mathematik, Natur- und Gewerbs-Kunde. Leipzig bey Brockhaus. 1828. 8.

Wörterbücher:

- Nemnichs Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte. 1793. 4.
 4 Bde.
 Wörterbuch der Naturgeschichte. Welmar, Industrie-Comptoir, seit 1824. 8.

Zeitschriften:

- Die Verhandlungen der Akademien und naturforschenden Gesellschaften, welche hier anzuführen unnöthig wäre.
 Der Naturforscher. Halle bey Gebauer. 8. 30 Hefte von 1774 — 1802.
 Die Beschäftigungen, Schriften, Magazin, Verhandlungen der Berliner naturforschenden Gesellschaft in 8. und 4. seit 1776.
 Isis, Leipzig bey Brockhaus. 4. seit 1817.

Forrieps Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heil-Kunde
Weimar. 4. seit 1823.

V e r m i s c h t e W e r k e :

Plinius II. *Historiae nat. Libri* 37.

Deutsch von G. Große. 1781. 8. 12 Bde.

Buffon, *histoire nat.* 1749—80. 4. 22 Vol. Sapp. 1773—78.
8 Vol.

Deutsch, allgemeine Historie der Natur von Binz. Hamburg,
1750. 4. Mit Kupfern.

Deßgleichen von Martini und Otto in 8.

S y s t e m e :

Caroll a Linne, *Syst. nat. edik. XII. Holmiae.* 1766. 8. 3 Vol.

Dazu entomologische Beyträge von Gölze. 1777. 8.

Diese Ausgabe übersetzt von Statius Müller. 8. 8 Bände.
1773. Mit Kupfern.

Idem edik. XIII. cur. Gmelin. 1766. 8. 10 Vol.

Dazu zoologische Beyträge von Donndorf. 1798. 8.

Oken's Lehrbuch der Naturgeschichte. 8. 1 Band Mineralogie,
2 Bde. Zoologie, 2 Bde. Botanik. Weimar, Industrie-
Comptoir.

Naturgeschichte der Mineralien.

B e g r i f f.

Die Naturgeschichte der Mineralien, oder die Mineralogie, hat die Aufgabe, die unorganischen Naturprodukte zur Kenntniß zu bringen, welche die feste Masse der Erde bilden, sie nach allen ihren Eigenschaften kennen zu lehren und zu zeigen, wie sie in wechselseitiger Beziehung und in Verbindung unter einander den Erdbörper zusammensetzen. In der weitesten Bedeutung des Wortes ist die Mineralogie die Wissenschaft vom Mineralreich.

Die unorganischen Naturprodukte, welche in ihrer Gesamtheit das Mineralreich bilden, heißen Mineralien. Sie unterscheiden sich von den organischen Naturprodukten, den Pflanzen und Thieren, durch das gleichförmige Bestehen ihrer Theile und das Verharren in vollkommener Ruhe, so lange keine äußere Gewalt auf sie einwirkt. Es mangeln ihnen die eigenthümlichen Einrichtungen oder Werkzeuge (Organe), mittelst welcher die organischen Körper mit der Außenwelt in Verkehr stehen, - und auch die der Assimilation und Secretion, wodurch ein steter Wechsel des Stoffes und der Form unterhalten wird. Pflanzen und Thiere leben nur eine bestimmte Zeit, während welcher sie eine Reihe verschiedener Zustände durchlaufen. Die Existenz des gleichförmig fortbestehenden Minerals ist an keine bestimmte Zeit gebunden.

G e s c h i c h t e

Bedürfniß zunächst, dann Streben nach Gewinn, mitunter auch Wißbegierde, lenkten die menschliche Aufmerksamkeit schon in den frühesten Zeiten auf die Mineralkörper. Sie wurden im grauen Alterthum schon zu Bauten und verschiedenen Zwecken des häuslichen Lebens verwendet und so akernächst nur hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit beachtet. Viele Stellen der heiligen Schrift beweisen dieß. Die Egyptianer wußten Steine zu schleifen, schrieben ihre Mysterien darauf, verstanden schon die Kunst aus Erzen Metalle auszuschmelzen, führten bekanntlich bewunderungswürdige Bauten aus Steinen auf und benutzten diese vielfältig zu Sculpturarbeiten. Egyptische Könige führten, wie Diodor von Sicilien berichtet, seit undenklichen Zeiten reichlich lohnenden Goldbergbau. In den homerischen Gesängen, in den Tagen und Werken des Hesiod, werden Mineralkörper angeführt. Sie wurden in Griechenland, nebst seltenen Pflanzen und Thieren in Tempeln aufgestellt. Solche Sammlungen sind gewissermaßen als die ersten Naturalien-Cabinets zu betrachten und haben ohne Zweifel zur Kenntniß der Naturalien beigetragen. Hippocrates erwähnt einiges von den Mineralien, was indessen nur den Arzt interessiert. Der Erste, welcher sie einigermaßen ordnete, war Aristoteles. Er theilt sie in zwei Classen ab. Sein Schüler und Nachfolger im Lehramt, Theophrast von Eresus, hat eine eigene Abhandlung von den Steinen geschrieben und gibt sich darin als den besten Mineralogen des Alterthums zu erkennen. Was nach ihm Dioscorides in seiner Arzneimittellehre, Galen in den von ihm verfaßten medicinischen Schriften von Mineralien erwähnt, hat nur für den Arzt einiges Interesse, so wie das, was der ältere Plinius in seiner Naturgeschichte davon angibt, vorzüglich dem Alterthumsforscher willkommen seyn dürfte. Der arabishe Arzt und Philosoph Avicenna, der von 980 bis 1036 lebte, hat nach einer Abhandlung, de Conglutinatione lapidis, welche man, wiewohl ohne hinreichenden Grund, ihm zuschreibt, die Mineralien zuerst in Steine, Metalle, schwefelige Substanzen und Salze abgetheilt.

Agricola aus Sachsen (1530) war aber der Erste, welcher die äußeren Kennzeichen der Mineralien genauer beachtete, sie zur Unterscheidung derselben anwendete, und darnach classifizierte. J. Rentmann aus Sachsen (1565), Conrad Gesner aus der Schweiz (1516 — 1565), Eüsalpin aus Italien (1596) und Andere gaben nach ihm Beschreibungen von Mineralien.

Der gelehrte Becher, ein Rheinländer, berücksichtigte zuerst auch die Zusammensetzung der Mineralien und ordnete sie in seinem Werke: „Unterirdische Physik“ (*Physica subterranea*), welches sein Schüler Stahl 1669 zu Frankfurt herausgab, — ein Werk, das in der Geschichte der Chemie eine neue Epoche begründet hat, nach chemischen Grundsätzen. Henfel aus Sachsen (1722), Pott aus Sachsen (1716), Wallerius aus Schweden (1747) bearbeiteten die Mineralogie mit Erfolg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Linne's durchgreifend ordnender Geist, brachte nach den Grundsätzen, wornach er Thiere und Pflanzen classifizierte, auch die Mineralien in ein System. Ihm gebührt namentlich das Verdienst, die Krystalle genauer bestimmt zu haben, als es vor ihm geschehen war. Wallerius entwarf viele Mineralbeschreibungen und bereicherte und verbesserte die Kunstsprache. In seinem letzten, 1747 erschienenen System, sind die chemischen und physikalischen Verhältnisse der Mineralien zugleich berücksichtigt; es übertrifft die früheren an Vollständigkeit und Bestimmtheit, und gibt das erste Beispiel richtigerer Würdigung der äußeren und inneren Verhältnisse der Mineralkörper.

Eronstedt in Schweden, gab das erste consequentere chemische Mineralsystem, und ist somit als der Begründer desselben zu betrachten. Er bediente sich zur Unterscheidung der Mineralien zuerst des Löthrohrs, wandte dabei schmelzbare Reagentien an, schloß nach den erhaltenen Reactionen oder Erscheinungen auf die chemische Zusammensetzung, und gründete nun darauf sein 1758 erschienenenes Mineralsystem. Eronstedt's scharfsinnige Untersuchungen wurden zwar von seinem Zeitalter nicht richtig verstanden, übten aber dennoch auf die späteren Bearbeitungen der Mineralogie einen wesentlichen Einfluß aus.

Bergmann, gleichfalls ein Schwede, bereicherte die Wissenschaft durch chemische Analysen von Mineralkörpern, prüfte mit den von Cronstedt bereits angewandten Reagentien die meisten zu seiner Zeit bekannten Mineralien, gab ihr Verhalten an, verbesserte die zu Röthrohruntersuchungen nöthigen Instrumente, und beschrieb seine Verfahrungsweise und die erhaltenen Resultate in der zu Wien erschienenen Abhandlung über das Röthrohr (T. Bergmann. comment. de tubo ferruminatorio, ejusdemque usu in explorandis corporibus praesertim mineralibus. Vindobonae 1779.) Gahn, sein Landsmann, welcher Bergmann schon unterstützt hatte, führte diese wichtige Art der Mineraluntersuchung auf einen höhern Grad von Vollkommenheit.

Ungeachtet solcher und so vieler Vorarbeiten, und der zahlreichen Mineralsysteme, welche in kurzer Zeit nach einander erschienen waren, gebrach es der Wissenschaft doch noch immer gar sehr an Methode, ihrer Sprache an Bestimmtheit, und es fehlten namentlich gute Mineralbeschreibungen, indem sich diese bisher immer nur auf Angabe der Bestandtheile, Aufzählung einiger vermeintlichen Hauptkennzeichen, und Anführung des Gebrauchs beschränkt hatten. Die scharfe, vollkommene Auffassung und richtige Darstellung der wesentlichen Kennzeichen, wurde vernachlässiget, in allen mineralogischen Schriften vermißt; daher kam es denn, daß sie sämmtlich wenig geeignet waren zur Bestimmung eines Mineralkörpers und zu dessen richtiger Unterscheidung von anderen ähnlichen Mineralien.

Abraham Gottlob Werner (geboren in der Lausitz 1749, gestorben 1817), war es, welcher der Mineralogie endlich bestimmte Gestalt und Methode gab. Eine wichtige Epoche der Wissenschaft beginnt mit dem Auftreten dieses ungewöhnlichen Mannes, durch dessen erfolgreiche Thätigkeit die Mineralogie zu einer wahrhaft deutschen, in unserem Vaterlande mit allgemeiner Liebhaberei erfaßten Doctrin wurde. Er trat als Reformator auf, und begann die Reform der bis auf seine Zeit um Vieles hinter ihren naturhistorischen Schwestern, der Botanik und Zoologie, zurückstehenden Wissenschaft, damit, daß er den Werth der äußeren Kennzeichen zeigte, sie verstellte, ihren

richtigen Gebrauch bey der Mineralbestimmung lehrte und nachwies, wie dieselben bey der Mineralbeschreibung darzustellen sind. Seine Schrift: „Von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien,“ die er 1774, während er noch in Leipzig studierte, herausgab, muß als die Grundlage der mineralogischen Terminologie betrachtet werden. Darin sprach er aus, daß die wesentliche Verschiedenheit der Mineralien in ihrer Mischung liege, und sich bis auf die Gattungen herab erstrecke. Sie müßten deßhalb auch nach ihrer chemischen Zusammensetzung geordnet werden. In seinem Mineralsysteme, das eine Reihe von Jahren hindurch in Deutschland das herrschende war, suchte er diesen Grundsatz durchzuführen. Er stellte Geschlechter und Gattungen nach ihrer Mischung auf, wobei er jedoch vorzüglich auf den quantitativ vorherrschenden Bestandtheil Rücksicht nahm, und überdieß Zusammenstellungen nach äußeren Aehnlichkeiten machte, die dem gewählten chemischen Eintheilungsgrund öfters ganz zuwider waren. Seine Mineralbeschreibungen sind sehr deutlich, bestimmter und vollständiger, als alle, welche vor ihm gegeben wurden. Wir haben indessen sowohl diese, als das mehrste Andere, was er für die Wissenschaft geleistet hat, nicht unmittelbar durch ihn selbst kennen gelernt, da er außer der oben genannten Schrift beinahe nichts öffentlich bekannt gemacht hat; sondern durch die Arbeiten seiner Schüler, namentlich durch die Schriften von Keuß, Freiesleben, Hoffmann und Breithaupt.

Als trefflicher Lehrer wirkte Werner durch einen belebenden Vortrag von Freiberg, von seinem Hörsaale aus, durch alle Theile der cultivirten Welt. Seit 1780 entwickelte er in seinen Vorlesungen jährlich sein Mineralsystem, in das er immer wieder einige neue Gattungen aufnahm und mit voller Bestimmtheit aufstellte, was seinem Lehrvortrage stets einen eigenthümlichen Reiz gab.

Crystallformen und Structurverhältnisse wurden von ihm zwar überall berücksichtigt und in jede Mineralbeschreibung aufgenommen; erstere aber keiner mathematischen Betrachtung unterworfen, letztere nicht gehörig von den Verhältnissen des Bruches unterschieden, und namentlich nicht in

ihrer Beziehung zu den Crystallformen untersucht. Angeregt durch einige Vorarbeiten von Bergmann und Romé de L'Isle über die Crystalle, war es dem französischen Geistlichen Haüy (geboren 1743, gestorben 1822), dem ausgezeichneten Zeitgenossen Werners, vorbehalten, über beide ein neues, glänzendes Licht zu verbreiten. Er begründete das wissenschaftliche mathematische Studium der Crystalle, beschäftigte sich mit dem ausgezeichnetsten Erfolge mit ihrer genauen Untersuchung und Beschreibung, entwickelte die Structurverhältnisse und wies ihren wesentlichen Zusammenhang mit den Crystallformen nach. Durch seine Arbeiten ward die Lehre von den Crystallen bald zu einem besonderen, höchst wichtigen Zweige der Mineralogie ausgebildet, welcher den Namen Crystallographie erhalten hat. Er bezeichnete ferner die Gattung am schärfsten, als den Inbegriff von Mineralkörpern, welche gleiche chemische Constitution, und gleiche Crystallform besitzen. Die zahlreichen genauen Mineralanalysen, welche die Chemiker Klaproth und Wauquelin nach und nach ausführten, boten Werner und Haüy reichliches Material zu ihren Untersuchungen und schätzbaren Stoff zu Vergleichen dar.

Das glückliche Zusammentreffen der Arbeiten dieser seltenen Männer, machte die Zeit, in welcher sie wirkten, für die Wissenschaft zu einer Periode des raschesten Fortschrittes. Sie hatte sich bald zu einem ehrenhaften Rang emporgeschwungen und mit Botanik und Zoologie in gleiche Reihe gestellt. Unser deutsches Vaterland war es dann insbesondere, in welchem sie noch eine weitere Ausbildung erhielt. Die Crystallographie wurde zumal auf eine eigene, selbstständige Weise betrieben und vervollkommenet. Durch Gründung einer neuen, ganz vorzüglichen crystallographischen Methode erwarb sich vor Allen Weiß, Prof. der Mineralogie zu Berlin, großes Verdienst. Seine eigenen, schönen Arbeiten, so wie diejenigen seiner ausgezeichneten Schüler, der Professoren G. Rose zu Berlin, Neumann zu Königsberg und Kupffer zu Petersburg beweisen ihre Vortrefflichkeit. Das System von Weiß berücksichtigt die gesammte Natur der Mineralkörper, ihre äußeren Eigenschaften, wie ihre chemische Zusammensetzung, und ist deßhalb ein natürliches. Da-

von völlig verschieden ist das System von Mohs, Prof. zu Wien, welches mit Ausschließung der chemischen Verhältnisse der Mineralien gebildet, und eben darum mehr ein künstliches ist. Die Mohs'sche crystallographische Methode bezieht sich, wie diejenige von Weiß, unmittelbar auf die Formen selbst, auf deren Beziehung zu einander, und gibt ebenfalls den Begriff der Crystallsysteme. Sie ist aber nicht so einfach und kurz in der Bezeichnung. Die Art, wie Mohs diese Wissenschaft bearbeitet, mit gänzlicher Ausschließung der chemischen Verhältnisse, so wie der zerreiblichen, erdigen, und der nicht crystallisirten, dichten Mineralkörper, die er *Lodte* und *Krüppel* nennt, kann nicht ein vollständiges Mineralsystem liefern. Alle Arbeiten dieses scharfsinnigen Mannes sind demungeachtet von hohem Werthe und ausgezeichnet durch Klarheit, Konsequenz und Präcision im Ausdrucke.

Genaue Analysen aller bekannten Mineralien, die in neuerer Zeit von deutschen Chemikern, und vorzüglich von dem großen Meister der analytischen Chemie, Professor Berzelius zu Stockholm, ausgeführt worden sind, so wie dessen hochwichtige, die Lehre von den chemischen Proportionen befestigende und erweiternde Arbeiten, endlich die tief eingreifende Entdeckung Mitscherlich's zu Berlin, vom Isomorphismus der Körper, haben das Aussehen des chemischen Theils der Mineralogie ganz verändert, helle Blicke in den Zusammenhang zwischen chemischer Constitution und äußerer Form gestattet, und die Wissenschaft mit geflügelten Schritten ihrer Entwicklung entgegen geführt.

Die nach den chemischen Eigenschaften der Mineralien entworfenen Systeme von Berzelius und L. Smellin, stehen dem, vorzüglich auf äußere Kennzeichen begründeten Systeme von Mohs, in großer Vollkommenheit gegenüber, gleich folgerichtig aufgestellt wie jenes und eben so sorgfältig ausgeführt.

Die Grundsätze, nach welchen ein natürliches Mineralsystem aufgestellt werden muß, nemlich mit gleicher Berücksichtigung der innern chemischen, wie der äußeren physischen Verhältnisse der Mineralkörper, stehen nunmehr fest, und sind auch ziemlich allgemein anerkannt. Demungeachtet ist bis jetzt noch kein Sy-

stem aufgestellt worden, in welchem die natürliche Verbindung zwischen Aeußerem und Innerem ganz beachtet, vollkommen richtig getroffen, und das deßhalb allgemein angenommen worden wäre.

E i n t h e i l u n g.

Wie bey den Pflanzen und Thieren zuerst die Gestalt, die Organe, Bestandtheile und die Berrichtungen betrachtet werden müssen, ehe man an die Anordnung derselben denken kann und an ihre Verbreitung auf der Erde, ebenso müssen zuerst die Gestalten, Bestandtheile und physischen Erscheinungen der Mineralien dargestellt werden. Die Mineralogie zerfällt daher in einen allgemeinen Theil, welcher von ihren Eigenschaften überhaupt handelt und in einen besondern, welcher wieder in ihre Anordnungen unter sich, das System zerfällt, und in ihre Anordnung auf dem Planeten.

Der allgemeine Theil hieß sonst Terminologie.

Der zweyte Theil heißt jetzt Dryctognosie. Sie betrachtet die Mineralien an und für sich, in ihrer Isolirung, und beschäftigt sich mit der Untersuchung der einzelnen derselben.

Die Darstellung ihrer Verhältnisse zu einander, und die Kenntniß von den zusammengefügten größeren unorganischen Massen, welche den Erdbörper bilden, gibt die Geognosie.

Nur ungemengte, einfache Mineralien, bei welchen weder durch das bewaffnete Auge, noch durch Anwendung mechanischer Trennungsmittel verschiedenartige Theile wahrgenommen werden können, sind Gegenstand der Dryctognosie. Die gemengten Mineralien, welche aus einer Verbindung verschiedenartiger Mineralkörper von abweichender Beschaffenheit bestehen, wie Granit, Gneis, Syenit, werden in der Geognosie betrachtet.

Erster Theil.

Eigenschaften der Mineralien.

Die Eigenschaften der Mineralien sind theils mathematische, welche die Gestalt, theils chemische, welche die Zusammensetzung, theils physicalische, welche die übrigen Beschaffenheiten betreffen. Alle diese Eigenschaften, welche zusammen die gesammte Natur eines Mineralkörpers ausmachen, müssen berücksichtigt werden. Man nennt sie auch Merkmale, Kennzeichen, insoferne sie zur Bestimmung, Unterscheidung und Erkennung der Mineralien dienen.

I. Mathematische Eigenschaften, oder Gestalt.

Unstreitig ist die Gestalt der Mineralien dasjenige, was bey ihrer Betrachtung zuerst in's Auge fällt. Dabey gewahren wir denn sogleich einen Hauptunterschied. Die Mineralkörper sind nemlich entweder von einer gewissen Zahl ebener Flächen begrenzt, die unter bestimmten Winkeln zusammenstoßen, d. i. sie sind *crystallisirt*, oder sie zeigen eine solche regelmäßige Begrenzung nicht, d. i. sie sind nicht *crystallisirt*.

Eine regelmäßige, symmetrische Gestalt eines Minerals, welche von ebenen Flächen begrenzt ist, heißt man *Crystall*. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet *Eis*. Die Griechen, und nach ihnen die Römer, waren nemlich der Meinung, die schönen symmetrischen Gestalten des reinen Quarzes, die heut zu Tage jedermann unter dem Namen Bergcrystall kennt, seyen nichts anderes als Eis, welches bey sehr großer Kälte im Hochgebirge gebildet worden wäre. Späterhin wurde die Benennung *Crystall* auch auf andere durchsichtige farblose Mineralkörper angewendet, wenn sie eine mehr oder weniger regelmäßige Gestalt besaßen, und endlich auf verschiedentlich gefärbte, und selbst auf undurchsichtige, wenn nur ihre Gestalt symmetrisch war.

Das Vermögen, eine regelmäßige Gestalt anzunehmen, wird Crystallisirbarkeit genannt, und die Kraft, durch welche diese Gestalten erzeugt werden, eine Modification der Cohäsionskraft, Crystallisationskraft. Der Vorgang, bey welchem Crystalle entstehen, heißt Crystallisation.

Die meisten Körper crystallisiren, wenn sie aus dem flüssigen Zustand in den festen übergehen, und so nimmt denn der größte Theil geschmolzener Körper Crystallform an, wenn sie langsam abkühlen, und die Crystalle werden um so regelmäßiger und größer, je langsamer die Abkühlung erfolgt. Das läßt sich namentlich bey verschiedenen Metallen nachweisen, und am leichtesten bey dem Bismuth. Läßt man dieses, in einem Tiegel oder eisernen Pfel eingeschmolzene Metall so weit erkalten, bis sich auf seiner Oberfläche eine dünne feste Lage gebildet hat, und sodann, nachdem diese durchgestochen worden, das im Innern noch flüssige Metall herauslaufen, so findet man dasselbe da, wo es sich an den Wandungen des Schmelzgefäßes langsam abgekühlt hat, in schönen würfeligen Crystallen.

Noch leichter erhält man Crystalle, wenn feste Körper in einer Flüssigkeit aufgelöst sind, und man diese erkaltet oder verdunstet. Gießt man auf zerstoßenen Alaun siedend heißes Wasser, rührt man das Gemenge um, so lange noch Alaun aufgelöst wird, läßt man hierauf die Lösung durch ein Filter- oder Seihezeug laufen und ruhig langsam erkalten, so crystallisirt derjenige Theil von Alaun heraus, den das siedendheiße Wasser mehr, als das erkaltete, in Auflösung halten konnte.

Körper, welche in kaltem und warmem Wasser beinahe in gleichem Grade löslich sind, crystallisiren nicht durch Abkühlung, sondern bloß durch fortgesetzte Verdunstung, wodurch ein Theil des Wassers verflüchtigt wird, im Folge dessen nicht mehr die ganze Quantität der Körper aufgelöst erhalten werden kann und heraus crystallisirt. So ist's gerade bey dem gemeinen Kochsalz, das man aus einer wässerigen Auflösung durch Verdunsten derselben an freyer Luft in zierlichen kleinen Würfeln erhält.

Derjenige Theil der Mineralogie, welcher sich mit der Untersuchung und Beschreibung der Crystalle beschäftigt, heißt Crystallographie.


Bei jedem Crystall unterscheidet man, als einzelne Theile desselben, Flächen, Kanten und Ecken. Flächen heißen die Begrenzungen eines Crystalls, und zur Unterscheidung von anderen Flächen nennt man sie Crystallflächen. Sie erhalten noch besondere Namen nach den Gestalten, die sie einschließen, und so nennt man die Flächen, welche den Würfel begrenzen, Würzelflächen, die, welche das Octaëder einschließen, Octaëderflächen u. s. w. Ferner heißen Flächen, die gleich und ähnlich sind, und eine gleiche Lage haben, gleichnamige, im umgekehrten Falle dagegen ungleichnamige.

Kanten nennt man die Durchschnitte der Flächen. Zwei sich schneidende Flächen bilden somit jederzeit eine Kante. Sie sind in den meisten Fällen gerade Linien und werden stets als solche betrachtet. Man unterscheidet stumpfe und scharfe, gleiche und ungleiche Kanten, nach der Neigungsgröße der Flächen und nach Gleichheit oder Verschiedenheit ihrer gegenseitigen Neigung.


Die Ecken werden durch das Zusammenlaufen von drey und mehreren Kanten gebildet, liegen an den Endpuncten der Kanten und werden nach der Anzahl der Flächen benannt, welche in ihnen zusammenstoßen. Darnach heißen sie dreiflächig, vierflächig u. s. w. Nach Beschaffenheit der Kanten, welche sie bilden, theilt man sie in reguläre, symmetrische und irreguläre. Bei den regulären Ecken sind die zusammenstoßenden Kanten gleich, bei den symmetrischen sind nur die abwechselnden einander gleich, und bei den irregulären sind sie entweder alle ungleich, oder wenn sich gleiche Kanten vorfinden, sind es nicht die abwechselnden. Ecken, deren Kanten unter einander gleich sind, heißen gleich, im entgegen gesetzten Fall ungleich.

Betrachten wir nun die große Anzahl uns bekannter Crystalle weiter, so zeigt sich ein wesentlicher Unterschied darin, daß die einen nur von gleichnamigen Flächen, die anderen aber von Flächen begrenzt werden, die zum Theil unter einander ungleichnamig sind. Von Crystallen der ersten Art sagt man: sie haben eine einfache Form; von Crystallen der letzteren Art aber: sie haben eine zusammengesetzte Form. Die

gewöhnlichste Form des Flußspathes, der Würfel Fig. 1.



von 6 Quadraten begrenzt, ist eine einfache Form; dagegen ist die gewöhnlichste Form des Bergcrystalls Fig. 2.




von 6 Rechtecken und 12 gleichschenkeligen Dreiecken begrenzt, eine zusammengesetzte Form, oder eine Combination.

Bei den einfachen Formen ist die Lage der Flächen gegen den Mittelpunkt nach einem bestimmten Symmetriegesetz geordnet. Es finden sich gewöhnlich an einem Ende eines Crystalls dieselben Flächen, Ecken und Kanten, wie an dem anderen, so daß, wenn man ein Ende kennt, auch das andere bekannt ist. Die genannten Theile des Crystalls haben in der Regel ihre parallelen. Diese einfachen Formen sind aber nicht mit den regulären Körpern der Geometrie zu verwechseln, die durch lauter congruente, reguläre Flächen, welche nur congruente Ecken bilden, begrenzt werden, da sie, wenn gleich nur von gleichnamigen Flächen begrenzt, doch nicht immer gleiche Kanten oder Ecken haben.

Zeigt nun eine einfache Form verschiedene Kanten und Ecken, so unterscheidet man, von einer bestimmten Stellung dieser Formen ausgehend, End- und Seiten-Kanten, so wie End- und Seiten-Ecken, und nennt die Ecken, die am oberen und unteren Ende liegen, End-Ecken, die übrigen Seiten-

Seiten, die Ranten, welche in den End-Seiten zusammenlaufen, End-Ranten, die übrigen Seiten-Ranten.

Wenn man sich bey einer 3. u. 4. m. m. gesetzten Form die einen oder die anderen gleichnamigen Flächen so weit vergrößert denkt, daß sie einen Eckpunkt für sich allein begrenzen, so erhält man dabey eine einfache Form: Vergrößert man z. B. auf solche Weise bey der gewöhnlichsten Form des Bergcrystalls die 12 gleichschenkeligen Dreypcken Fig. 1. u. bis zur Ver-
dopplung der 8 rechtseitigen Flächen, so erhält man als einfache Form das Hexagondodecaeder, oder die sechsseitige Doppelpyramide, Fig. 3. und man wird sehen, daß die ursprüngliche Form in der That aus 12 gleichschenkeligen Dreypcken besteht, die sich zu 4 an einem Eckpunkte vereinigen. Wenn man die 6 Quadranten der Würfelform Fig. 1. vergrößert, so erhält man das Hexagondodecaeder des Quaders, oder das sechsseitige Doppelpyramiden-ähnliche Dodecaeder, Fig. 4.



die von 6 Quadraten und 8 gleichseitigen Dreypcken begrenzt ist, die 6 Quadrate auf die angeführte Weise, so entsteht daraus der Würfel Fig. 1.; vergrößert man die 8 gleichseitigen Dreypcke, so entsteht daraus das reguläre Dodecaeder, Fig. 5.




Man erkennt also die zusammengesetzten Formen immer leicht an dem Daseyn verschiedenartige Flächen. Es sind in denselben stets die Flächen von so vielen einfachen Formen enthalten, als sie verschiedenartige Flächen haben, und die Entwicklung solcher Combinationen geschieht einfach durch Angabe des geometrischen Characters jeder einzelnen Form.

Nicht selten kommen indessen unter den verschiedenen gleichnamigen Flächen einer Combination solche vor, die, auf die oben angegebene Weise vergrößert, für sich allein den Raum nicht vollständig begrenzen. Das ist gerade der Fall bey den 6 recht-eckigen Flächen der gewöhnlichsten Form des Quarzes Fig. 2., welche für sich eine reguläre sechseckige Säule oder Prisma bilden, welches an den Enden offen ist. Die übrigen 12 dreyseitigen Flächen bilden dagegen für sich allein das Hexagonbocæder Fig. 3., eine vollkommen geschlossene einfache Form. Solche Flächen, welche für sich allein den Raum nicht vollständig begrenzen, nennt man zusammengehörige Flächen. Sie kommen immer nur in Combinationen vor und werden bey vielen zusammengesetzten Formen angetroffen.

Die Kanten, welche durch den Durchschnitt der Flächen zweyer oder mehrerer Formen gebildet werden, nennt man Combinations-Kanten, und die Ecken, welche durch das Zusammenlaufen der Kanten der verschiedenen Formen entstehen, Combinations-Ecken.

Die meisten einfachen Formen zeigen sich zuweilen auf eine eigenthümliche Weise verändert. Diese Veränderung besteht darin, daß die Hälfte ihrer Flächen, hin und wieder auch der vierte Theil derselben, so groß ist, daß die übrigen, nach bestimmten Gesetzen, ganz aus der Begrenzung verschwinden. Solche Formen haben dann nur die Hälfte oder ein Viertel der Flächen der ursprünglichen Gestalt und werden im Gegensatz derselben, Halbstflächenner und Viertelstflächenner, oder hemiëdrische und tetartoëdrische Formen genannt, während man die ursprünglichen Formen homoëdrische nennt. So ist z. B.

das Tetraëder oder die dreyseitige Pyramide Fig. 6.



von der Hälfte der Flächen des Octaëders Fig. 5. begrenzt und heißt drum auch Hemioctaëder, oder Halboctaëder.

Man kann bey jeder einfachen Form gewisse Linien annehmen, welche zwey entgegengesetzte gleichnamige Ecken, oder die Mittelpunkte zweyer paralleler Flächen, oder zweyer entgegengesetzter Kanten verbinden, und durch den Mittelpunkt der Gestalt gehen. Solche Linien, um welche die Flächen symmetrisch vertheilt sind, heißt man Achsen. Solcher Linien kann man bey'm Würfel Fig. 1. dreyerlei annehmen. Einmal Linien, welche die entgegengesetzten Ecken verbinden, und von der Art finden sich an dieser Gestalt vier, da sie 8 Ecken hat; sodann Linien, und zwar drey, welche die Mittelpunkte von je zwey parallelen Flächen verbinden, und endlich Linien, welche die Mittelpunkte zweyer entgegengesetzter Kanten verbinden, und solcher Linien oder Achsen lassen sich bey'm Würfel 6 annehmen, da er 12 gleiche Kanten hat.

Gleichergestalt, wie der Würfel, hat auch jede andere einfache Form stets mehrere Achsen, die theils gleichartig, theils ungleichartig sind. Die gleichartigen Achsen schneiden sich immer unter gleichen Winkeln.

Bey'm Würfel kommen alle Achsen in mehrfacher Zahl vor. So ist es aber nicht bey allen Gestalten. Es gibt solche, bey denen theils eine, theils mehrere Achsen keine gleichartigen haben. Ersteres ist der Fall bey'm Hexagondodecaëder, Fig. 3. Die Linie, welche bey dieser Form die sechsflächigen Ecken verbindet, ist eine Achse, welche keine gleichartigen hat; und auch die einzige dieser Art, die man hier annehmen kann. Formen, in denen sich eine oder mehrere Achsen finden, die keine gleichartigen haben, nennt man Einachsige, diejenigen dagegen, in welchen

sich, wie bey'm Würfel, keine einzelnen Achsen finden, vielschichtige Formen.

Bev der Untersuchung der einfachen Formen bringt man stets eine ihrer Achsen in verticale Stellung. Die verticale Achse uennt man die Hauptachse, die übrigen Nebenachsen. Bev Formen, welche nur eine einzige Achse haben, zu welcher sich keine gleichartige findet, ist diese einzelne Achse auch ihre Hauptachse. Bev den einachsigigen Formen, welche mehrere einzelne Achsen haben, wird willkürlich eine der einzelnen Achsen zur Hauptachse gewählt; sie muß aber, einmal gewählt, consequent beibehalten werden. Bev den vielachsigigen Formen kann jede der Achsen zur Hauptachse genommen werden.

Die Anzahl der bekannten Crystalle ist sehr groß und bey weitem die meisten von diesem sind zusammengesetzte Gestalten. In der Regel sind bey diesen die Flächen einer einfachen Form größer und ausgedehnter, und herrschen vor, während die Flächen der übrigen Formen von geringerer Ausdehnung sind, und als untergeordnet erscheinen.

Sollen solche zusammengesetzte Gestalten beschrieben werden, so geht man dabey von der vorherrschenden Form aus, bringt diese in eine bestimmte Stellung, die unverändert für die ganze Betrachtung beybehalten wird, erwägt nun die Lage der übrigen Flächen gegen die vorherrschende Form, gibt dieselbe an, wie sie an den Kanten und Ecken erscheinen, und beschreibt, wie sie dieselbe verändern. Diejenige Form, auf welche man die Flächen aller übrigen bezieht, nennt man Grundform, die Flächen der übrigen, in der Combination vorhandenen, Formen aber heißen Abänderungsflächen.

Werner hat die ungemein mannichfaltigen Veränderungen der Grundformen mit den Worten: Abstumpfung, Zuschärfung und Zuspitzung bezeichnert, woran man ihm allgemein gefolgt ist.


Wenn an der Stelle einer Kante oder einer Ecke einer Grundform eine Fläche vorhanden ist, so nennt man dieselbe abgestumpft und die Abänderungsfläche die Abstumpfungsfläche. Sind ihre Neigungen gegen die Flächen der Kanten oder die Flächen am Eck gleich geneigt, so ist die Abstumpfung

fläche gerade; sind sie ungleich, so ist sie schief. So ist Fig. 4. ein Würfel, welcher an den Ecken durch die Flächen o gerade abgestumpft ist.

Oftmals ist eine schiefe Abstumpfungsfäche gegen eine Kante der Ecke so geneigt, daß sie mit den beyden Flächen dieser Kante gleiche Winkel bildet; man sagt dann: die Abstumpfungsfäche des Ecks ist auf eine (nun noch näher zu bestimmende) Kante aufgesetzt. Man nennt sie auf eine Kante schief aufgesetzt, wenn sie mit den Flächen der Kante ungleiche Winkel bildet.

Die Ecken der einfachen Formen sind immer gerade, die Combinations-Ecken dagegen schief abgestumpft.


Sind an der Stelle einer Kante, einer Ecke, oder einer Fläche einer Grundform zwey Abänderungsflächen vorhanden, so nennt man dieß Zuschärfung, die beiden Abänderungsflächen nennt man Zuschärfungsflächen, und die Kante, die sie mit einander bilden, Zuschärfungskante. So ist das Octaëder Fig. 7.



durch die Flächen dann den Ecken so zugeschärft, daß die Zuschärfungsflächen auf zwei gegenüberliegende Kanten gerade aufgesetzt sind.

Wenn statt eines Ecks einer Grundform ein anderes stumpferes vorhanden ist, so nennt man das Eck zugespitzt und die Abänderungsflächen Zuspitzungsflächen der Ecken. Sie sind entweder in derselben oder in der halben Zahl vorhanden, wie die Flächen des Ecks, und sind theils auf die Flächen, theils

auf die Kanten des Würfels gerade aufgesetzt. Fig. 3.



stellt einen Würfel dar, der an den Ecken so zugespitzt ist, daß die Zuspitzungsflächen auf die Flächen des Würfels gerade aufgesetzt sind.

Auch bey prismatischen Crystallen bedient man sich der Ausdrücke Zuspitzung und Zuspizung, um damit die Art anzugeben, wie sie an den Enden mit Flächen begrenzt sind. Die Zuspitzung wird durch zwey, die Zuspizung durch drey oder mehrere gleichnamige Flächen gebildet. Es wird dabey bemerkt, ob die Veränderungsflächen auf die Kanten oder auf die Flächen gerade aufgesetzt sind. Die an den Enden prismatischer Crystalle vorkommenden schiefen Zuspitzungen werden nach der Lage der Zuspitzungskanten gegen andere Flächen und Kanten noch genauer bestimmt. Begrenzt eine einzelne Fläche das Ende eines prismatischen Crystals, so heißt sie die Endfläche. Sie bildet mit den Seitenflächen der Prismen rechte oder schiefe Winkel und wird demnach gerade oder schief; im letzteren Fall ist sie entweder auf Kanten oder Flächen gerade oder schief aufgesetzt.

Bey diesen Veränderungen der Grundformen, wodurch die mannfaltigsten Combinationen entstehen, beobachtet man, daß gleiche Theile einer einfachen Form durch die Flächen einer andern hinzutretenden, stets auf gleiche Weise verändert werden. Zeigt sich der Würfel Fig. 4. an den Ecken abgestumpft, so sind stets alle Ecken so verändert, weil sie alle gleich sind; und die Abstumpfungsflächen sind alle gerade, weil alle Flächen des Würfels gleichnamig sind. Niemals findet man den Würfel nur an einigen Ecken abgestumpft und an anderen nicht. Dies zeigt, daß die Flächen der untergeordneten Form ganz symmetrisch zu denen der vorherrschenden Form treten, sie müssen also auch mit dieser gleiches Symmetriegesetz und gleiche Achsen haben; die

mit denen der vorherrschenden Form nach Zahl, Lage und relativer Größe übereinstimmen. Formen von verschiedenem Symmetriegesetz und verschiedenen Achsen kommen niemals mit einander verbunden vor. Diese wichtige, durchaus bestätigte Thatsache sondert die vorkommenden Crystallformen scharf von einander, und macht es möglich, die überaus große Anzahl derselben nach der Art ihres Zusammenvorkommens in einige Gruppen zu ordnen, die man Crystallisations-Systeme heißt. Dadurch ist es möglich, einen Ueberblick über die außerordentliche Mannfaltigkeit der Formen zu erhalten, und die Crystalle, die hinsichtlich der Neigung der Flächen eine unübersehbare Verschiedenheit darbieten, unter einfache Gesichtspunkte zu bringen.

Combinationen kommen also immer nur innerhalb eines und desselben Crystallisations-Systemes vor; Formen verschiedener sind niemals mit einander verbunden.

Den Begriff der Crystallisations-Systeme haben zuerst Weiss und Mohs entwickelt. Beide haben sechs solcher Systeme aufgestellt. Weiss, dem wir folgen, hat auf den Grund hin, daß das Verhältniß der Theile der Crystalle durch drei auf einander senkrechte Liniardimensionen, Achsen, bestimmt werden kann, folgende Crystallisations-Systeme aufgestellt:

1) Das reguläre; die Formen desselben sind durch 3 Achsen ausgezeichnet, die gleichartig und unter einander rechtwinklig sind;

2) Das 2- und 1achsige; seine Formen sind durch 3 Achsen ausgezeichnet, die unter einander rechtwinklig und von denen 2 gleichartig sind, die dritte aber gegen diese ungleichartig ist;

3) Das 3- und 1achsige; seine Formen sind durch 4 Achsen ausgezeichnet, von denen 3 unter einander gleichartige sich unter Winkeln von 60° und die vierte ungleichartige rechtwinklig schneiden;

4) Das 1- und 1achsige; seine Crystalle haben 3 Achsen, die ungleichartig und unter einander rechtwinklig geneigt sind;

5) Das 2- und 1gliederige; seine Formen besitzen drei Achsen, die ungleichartig sind, und von denen die eine schief-

reineckig gegen die zweite, die erste und dritte aber, wie auch die zweite und dritte, rechteckig gegen einander geneigt sind.)

6) Das 1.^{te} und 1. gradeartige, seine Formen sind durch 3 Achsen ausgezeichnet, die ungleichartig und unter einander schiefwinklig geneigt sind *).

Wir lassen nun eine Auseinanderlegung der Hauptverhältnisse der Crystallformen, die zu den bezeichneten Systemen gehören, nach den Angaben des Prof. Gustav Rose, eines ausgezeichneten Schülers von Weiss, folgen.

Einfache Formen und Combinationen der Crystallsysteme.

1) Regulares System.

Der Würfel, oder das Hexaëder (der Sechseckner) Fig. 1, S. 36, hat 6 Flächen, die Quadrate sind, 12 Kanten und 8 Ecken. Die Neigung der Flächen gegen einander ist 90° .

Die gewöhnlichste Gestalt des Flußspathes.

Das reguläre Octaëder (der Achteckner) Fig. 4, S. 37, ist von 8 gleichseitigen Dreiecken begrenzt, hat 12 unter sich gleiche Kanten, und sechs vierflächige Ecken. Die Flächen sind unter $109^\circ 28'$ gegen einander geneigt.


Würfel und Octaëder kommen häufig mit einander verbunden vor. Die Flächen des einen Bodm. erscheinen in diesen Combinationen als Abstumpungsflächen der Ecken der anderen. Fig. 2, S. 37, ist eine solche Combination, in welcher die Flächen O, die Abstumpungsflächen der Ecken des Würfels, die Octaëderflächen, die Flächen A die Würfelflächen sind. Sind die Abstumpungsflächen so groß, daß sie sich berühren, so heißt die Combination der Mittel-Crystall zwischen Würfel und Octaëder.

*) Nach Mohs heißen diese Systeme: Naumann nennt diese Systeme:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) Das tessularische. | h) Das tetraëd. |
| 2) Das pyramidale. | 2) Das tetragonale. |
| 3) Das rhomboëdrische. | 3) Das hexagonale. |
| 4) Das orthotype. | 4) Das rhombische. |
| 5) Das hemiorthotype. | 5) Das monoclinoebrische. |
| 6) Das anorthotype. | 6) Das trichlinoebrische. |

oder Subo-Dodekaeder. Der Mangel zeigt dergleichen Combinationen am häufigsten.


Das Dodecaeder (der Zwölfflächner) Fig. 9.



ist von 12 gleichen rautenförmigen Flächen begrenzt und heißt darum auch Rautendodecaeder, und weil es die gewöhnlichste Form des Granats ist, auch Granatoëder. Die 24 Kanten sind gleich, die 14 Ecken aber sind unter einander ungleich und von zweyerley Art; 6 Ecken, A, sind 4flächig und haben dieselbe Lage, wie die Ecken beym Octaëder, weshalb man sie auch Octaëdercken nennt; 8 Ecken, O, sind 3flächig und liegen wie die Ecken beym Würfel (Würfecken).

Von den drey beschriebenen Gestalten kommen öfters zwey, zuweilen auch alle drey mit einander verbunden vor.

Die Icositetraëder (Vierundzwanzigflächner) Fig. 10.




werden durch 24 symmetrische Trapezoide begrenzt. Sie haben 48 Kanten, die zweyerley sind: 24 längere, D, von denen je 2 zwey Octaëderachsen verbinden, und 24 kürzere, F, von denen je 2 zwey benachbarte Würfelachsen verbinden. Der Ecken sind 26 und diese dreyerley: 6 Ecken, A, liegen wie die Ecken des Octaëders (Octaëdercken), sie sind regulär und 4flächig; 8 Ecken, O, liegen wie die Ecken des Würfels (Würfecken), sie sind regulär

und 8flächig; 12 Ecken, E, liegen wie die Mittelpuncte der Flächen des Dodecaëders, sie sind symmetrisch, 4flächig.

Man kennt zwey Arten von Icositetraëdern, wovon dasjenige, welches bey dem Leucit vorkommt, das gewöhnliche ist und auch Leucitoëder genannt wird. Es bildet sehr schöne Combinationen mit dem Dodecaëder, an welchem es als die geraden Abstumpungsflächen der Kanten vorkommt, und mit dem Würfel, an dessen Ecken seine Flächen eine 3flächige auf die Würfel Flächen gesetzte Zuspitzung, I bilden. Fig. 8. S. 42.

Die Hexakisoctaëder (Sechsmalachtflächner oder Achtundvierzigflächner.) Fig. 11.



Sie haben 48 Flächen, 72 Kanten und 26 Ecken. Die Flächen sind ungleichseitige Dreyecke, die Kanten dreyerley; 24 Kanten, D, von denen je 2 zwey Octaëder-Achsen verbinden, 24 Kanten, F, von denen je 2 zwey Hexaëder-Achsen verbinden, und 24 Kanten, G, welche die Octaëder- und Würfel-Achsen verbinden. Die Ecken sind ebenfalls dreyerley; 6 Ecken, A, sind 8flächig, symmetrisch, und haben eine den Ecken des Octaëders entsprechende Lage; 8 Ecken, O, sind 6flächig, symmetrisch, und haben eine gleiche Lage wie die Ecken des Würfels; und endlich 12 Ecken, E, die 4flächig und symmetrisch sind, und dieselbe Lage haben, wie die symmetrischen Ecken, F, der Icositetraëder. Die verschiedenen Arten der Hexakisoctaëder unterscheiden sich von einander dadurch, daß bald mehr die Octaëder-ecken, bald mehr die Würfel-ecken hervortreten, und sie daher bald mehr das Haupt-ansehen des Octaëders oder des Würfels haben. Man hat diese Formen bisher bloß bey dem Demant selbstständig gefunden. In Combination mit dem Würfel erscheinen seine Flächen als 6flächige Zuspitzung der Ecken, welche auf die Würfel Flächen aufgesetzt ist.

So am Glaspfath aus dem Münsterthal im Schwarzwalde und an demjenigen aus Derbyshire in Cumberland


Die Tetraflishexaëder haben das Ansehen von Würfeln, auf deren Flächen 4seitige Pyramiden aufgesetzt sind, und werden deßhalb auch Pyramidenwürfel genannt.

Die Triaklistortaëder haben im Allgemeinen das Ansehen eines Octaëders, auf dessen Flächen 3seitige Pyramiden aufgesetzt sind.

Als hemiedrische Formen müssen ferner hier angeführt werden:

Das Tetraëder, Fig. 6. C. 89, (Vierflächner, Halboctaëder, Hemioctaëder). Es wird durch 4 Flächen begrenzt, die gleichseitige Dreiecke sind, hat 6 gleiche Kanten, 4 gleichflächige Ecken, und ist eine Gestalt, die keine parallelen Flächen hat. Das Tetraëder entsteht aus dem Octaëder, wenn die abwechselnden Flächen desselben so in Größe zunehmen, daß die anderen ganz aus der Begrenzung verdrängt werden. Man findet diese Gestalt öfters sehr schön rein ausgebildet beim Fahlerz, und in Combinationen mit dem Würfel und dem Dodecaëder.

Das Pentagondodecaëder Fig. 12.




ist durch die Hälfte der Flächen des Pyramidenwürfels, oder Tetraflishexaëders begrenzt, und wird auch Pyritoköder (von Pyrites, Schwefelkies) genannt, weil es bey diesem Minerale vorzugsweise vorkommt. Die 12 Flächen, welche diese Gestalt einschließen, sind symmetrische Fünfecke, die vier gleiche Seiten und zwey Paar gleiche Winkel haben. Dem einzelnen Winkel C steht die einzelne Seite a gegenüber. Der einzelne Winkel C mißt $121^{\circ} 25'$ und ist der größte, indem die Winkel D $102^{\circ} 36'$ betragen und die Winkel E $106^{\circ} 36'$. Man kennt noch mehrere

Pentagondodecaëder, die aber nicht so oft und nicht so selbstständig wie das Pyritoëder vorkommen. Dieses findet man öfters mit dem Würfel verbunden, an dem es als schiefe Abstumpungsflächen der Kanten jener Gestalt erscheint. In Verbindung mit dem Octaëder bildet es eine Gestalt, welche mit dem Icosaëder der Geometrie Aehnlichkeit hat. Auch mit dem Dodecaëder bildet es Combinationen und mit diesem so wie mit dem Würfel und Octaëder zusammen.

Unter den Crystallformen, welche zum regulären Systeme gehören, sind der Würfel, das Octaëder, das Dodecaëder, das Leucitoëder, das Tetraëder und das Pyritoëder bey weitem die wichtigsten, da sie am häufigsten vorkommen, sich gar oft selbstständig finden und ihre Flächen in den Combinationen, in welchen man sie antrifft, in der Regel vorherrschen.


2) Zwey- und einachsiges System.

Ein quadratisches Octaëder, Fig. 13.




von 8 Flächen, O, begrenzt, die gleichschenkelige Dreiecke sind, ist die Hauptgestalt dieses Systems. Die Kanten sind zweyerley; 8 Endkanten, D, und 4 Seitenkanten, G. Die Ecken sind ebenfalls zweyerley; 2 Endecken, C, die gleichkantig, 4flächig sind, und 4 Seiteneden, A, die 4flächig und symmetrisch sind. Der durch die Seitenkanten G gelegte Schnitt ist ein Quadrat, die Basis des Octaëders, das nach der Form dieser Fläche Quadrat-Octaëder genannt wird. Unter den Gestalten dieses Crystallisations-Systems kommen viele Quadrat-Octaëder vor, die sich von einander nur durch verschiedene Neigung der Flächen unterscheiden und spitze oder stumpfe genannt werden, je nachdem ihre Hauptachsen länger oder kürzer sind als jene der Nebenachsen. Die Hauptachse verbindet die entgegengesetzten Endecken; die

Nebenachsen entweder die entgegengesetzten Seitenkanten, oder die Mittelpunkte zweyer entgegengesetzten Seitenkanten. Octaëder, bey welchen ersteres der Fall ist, heißt man Octaëder der ersten Ordnung; Octaëder, bey welchen die Nebenachsen die Mittelpunkte entgegengesetzter Seitenkanten verbinden, dagegen Octaëder zweyter Ordnung. Die Flächen dieser erscheinen als gerade Abstumpungsflächen, d, der Endkanten der Octaëder erster Ordnung. Fig. 14.



An diesen Octaëdern kommt oft eine gerade Endfläche vor, Fig. 14, c, welche rechtwinkelig gegen die Hauptachse geneigt, und wie die Basis der Octaëder ein Quadrat ist. Erscheint in einer Combination des Quadratoctaëders mit der geraden Endfläche diese sehr vergrößert und vorherrschend, so hat die zusammengesetzte Form eine tafelartige Gestalt.

Gewöhnliche Formen sind in diesem Crystallisations-Systeme auch die geraden quadratischen Prismen, welche, wenn sie allein auftreten, von 2 Quadraten als Endflächen begrenzt sind, die Lage und Gestalt der Basis des Octaëders haben, und von 4 Rechtecken, welche als Seitenflächen erscheinen. Fig. 15.



Mit diesem Prisma kommt sehr oft ein anderes quadratisches allg. Naturg. I.

sches verbunden vor, dessen Flächen als gerade Abstumpungsflächen der Seitenkanten des ersten erscheinen, so daß die beiden verbundenen Prismen sich gegen einander in diagonalen Stellung befinden. Während die Nebenachsen bey dem ersten die Winkel verbinden, vereinigen sie bey diesem die Mittelpuncte entgegengesetzter Endkanten. Die Querschnitte dieser Prismen haben somit eine gleiche Lage, wie die Basis der Quadratoctaëder 1ster und 2ter Ordnung, und nach der Uebereinstimmung ihres Querschnitts mit einer oder der andern Basis dieser Octaëder heißt man sie auch: erstes und zweites quadratisches Prisma.

Diese quadratischen Prismen kommen häufig in Combinationen mit Quadratoctaëdern vor und erscheinen an diesen als Abstumpungsflächen der Seitenkanten und der Seitenecken. Beyderley quadratische Prismen kommen auch, wie oben schon angedeutet wurde, mit der geraden Endfläche zusammen vor. Wenn diese Fläche den Prismenflächen an Größe gleich kommt, dann hat die Combination das Ansehen eines Würfels, ist indessen von diesem immer dadurch unterschieden, daß nur 2 Flächen Quadrate, die übrigen Rechtecke sind. In diesen Combinationen sind indessen bald die Prismenflächen größer, bald die Endflächen, wodurch die Crystalle bald eine säulenförmige, bald eine tafelförmige Gestalt erhalten.

Als hemiedrische Formen müssen wir Tetraëder anführen, die durch gleichschenkelige Dreyecke begrenzt werden, und die Hälfte von Quadratoctaëdern sind. Man findet sie besonders bey Kupferkies.

3. Drey- und einachsiges System.


Die Formen dieses Systems haben im Allgemeinen eine große Ähnlichkeit mit denen des vorigen Systems. Durch die Beschaffenheit ihrer Achsen haben die Gestalten beider Systeme eine bestimmte Stellung und eine gleiche Symmetrie der Flächen. Beym 2- und 1achsigen Systeme, wegen der 2 Nebenachsen, 4, 8 oder 16 Flächen, während die Gestalten des 3- und 1achsigen Systems, wegen der 3 Nebenachsen, 6, 12 oder 24 Flächen haben. Man unterscheidet bey diesem System ebenfalls Endkanten und Seitenkanten, Endecken und Seitenecken, wie beym vorhergegangenen.

Die Hexagondodecaëder, wovon C. 37. Fig. 5. dasjenige des Quarzes dargestellt ist, sind die Hauptformen aus der hemioëdrischen Reihe des dreys- und lachfigen Systems. Sie haben zwölf Flächen, die gleichschenkelige Dreyecke sind, 18 Kanten, 12 Endkanten, D, 6 obere und 6 untere, und 6 Seitenkanten, G; die Ecken sind ebenfalls zweyerley, 2 Endecken, C, die 6flächig und regulär, 4 Seitenecken, A, die 4flächig und symmetrisch sind. Die Basis dieser Gestalt ist ein regelmäßiges Sechseck, wornach die 3- und lachfigen Dodecaëder Hexagondodecaëder genannt worden sind. Man theilt die verschiedenen Dodecaëder dieser Art, wie die Quadratoctaëder, je nachdem ihre Hauptachsen länger oder kürzer als jede ihrer Nebenachsen sind, in spitze und stumpfe ein. Hinsichtlich der Lage ihrer Flächen gegen die Achse und ihrer gegenseitigen Stellung, werden sie ferner, wie die Quadratoctaëder, in Hexagondodecaëder 1ster und 2ter Ordnung eingetheilt. Mit den Flächen dieser Dodecaëder ist sehr oft eine gerade Endfläche verbunden, die als gerade Abstumpungsfläche der Endecken erscheint und ein reguläres Sechseck bildet, wie die Basis der Hauptgestalt, mit welcher sie parallel ist.

Sechseckige Prismen, deren Flächen der Hauptachse parallel sind und sich unter Winkeln von 120° schneiden, kommen auch mit der geraden Endfläche vor und mit den Hexagondodecaëdern.


Didodecaëder (zweymalzwölfflächner), kommen selten und immer nur untergeordnet vor. Sie haben das Ansehen der Hexagondodecaëder und noch einmal so viel Flächen als diese.

Von den hemioëdrischen Gestalten dieses Systems sind die Rhomboëder oder Hemidodecaëder, Fig. 16.,



ausgezeichnet. Sie werden von 6 Flächen, r , begränzt, die gleiche Rhomben sind. Die Kanten sind zweyerley, 6 Endkanten X , 3 obere und 3 untere, und 6 Seitenkanten, Z , die nicht in einer Ebene liegen, sondern im Pfah auf- und absteigen. Zwei Enddecken, C , sind flächig, regelmäßig, und 6 Seitendecken, E , ebenfalls flächig aber unregelmäßig. Sie liegen wie die Seitenkanten, nicht in einer Ebene. Die Hauptachse verbindet die beiden Enddecken, die Nebenachsen verbinden die Mitten der gegenüberliegenden Seitenkanten. Der durch die Mitte der Hauptachse gelegte Schnitt ist ein regelmäßiges Sechseck, dessen Diagonalen zugleich die Nebenachsen sind.

Man theilt die Rhomboëder in stumpfe und spizige ein. Stumpfe Rhomboëder heißt man diejenigen, deren Endkantenwinkel größer als 90° und spizige diejenigen, deren Endkantenwinkel kleiner als 90° sind. Die Rhomboëder sind die Hälfte flächner der Hexagonododecaëder, und entstehen aus denselben dadurch, daß die abwechselnden Flächen sich so vergrößern, daß die andern ganz aus der Begränzung verdrängt werden und also von den Flächen des obern und untern Endes die parallelen übrig bleiben. Je nachdem nun die einen oder die andern Flächen an Größe zunehmen, entstehen aus jedem Hexagonododecaëder Fig. 5. zwey Rhomboëder Fig. 16. und 17.,



von denen das eine gegen das andere eine um die Hauptachse um 60° gedrehte Stellung und seine Kanten in der Richtung der Flächen des andern hat. Die beyden Rhomboëder, die solchergestalt aus einem Hexagonododecaëder entstehen, verhalten sich also in letzterer Hinsicht zu einander, wie zwey Quadratoctaëder,

eines 1ster und eines 2ter Ordnung, und sie werden deshalb auch Rhomboëder 1ster und 2ter Ordnung genannt.


Die Crystalle eines Minerals, dessen Formen zur hemikratischen Abtheilung des 3- und 1achsigen Crystallisationsystems gehören, sind oft verschiedene Rhomboëder, sowohl 1ster als 2ter Ordnung, und sowohl stumpfe als spitze. Nimmt man ihre Nebenachsen als gleich an, so liegt der Hauptunterschied der Rhomboëder in der verschiedenen Größe der Hauptachsen, und die Größen dieser stehen unter einander immer in einem einfachen rationalen Verhältnisse. Die Hauptachsen derselben nehmen nämlich bey gleichen Nebenachsen, von den stumpferen zu den spitzeren Rhomboëdern in einer geometrischen Progression zu. Ein Rhomboëder der Reihe wird als Hauptrhomboëder oder als Grundform angenommen und nach diesem die Bestimmung der gegenseitigen Verhältnisse der übrigen gemacht. Angenommen die Hauptachse einer solchen Grundform sey = 1, so verhalten sich die Hauptachsen der stumpfern, des Haupt- und der spitzeren Rhomboëder zu einander wie die Zahlen:

$$... \frac{1}{8} : \frac{1}{4} : \frac{1}{2} : 1 : 2 : 4 : 8 ...$$

Sehr oft erscheint an verschiedenen Rhomboëdern die gerade Endfläche, als gerade Abstumpfungsfläche der Endede, in Form eines gleichseitigen Dreyecks. Erscheint sie so vergrößert, daß sie bis zu den Seitenecken eines Rhomboëders reicht, so hat die Combination Aehnlichkeit mit einem Octaëder, nämlich eine Begrenzung von 8 Flächen, die Dreyecke sind. Von dieser sind aber nur 2, die Endflächen, gleichseitige Dreyecke, die übrigen, Reste der Rhomboëderflächen, sind gleichschenkelige Dreyecke.


An allen Rhomboëdern kommen auch Flächen des ersten 6seitigen Prisma's vor, als Abstumpfungen der Seitenecken. Herrschen die Flächen des 6seitigen Prisma's vor, so erscheinen die Rhomboëderflächen r als 3flächige Zuspitzung an den

Enden des Prisma's s Fig. 18.




Die Rhomboberflächen sind symmetrische Fünfecke und auf die abwechselnden Flächen des Prisma's gerade aufgesetzt.

Die Flächen des 2ten 6seitigen Prisma's bilden an den Rhomboedern Abstumpungsflächen der Seitenecken. Die Rhomboberflächen behalten in dieser Combination ihre Gestalt; die Flächen des 2ten Prisma's sind Rhomboide. An einer Combination, in welcher die Prismenflächen, s , vorherrschen, erscheinen die Rhomboberflächen r als 3flächige, auf die abwechselnden Seitenkanten aufgesetzte Zuspitzung, Fig. 19.



Am häufigsten steht man verschiedene Rhomboeder mit einander in Combination. Ist das Hauptrhomboeder einer Reihe mit dem 1sten stumpferen combinirt, so bilden die Flächen des letzteren $\frac{r}{2}$ an jenem die Abstumpfungen der Endkanten.

ten Fig. 20.



An dem 1sten stumpferen Rhomboëder, wenn dieses vorherrscht, erscheinen die Flächen des Hauptrhomboëders als Abstumpfungen der Seitenecken. Eine Combination von mehreren Rhomboëdern, Dem Grundrhomboëder r , vom 1sten stumpferen $\frac{r}{2}$ und dem 1sten spitzeren $2r'$ ist ebenfalls durch Fig. 20 dargestellt. Die Flächen des 1sten spitzeren Rhomboëders $2r'$ erscheinen als Abstumpfungsflächen der Seitenecken. In einer Combination des 2ten spitzeren Rhomboëders mit dem Hauptrhomboëder, Fig. 21,



erscheinen die Flächen r des Hauptrhomboëders als schräge Einspitzung der Enden, auf die Flächen $4r$ des spitzeren Rhomboëders aufgesetzt.

Die Scalenoëder (von Scalanos, nach der Form der Flächen gebildet), sind Hemibidodecaëder, von 12 ungleichseitigen

Dreyecken begrenzt, Fig. 22.




Sie haben dreyerley Kanten: 6 kürzere und schärfere Endkanten x , die wie die Endkanten eines Rhomboëders liegen, 6 längere und stumpfere Endkanten, y , die wie die Endkanten eines andern Rhomboëders liegen, was, mit dem ersten verschiedener Ordnung ist, so daß, die längeren und stumpferen Endkanten des oberen Endes auf die kürzeren und schärferen des unteren Endes stoßen, und endlich 6 Seitenkanten, z , die, wie die Seitenkanten eines Rhomboëders, nicht in einer Ebene liegen, sondern im Zickzack auf- und absteigen. Die Ecken C , Endecken, sind 6flächig und symmetrisch; die Ecken K , Seitenecken, sind 4flächig und unregelmäßig, und es liegen von ihnen, wie bey den Seitenecken des Rhomboëders, 3 abwechselnde der oberen Endecke, die 3 andern der unteren Endecke näher.

Die Scalenohöder entstehen aus den Didocahedern **S. 22.** durch Verschwinden der Hälfte ihrer Flächen, und sind somit die hemihedrische Form derselben. Sie kommen mit andern Scalenohedern, mit Rhomboëdern, und überhaupt mit denselben Gestalten in Combinationen vor, mit welchen die Rhomboëder zusammen vorkommen.

Die Seitenkanten und die zweyerley Endkanten der Scalenohöder haben dieselbe Lage, wie die Seitenkanten von einem und die Endkanten von 2 andern Rhomboëdern, und so werden durch jedes Scalenohöder zugleich 3 verschiedene Rhomboëder bezeichnet, die zu dem Scalenohöder in naher Beziehung stehen, und mit demselben auch häufig vorkommen. Eine solche Combination ist


Fig. 23.



Die Flächen des Rhomboëders der Seitenkanten r , erscheinen am Scalenoeëder, S , als 3flächige Zuspitzungen des Endes. Die Zuspitzungsflächen sind auf die längeren Kanten gerade aufgesetzt, und die Combinationenkanten den Seitenkanten des Rhomboëders parallel.

4. Ein- und einachsiges System.

Unter den, zu diesem System gehörigen, durch 3 unter einander rechtwinkelige, sämtlich ungleiche Achsen characterisirten Formen zeichnen sich besonders die Rhombenoctaëder aus Fig. 24.



Sie werden von 8 ungleichseitigen Dreyecken O begränzt und haben 12 Kanten, die von dreyerley Art sind: 4 Endkanten, D , welche die Endpunkte der Haupt- und der 1ten Nebenachse verbinden, 4 Endkanten, F , welche die Endpunkte der Haupt- und der 2ten Nebenachse mit einander verbinden, und 4 Seitenkanten, G , welche die Endpunkte der Nebenachsen vereinigen. Die

Endkanten D heißen die ersten, die Endkanten F die zweiten Endkanten. Die 6 Ecken sind sämmtlich 4flächig, symmetrisch und von dreierley Art: 2 Endecken, C, 2 Seitendecken, A, an den Enden der ersten Nebenachse und 2 Seitendecken, B, an den Enden der zweiten Nebenachse.

Die Mineralien, deren Formen zu dem ein- und einachsigen Crystallisationsystem gehören, zeigen oft mehrere solcher Rhombenoctaëder, die hinsichtlich ihrer Achsen alle von einander unterschieden sind. Diese stehen aber ebenfalls in einem einfachen rationalen Verhältniß zu einander.


Ferner kommen häufig geschobene, oder rhombische vertikale 4seitige Säulen vor, mit der geraden Endfläche C an den Enden begränzt, Fig. 25.



Herrscht in dieser Combination die Endfläche vor, so erscheinen die Crystalle tafelfartig. In Combination mit Rhombenoctaëdern bilden die vertikalen rhombischen Prismen, wenn die Octaëderflächen vorherrschen, die Abstumpfungen der Seitenkanten derselben; herrschen dagegen die Prismenflächen vor, so erscheinen die Octaëderflächen als 4flächige Zuspizung derselben, wobei die Zuspizungsflächen auf die Flächen der Prismen gerade aufgesetzt sind. Ueberdies erscheinen Flächen horizontaler 4seitiger Prismen, von denen die einen, in Combination mit Rhombenoctaëdern, Abstumpfungen der 1ten Endkanten, die andere Abstumpfungen der 2ten schärferen Endkanten der Octaëder bilden.

Sehr oft treten auch vertikale und horizontale rhombische Prismen, ohne Octaëder, mit einander in Combination. Flächen


eines horizontalen Prisma's erscheinen an dem vertikalen Prisma als Zuschärfungen des Endes, bey denen die Zuschärfungsflächen auf die größeren Seitenkanten gerade aufgesetzt sind. Je nachdem nun die einen oder die anderen Flächen vorherrschen, zeigt die Combination einen verschiedenen Charakter. In Fig. 26.,



sind die Flächen *g* des vertikalen rhombischen Prismas, mit der geraden Endfläche *e* und mit den Flächen *d* des horizontalen Prisma's, welche vorherrschen, combinirt. Diese Verbindung trifft man sehr oft bey dem Schwerspath an.

5. Zwey- und eingliedriges System.

Die Formen dieses Systems unterscheiden sich von denjenigen des vorhergehenden durch die Schiefwinkligkeit ihrer Achsen. Sie haben nämlich 3 Achsen, die alle ungleichartig sind, und von denen 2 unter einem schiefen Winkel gegen einander geneigt sind, die 3te aber einen rechten Winkel mit beyden andern macht. Als Hauptformen erscheinen Octaeder, Fig. 27.,



die man 2- und 1gliedrige nennt. Sie haben 8 Flächen, die ungleichseitige Dreyecke und von zweyerley Art sind. Sie bilden 4 Flächenpaare, von welchen die Flächen zweyer einander gleich sind, nämlich die Flächen *o* des oberen vorderen und unteren hinteren Paares, und die Flächen *o'* des oberen hinteren und unteren vorderen Paares. Die 12 Kanten sind von vier-


erley Art: 4 Endkanten, welche die Achsen a und c verbinden, von denen wegen der Schiefwinkeligkeit der beyden Achsen nur die gegenüber liegenden einander gleich sind, nämlich die oberen vordern und die unteren hinteren, D, welche man die 1sten Endkanten nennt, und die oberen hinteren und unteren vorderen, D', welche man die 3ten Endkanten nennen kann; 4 Endkanten, F, welche die Achsen b und c verbinden, und die man die 2ten Endkanten heißen kann, und endlich 4 Seitenkanten, G, welche die Nebenachsen verbinden. Die ersten und dritten Endkanten werden von gleichen Flächen, die zweyten Endkanten und die Seitenkanten aber von ungleichen Flächen gebildet und daher Combinationskanten.

Die 8 Ecken sind 4flächig und von dreyerley Art; zwey dreyerleykantige Endecken, C, liegen an den Enden der Hauptachse, zwey dreyerleykantige Seitenecken, A, an den Enden der 1sten Nebenachse (1ste Seitenecken) und zwey symmetrische Seitenecken, B, an den Enden der 2ten Nebenachse. (2te Seitenecken.)

Dergleichen Octaëder, deren durch die 1sten und 3ten Endkanten gelegter Schnitt ein Rhomboid ist, können, unter den Crystallen eines Mineralgeschlechts viele vorkommen, die sich wiederum durch die verschiedene Länge ihrer Achsen unterscheiden. Man wählt auch hier eines derselben als Grundform, von welchem man ausgeht und nach dem der Zusammenhang der übrigen Gestalten aufgesucht wird. Es hat eine solche Grundform zwar, wie oben bemerkt worden ist, zweyerley Flächen, und somit nicht den Character einer reinen einfachen Gestalt; aber es verhält sich ein solches 2- und 1gliedriges Octaëder doch hinsichtlich des Zusammenhangs mit den übrigen Formen des Mineralgeschlechts gerade so wie eine einfache Grundform, indem die Achsen aller übrigen Gestalten derselben mit ihr in einfachen rationalen Verhältnissen stehen.

Solche Octaëder kommen selten selbstständig vor. Gewöhnlich erscheinen davon nur die einen Flächenpaare und diese bilden, wenn sie allein vorkommen, wo ihre Flächen sich alsdann in Kanten schneiden, schiefe vierseitige Prismen, welche aber, da sie den Raum nicht vollständig begränzen, nie allein,

sondern immer in Combinationen vorkommen. Diese Prismen sind sehr oft mit einer schiefen Endfläche c in Combination Fig. 28.,




die an der Grundform des Systems als Abstumpungsfläche des Endes erscheint und die Gestalt eines Rhombus hat. Combinationen der Grundform eines vertikalen rhombischen Prisma's und der schiefen Endfläche, trifft man namentlich unter den Gestalten des Augits und Feldspaths.


Nicht selten sind die Flächen der Grundform mit einem vertikalen rhombischen Prisma combinirt. Die Flächen jener bilden sodann eine 4flächige Zuspizung des Endes des Prisma's. Erscheinen die Prismenflächen an der vorherrschenden Grundform, so bilden sie Abstumpfungen der Seitenkanten, die zwar mit der Achse der Grundform parallel, aber nicht gerade, sondern gegen eine obere und untere Octaëderfläche verschieden geneigt sind.

Eine in dem 2- und 1gliedrigen Crystallisationsystem oft vorkommende und sehr charakteristische Combination ist diejenige des vertikalen rhombischen Prisma's mit einem der schiefen Prismen des Grundoctaëders, dessen Flächen alsdann das vertikale Prisma an den Enden zuspitzen. Die Zuspitzungskante läuft schief gegen die vordere oder hintere erste Seitenkante am oberen Ende, je nachdem die einen oder die anderen Flächenpaare der Grundform sich mehr ausgedehnt haben. Diese Combination trifft

man oft, beym Augit an. Fig. 29.



Ofters kommen auch Flächen vor, welche als gerade Abstumpfungsfächen der 1ten und 2ten Seitenkante des vertikalen rhombischen Prisma's erscheinen, und rechtwinkelig auf der 1ten und 2ten Nebenachse stehen, a und b Fig. 29. Diese beyden Seitenflächen und die schiefe Endfläche c bilden zusammen ein schiefes rechtwinkeliges 4seitiges Prisma, Fig. 30.,




das beym Feldspath angetroffen wird.

6. Ein- und eingliedriges System.

Dieses Crystallisationsystem steht in dem größten Gegensatz mit dem regulären System. Bey diesem findet durch die Gleichheit der Achsen die größte Symmetrie bey allen Gestalten Statt bey dem 2- und 1gliedrigen Crystallisationsystem finden sich dagegen gar keine symmetrischen Flächen, alle 3 Achsen sind ungleichartig und schneiden sich unter schiefen Winkeln. Als Grundform wird ein

Octaëder angenommen, Fig. 31.,



welches das 1- und 1gliedrige heißt und von 8 Flächen begrenzt wird, die ungleichseitige Dreiecke und von viererley Art sind, so daß nur die parallelen Flächen gleichartig sind. Die 12 Kanten sind sechserley, die vordere Endkante, D, ist verschieden von der hinteren, D', die rechte Endkante, F, verschieden von der linken F', die rechte Seitenkante, G, verschieden von der linken G'. Die Ecken sind dreierley, und sämtlich viererleykantig. Die durch die Endkanten D und F und durch die Seitenkanten, G, gelegten Schnitte sind Rhomboide.

Die gewöhnlichsten Gestalten sind Prismen, wie bey dem 2- und 1gliedrigen System, deren rechtwinkliger Durchschnitt ein Rhomboid ist, also rhomboidische Prismen. Sie haben zweyerley Flächen, die daher auch einzeln in Verbindung mit anderen Flächen vorkommen können. Ueberdies kommen in diesem System Flächen vor, welche die dreierley Ecken der 1- und 1gliedrigen Octaëder abstumpfen, und diese stehen alle schiefwinklig auf den verschiedenen Achsen.

Die Crystalle, welche zu diesem Systeme gehören, sind oft sehr complicirt; doch sind es nur wenige Mineralgeschlechter, deren Gestalten zu demselben gerechnet werden müssen.

Von der Verbindung der Crystalle unter einander.

Sehr oft sind einzelne Crystalle mit einander verbunden. Wird durch die Verbindung von gleichartigen Crystallindividuen eine regelmäßige Gestalt gebildet, so heißt man die Verbindung eine regelmäßige, im entgegengesetzten Fall aber eine unregelmäßige. Von Crystallen, die sich unter einander in

einer unregelmäßigen Verbindung befinden, sagt man: sie seyen zusammengewachsen.


Man hat die zusammengefügten Gestalten, welche aus regelmäßig mit einander zu einem einzigen Ganzen verbundenen Crystallindividuen bestehen, nicht unpassend mit den monströsen Doppelbildungen verglichen, die im organischen Reiche bey Pflanzen und Thieren angetroffen werden, von welchen bisweilen zwey Individuen derselben Gattung nach einem gewissen Gesetze an oder durch einander gewachsen sind. Einige Theile der verbundenen Individuen sind alsdann gemeinschaftlich, während andere halb dem einen, halb dem andern Individuum angehören. Was aber nun bey Pflanzen und Thieren selten vorkommt, und als eine Monstrosität angesehen wird, das findet man dagegen im organischen Reiche, bey den Mineralien, sehr oft und bey einigen Mineralgeschlechtern so häufig, daß die Verbindung der Individuen Regel, das einzelne Auftreten derselben eine Ausnahme ist.

Je nachdem nun zwey, drey, vier und mehrere Individuen mit einander verbunden sind, nennt man diese Bildungen *Zwillinge*-, *Drillinge*-, *Sterlinge*-Crystalle u. s. w., wobei man jedoch im Allgemeinen jede solche Verbindung an und für sich mit dem Namen eines *Zwillingscrystalls* belegt. Man erkennt die *Zwillingscrystalle* in der Regel daran, daß sie einspringende Kanten haben, d. i. Kanten, die mehr als 180° messen und eine Vertiefung bilden.


Die verbundenen Individuen sind nun entweder an oder durch einander gewachsen und darnach unterscheidet man *Zwillingsbildung* durch *Juxtaposition* und durch *Durchwachsung* der Individuen. Dieser Unterschied ist jedoch kein wesentlicher, indem man Crystallindividuen desselben Minerals einmal an einander, ein andermal durch einander gewachsen antrifft. Alle *Zwillingsbildungen* haben aber das gemeinschaftliche Gesetz, daß die sie zusammensetzenden Crystallindividuen identisch sind, daß sie mit einander irgend eine Achse, eine Haupt-, Neben-, oder Zwischen-Achse, oder bestimmte Flächen gemein haben, die man unter der Reihe der Crystalle eines Minerals bemerkt, und daß endlich ein Individuum gegen das andere immer ver-

dreht ist. Nach dieser letztern Thatsache, der Verdrehung der Individuen an einander, hat Haüy die Zwillingacrystalle auch mit dem Namen *Hemitropie* belegt. Man kann sich nämlich vorstellen, daß die Individuen sich in einer Fläche, der Zusammensetzungsfläche, berühren, und eines derselben um eine auf der Zusammensetzungsfläche senkrechte oder weiter ihrer Lage nach bestimmte Linie, welche man *Umdrehungsachse* nennen kann, um die halbe Peripherie, um 180° an dem andern Individuum verdreht sey. Auch kann man sich denken, ein Individuum sey durch einen, der Zusammensetzungsfläche parallelen Schnitt halbt und hierauf die eine Hälfte gegen die andere um die auf der Schnittfläche senkrechte Umdrehungsachse um eine gewisse Anzahl Grade verdreht worden.

Gar schön und leicht zu erklären sind die Zwillinge, welche aus Crystallen des regulären Systems zusammengesetzt sind. Die Zwillinge der Gestalten, welche die Hauptform des Octaëders haben, zeigen eine Zusammensetzungsfläche, welche einer Octaëderfläche parallel ist, die Umdrehungsachse steht darauf senkrecht und das eine Individuum ist gegen das andere um diese Achse durch 60° verdreht. Solche Zwillinge kommen oft bey dem Magnetkies vor und sind bey diesem Mineral durch Juxtaposition gebildet, Fig. 32.



Bey andern Mineralien trifft man mitunter auch eine aus Octaëdern bestehende Zwillingbildung, wobey die Individuen durch einander gewachsen sind, Fig. 33.



Die weiteren Gesetze, nach welchen sich Individuen der übrigen Crystallisationsysteme zu Zwillingen vereinigen, wollen wir später, wenn wir bey der Beschreibung der einzelnen Mineralien auf Zwillingsgestalten stoßen, bey dem ersten Fall jeder Art angeben.

Die unregelmäßige Verbindung mehrerer Crystallindividuen nennt man Gruppierung. Trägt dabey ein Crystall den anderen, so heißt man die Verbindung eine Crystallgruppe. Sitzen mehrere unregelmäßig zusammen gewachsene Crystalle auf einer Unterlage, die sie alle trägt, so belegt man ihre Gesamtheit mit dem Namen Crystalldruse. Solche Drusen findet man oft in Höhlungen und Spalten, deren Wände die Unterlage der aufstehenden Crystalle bilden. Man trifft sie am häufigsten beym Quarz und Kalkspath.

Von den Unvollkommenheiten der Crystalle.

Bey der gegebenen Beschreibung der Crystalle haben wir angenommen, daß ihre Flächen vollkommene Ebenen, daß sie glatt, d. i. frey von allen kleineren Unebenheiten seyen, und endlich, daß die gleichnamigen Flächen der Crystallgestalten auch völlig gleiche Ausbildung besitzen. So vollkommen regelmäßig ausgebildet findet man aber die Crystalle selten in der Natur. Wir haben der Unvollkommenheiten derselben indessen bisher absichtlich nicht erwähnt und werden sie auch später bey der Beschreibung der einzelnen Mineralgeschlechter nicht anführen, da wir hier, wie bey der Darstellung der Hauptverhältnisse der Thiere und Pflanzen und der Beschreibung ihrer Geschlechter und Gattungen, als deren Repräsentanten die normalen Gebilde und nicht die Mißgeburten betrachten. Es ist jedoch auch von Interesse und im Grunde wohl nöthig, die verschiedenen Unvollkommenheiten im Allgemeinen kennen zu lernen, theils weil wir in denselben Modificationen der Crystallisation wahrnehmen, deren Ursachen nachzuforschen nicht ohne Erfolg für die Wissenschaft bleibt, theils weil man durch die Kenntniß der verschiedenen Abweichungen von der Vollkommenheit der Crystalle, Verwechselungen und Fehlschlüssen entgeht.

Sehr oft beruht die Unvollkommenheit der Crystalle auf einer ungleichen Ausdehnung ursprünglich gleichnamiger Flächen, und die Gestalten erscheinen dabey wie verzerrt. Sie sind in der Richtung einer Haupt- oder Nebenachse verkürzt oder in die Länge gezogen. Das gewöhnlichste Beyspiel davon giebt der Flußspath, dessen Würfel nicht selten das Ansehen einer geraden rectangulären Säule, oder auch eines quadratischen, öfters tafelartigen Prisma's besitzt. Das Rautendodecaëder des Granats ist sehr oft in der Richtung einer Achse in die Länge gezogen, welche die entgegengesetzten 3flächigen Ecken verbindet, und hat alsdann das Ansehen einer rhomboëdrischen Combination, nämlich einer 6seitigen; durch drey Flächen zugespitzten Säule. Mitunter ist es in der Richtung einer Achse verlängert, welche die 4flächigen Ecken verbindet, dann hat es das Ansehen einer Combination des 2- und 1achsigigen Systems, nämlich einer quadratischen Säule, die an den Ecken mit vier auf den Seitenkanten aufgesetzten Flächen zugespitzt ist.

Nicht selten erscheinen in einer Combination nicht alle Flächen der verbundenen Gestalten, und es zeigt sich auf diese Weise, und zwar in allen Crystallsystemen, eine Unvollständigkeit der Flächen, welche von dem Auftreten der Halbfächner homoëdrischer Gestalten wohl zu unterscheiden und in keine Regel zu bringen ist. So erscheinen z. B. an dem Würfel bisweilen nur eine oder einige Kanten, nur ein oder mehrere Ecken abgestumpft, da nach dem, beym regulären Systeme durchgreifend statt findenden Symmetriegesetz, die gleichartigen Theile einer Gestalt alle auf gleiche Weise verändert seyn müßten. Auch bey Combinationen des 2- und 1achsigigen, sowie des 3- und 1achsigigen Systems, sind 4- und 6seitige Prismen und Pyramiden öfters nicht mit der vollen Zahl ihrer Flächen mit einander verbunden. Kommt dazu noch eine ungleiche Ausdehnung der gleichnamigen Flächen, dann haben die Gestalten ein so unsymmetrisches und regelloses Ansehen, daß es nicht immer ganz leicht ist, sie richtig zu beurtheilen.

Eine ganz gewöhnliche Unvollkommenheit der Crystalle besteht in der Unvollständigkeit ihrer Umrisse. Sie sind nämlich sehr selten rundum ausgebildet, sondern gewöhnlich mit

einem Ende aufgewachsen, an diesem durch die Unterlage in freyer Entwicklung gehindert und wie abgeschnitten. Die Adhäsion an die Unterlage wirkt der vollkommenen Gestaltung hemmend entgegen, die nur im freyen Raume erfolgen kann, oder da wo die Adhäsionsverhältnisse der regelmäßigen und allseitigen Ausbildung der Crystalle keine Schranken setzen. Das kann man gar gut sehen, wenn man Alaun, der bey freyem Wachsthum der Crystalle schöne regelmäßige Octaëder bildet, in einer Glas- oder Porzellanschaale crystallisiren läßt, wobey man in der Regel lauter Gestalten erhält, die an dem Theile, mit welchem sie auf dem Boden oder der Wand der Schaale feststehen, unvollkommen ausgebildet sind. Legt man diejenigen von ihnen, welche die vollkommenste Gestalt haben, in eine gesättigte kalte Alaunauflösung auf eine der ausgebildeten Flächen, so daß die unvollkommen ausgebildeten Theile nach oben und frey in die Flüssigkeit zu liegen kommen, so gestalten sich auch diese nach und nach vollkommener. Auf eine solche Weise verschafft man sich, durch achtsames Umwenden der in eine gesättigte Lösung eingelegten kleineren und vollkommeneren Crystalle eines Salzes, sehr schöne, große und wohl ausgebildete Crystalle, indem durch ein zweckmäßiges Umwenden derselben der hemmende Einfluß der Unterlage beynahe völlig aufgehoben wird.

Krümmung der Flächen beeinträchtigt die Vollkommenheit der Crystalle gleichfalls nicht selten. Bey vielseitigen Prismen wird sie öfters dadurch veranlaßt, daß die Flächen unter sehr stumpfen Winkeln zusammenstoßen, wie man dieß bey Turmalin, Beryll und Apatit sieht. Bisweilen sind ganze Crystalle gekrümmt, wie die Prismen des Turmalins und Cyanits. Gar oft leidet die Vollkommenheit der Flächen auch durch Streifung derselben, welche dadurch entsteht, daß die Flächen von zwey in einer Combination vorhandenen Gestalten sich abwechselnd in sehr geringer Entwicklung wiederholen. Eine solche Streifung läuft immer mit der Verbindungsante der Gestalten parallel. Man findet sie ganz gewöhnlich bey Bergcrystall, von welchem man kaum irgend ein Stück in die Hand bekommt, an dem sie nicht deutlich ausgesprochen wäre. Er wird in der Regel in Gestalt einer Sechseckigen, an den Enden mit einer flächigen

gen Pyramide zugespitzten Ende gefunden, Fig. 2. C. 36, deren Flächen horizontal gestreift sind. Diese Streifung rührt davon her, daß sich in dem prismatischen Theil der Gestalt Fig. 1. die Flächen der Pyramide in unbedeutender Entwicklung immer abwechselnd zwischen den Prismenflächen einfinden und wieder holen, gegen diese aber zurückstehen, bis sie endlich gegen die Spitze des Crystalls die Oberhand gewinnen und die Enden desselben für sich allein bilden. Zeigen sich die Pyramidenflächen etwas stärker entwickelt, so erhält die Combination durch die Abwechselung schmaler Flächenstreifen der einen Gestalt mit solchen der andern Gestalt ein treppenartiges Ansehen.

Eine weitere Unvollkommenheit der Crystalle besteht darin, daß sie hin und wieder eine unterbrochene Räumerefüllung zeigen, oder mit anderen Worten, daß die Substanz eines Crystalls den Raum der Gestalt, den die Umrisse andeuten, nicht vollkommen erfüllt. Die Flächen zeigen alsdann gewöhnlich trichterförmige Vertiefungen, auch wohl öfters unregelmäßige Aushöhungen. Diese Unvollkommenheit der Crystalle scheint durch allzugroße Beschleunigung des Crystallisationsprocesses veranlaßt zu werden. Dadurch hervorgerufen, sehen wir sie wenigstens immer beim Kochsalz, dessen würfliche Crystalle gemeinhin trichterförmig vertiefte Flächen zeigen. Der Bergcrystall bietet am öftesten Beispiele dieser Art von Unvollkommenheit dar; die man auch häufig bey den künstlich bereiteten Crystallen des metallischen Wismuths sieht und in älteren Sammlungen bisweilen als „Crystallisation à la Grecque“ bezeichnet findet.

Eine ganz merkwürdige Abweichung von der Symmetrie der Crystalle ist die ungleiche Ausbildung einiger, mit einer vorherrschenden Hauptachse versehenen, Gestalten an den Enden, wobey sie an einem Ende oft mehr und andere Flächen, als an dem entgegengesetzten besitzen. Solche Crystalle haben die Eigenschaft durch Erwärmung electricisch zu werden, und an den entgegengesetzten Enden auch die entgegengesetzten Electricitäten zu zeigen. Ihre unsymmetrische Bildung scheint daher mit der Erregbarkeit und Vertheilung der Electricität in einem gesetzmäßigen Zusammenhange zu stehen. Das Ansehen solcher Crystalle ist berggestalt,

als gehörten die verschiedenen Enden auch verschiedenen Crystall-individuen an, und als wären von jeder Gestalt entweder nur die zur oberen oder die zur unteren Hälfte gehörigen Flächen vorhanden und erschienen somit an den beyden Enden die Hälften verschiedener Crystalle. Der Turmalin und der Topas zeigen diese Erscheinung am häufigsten.

Bei größeren Crystallen sieht man endlich die Flächen sehr oft rauh, d. i. von sehr kleinen Unebenheiten verunstaltet, oder brustig, d. h. versehen mit Hervorragungen, welche durch die Ecken sehr kleiner Crystallrudimente gebildet werden, die der Oberfläche ein eigenthümliches gehacktes oder stacheliges Ansehen verleihen, je nachdem sie parallelepipedisch oder pyramidal sind. Der Flußspath zeigt in größeren Crystallen dieses Verhältniß am gewöhnlichsten.

Bemerkenswerth ist noch die Thatsache, daß die Flächen, welche zu einerley Gestalt gehören, immer dieselbe übereinstimmende Beschaffenheit der Oberfläche besitzen, sie mögen im Uebrigen auch noch so ungleichartig ausgebildet seyn. Dadurch werden wir in den Stand gesetzt, bey Combinationen, in welchen die Flächen einer Gestalt durch ungleichartige und unverhältnismäßige Ausdehnung einander sehr unähnlich geworden sind, sie demungeachtet als zusammen gehörige oder gleichnamige zu erkennen.

Von den Asterectystrallen oder Pseudomorphosen.

Zuweilen sieht man Crystalle, welche die wohl bekannte Form eines Mineralgeschlechtes an sich tragen, im Innern aber aus einer ganz andern Masse bestehen, und die somit eine Gestalt besitzen, welche mit der chemischen Zusammensetzung und den übrigen Verhältnissen des Minerals durchaus in keinem Zusammenhange steht. Solche Bildungen, welche hinter einer fremden erborgten Form gleichsam ihre wahre Natur verbergen, hat man schon lange beobachtet und verschiedentlich: Asterectystralle, falsche Crystalle, oder Pseudomorphosen, Irngestalten genannt. Die Formen der Pseudomorphosen gehören, dem Gesagten zufolge, nicht, wesentlich dem Mineralkörper an, der sie zeigt, und sind insofern auch keine wahren Crystalle.

Diesen Namen geben wir durchaus nur solchen Gestalten, die mit der Gesamtheit der übrigen Eigenschaften eines Minerals im innigsten Zusammenhange stehen.

Die Flächen der Pseudomorphosen sind im Allgemeinen weniger glatt, als die Flächen wahrer Crystalle, gewöhnlich glanzlos. Man bemerkt an ihnen seltener einzelne über die Oberfläche hervorragende Theile, wodurch eine Drusigkeit entsteht. Der Mangel des Glanzes fällt besonders bey den Pseudomorphosen des Eisenglanzes auf, die Kalkspathform besitzen, da wir, die Flächen der Eisenglanzcrystalle stark glänzend zu sehen gewohnt sind. Ein richtiges negatives Kennzeichen der Pseudomorphosen ist ferner der gänzliche Mangel an Theilbarkeit. Im Innern sind sie oft hohl und manchmal drusig.

Die Bildung der Pseudomorphosen kann auf verschiedene Weise geschehen. Manche wurden offenbar durch Ausfüllung gebildet, indem die weiche Masse eines Minerals den Raum ausfüllte, den ein Crystall hinterließ, welcher einen Eindruck in der ihn umschließenden Masse bewirkt hatte. Diese Bildung ist der Anfertigung eines Abgusses vergleichbar, wobey man eine flüssige oder breiartige Masse in einen Model oder eine Form gießt. Wird nach erfolgtem Guß die Form zerbrochen, so steht das Gebilde selbstständig da. Die Pseudomorphosen erscheinen, wenn die Masse, worin der Crystall-Eindruck war, zerstört ist, als aufgewachsene Crystalle.

Eine andere Art der Bildung fraglicher Gestalten geschieht durch Ueberzug. Substanzen, die sich aus Flüssigkeiten absetzen, überziehen die Oberfläche eines Crystalls und bedecken denselben, wie die Schale einen Kern. Das Incrustat nimmt mehr oder weniger vollkommen die Form des Crystalls an, den es überzieht, und erscheint hohl, wenn derselbe auf irgend eine Weise zerstört worden ist. Die Oberfläche solcher Pseudomorphosen ist mitunter rauh und drusig, da die im flüssigen oder breiartigen Zustand auf den Kern sich ablagernde Substanz beym Bestwerden ihrer eigenthümlichen Crystallisation folgen konnte.

Endlich entstehen viele Pseudomorphosen auf die Art, daß ein crystallisiertes Mineralindividuum, vermittelt einer Veränderung seiner chemischen Zusammensetzung, unter Bey-

behaltung der ersten Crystallform, sich in ein Mineralindividuum von anderer chemischer Beschaffenheit verwandelt. Das gewöhnlichste Beispiel dieser Art geben die Pentagonalbodecaëder des Schwefelkies, deren Masse aus Brauneisenstein besteht. Schwefelkies, dessen Bestandtheile Eisen und Schwefel sind, in seiner gewöhnlichsten Form crystallisirt, hat sich, bey vollkommener Erhaltung derselben, in Brauneisenstein, d. h. in eine Verbindung von Eisenoryd und Wasser verwandelt. Von dieser eigenthümlichen chemischen Umwandlung einer Substanz in eine andere, mit Beybehaltung der Form der ersteren, werden wir später, wenn von der chemischen Constitution der Mineralien die Rede seyn wird, ein Mehreres anführen.

Von der Beständigkeit der Winkel.

Bei aller Verschiedenheit in Größe und Figur der Flächen, bey aller Wandelbarkeit der Physiognomie zusammengesetzter Crystalle, je nachdem nun diese oder jene Gestalt in der Combination vorherrscht, bleibt doch die gegenseitige Lage der Flächen der Crystalle beständig eine und dieselbe, und zwar bey den vielschfigen Gestalten unter allen Bedingungen, bey den einschfigen Gestalten aber bey einer und derselben Temperatur. Romé de l'Isle war der Erste, welcher die interessante Beobachtung machte, daß die Winkel, welche durch das Schneiden der Crystallflächen gebildet werden, constant sind, eine Thatfache, welche als das wahre wissenschaftliche Element der Crystallographie betrachtet werden muß. Kanten- und Flächenwinkel sind die beständigen, unumwandelbaren Verhältnisse der Crystalle, während die Länge der Kanten, die Flächen und ihre Diagonalen, ja selbst die Achsen auf die mannigfaltigste Weise wechseln. Messungen der beständigen Winkel werden daher zur wahren Erkenntniß der Gestalten führen, und können allein der Berechnung und vollständigen Bestimmung der Crystalle zu Grunde gelegt werden. Am zweckmäßigsten, weil am leichtesten und sichersten, nimmt man die Messungen an Kantenwinkeln vor. Ganz kleine, unwesentliche Abweichungen von einigen Minuten, zeigen sich indessen auch bey wohl ausgebildeten Crystallen, mit glatten spiegelnden Flächen.

aus scharfen Kanten, und bisweilen selbst in Winkeln bey einem und demselben Crystalle. Kleine Crystalle mit sehr glatten Flächen kommen einer völligen Uebereinstimmung in den Winkeln gewöhnlich sehr nahe, zumal wenn sie von einerley Lagerstätte abstammen. Die genauesten Messungen schwanken indessen innerhalb derselben Grenzen, in welchen sich die meisten Abweichungen einzelner Crystalle in ihren Winkeln bewegen. Wir können daher ein Mittel aus sehr vielen Beobachtungen als festen Punkt annehmen, um welchen herum die kleinen Abweichungen liegen, und auf diese Weise der Crystallographie eine sichere geometrische Grundlage geben.


Wir haben oben bemerkt, daß bey den einachsigen Gestalten die Winkel nur bey einer gleichen Temperatur unwandelbar sind. Nach den höchst interessanten Beobachtungen von Mitscherlich finden bey jenen Gestalten Veränderungen der Winkel statt, wenn man sie erwärmt. Diese scheinen ihren Grund in der ungleichen Ausdehnung der verschiedenen Achsen zu haben. Die Winkelveränderung beträgt von 0° bis $+100^{\circ}$ 10 bis 12 Minuten und bis zur Siedhize des Oels bis 20 Minuten. Die Rhomboëder des Kalks, Eisens und Bitterspaths erleiden, beym Erwärmen, in der Richtung der Hauptachse eine Ausdehnung, in der Richtung der Nebenchsen dagegen eine Zusammenziehung. Arragonit und mehrere andere Crystalle des 1- und 2achsigen Crystallisationsystems erleiden nach allen drey Achsen eine ungleiche Ausdehnung.

Vom Messen der Winkel.

Eine genaue Untersuchung der Crystallwinkel ist nach dem, was über die regelmäßigen Formen der Mineralien angeführt wurde, von großem Interesse, und da die Untersuchungen der Größe der Winkel eines crystallisirten Minerals, wenn sie bey einerley Temperatur vorgenommen werden, ein immer gleiches unwandelbares Resultat liefern, so werden die Winkel der Crystalle ein wesentliches Kennzeichen zur Erkennung und Unterscheidung der Mineralien seyn.

Die Größe der Neigung zweyer Flächen oder Kanten eines

Erystals, kann auf verschiedene Weise bestimmt werden, und man hat auch mancherley Instrumente zum Messen der Winkel ausgedacht. Erst maß man die Länge der Kanten mit Zirkeln oder Micrometern, berechnete daraus die gegenseitige Neigung derselben und leitete aus diesem sodann die Neigungen der Flächen her. Diese wenig genaue Methode wandten Huyghens, Gaussure, Kästner und Andere an. Carangeau erfand ein eigenthümliches Meßinstrument, ein Gonyometer, Fig. 34.,



welches nach der Art seiner Anwendung Anlegegoniometer genannt wird. Im Besitze dieses Instruments, war Romé de l'Isle schon im Stande viel genauere Beobachtungen zu machen, als seine Vorgänger. Haüy machte seine Messungen ebenfalls noch mit diesem Instrumente. Seine Construction ist sehr einfach. Es besteht aus einem in Grade getheilten Halbkreis von Messing, an dem zwey bewegliche stählerne Lineale angebracht sind. Das eine $a b$, kann nur der Länge nach verschoben werden. Seine Mittellinie, welche durch den Mittelpunkt der Bewegung des andern Lineals $c d$ geht, verbindet die Punkte von 0° und 180° mit einander, oder liegt genau im Durchmesser des Kreises. Das Lineal $c d$ hat zwey Bewegungen, einmal um den Punct g herum, und sodann auch der Länge nach, vermittelst der Oeffnung $o f$.

Die scharfe Kante $h i$ dieses Lineals, deren Verlängerung durch den Umdrehungspunct g geht, schneidet auf dem Halbkreis

die Grade und Minuten ab, welche das Maaß eines Winkels sind, der von den beyden Stücken der Lineale *a k* und *d k* eingeschlossen wird, da die Scheitelwinkel gleich sind. Will man nun mit diesem Instrumente eine Kante messen, so bringt man die Linealstücke *a k* und *c k*, so wie Fig. 35.




zeigt, mit der an der Kante anliegenden Fläche in Berührung, so daß jedes Linealstück senkrecht auf einer Fläche aufliegt. Die Lineale sind, um dieses leicht und genau ausführen zu können, etwas stark gearbeitet. Den zu messenden Crystall hält man in der linken Hand, während man mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten das Lineal *c d* bewegt und an die zu messende Fläche anlegt. Schließen die Linealstücke genau an und laufen sie völlig parallel mit den Flächen, auf welche sie möglichst richtig senkrecht aufgesetzt sind, so geschieht die Messung mit dem Grade von Genauigkeit, den dieses Instrument giebt, mit welchem man die wahre Größe der Winkel bis auf 15 Minuten genau bestimmen kann. Diese Messung setzt indessen Crystalle von einiger Größe voraus, weil man die kleinen vermittlest der Finger nicht mehr genau dem Instrumente darbieten kann und die Lineale darauf nicht mehr angelegt werden können.

Kleine Crystalle sind aber gerade die regelmäßigsten und vollkommensten, und die Messung ihrer Winkel somit besonders wichtig. Bey diesen wird nun die Winkelmessung auf das Prinzip der Spiegelung der Flächen gegründet. Auf dieses Prinzip gründete Wollaston das höchst sinnreiche Reflexions-Gonjometer, durch welches der Winkel der Flächen, durch abwechselnde Spiegelung eines Gegenstandes vor denselben, gemessen wird. Der allgemeineren Anwendung dieses Instrumentes verdankt der cry-

stakographische Theil der Dryctognosie jenen Grad von Genauigkeit, der ihm den scharfen wissenschaftlichen Character verleiht.

Wollastons Reflexions-Gonjometer, Fig. 36,



besteht im Wesentlichen aus folgenden drey Stücken. Das erste ist ein unbewegliches Gestell mit zwey Säulen d o, welches einen Nonius o trägt. Das zweyte ist ein eingetheilter Kreis a b, der mit der Scheibe k in fester Verbindung steht, und um seine Achse beweglich ist; eine feste Linie n, welche auf der den Nonius tragenden Platte c angebracht ist, zeigt jede Bewegung des eingetheilten Kreises an, indem sie auf die Grade und Minuten desselben hinweist. Das dritte Stück endlich ist die Achse f k, welche sich innerhalb des Stückes a b und im Centrum von k, wie in einer Röhre, ebenfalls um ihre Achse drehen läßt. Sie wird durch die Scheibe i bewegt. An ihr ist zur Linken der Apparat angebracht, woran der Crystall l befestigt wird, den man messen will. Die Scheibe i, der Stift o und der Apparat t, woran der Crystall angebracht wird, können unabhängig von a b und k bewegt werden, dagegen bewegen sich i und t mit der Scheibe k.

Es ist bekannt, daß reine Crystallflächen sehr stark spiegeln. Wenn man eine glänzende Fläche eines Crystalls nahe ans Auge bringt, so erhält man von ihr, wie von einem künstlichen Spiegel, das vollkommene Bild irgend eines gehörig der Crystallfläche gegenüberliegenden Körpers, z. B. der Querstäbe eines Fensters, der Gesimse eines Gebäudes. Dreht man nun den Crystall herum, bis eine andere Fläche desselben spiegelt, und das gleiche Bild an demselben Orte zeigt, so muß man mit dem Crystall nothwendig eine Bewegung von einer gewissen Anzahl Grade um eine horizontale Achse machen. Will man den Crystall nun mit Hülfe des Reflexionsgoniometers messen, so befestigt man denselben an der Achse *ff* und stellt ihn so, daß die Spiegelung von der ersten Fläche mit 0° (Zero) oder mit 180° übereinstimmt. Wenn der Crystall nun gedreht wird, bis eine andere Fläche die gleiche Spiegelung zeigt, so weist der Nonius auf einen gewissen Grad auf dem eingetheilten Kreise, wodurch die Größe der Winkelbewegung angedeutet wird. Diese Größe ist das Supplement des zu messenden Winkels zu 180° , und deßhalb ist das Instrument auch von unten hinauf eingetheilt. Zur genauen Bestimmung der Neigung zweier Flächen gegen einander ist bei diesem Verfahren nothwendig, daß die Kante, welche der Durchschnit derselben ist, der Achse des Instruments vollkommen parallel und derselben auch so nahe als möglich sey. Man stelle zu diesem Ende das Instrument so auf, daß die Achse desselben einer bestimmten horizontalen Linie, z. B. einem Fensterquerstabe *v* parallel ist, der wegen des Contrastes von Licht und Schatten sich zur Anwendung besonders gut eignet. Er ist auch zugleich der Gegenstand, welchen die Crystallflächen reflectiren. Der zur Linken der Achse *ff* angebrachte Apparat hat den Zweck, die Horizontalstellung des Crystalls zu erleichtern. Dieser wird nämlich mit Wachs an dem Ende *h* des Stiftes *o* befestiget, der sich in der Röhre *p* bewegt, rund ist und daher auch um seine Achse beweglich ist. Bey *t* ist noch eine Bewegung, da sich derjenige Theil, welcher den Stift *o* trägt, ebenfalls um eine Achse, nämlich um den kleinen Stift *r* dreht. Durch diese drey senkrecht auf einander stehenden Bewegungen ist es möglich, eine gegebene

Kante eines Crystalls der Achse des Instruments vollkommen parallel zu stellen.

Das eigentliche Verfahren bey der Messung ist nun folgendes: ein vollkommener Crystall mit glatten Flächen, z. B. eines der stumpfen Rhomboëder des Kalkspaths wird, wie es die Figur zeigt, mit Wachs befestiget. Unter dem Fenster zieht man an der Wand eine Linie v , die den Fensterquerstäben parallel und somit horizontal ist. Je weiter entfernt diese Linie und der sich spiegelnde Gegenstand von dem Instrumente sind, desto genauer fällt das Resultat der Messung aus. Deshalb können Horizontallinien auf der Fagade eines Gebäudes, Gärten, Gesimse u. s. w., die Firste eines gegenüber stehenden entfernten Hauses, mit Vortheil zu diesem Zwecke benützt werden. Doch muß man in diesem Fall vermittelt eines Fernrohrs mit einem Fadenkreuz sich von der richtigen Lage des Gegenstandes versichern.

Wenn man das Auge nun einer der spiegelnden Flächen nahe bringt, so fällt das Bild des Fensterstabes nicht ganz genau auf die schwarze Linie v ; zur Bewerkstelligung dieses dient nun der Apparat, der an die Achse f angebracht ist. Man sucht es erst mit einer, dann mit der anderen der Flächen zu vollführen und gelangt durch Uebung bald dahin, das erforderliche Zusammenfallen des Bildes und der Linie v mit Leichtigkeit zu Stande zu bringen. Der an h befestigte Crystall wird nun vermittelt der Scheibe i , mit der oberen Seite gegen das Auge des Beobachters zu, so lange gedreht, bis das Bild eines der Fensterstäbe genau auf die schwarze Linie v fällt, während der Nonius auf Null oder 180° steht. Innerhalb des in Grade getheilten Kreises ist bey x eine Vorrichtung angebracht, wodurch der Kreis auf diesem Punkte festgehalten wird, wenn man ihn dem Beobachter entgegen dreht.

Fällt nun das Bild auf die schwarze Linie, so dreht man mit der Scheibe k das Ganze, mit Ausnahme des Nonius, um die Achse herum, bis das von der zweyten Fläche zurückgeworfene Bild ebenfalls auf die schwarze Linie fällt. Jetzt liest man die Anzahl der Grade und Minuten ab, welche der Nonius angibt. Bey der auf beschriebene Weise mit dem als Beyspiel gewählten Kalkspathcrystalle vorgenommenen Messung steht Null des No-

nus etwas über 150° , und weiter sieht man, daß der auf dem Nonius mit 5 bezeichneten Linie genau eine Linie des eingetheilten Kreises gegenüber steht, woraus folgt, daß der gemessene Winkel gleich $105^\circ 5'$ ist.

Auch bey dieser, zur Zeit genauesten, Messungsweise der Crystallwinkel, stimmen die Resultate der Messung eines und desselben Winkels, bey verschiedenen Crystallen, und sogar wenn man die gleichen Winkel an entgegengesetzten Theilen eines und desselben Crystalles mißt, nicht immer mit einander überein. Der Hauptgrund davon liegt in der unvollkommenen Ausbildung der Crystallflächen. Eine weitere Ursache liegt in der Excentricität der zu messenden Kante, welche zumal dann von Belang ist, wenn der sich spiegelnde Gegenstand und die schwarze Linie v dem Auge des Beobachters nahe liegen. Endlich wirkt auf die Fehler auch eine bedeutende Größe eines zu messenden Crystalls ein, weil alsdann durch die Beugung der Lichtstrahlen die schwarze Linie nicht in ihrer wahren Lage erscheint.

Von den crystallinischen Gestalten.

Zeigen die Gestalten der Mineralien, statt der vollkommenen, regelmäßigen, von geraden und ebenen Flächen gebildeten Begrenzung, nur Andeutungen oder Spuren derselben, so nennt man sie crystallinische. Sie entstehen bey gestörter oder gehemmter Crystallisation und sind die eigentlichen Rudimente der Crystalle.

Das gewöhnlichste Beyspiel der Bildung crystallinischer Gestalten gibt uns das Fenstereis. Das Wasser, welches an den kalten Fensterscheiben zu Eis erstarrt, bildet bey dem langsamen Gefrieren im freyen Raume sechsseitige Säulen. Beym Erstarren am Glas aber wirkt die Adhäsion des Wassers an dasselbe der Crystallisationskraft entgegen. Statt eines sechsseitigen Prisma's entsteht ein blümiges, federfahnenartiges Gebilde, aus geraden Linien zusammengesetzt, von welchen aus nach einer oder nach beyden Seiten unzählig viele Linien gehen, die mit den ersten Winkel von 60° und 120° machen. Die zahlreichen weiteren Modificationen der Fenstereisgestalten lassen sich durch die Krüm-

mung erklären, welche die geraden Linien erleiden und welche wir auch bey den Flächen und Kanten ausgebildeter Crystalle antreffen. Die Neigung zur Hervorbringung regelmäßiger Gestalten sehen wir bey dieser Bildung unterkennbar ausgesprochen. Die Adhäsionsverhältnisse aber scheinen der körperlichen Ausbildung nach drei Dimensionen mächtig entgegenzuwirken, und so bildet sich unter ihrem Einfluß vorzüglich das Lineare, in den Achsen, dagegen die Fläche höchst unvollständig und die dritte Dimension bereits gar nicht aus.

Völlig so und unter denselben Verhältnissen sind wohl auch die, oft so zierlichen, strauch- und krautartigen Formen entstanden, welche man nicht selten auf den Sohlenhofer Kalkplatten, und überhaupt öfters auf schieferigen Gesteinen, zumal auch auf Sandsteinplatten antrifft und die man Dendriten nennt. Diese schwarzen oder braunen crystallinischen Gebilde bestehen in der Regel aus den wasserhaltigen Dryden des Mangans und Eisens. Ursprünglich gelangten diese Metalle wohl als Carbonate, in Wasser gelöst, auf Spalten in das Gestein, setzten sich in den zarten Klüften ab, wo durch Wirkung der Haarröhrchenanziehung die Lösung derselben weithin verbreitet wurde. Man kennt viele Salze, deren gesättigte Lösung an den Wandungen des Glases einen crystallinischen Ansaß bildet, zwischen welchem und dem Glase sodann von der Lösung durch Capillarität heraufgezogen wird, wodurch sich die crystallinische Bildung nach und nach bis zum Rande des Gefäßes heraufmacht, indem jeder neue feste Ansaß nach oben, auch die capillare Wirkung bis dahin führt. Die ganze Innenseite des Glases ist in kurzer Zeit von strauchartigen Gebilden überzogen, die wenn sie bis zum Rande des Gefäßes gelangt sind, die Flüssigkeit sogar über das Glas herausziehen, worauf sie sodann an der Außenseite herabfließt. Eine gesättigte Ealminallösung kann am zweckmäßigsten zu einem derartigen Versuche benützt werden.

Gar oft lassen sich gewisse crystallinische Gestalten mit organischen Gebilden nicht unpassend vergleichen, und man nennt sie deshalb mitunter auch nachahmende Gestalten.

Durch Gruppierung sehr kleiner Crystalle, die in gegenseitiger unmittelbarer Berührung wechselseitig störend auf die freye

Ausbildung der Individuen auf einander einwirken, entstehen reihenförmige, lineare Gestalten, mit deren Längenerstreckung die Hauptachsen der Individuen meist zusammenfallen. Sind die einzelnen an einander gereihten Gebilde sehr fein, so haben sie oftmals ein haarförmiges Ansehen. Sind viele solche haarförmige Gebilde parallel und gleichsam zu Büscheln verwachsen, so entstehen bey ungleicher Länge derselben zähnlige Gestalten. Auch bey den drahtförmigen Gestalten sind die einzelnen Individuen reihenförmig verbunden. Erscheinen drahtförmige Gestalten gebogen, oder gekrümmelt, so stellen sie wollige oder moosartige Bildungen dar.

Die baumförmigen Gestalten entstehen auf die Art, daß sich an ein reihenförmiges Gebilde ähnliche andere seitwärts in einer Ebene, wie an eine Achse unter 90° oder 60° , ansetzen. Verfließen solche einzelne reihenförmige Bildungen in eine einzige Masse, so werden blatt- und blechförmige Gestalten gebildet. Durchkreuzen sich lineare Körper, was gewöhnlich nach drey auf einander senkrechten Richtungen der Fall ist, so entstehen die gestrickten Gestalten, die oftmals ein dichtes Gewebe bilden, den Schneeflocken vergleichbar, die aus über einander liegenden Schneesternen, den Rudimenten der seitigen Säule, zusammengesetzt sind. Alle diese Gestalten kommen in der Regel nur bey gebiegenen Metallen vor und bey einigen Vererzungen derselben.

Sind unvollkommen ausgebildete prismatische Individuen an einander gereiht, und zwar parallel, so entstehen stangenförmige Gebilde. Divergiren dagegen die langsäulenförmigen Körper, so daß sie gleichsam strahlenförmig von einem Puncte auslaufen, so werden büschelförmige Gestalten gebildet.

Sind viele stängelige, nadel- oder haarförmige Individuen in der Richtung der Radialen einer Kugel an einander gereiht, dergestalt, daß sie strahlenförmig von einem gemeinschaftlichen Mittelpuncte auslaufen, so entstehen sternförmige Gebilde oder halbkugelige Körper, je nachdem sich die crystallinischen Theile nur auf der Oberfläche oder über derselben nach allen Richtungen gleichförmig ausbreiten. Durch Verbindung vieler halbkugeligen Körper werden traubige und nierenförmige Dens allg. Naturg. 1.

Gestalten gebildet. Legen sich mehrere nierenförmige oder halbkugelige Gestalten über einander hin, so nennt man diese Gestalten, wenn sie bey metallischen Mineralien auftreten, wie bey Roth- und Brauneisenstein, bey welchen die Oberfläche der kugeligten Gebilde mehrentheils stark glänzend ist, Glasköpfe (Glanzköpfe). Sind viele kleine pyramidale Gestalten um einen mittleren dergleichen so vereinigt, daß sich ihre Endspitzen etwas zusammenneigen, so entstehen die knospenförmigen Gestalten, die man öfters bey Quarz und Schwerstein sieht.

Wenn viele kleine tafelartige crystallinische Gestalten, mit den breiten Seitenflächen an einander schließend, um eine gemeinschaftliche Achse divergirend versammelt sind, wobey jedes Individuum nach dieser Achse hin sich keilförmig verschmälert zeigt, so entstehen fächerartige Gebilde. Sehen die gegen die Achse hin verschmälerten Tafeln jenseits derselben wieder fort, so entstehen Bündel von Tafeln, welche in der Mitte mehr oder weniger zusammengeschnürt sind und nach beyden Enden divergiren. Man nennt solche Gestalten garbenförmige. Sind tafelartige Gebilde um eine gemeinschaftliche Achse dergestalt divergirend verbunden, daß die breiten Seitenflächen der Tafeln in eine Ebene fallen, so entstehen kammförmige Gestalten, welche man bisweilen bey Schwefelkies (Kammkies) antrifft. Wenn viele Tafeln oder flache tafelartige rhomboëdrische Körper um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt sich nach Art der Blumenblätter einer gefüllten Rose ordnen, so entstehen rosenförmige Gestalten.

Sind gleichartige crystallinische Gestalten von ziemlich gleichen Dimensionen mit einander in inniger Verbindung, so entstehen körnige Gebilde, sehr verschieden nach Größe und nach der Festigkeit des Zusammenhangs. Die Größe des Kornes wird gewöhnlich vergleichungsweise angegeben, indem man die Körper bezeichnet, welchen die Dimensionen der körnigen Individuen zukommen, z. B. kopf-, faust-, walnuß-, haselnuß-, erbsen-, hirseforn-, mohnkorngroße Individuen unterscheidet. Werden die körnigen Körperchen sehr klein, so kann man sie endlich mit freiem Auge nicht mehr unterscheiden und ihre Gesamtheit erscheint uns alsdann als eine dichte Masse.

Wenn bey crystallinischen Gestalten zwey ihrer Dimensionen gegen die Dritte vorherrschen, so erscheinen sie als Blättchen oder Schuppen, wobey man groß-, klein- und feinsblättrig, gerad- und krummblättrig unterscheidet. Krumme Blätter werden als Schalen bezeichnet, und die crystallinischen Körper, welche aus solchen bestehen, in dick- und dünnchalige, nierenförmig-, konisch-, wellenförmig-, concentrisch- und unbestimmt krummschalige unterschieden.

Herrscht bey crystallinischen Gestalten eine ihrer Dimensionen gegen die beiden andern sehr vor, so haben sie, mit einander verbunden, ein stängeliges Ansehen und werden, nach Maßgabe der Dicke, Beschaffenheit und Verbindung der Individuen, in grob-, fein-, gerade-, krumm-, parallel aus einander laufend und verworren stängelig unterschieden. Sind die stängeligen Gestalten sehr dünn, so nennt man sie Fasern.

Zu den crystallinischen, nachahmenden Gestalten können wir auch noch die Tropfsteine oder Stalaktiten zählen, welche durch das Herabtropfen einer Substanz entstanden sind, was der Name ungefähr anzeigt.

Sickern Wasser, welche fremdartige Substanzen in Auflösung enthalten, z. B. Kalk, was der gewöhnlichste Fall ist, durch die Gebirgslagen durch, und gelangen sie dabey in Spalten oder Höhlungen, wo durch vermehrten Luftzug eine starke Verdunstung Statt findet, so sehen sie das Geköste an dem Puncte, wo sie verdunsten, ab. Der am Gewölbe einer Höhle ankommende, Kalktheile enthaltende, Wassertropfen erleidet Verdunstung und setzt da, wo er am Gestein haftet, einen feinen Kalkring ab. Nachfolgende Tropfen, die sich ebenso verhalten, machen den Kalkring größer und größer, verlängern ihn zur Röhre, zur walzenförmigen oder cylindrischen Gestalt, und diese hängt nun frey von der Wölbung herab. Fallen die Tropfen mit Kalk beladen von oben auf den Boden einer Höhle, so erfolgt durch die nun hier vor sich gehende Verdunstung ebenfalls ein Kalkabsatz, der sich von unten nach oben verlängert, aufwärts wächst und zur Unterscheidung Stalagmit genannt wird.

Die Masse der Tropfsteine besteht, wenn sie kalkiger Natur ist, in der Regel aus faserigen oder stängeligen Individuen, die

senkrecht auf der Hauptachse der zapfenförmigen oder cyindrischen Gestalten stehen, welche sich selbst vertical gegen die Ebene verhalten, an welcher sie aufgehängt sind, oder auf welcher sie ruhen.

Von den unregelmäßigen Gestalten.

Zeigen die Gestalten der Mineralien nicht nur keine regelmäßige Begrenzung durch ebene Flächen, sondern auch keine Andeutung von regelmäßiger geometrischer Ausbildung und auch keine Ähnlichkeit mit der Gestalt anderer Dinge, so heißt man sie unregelmäßige Gestalten.

Zu diesen gehören zunächst die Platten, welche entstehen, wenn eine weiche oder flüssige Substanz Risse oder Sprünge eines Gesteins oder eines einfachen Minerals ausfüllt und darinn erhärtet. Zu größerem Maßstabe entwickelt mit bedeutender Erstreckung in Länge und Breite, nennt man solche Platten Gänge. Liegen Platten so zart auf den Wandungen einer Spalte, daß sie sich, ungeachtet ihrer unbedeutenden Weite, dennoch nicht berühren, so nennt man dieses Vorkommen einen Anflug und sagt von dem Mineral, welches dasselbe zeigt, es sey angeflogen. Erscheint ein Mineral in Platten mit einer glatten, oft wie polierten Oberfläche, so sagt man, daß es mit Spiegeln breche.

Füllt ein dichtes Mineral den Raum nicht stetig aus, so zeigt es hohle Zwischenräume und man nennt es durchlöchert, porös, zellig, blasig, schwammig. Bilden sich in solchen Räumen andere Mineralien, so nehmen sie die Gestalt derselben an und erhalten dabey mitunter eine kugelförmige Gestalt. Alle Mineralien und Gesteine, die ausgefüllte Blasenräume besitzen, nennt man mandelsteinartige. Die kugelförmigen Gestalten bestehen öfters aus concentrischen Lagen verschiedener Mineralien. Bilden verschiedene Quarzarten, die in concentrischen, der Oberfläche entsprechenden Lagen mit einander wechseln, solche Kugeln, so werden diese Achat-Kugeln genannt. Diese sind nicht selten hohl und enthalten alsdann meistens Kristalle. Sehr unregelmäßige Gestalten, welche mit den knolligen Wurzeln gewisser Pflanzen einige Ähnlichkeit besitzen, nennt

man knollige Gestalten. Man trifft sie am öftesten beym Feuerstein an.

Oben sich Mineralien, in Crystallen, berben oder dichten Stücken, von der ursprünglichen Lagerstätte ab, so gleiten sie auf der Erde fort, nach dem Gesetz der Schwere an Bergen und Abhängen herab und werden dabey an Ecken und Kanten, so wie überhaupt an ihrer Oberfläche, mehr oder weniger abgerieben. In diesem Zustande nennt man sie Geschiebe. Gelingen derartige Stücke in fließendes Wasser, das sie fortträgt, gegen andere steinige Massen stößt und über solche hinschleift, so werden sie noch weit stärker abgerieben, mehr gerundet und man heißt sie alsdann Gerölle.

Mit der Gestalt der Mineralien und zwar in ihrer größten Vollkommenheit, mit den Crystallen, steht die

Theilbarkeit

in einem so innigen Zusammenhange, daß man sie mit Grund den inneren Ausdruck der äußeren regelmäßigen Form nennen kann. Man versteht darunter die Eigenschaft eines Mineralkörpers, vermöge welcher er beym Zerbrechen gleichartige Stücke liefert, die von ebenen, glatten und glänzenden Flächen begrenzt sind und der zu Folge bey seiner Zerstückelung auch solche Flächen in jedem Theile desselben zum Vorschein kommen.

Mehrere Mineralien zeigen die Theilbarkeit in einem ganz ausgezeichneten Grade. So namentlich Kalkspath. Ein Kalkspathcrystall, welches auch immer seine Gestalt seyn mag, oder ein berbes Stück dieses Minerals, wird durch Hammerschläge in kleinere zertheilt, die eine rhomboëdrische Form und sämmtlich Endkantenwinkel von $105^{\circ} 5'$ haben. Jedes größere Rhomboëder kann weiter, und zwar so lange es die Feinheit der Sinne und Instrumente gestatten, in ähnliche kleinere Gestalten zertheilt werden. Flußspath liefert beym Zerbrechen immer sehr leicht niedliche Stücke von octaëdrischer Gestalt, die völlig mit dem regulären Octaëder übereinstimmen. Die Gestalten, welche bey einer solchen Zertheilung erhalten werden, nennt man Theilungsgestalten, und die Flächen, welche dieselben begrenzen, Theilungsflächen. Am schönsten werden die Theilungsgestalten gewonnen, wenn man sich eines kleinen Meißels bedient.

und die Schneide desselben so ziemlich in der Richtung, in welcher man die Theilbarkeit kennt oder erwartet, aufsetzt. Ein rascher Hammerschlag auf den Meißel löst dann immer eine mehr oder weniger vollkommene Theilungsgestalt ab. Setzt man den Meißel so an, daß seine Richtung genau derjenigen entspricht, in welcher die Theilbarkeit statt findet, so wird gewöhnlich da, wo man denselben anbringt, zu viel von dem Minerale zu Pulver zerdrückt, wodurch die Theilungsgestalt weniger vollkommen wird. Wo man auch an Crystallen den Meißel ansetzen mag, überall gelingt es eine Theilungsfläche hervorzubringen, woraus folgt, daß sie die Eigenschaft besitzen, in solchen Richtungen, in welchen die Theilungsflächen erhalten werden, die Trennung ihrer Theile leichter zuzulassen, als in anderen. Der Grund hiervon liegt wohl nur darin, daß die Cohärenz der Theile nach einer, oder nach einigen Richtungen weit geringer und gleichsam im Minimum vorhanden ist, weshalb auch der Crystall nach diesen leichter gespalten werden kann.

Die Anzahl der Theilungsflächen ist bey den verschiedenen theilbaren Mineralien sehr ungleich, und sie werden auch nicht bey jedem Minerale mit gleicher Leichtigkeit erhalten. Gyps und Glimmer lassen sich leicht in ganz dünne Blättchen zertheilen, aber sie lassen sich nur nach einer Richtung so leicht theilen, obgleich sie auch noch nach anderen theilbar sind. Die Hornblende kann nach zwey Richtungen gespalten werden, der Kalk nach drey, der Fluß nach vier, die Zinkblende nach sechs. Wenn vier oder sechs Theilungsflächen an einem Minerale vorkommen, so erhält man verschiedene Theilungsgestalten, je nachdem man alle gleichmäßig verfolgt, oder nur einen Theil derselben. Spaltet man den Fluß gleichförmig nach den vier Richtungen, nach welchen er die Theilung zuläßt, so wird ein Octaëder als Theilung gestalt erhalten; verfolgt man von den 4 Theilungsflächen nur 3, mit Vernachlässigung der vierten, so entsteht durch Vergrößerung von sechs Flächen der octaëdrischen Theilungsgestalt, wenn diese so weit geht, daß die zwei letzten parallelen Octaëderflächen ganz aus der Begrenzung verschwinden, ein scharfes Rhomboëder. Nimmt man nun die Spitzen dieses Rhomboëders durch Verfolgung der vierten Theilungsfläche weg, so erhält man als Theil-

lungsgestalt ein Tetraëder. Hat nun ein Mineral, wie die Zinkblende, mehr als vier gleich vollkommene Theilungsrichtungen, so sind die Gestalten, welche man durch Verfolgung der verschiedenen Theilungsflächen erhalten kann, noch verschiedenartiger.

Die Theilungsflächen sind, wie nicht immer gleich leicht zu verfolgen, so auch nicht immer von gleicher, glatter und glänzender Beschaffenheit. Während oftmals eine Theilungsfläche sehr glatt und eben ist, erscheint eine andere uneben und rauh.

Die interessanteste Thatsache, welche die Theilbarkeit der Mineralien darbietet, besteht darinn, daß die Theilungsflächen jederzeit einer oder der anderen Crystallfläche parallel laufen, die man an den Gestalten eines Minerals antrifft. So laufen die Theilungsflächen des Kalkspaths parallel den Flächen eines Rhomboëders, welches unter den Kalkspath-Crystallen vorkommt. Die Theilungsflächen des Flußspaths sind den Flächen eines regulären Octaëders parallel, das unter den Formen des Flußes auftritt; die Theilungsflächen der Zinkblende sind den Flächen eines Rauteubecaëders parallel, welches sehr oft die Crystalle dieses Minerals bildet. Die Theilungsflächen der Hornblende laufen einem Prisma von $124^{\circ} 30'$ parallel, welches das gewöhnliche rhombische Prisma dieses Mineralkörpers ist. Dadurch wird der innige Zusammenhang zwischen Crystallform und Theilbarkeit bewiesen, und die Bedeutung der letzteren ist in ein klares Licht gesetzt. Es ist noch von besonderer Wichtigkeit, daß die Theilbarkeit bey den verschiedenen Gattungen eines Mineralgeschlechtes weit beständiger ist, als die äußere Form und daß sie auch bey zerbrochenen Stücken sehr gut wahrgenommen werden kann. Dieß macht sie ganz besonders als Unterscheidungsmerkmal brauchbar.

Vom Bruche.

Wenn bey dem Versuche, ein Mineral zu zerschneiden, dieses nicht in bestimmten Richtungen die Zerschneidung zuläßt, nicht nach ebenen und glatten Flächen, und wenn dabey keine regelmäßige Gestalten als Resultat der Theilung erhalten werden, so sagt man, daß sich das Mineral zerbrechen lasse; nennt die Verhältnisse, welche dabey sichtbar werden, Bruchverhältnisse und bezeichnet das Ganze mit dem Namen Bruch. Die Tren-

nung erfolgt hiebei nach krummen und unregelmäßigen Flächen, die man Bruchflächen heißt, und gibt Bruchstücke die von solchen Flächen begrenzt sind.

Man unterscheidet verschiedene Arten von Bruch, als: den muschligen Bruch, dessen Flächen mit dem Innern einer Muschel Aehnlichkeit haben; den unebenen Bruch, der ein grobes Ansehen, eckige und unregelmäßige Erhöhungen hat; den erdigen Bruch, eine Abänderung der vorhergehenden Art, bei wenig zusammenhängenden, erdigen Mineralien vorkommend; den ebenen Bruch, dessen Flächen gar keine, oder nur sehr wenige und geringe Unebenheiten zeigen; den splittetigen Bruch, auf dessen Flächen kleine splittetförmige Theilchen losgezogen werden, die an ihrem dickeren Ende noch mit der Masse zusammenhängen und zugleich etwas durchscheinend sind; der hakige Bruch, dessen Flächen kleine hakenförmige Spitzen zeigen, die entstehen, wenn man dehnbare Metalle von einander reißt.

Die durch Bruch abgetrennten Stücke, Bruchstücke, werden, nach der Beschaffenheit ihrer Kanten, in scharfkantige und stumpfkantige unterschieden.

Von den älteren crystallographischen Methoden.

Werner, durch dessen Arbeiten die Mineralogie eine bestimmtere wissenschaftliche Gestalt erhielt, gebrauchte zur Darstellung der Crystallformen der Mineralien, eine vor ihm theilweise schon von Romé de l'Isle angewendete beschreibende Sprache, welche ziemlich allgemein angenommen und benutzt wurde. Er betrachtete die Combinationen und selbst einige einfache Gestalten als Modificationen anderer, die er Grundgestalten nannte und als welche er den Würfel, die Pyramide, die Säule, die Tafel und die Linse auführte. Die Veränderungen an denselben erklärte er durch Abstumpfung, Zuspitzung und Zuspizung. Die nähere Angabe des Verhaltens der modificirenden Flächen zu denjenigen der Grundgestalt war sehr unbestimmt, und Neigungswinkel wurden keine angegeben. War einmal die Rede von einem rechten Winkel, so war darunter ein solcher zu verstehen, der zwischen 85° und 95° liegt. Welche Gestalten hervorgehen, wenn die modificirenden Flächen der Abstumpfung, Zuspitzung und

Zuspitzung mit einander in Berührung stehen, das wurde nicht untersucht, da man diese sogenannten Veränderungen für etwas weniger Wichtiges ansah. Auf diese Weise wirkte die Werner'sche crystallographische Methode dem Studium der Crystallographie im Allgemeinen, namentlich aber dem Studium der zusammengefügteren Gestalten sichtlich entgegen.

Haüy's crystallographische Methode gieng aus den wichtigen Untersuchungen dieses Mannes über die Theilbarkeit der Mineralkörper hervor, auf welche er zuerst die Aufmerksamkeit der Naturforscher lenkte und die er mit dem ausgezeichnetsten Erfolge studierte. Nachdem er entdeckt hatte, daß die Theilbarkeit aller, zu einem Mineralgeschlecht gehörenden Individuen eine und dieselbe ist, während die Crystalle verschieden und oft gar nicht vorhanden sind, gründete er darauf seine eigenthümliche crystallographische Methode, bey welcher vor Allem, vermittelt der regelmäßigen Theilung, eine Gestalt bestimmt wird, die von den deutlichsten Theilungsflächen begrenzt seyn muß und *Primitiv* oder *Kernform* genannt wird, während alle übrigen als *Secundärformen* betrachtet werden, die man durch besondere, unveränderliche Geseze auf die Kernform zurückführt. Bey dem Zusammenhang der Theilbarkeit mit der äußeren Form ist es sehr oft der Fall, daß dieselbe den Flächen einfacher Gestalten parallel geht, und so erscheinen auch diese mitunter als Kernformen, wie zum Beispiel die octaëdrische Theilungsgestalt des Flusses, die rhomboëdrische des Kalkspaths, die würfelige des Bleyglanzes. In diesen und ähnlichen Fällen ist Haüy's Kernform gänzlich einerley mit der Grundgestalt der Methoden von Weiß und Mohs. Dieß trifft sich jedoch seltener, da die Theilbarkeit in den meisten Fällen nicht nach allen Flächen einer einfachen Gestalt und oft nur nach einer Fläche einer Gestalt erfolgt, die zu der Crystallreihe eines Mineralkörpers gehört.

Verfolgt man die Theilung, nachdem die Kernform durch sie erhalten worden ist, noch weiter, so entstehen Körper, die einander entweder vollkommen ähnlich sind, oder doch nahe Verwandtschaft mit einander zeigen und von gleichen Flächen begrenzt werden. Eine solche Theilung, meint Haüy, könne so weit gehen, bis man endlich Theilchen erhält, die man nicht weiter zertheilen

kann, ohne sie zugleich in ihre chemische Bestandtheile zu zerlegen. Aus solchen Theilchen sollen die Körper bestehen. Ein Würfel von Bleiglanz könnte demzufolge so lange in einen kleinen Würfel zertheilt werden, bis man endlich zu einem so kleinen gelangt, der bei weiterer letzter Zertheilung in Blei und Schwefel zerfiel. Diese letzten Bestandtheile der Körper nennt Haüy *Elementar-Moleküle*, die kleinsten Theilchen aber, welche unmittelbar ein Mineral zusammensetzen, *integrirende Moleküle*. Sehr oft und wo immer möglich, ist das integrirende Molekül hinsichtlich seiner geometrischen Beschaffenheit noch einfacher, als die Kernform. So ist diese beim Fluß ein reguläres Octaëder und das integrirende Molekül ein reguläres Tetraëder; die Kernform des Apatits ist ein regelmäßiges sechsseitiges Prisma, welches sich wieder in lauter dreiseitige Prismen zertheilen läßt, welche als die integrirenden Moleküle des Minerals betrachtet werden.

Alle Formeney führte Haüy auf folgende fünf Kernformen zurück: 1) Das Parallelepipedium, worunter alle vierseitigen Prismen begriffen sind, sie mögen rechtwinkelig, rhombisch, rhomboëdrisch, gerade oder schief seyn; 2) das Octaëder, welches sowohl das reguläre Octaëder, als die übrigen ähnlichen Gestalten der weiteren Crystallisationsysteme von Weiss und Mohs begreift; 3) das reguläre Tetraëder; 4) das reguläre sechsseitige Prisma; 5) das Rhombendodecaëder.

Die Gestalten der integrirenden Moleküle sind: das Parallelepipedium, das dreiseitige Prisma und das Tetraëder, als die einfachsten denkbaren Formen, die, wie sie aufgeführt sind, von sechs, fünf und vier Flächen eingeschlossen werden.

Die Zurückführung der secundären Formen auf die Kernform gründete Haüy auf die Beobachtung, daß, wenn man die Secundär-Form eines theilbaren Minerals, zum Beispiel ein spitzes Rhomboëder von Kalkspath, von den schärfsten Ecken und Kanten weg zu theilen anfängt, die Theilungsflächen erst klein sind und immer größer werden, je näher man dem Mittelpunkt des Körpers kommt, und es sind daher auch die Theilungsgestalten, die dabei erhalten werden, die Blättchen, welche zwischen je zwei Theilungsflächen liegen, um so größer, je mehr, man sich bei

diesem Verfahren der äußeren Begrenzung der Kernform nähert, was in dem vorliegenden Fall die Flächen eines Rhomboëders sind, mit dessen Seitenkanten die Seitenkanten des spitzen secundären Rhomboëders zusammenfallen. Dieß erklärt Haüy dadurch, daß er in Folge der angeführten Beobachtung annimmt, es entstehen secundäre Crystallformen aus einer Primitiv- oder Kernform, indem sich Blättchen derselben Substanz an eine Primitivform anlegen und nach Maßgabe ihrer Entfernung vom Mittelpunkt an Größe abnehmen. Die Gesetze, nach welchen diese Abnahme Statt findet, nannte er Decreſcenz-Gesetze. Auf gleiche Weise, wie man die Kernform schon als zusammengesetzt aus integrierenden Moleculen betrachtet, die der Leichtigkeit der Rechnung wegen als einander gleich angenommen werden, sieht man auch die bey einer solchen Theilung fallenden Blättchen als einander gleich an, und mißt ihre Abnahme nach Reihen von Moleculen, um die sie an ihren Rändern kleiner werden, nach Maßgabe als man sich von der Oberfläche der Kernform entfernt.

Man stelle sich vor, daß der Würfel Fig. 27.




aus lauter kleinen Körperchen derselben Art bestehe und zwar so, daß jede Kante desselben die Länge von fünf kleinen Würfeln hat, welche als die integrierenden Moleculæ gelten. Auf diesen Würfel sollen Blättchen von Moleculen gelegt werden, in der Höhe eines derselben, und zwar so, daß sie an den Rändern ebenfalls um die Breite eines Moleculs abnehmen. Auf jede der in fünfundzwanzig Quadrate abgetheilten Würfelflächen muß man ein Blättchen legen, das aus neun kleinen Würfeln besteht,

und auf dieses wieder ein anderes Blättchen, welches aus einem einzigen Molecüle, aus einem einzigen Würfelchen besteht. Damit nun, mit dieser Arbeit, welche Haüy selbst recht passend eine grobe Maurerarbeit nennt, vergleicht er die unendlich zarten Crystallgebilde, das Product der, geheimnißvollen Naturkräfte.

Legt man eine Ebene auf die hinter einander folgenden Kanten ab , cd , ef , gh , ik der kleiner werdenden Blättchen, so zeigt diese die Lage derjenigen secundären Fläche an, welche in Folge dieses Decreescenz-Gesetzes entsteht. Sie gehört dem Rhombendodecaëder an, und diese Gestalt entsteht nach Haüy also aus dem Würfel durch eine Decreescenz von einer Reihe Molecülen in der Breite der einzelnen Lagen, an den Kanten dieser Primitivform.

Sind die integrirenden Molecüle Parallelepipeden, wie in dem angeführten Beispiel, so ist die Ableitung der secundären Formen durch Decreescenzen leicht einzusehen, da man die Parallelepipeden reihenweise wegnehmen kann. Dieß kann aber nicht geschehen, wenn die integrirenden Molecüle dreiseitige Prismen oder Pyramiden sind, und in diesem Falle nimmt man mehrere derselben zusammen und verbindet sie dergestalt in Gruppen, daß eine parallelepipedische Gestalt daraus entsteht. Beim regulären sechsseitigen Prisma zum Beispiel, dessen Grundfläche, Fig. 38,



dargestellt ist, erscheinen die integrirenden Molecüle als dreiseitige Prismen. Je zwey derselben, a und b , bilden zusammen genommen immer einen einzigen Körper, der ein rhombisches

Prisma von 120° und 60° und von parallelepipedischer Beschaffenheit ist. Durch eine ähnliche Gruppierung der Tetraëder, die ebenfalls öfters als integrierende Molecüle auftreten, bringt man ein Parallelepipedum hervor, das ein Rhomboëder ist. Solche Körper sind nun zum Behuf der crystallographischen Rechnung so eigentlich nur erfunden und haben von Haüy den Namen *subtractive Molecüle* erhalten, weil man sie von den Ecken, die dazu dienen, eine Secundärform aus einer primitiven zu erhalten, reihenweise wegnimmt.

Man unterscheidet drey Arten von Decrescenzen. Die, welche den Kanten parallel sind, wie in dem angeführten Beispiel des Würfels, heißen Decrescenzen an den Kanten; die, welche den Diagonalen der Flächen der Primitivform gleich laufen, heißen Decrescenzen an den Ecken, und diejenigen endlich, welche parallel einer Linie Statt finden, die sowohl gegen die Kanten als gegen die Diagonalen der Flächen geneigt ist, heißen *intermediäre Decrescenzen*.

Diese crystallographische Methode Haüy's erklärt nun namentlich, wie man sich die verschiedenen, bei einem Mineralgeschlecht vorkommenden Gestalten aus einer Menge kleiner Körper zusammengesetzt denken kann, die gar oft eine unter den Formen des Minerals selbst vorkommende Gestalt haben. Die wahre geometrische Beschaffenheit der Crystallformen und ihre Beschreibung erhält man aber nur in so fern, als man sie kennen muß, um das Körpergebäude zu verstehen, und also eigentlich nur nebenher. Diese Nichtbeachtung der wahren geometrischen Beschaffenheit der Gestalten ist die Ursache, daß spätere Crystallographen, die Beobachtungen Haüy's benutzend, sehr viele neue Formen durch unmittelbare mathematische Untersuchungen der Crystalle entdeckt haben.

Die Methoden von Weiß und Mohs beziehen sich unmittelbar auf die Formen selbst, unterscheiden scharf einfache Gestalten und Combinationen, entwickeln diese mit mathematischer Genauigkeit und leiten durch geometrische Verfahrensarten die Formen von einander ab. Den Inbegriff aller aus einander ableitbaren Formen, die zusammen eine eigenthümliche abgeschlossene Gruppe bilden, heißen sie ein Crystallsystem,

und nehmen als Grundgestalt desselben diejenige einfache Gestalt an, welche von der geringsten Flächenzahl begrenzt ist.

Phyiscalische Eigenschaften.

Nächst der Form der Mineralien fallen deren Verhältnisse gegen das Licht, die optischen Eigenschaften derselben, vorzüglich in's Auge. Das Licht wird von denselben entweder zurückgeworfen, oder durchgelassen, in beiden Fällen aber theilweise verschluckt. Dadurch werden Modificationen des Lichtes hervorgerufen, die man mit dem Namen Glanz, Farbe und Durchsichtigkeit bezeichnet, von welchen für die Mineralogie die verschiedenen Arten des Glanzes, die sogenannten metallischen Farben und die einfache und doppelte Strahlenbrechung die wichtigsten sind.

Unter Glanz versteht man jene optische Erscheinung der Körper, welche durch spiegelnde Zurückwerfung des Lichtes hervorgebracht wird.

Die Arten des Glanzes sind:

Der Metallglanz, welcher den wohlbekannten verarbeiteten Metallen eigen ist, wie dem Silber, dem Golde, dem Kupfer, und metallischen Legierungen, wie dem Messing, Zinnbad u.s.w. Er ist gewöhnlich mit vollkommener Undurchsichtigkeit verbunden, namentlich, wenn er als vollkommener Metallglanz auftritt. Der unvollkommene Metallglanz neigt sich gegen andere Arten des Glanzes hin, und ist weniger hoch.

Der Demantglanz, in höchster Vollkommenheit am Demant wahrnehmbar. Er nähert sich öfters dem Metallglanze.

Der Glasglanz, dem gemeinen Glase eigen, findet sich bei vielen harten Mineralien, namentlich sehr ausgezeichnet am Bergcrystall.

Der Fettglanz, ist vom Glanze eines mit irgend einem Fett Oel, Wachs beschmierten Körpers. Der Pechstein zeigt diese Art des Glanzes, die von Andern auch Wachsglanz genannt wird, am ausgezeichnetsten.

Der Perlmutterglanz ist der Glanz derjenigen Mu-

schel, die unter dem Namen Perlmutter allgemein bekannt ist. Er kommt ausgezeichnet am blätterigen Gyps und an verschiedenen Glimmerarten vor. Nicht selten ist er metallähnlich, wie z. B. am Schifferstein.

Glasglanz und Perlmutterglanz erscheinen bei einem dünnfädigen oder faserigen Gefüge modificirt, und dem Glanze der Seide ähnlich. Der Seidenglanz gilt uns deshalb nicht als eine besondere Art.

Nach dem Grade der Stärke des Glanzes unterscheidet man:

Starkglänzend, die Flächen spiegeln lebhafte und scharfe Bilder der Gegenstände, wie am Kalkspath, Eisenglanz, Blutglanz;

Glänzend, die gespiegelten Bilder sind nicht scharf und lebhaft;

Weniggglänzend; das zurückgeworfene Licht tritt als ein einziger allgemeiner Lichtschein auf. Die Bilder der Gegenstände sind nicht mehr zu unterscheiden;

Schimmern; es wird das Licht nur noch von einzelnen Punkten zurückgeworfen; der allgemeine Lichtschein ist beinahe ganz verschwunden.

Glanzlosigkeit wird durch matt bezeichnet.

Bei zusammengesetzten Crystallen ist der Glanz aller zu einerley Gestalt gehörigen Flächen gleich, einer und derselbe; bey Flächen verschiedener Gestalten aber sehr oft ein der Art und der Stärke nach sehr verschiedener.

Mitunter kommen bey einem Mineralgeschlechte verschiedene Arten des Glanzes vor. Doch sind diese dann immer in enge Grenzen eingeschlossen und durch Mittelglieder verbunden, so daß ununterbrochene Reihen entstehen. So trifft man am Quarz Glasglanz und Fettglanz, zwischen diesen beiden Endpuncten aber Glieder, welche dieselben verbinden.

V o n d e r F a r b e .

Die Lichtstrahlen, welche auf Gegenstände fallen, gehen niemals, und selbst durch die allerdurchsichtigsten nicht, vollkommen hindurch. Ein Theil derselben wird immer verschluckt, und be-

wirkt, in Verbindung mit der Größe und Anordnung der Körpertheile, die eigenthümlichen und bleibenden Farben der Materie.

Zum Behufe der mineralogischen Beschreibungen stellte Werner folgende acht Hauptfarben, weiß, grau, schwarz, blau, grün, gelb, roth und braun, auf, von denen jede in verschiedenen Schattierungen vorkommt, die man noch näher bezeichnet, wie schneeweiß, röthlichweiß, aschgrau, bläulichgrau, samtschwarz, graulichschwarz u.s.w. Der geringen Wichtigkeit wegen, welche diese Schattierungen haben, wollen wir sie hier nicht vollständig anführen.

Die Farben, welche an den Metallen vorkommen, und deshalb metallische genannt werden, erscheinen, wo sie vorkommen, in ihren Arten sehr beständig, geben gute Kennzeichen ab, und müssen darum genauer betrachtet werden. Man unterscheidet: Kupferroth, die Farbe des metallischen Kupfers, kommt am gediegenen Kupfer vor; Goldgelb, die Farbe des reinen Goldes; Messinggellb, die Farbe des Messings, findet sich am Kupferkies; Speisgelb, die Farbe der sogenannten Glocken-Speise, des Glockenmetalls, ist charakteristisch für den Schwefelkies; Silberweiß, die Farbe des reinen Silbers; Zinweiß, die Farbe des reinen Zinns; Bleigrau, die Farbe des Bleis, wobey man das reine, das weißliche und das schwärzliche Bleigrau unterscheidet; Eisenschwarz, die Farbe des Magneteisensteins.

So beständig, wie schon bemerkt wurde, die metallischen Farben bey einem Mineralgeschlechte sind, so wenig beständig sind im Allgemeinen die nicht metallischen Farben. Nur da, wo gefärbte Dreyde oder Salze eines Metalles einen wesentlichen Bestandtheil eines Minerals ausmachen, zeigen sie sich beständiger. Ganz gewöhnlich sieht man, daß ein Mineral, dessen Aussehen nicht metallisch ist, mehrere Farben und viele Schattierungen derselben zeigt. So gerade beym Flußspath. Den Begriff von Farbenvarietäten eines Minerals heißt man Farbenreihe. Eine solche läßt sich aber nicht wohl beschreiben; man muß sie sehen. Sehr oft besitzt ein Mineral verschiedene Farben, die unter einander gemischt, oder mit einander wechselnd,

verschiedenartige Figuren darstellen. Diese Erscheinung heißt Farbenzeichnung.

Mehrere Mineralien lassen intensivgefärbte Punkte wahrnehmen, wenn das Licht in gewissen Richtungen auf sie fällt. Man nennt dieß Farbenspiel. Es wird vorzüglich am Diamant und am Opal wahrgenommen. Es beruht bey ersterem darauf, daß die hinteren Flächen des Minerals das einfallene und gebrochene Licht zurückstrahlen. Beym Opal hängt es von der eigenthümlichen Anordnung seiner Theile ab. Davon röhret auch der eigenthümliche Lichtschein her, den gewisse Mineralien, wie das Katzenauge, der sogenannte Mondstein, ein Feldspath, zeigen, und den man das Opalisieren nennt. Wenn ein Mineral, das man in verschiedener Richtung gegen das Licht hält, verschiedene Farben in Richtungen zeigt, die von der Theilbarkeit des Minerals abhängen, in größeren Parthien auftreten und nicht so schnell, wie beym Farbenspiel abwechseln; so heißt dieß Farbenwandlung. Die dabey erscheinenden Farben sind roth, blau, grün, gelb, und zeigen sich oft in prächtigen Nuancen. Am ausgezeichnetsten läßt sie der Labrador wahrnehmen. Manche Mineralien zeigen in ihrem Innern die Farben des Regenbogens, namentlich der Kalkspath und der Bergcrystall. Diese Erscheinung nennt man das Irisiren. Sie entsteht, wenn sich im Innern eines durchsichtigen Körpers Sprünge befinden, deren Wandungen sich unvollkommen berühren, wodurch die Farbenringe hervorgebracht werden. Einige Mineralien, wie Schörl, Dichroit, haben die Eigenschaft, zwey verschiedene Farben zu zeigen, wenn man sie in zwey verschiedenen Richtungen betrachtet. Diese interessante Eigenschaft nennt man Dichroismus. Das erste der genannten Mineralien erscheint in vielen Crystallen schwarz und undurchsichtig, wenn man dieselben in der Richtung der Hauptachse betrachtet gelblichbraun und durchscheinend hingegen, wenn man sie senkrecht gegen jene Achse untersucht; letzteres Mineral, welches nach der angeführten Eigenschaft den Namen erhalten hat, zeigt, in einer Richtung betrachtet, ein sehr schönes dunkles Blau, in allen andern senkrecht auf dieser stehenden Richtungen aber ein unreines Gelblichgrau. In der Luft verändern manche Mineralien ihre Farbe. Dieß eignet

sich indessen nur an der Oberfläche und hat seinen Grund in einer chemischen Veränderung, einer oberflächlichen Zersetzung, welche die Mineralien an der Luft erleiden, wobey häufig die sogenannten Anlauf-Farben des Stahls zum Vorschein kommen. Man nennt dieß darum auch das Anlaufen. Es zeigt sich besonders bey metallischen Mineralien, bey dem Eisenglanz, Schwefelkies, Kupferkies und vorzüglich bey dem Buntkupfererz, welches darnach benannt ist.

Sehr oft ist die Farbe des Minerals verschieden von der Farbe des Pulvers, welches durch dessen Zerkleinerung, Zerreibung erhalten wird. Dieß bemerkt man am besten, wenn man das in dieser Hinsicht zu untersuchende Mineral mit einem harten spitzen Körper reibt oder streicht, oder auf einer Platte von weißem Porzellan-Biscuit, weßhalb auch die Farbe eines Mineralpulvers gewöhnlich sein Strich genannt wird.

Von der Durchsichtigkeit.

Mineralien, welche gar kein Licht durchlassen, so daß sie selbst in Splintern und an Kanten keinen Lichtschein zu erkennen geben, nennt man undurchsichtig; solche hingegen, die so viel Licht durchlassen, daß man eine Schrift durch sie lesen, einen hinter denselben befindlichen Gegenstand ganz deutlich durch sie hindurch erkennen kann, durchsichtig. Die Durchsichtigkeit zeigt verschiedene Abstufungen. Ist bey einem Mineral mit der Durchsichtigkeit auch vollkommene Farblosigkeit verbunden, so sagt man, es sey wasserhell. Halb-durchsichtig heißt das Mineral, wenn man Gegenstände durch dasselbe zwar wahrnehmen, aber nicht mehr in unterscheidbaren Umrissen erkennen kann. Durchscheinend nennt man ein Mineral, wenn es in größeren Stücken einen einformigen Lichtschein durchläßt; und an den Kanten durchscheinend, wenn es diesen Lichtschein nur an den scharfen Kanten größerer Stücke, oder in Splintern durchläßt.

Jeder Lichtstrahl, der in schiefer Richtung durch einen festen oder flüssigen Körper fällt, wird von seiner ursprünglichen Bahn mehr oder weniger abgelenkt oder gebrochen, und daher üben auch alle durchsichtigen Mineralien auf schief einfallende Lichtstrahlen eine solche Brechung aus. Wenn nach derselben die

Lichtstrahlen in einem Bündel vereinigt bleiben, so nennt man diese Brechung einfache Strahlenbrechung. Sehr viele durchsichtige Crystalle haben aber die merkwürdige Eigenschaft, jeden in sie eindringenden Lichtstrahl in zwey Strahlenbündel zu spalten, was zur Folge hat, daß Körper, welche man durch sie hindurch betrachtet, doppelt erscheinen. Man nennt diese Art von Strahlenbrechung deshalb die doppelte Strahlenbrechung. Erasmus Bartholin beobachtete sie zuerst bey wasserhellen Stücken des isländischen Kalkspaths, welcher dieser Eigenschaft wegen auch Doppelspath genannt wurde.

Eines der beiden Strahlenbündel folgt den Gesetzen der gewöhnlichen einfachen Strahlenbrechung, und heißt das gemeine oder ordentliche; das andere, welcher besondern Gesetzen folgt, heißt das außerordentliche, auch das abirrende Strahlenbündel, da er sich von dem ordentlichen entfernt. Den Abstand zwischen beiden Strahlenbündeln nennt man die Aberrationsweite.

Diese höchst merkwürdige doppelte Strahlenbrechung erscheint allein nicht bey den Crystallen, welche zum regulären System gehören. Diese lassen einen Lichtstrahl nach jeder Richtung als einfachen durch.

Untersucht man einen Crystall, welcher doppelte Strahlenbrechung zeigt, genauer, so findet man immer, daß er diese nicht in allen Richtungen wahrnehmen, sondern daß er in einer oder in zwey Richtungen den Lichtstrahl einfach durchgehen läßt. Diese Richtungen, gleichsam eine optische Indifferenz anzeigend, heißen die Achsen der doppelten Strahlenbrechung. Die Crystalle des zwey- und einachsigen (quadratischen) und des drey- und einachsigen (rhomboëdrischen) Systems sind in dieser Beziehung einachsig; diejenigen der andern Crystallsysteme, das reguläre ausgenommen, zweyachsig. Dergestalt lassen sich sämtliche Crystalle in optisch-einachsige und optisch-zweyachsige theilen. Bey vielen derselben nähert sich der abirrende Strahl der bezeichneten Refraktionsachse, bey vielen entfernt er sich dagegen von ihr, was einige Aehnlichkeit mit einem Angezogen- oder Abgestoßenwerden hat, weshalb man auch attractive und repulsive doppelte Strahlenbrechung unterscheidet.

Ob ein Mineral doppelte Strahlenbrechung habe oder nicht, erfährt man auf dem einfachsten und sichersten Wege, wenn man klare durchsichtige Crystalle oder Theilungsgealten desselben zwischen zwey dünne durchsichtige Täfelchen von Turmalin legt, die von einem prismatischen Crystalle parallel seiner Hauptachse abgeschnitten und so über einander gelegt sind, daß sich ihre Achsen unter rechten Winkeln durchschneiden. Besteht das zu untersuchende Mineral doppelte Strahlenbrechung, so wird der Punct, in welchem sich die Achsen der Turmalintäfelchen durchkreuzen, hell, im entgegengesetzten Falle bleibt er dunkel. Dieses Verfahren gründet sich auf die Eigenschaft des Turmalins, das Licht zu polarisiren, welche in der Physik erläutert wird.

Auf eine ähnliche Weise geschieht die Bestimmung, ob ein Mineral eine oder zwei Achsen doppelter Strahlenbrechung habe, wehmlich gleichfalls vermittelt zweyer Turmalintäfelchen. Das zu untersuchende Mineral wird senkrecht auf die Hauptachse des Crystalls in Tafeln geschnitten und zwischen die Turmalintäfelchen gelegt. Hat das Mineral nur eine Achse doppelter Strahlenbrechung, so erscheinen farbige Ringe, die gewöhnlich durch ein schwarzes Kreuz getheilt sind, dessen Arme vom Mittelpuncte gegen die Enden hin breiter werden, wenn man den kleinen Apparat zwischen das Licht und das Auge und diesem gehörig nahe bringt. Hat das Mineral zwey Achsen doppelter Strahlenbrechung, so werden die farbigen Ringe um jede derselben wahrgenommen, nicht aber durch ein schwarzes Kreuz, sondern durch eine einfache schwarze Linie getrennt.

Man verdankt Brewster eine Reihe höchst interessanter Untersuchungen über das optische Verhalten der Mineralien, aus welchen aber unter Anderem auch hervorgeht, daß schon kleine Quantitäten fremder Gemengungen im Stande sind, die optischen Phänomene zu verändern. Je mehr aber diese für kleine Gemengungen fremder Substanzen empfindlich sind, desto weniger passen sie als definitive Charactere der Gattungen in der Mineralogie.

Von der Phosphorescenz.

Viele Mineralien besitzen die Eigenschaft, im Dunkeln schwach zu leuchten, wobey eine nur ganz geringe oder gar keine Wärmen-entwicklung Statt findet. Man nennt diese schwache Lichtentwicklung Phosphorescenz. Sie läßt sich hervorbringen:

1) Durch mechanische Gewalt, durch Reibung oder Stoß, wobey das entstehende Licht meist nur momentan, weiß oder gefärbt, und bisweilen von einem eigenthümlichen Geruche begleitet ist. So leuchten die crystallinischen Dolomite schon beym Kratzen mit einer Federspiße, Quarzstücke beim Aneinanderreiben, Edelsteine beim Darauffschlagen mit einem Hammer.

2) Durch Insolation oder Bestrahlung, das heißt durch Aussetzen an das Tages- oder Sonnen-Licht. In einem ganz vorzüglichen Grade besitzen manche Demante die Eigenschaft, nach der Bestrahlung im Dunkeln zu leuchten, sodann alle Flußspathe, zumal derjenige von Kertschinsk, den man wegen seines grünen Lichtes mit dem Namen Chlorophan bezeichnet hat, alle kohlen-saure Kalksteine, Strontianit und Arragonit. In geringerem Grade leuchten nach der Insolation Steinsalz, Gyps, der sogenannte Bologneserspath, strahliger Baryt u. v. a. Aber kein gebiegenes Metall leuchtet unter solchen Verhältnissen. Gläser im Focus eines Brennsiegels zerstört die Phosphorescenz durch Bestrahlung in vielen Fällen. Dauer des Leuchtens und Farbe des Lichts zeigen sich sehr verschieden, je nach der Beschaffenheit des Minerals. Der Chlorophan leuchtet, nach vorhergegangnem Aussetzen an die directen Sonnenstrahlen, nach den Versuchen von Grotthius volle zehn Tage; alle andern in dieser Beziehung untersuchten Mineralien aber viel kürzere Zeit. Die meisten zeigen dabey ein weißes Licht. Die Temperatur scheint keinen wesentlichen Einfluß darauf auszuüben, denn das Leuchten findet bei -12° so gut wie bei $+25^{\circ}$ Statt.

3) Durch Erwärmung. Beynahe alle Mineralien, welche durch Insolation phosphorescieren, werden auch durch Erwärmung leuchtend. Die Demante zeichnen sich auch hier wieder durch einen hohen Grad von Phosphorescenz aus, und zwar leuchten bey der Erwärmung auch jene Demante, die durch Bestrahlung

nicht leuchten. Dasselbe beobachtet man bey vielen andern Mineralien, so daß die Fähigkeit derselben, durch Erwärmung zu leuchten, weit allgemeiner erscheint, als die Phosphorescenz durch Insolation. Die dazu nöthige Temperatur ist sehr verschieden. Der grüne Flußspath von Nertschinsk (Echlorophan) leuchtet schon, wenn er die Wärme der Hand hat; der gewöhnliche Flußspath leuchtet bey einer Erwärmung von 63° bis 100° C., der Demant im Allgemeinen bei $+100^{\circ}$ bis 250° C., der Kalkspath bei $+200^{\circ}$ bis 325° C., Quarze und viele Silicate bei $+250^{\circ}$ bis 375° C. Die Farbe des Lichtes ist mannigfaltiger, als bey dem Leuchten durch Bestrahlung; grün bey dem Echlorophan, blau bey dem Petalit und Cyanit, weiß bey dem Witherit, gelb bey dem Kalkspath, orange bey dem Arragon und Harmotom, roth bey dem Schwerstein und rothen Turmalin. Auch zeigt dasselbe Mineral in den verschiedenen Zeiten der Erwärmung oft mehrere Farben.

Versuche über die Phosphorescenz der Mineralien durch Erwärmung kann man auf die einfachste Weise anstellen, wenn man im dunkeln Zimmer einzelne Mineralienstücke auf Eisenblech, das auf einer offenen Blechröhre ruht, vermittelt einer untergestellten Weingeistlampe erhitzt. Im hellen Zimmer kann man den Versuch so ausführen, daß man das Mineral in das zugeschmiedete Ende eines Flintenlaufs einbringt, diesem sodann eine horizontale Lage gibt und das Ende erhitzt. Dabei wird in der dunkeln Röhre auch die schwächste Phosphorescenz sichtbar.

4) Durch Electricität. Manche Mineralien werden leuchtend, wenn man einige Zeit lang electriche Funken hat durch sie schlagen lassen. Auch erhalten solche Mineralien, die durch Rothglühen die Fähigkeit zu leuchten verloren haben, dieselbe wieder, wenn man electriche Funken durch sie leitet. Die Beobachtungen von Dessaigne machen es wahrscheinlich, daß alle Phosphorescenz auf einer Ausströmung electriccher Materie beruht. Sie zeigen auch, daß dieselbe mit der Theilbarkeit und mit der Beschaffenheit der Oberfläche zusammenhängt.

Von der Cohärenz der Mineralien.

Die meisten Mineralien zeigen einen hohen Grad von Cohärenz, sind veß. Nur bey einigen wenigen, die flüssig sind,

erscheint sie gleich Null. Hinsichtlich der Qualität der Cohärenz bemerkt man vorzüglich folgende Verschiedenheiten. Ein Mineral ist

1) spröde, wenn bey dem Versuche, kleine Theile von demselben mit einer Stahlspitze, einer Feile oder einem Messer loszutrennen, die Trennung sich nach mehreren Richtungen fortsetzt, wodurch die Theile ihren Zusammenhang verlieren, mit Geräusch abspringen und als feines Pulver oder kleine Splitter umherfliegen. Die Cohärenz spröder Körper scheint mit einer gewissen Spannung der Theile verbunden zu seyn. Die Edelsteine, viele Erze, überhaupt harte Mineralien sind spröde;

2) mild, wenn bey dem vorigen Versuche die Unterbrechung des Zusammenhangs sich nur wenig fortsetzt, die abgetrennten Theile zwar pulverartig zertheilt erscheinen, auf dem trennenden Werkzeuge aber ruhig liegen bleiben. Nur Mineralien von geringer Härte, wie Graphit, Molybdän, sind mild;

3) geschmeidig, wenn bey demselben die Unterbrechung des Zusammenhangs sich nur so weit fortsetzt, als das trennende Werkzeug eindringt, und die abgetrennten Theile ihren Zusammenhang behalten. Ein geschmeidiges Mineral läßt sich unter dem Hammer dehnen, mit einem Messer in Spähne zerschneiden. Ein großer Theil der gebiegenen Metalle zeigt dieses Verhalten;

4) biegsam, wenn dünne Blättchen desselben gebogen werden können; aber die frühere Lage nicht wieder einnehmen, wann die biegende Kraft zu wirken aufgehört hat. Biegsam sind Talk und Gyps;

5) elastisch, wenn die Theile, deren Lage durch eine von Außen einwirkende Kraft verändert worden ist, ihre frühere Lage wieder annehmen, wann die Einwirkung der äußern Kraft aufhört. Der Glimmer ist in hohem Grade elastisch.

Die flüssigen Mineralien sind

1) dünnflüssig, wenn Tropfen derselben wie gerundet abfallen, ohne Fäden zu ziehen;

2) dickflüssig, wenn die Tropfen Fäden ziehen.

Das Cohärenzverhältniß bedingt auch den Eindruck, welchen ein festes Mineral bei seiner Betastung auf den Tastsinn macht, und den man das Anfühlen nennt. Die Untersuchung geschieht,

indem man die Fingerspitzen über die Oberfläche des Minerals hinführt. Man unterscheidet fettiges, sanftes, rauhes, kaltes Anfühlen. Talc, Glimmer, Trippel, die Edelsteine können als Beispiele gelten.

H ä r t e.

Die absolute Quantität der Cohärenz gibt sich durch die Härte zu erkennen, d. i. durch den Widerstand, den ein Körper der Verschiebung oder Trennung seiner Theile entgegen setzt. Dieser ist bei den Mineralien sehr verschieden, wie man bald erfährt, wenn man versucht, das eine mit dem andern zu reizen, oder Theile von verschiedenen Mineralien mit einer Stahlspitze, einem Messer oder einer Feile abzutrennen. Man wird dabei finden, daß der Bergcrystall größeren Widerstand leistet, als der Flußspath, und dieser größeren, als der Gyps. Die Größe dieses Widerstandes nennt man in der Mineralogie den Härtegrad. Für das Bedürfniß der Mineralogie genügt eine annähernde Bestimmung des Härtegrades vollkommen, und diese geschieht, unter der Voraussetzung, daß von zwey Mineralien, von welchen das eine das andere reißt, das reißende stets härter ist, als das gerißte, indem man untersucht, wie die Mineralien sich in dieser Beziehung zu einander verhalten. Auf genannte Voraussetzung hin hat Mohs eine sehr brauchbare Härtescala gegründet und aufgestellt, indem er eine Anzahl von Mineralien auswählte, von denen jedes folgende jedes vorhergehende reißt, von diesem aber nicht gerißt wird. Er wählte folgende zehn Mineralien aus und vergleicht nun damit die Härtegrade der übrigen:

- 1) Talc, theilbar, von weißlicher oder grünlicher Farbe.
- 2) Steinsalz, ein theilbares Stück, wie man es in den Salzgruben findet; oder Gyps.
- 3) Kalkspath, theilbar, weiß.
- 4) Fluß, theilbar.
- 5) Apatit, crystallisirt.
- 6) Feldspath, theilbar, weiß.
- 7) Quarz, weiße durchsichtige Bergcrystalle.
- 8) Topas, Crystall.

9) Korund, die grüne bengalische Varietät, welche beym Zerschlagen ebene Flächen gibt.

10) Demant.

Die Grade der Härte werden durch die den Mineralien der Scala vorgesezten Zahlen ausgedrückt. So sagt man, die Härte des Steinsalzes sey gleich zwey, die Härte des Flußspathes gleich vier, und schreibt dieß so: $H. = 2.0$, $H. = 4.0$. Die zwischen zwey Gliedern der Scala liegenden Härtegrade werden nöthigenfalls auf die Hälfte 0.5 oder das Viertel 0.25 geschätzt. Das Null dieser Scala zeigt die Flüssigkeit einer Mineralsubstanz an.

Um die Härte eines Minerals zu finden, verfährt man nach Mohs auf folgende Weise: Man versucht die Glieder der Scala mit einem Eck des gegebenen Minerals zu reizen, und zwar von oben herab, damit man die untern Glieder nicht unnöthigerweise zertrübt. Hat man auf diese Weise das erste Mineral der Scala gefunden, welches geritzt wird; so nimmt man eine Feile und streift darauf ganz leicht sowohl das zu untersuchende Stück, als das geritzte Mineral der Scala und das nächste härtere Glied derselben, um sie mit einander zu vergleichen. Man wählt dazu wo möglich Stücke von ziemlich gleicher Größe, Gestalt und Beschaffenheit der Ecken und Kanten aus, und urtheilt nach dem größeren oder geringeren Widerstand, den diese Körper der Feile leisten, nach dem Geräusch, das sie beym Streichen auf der Feile verursachen, nach der Menge des Pulvers, das darauf liegen bleibt, oder nach der Stärke der Politur, die letztere annimmt. Hat man sich durch öftere Wiederholung und zweckmäßige Abänderung des Versuchs überzeugt, daß der Härtegrad sicher bestimmt ist; so drückt man ihn in Zahlen aus, welche die entsprechenden Glieder der Scala repräsentiren, und fügt nöthigenfalls die Bruchtheile bey. Die Feilen, welche man zu diesen Versuchen verwendet, müssen hart und fein gehauen seyn.

Mineralien, die eine ausgezeichnete Theilbarkeit nach einer Richtung besitzen, zeigen auf der entsprechenden Theilungsfläche eine geringere Härte, als auf den übrigen Flächen. So wird der Gyps auf seiner ausgezeichneten Theilungsfläche vom Fingernagel geritzt, nicht aber auf den andern Theilungsflächen. Der

Gyanit wird auf den leicht hervorzubringenden Theilungsflächen vom Flußspath geritzt; seine Ecken ritzen dagegen den um einen ganzen Grad härteren Apatit.

Vom eigenthümlichen Gewichte.

Zwey gleich große Würfel von verschiedenen Substanzen zeigen in der Regel ein ungleiches Gewicht. Wenn man nun das Gewicht des einen Würfels als Einheit annimmt, so heißt das Gewicht des andern sein eigenthümliches oder specifisches Gewicht. Das Gewicht aller festen und flüssigen Körper vergleicht man mit dem des destillierten Wassers, welches als Einheit angenommen wird. Wiegt nun zum Beispiel ein Würfel Wasser ein Pfund, so wiegt ein eben so großer Würfel vom Bergcrystall zwey Pfund und ganz nahe sieben Zehntel eines Pfundes, ein gleich großer Würfel Schwefelkies nahezu fünf Pfund. Das specifische Gewicht des Wassers verhält sich daher zu dem specifischen Gewichte des Bergcrystalls und des Schwefelkies wie $1 : 2,7 : 5$, und der Ausdruck ist für den Bergcrystall $G. = 2,7$, für den Schwefelkies $G. = 5,0$.

Ein ganz zweckmäßiges Verfahren zur genauen Bestimmung des eigenthümlichen Gewichtes fester, in Wasser unlöslicher Mineralien ist folgendes: Man wiegt das zu untersuchende Mineral in freier Luft auf einer scharfen Wage, die jedenfalls, bei einer Belastung von 400 Gran, noch $\frac{1}{100}$ Gran Ausschlag gibt. Hierauf füllt man ein kleines cylindrisches Gläschelchen, das eine weite Oeffnung hat, mit destilliertem Wasser, schließt es durch einen gut passenden Glasstöpsel oder ein aufgeschliffenes, genau auf den Rand der Oeffnung passendes Glasblättchen, trocknet es außen sorgfältig ab und bestimmt sodann ebenfalls dessen Gewicht auf der Wage. Die gefundenen Gewichte, dasjenige des Minerals und das des mit Wasser gefüllten Gläschelchens, werden nun addiert. Die Summe wird bemerkt. Nun trägt man das Mineral in das gefüllte Gläschelchen ein, wobey es ein dem feinigsten gleiches Volum Wasser austreibt. Man entfernt sorgfältig alle dem Mineral anhängenden Luftblasen, füllt das Gläschelchen wiederum ganz genau, schließt es und wiegt es nach vorangegangener Abtrocknung abermals. Was es nun weniger wiegt, als

die bemerkte Summe, das ist das Gewicht des verdrängten Volums Wasser, welches bekanntlich eben so groß ist, als das Volumen des in das Gläschchen eingebrachten Minerals. Will man nun wissen, wie sich das eigenthümliche Gewicht des Minerals zu demjenigen des als Einheit angenommenen Wassers verhält; so dividirt man das Gewicht des Minerals durch das Gewicht des ausgetriebenen Volums Wasser. Die Zahl, welche dabey erhalten wird, drückt das eigenthümliche Gewicht des gegebenen Minerals aus. Gesezt, das Mineral sey dichter Dolomit, die zum Versuche angewendete Menge betrage 28 Gran, das Gewicht des ausgetriebenen Wassers sey 10 Gran, so ist $\frac{28}{10} = 2,8$ das eigenthümliche Gewicht des Dolomits.

Beim diesem Verfahren kann man das Mineral in kleinen ausgefuchten Körnern anwenden und sehr genaue Resultate erhalten. Mit der sogenannten hydrostatischen Wage erreicht man denselben Grad von Genauigkeit. Es ist dieses eine gewöhnliche scharfe Wage, bei welcher eine der Wagschalen viel höher als die andere hängt. An der höher hängenden Schale ist ein Hälchen angebracht, an welches das zu untersuchende Mineral mittelst eines Menschenhaares befestigt werden kann. Man wiegt zuerst das Mineral in der Luft, befestigt es sodann an das Hälchen der höheren Wagschale, senkt es hierauf in destillirtes Wasser, das in einem cylindrischen Gefäße untergestellt ist, und wiegt es nochmals. Es wiegt jetzt weniger als in der Luft, und zwar genau so viel weniger, als das Gewicht eines seinem Volumen gleichen Wasservolums beträgt. Mit dem Gewichtsunterschied wird nun in das Gewicht des in der Luft gewogenen Minerals dividirt; der Quotient ist das specifische Gewicht des Minerals. Beim dieser Verfahrensweise muß das Mineral aus einem Stücke seyn. Man kann jedoch die Wage auch so abändern, daß man an das Hälchen ein kleines Uhrglas mittelst eines Menschenhaares befestigt und in Wasser senkt. Dabey kann man auch Körner, lose Crystalle oder reine Bruchstücke anwenden.

Das Nicholson'sche Aräometer, dessen Beschreibung in die Lehrbücher der Physik gehört, gibt nicht die genauen Resultate, welche die angeführten Verfahrensarten liefern.

Will man das specifische Gewicht von Mineralien bestimmen, die zwar unlöslich in Wasser sind, aber davon einsaugen, wie es bey weichen, erdartigen Substanzen, bey einigen Opalen der Fall ist; so bestimmt man, wie gewöhnlich, erst ihr Gewicht in der Luft, bringt sie dann ins Wasser, läßt sie sich vollsaugen, bestimmt hierauf die erfolgte Gewichtszunahme, so wie das Gewicht des Wasservolums, das sie verdrängen, zieht von diesem ab, was sie durch Einsaugen von Wasser zugenommen haben, und dividirt mit dem Rest in das Gewicht derselben in der Luft.

Soll das specifische Gewicht solcher Mineralien bestimmt werden, die in Wasser auflöslich sind, wie Gyps, Steinsalz, Alaun; so wählt man eine Flüssigkeit, in welcher sie sich nicht auflösen, und deren eigenthümliches Gewicht bekannt ist, Oel oder Weingeist, bestimmt nach der eben angegebenen Methode das specifische Gewicht derselben im Verhältniß zu ihrem bekannten specifischen Gewicht, und multiplicirt hierauf die erhaltenen Zahlen. Das Product ist das gesuchte specifische Gewicht der gegebenen Mineralien.

Das eigenthümliche Gewicht eines flüssigen Minerals wird bestimmt, indem man ein Fläschchen mit eingeriebenem Stöpsel und vom bekanntem Gewichte, nach einander, mit der zu untersuchenden Flüssigkeit und mit destilliertem Wasser, angefüllt, abwägt; und hierauf das Gewicht der Flüssigkeit durch dasjenige des Wassers dividirt.

Bei allen derartigen Bestimmungen müssen die zu untersuchenden Substanzen vollkommen rein von fremdartigen Beymengungen seyn. Größere Stücke sind selten ganz frey von fremdartigen Einmengungen, und man wählt daher immer kleine Stücke, einzelne kleine Crystalle, oder zertheilt größere Stücke, und sucht die reinsten Körner sorgfältig aus. Exemplare, welche Blasen oder Höhlungen haben, müssen vermieden werden. Kann man statt ihrer keine anderen erhalten, so müssen die Luftblasen aus ihnen, durch Kochen des Minerals im Wasser, vor dem Wägen, oder durch Anwendung einer Luftpumpe, entfernt werden. Die der Oberfläche gewöhnlich anhängenden Luftblasen muß man durch Benetzung der Stücke vor der Wägung in Wasser, durch Umwenden derselben, wenn sie darinn liegen, durch Streichen

ihrer Oberfläche mit einem Pinsel, einer zarten Federfahne, mit einem Platindraht, sorgfältig zu entfernen suchen. Dieß gelingt nun in der Regel nicht so schnell, und scharfe Bestimmungen des specifischen Gewichtes erfordern daher, neben großer Genauigkeit auch eben so viel Geduld. Geschehen die Bestimmungen bey einer Temperatur zwischen $+5^{\circ}$ und $+16^{\circ}$ C., so ist es nicht nöthig, daß man dieselbe angibt, da nach Hallströms Bestimmungen das specifische Gewicht des Wassers in den bezeichneten Temperaturgränzen = 0,999, das heißt gleich groß ist. Ist aber die Temperatur, bey welcher die Bestimmung gemacht wird, darunter oder darüber, so muß sie genau angegeben werden, damit nöthigenfalls die Reduction auf eine gewisse Temperatur gemacht werden kann.

Die Bestimmungen des specifischen Gewichtes der Mineralien haben eine hinlängliche wissenschaftliche Genauigkeit, wenn sie bis auf die vierte Decimalstelle scharf sind. In den meisten Fällen genügen zwey Decimalzahlen, und wenn es sich um die Erkennung eines wissenschaftlich schon bestimmten Minerals handelt, reicht eine einzige aus.

Die ganz genaue Ermittlung des specifischen Gewichtes der Mineralien ist von großer Wichtigkeit, da verschiedene Geschlechter und Gattungen meistens auch ein verschiedenes, die Varietäten einer und derselben Gattung dagegen sehr nahe gleiches, specifisches Gewicht besitzen. Dadurch wird dasselbe für die Mineralogie ein Merkmal vom ersten Range.

Vom Magnetismus.

Wenige Mineralien wirken auf die Magnetnadel; aber gerade deshalb ist diese Wirkung, wo sie hervortritt, sehr charakteristisch. Sie zeigt sich nur bey eisenhaltigen Mineralien, ist also durch einen Eisengehalt bedingt, und gibt denselben somit aufs Bestimmteste zu erkennen. Bey einigen Mineralien ist die magnetische Kraft so durch ihre Masse vertheilt, daß ihre entgegengesetzten Enden die Pole der Magnetnadel abwechselnd anziehen oder zurückstoßen. Mineralien, welche diese Wirkung auf die Magnetnadel zeigen, sind polarisch magnetisch, wirkliche Magnete. Viele Crystalle von Magneteisenstein verhalten sich

über einander liegenden Metallstreifen, daß sie sich nicht unmittelbar berühren, und nur mittelst desselben mit einander in Berührung stehen, worauf man sie an einem Ende etwas in die verdünnte Schwefelsäure eintauchen läßt. Die Gasentwicklung findet man am Zink und Kupfer statt, wenn das Mineral ein Leiter ist, zeigt sich aber am Kupferstreifen nicht, wenn dasselbe ein Isolator der Electricität ist.

III. Chemische Eigenschaften.

Von den Grundstoffen der Mineralien.

Man kennt bis jetzt 54 Grundstoffe, und diese alle hat man im Mineralreich gefunden. Sie bilden theils für sich, theils auf mannfaltige Weise mit einander verbunden, die gesammte Körperwelt. Grundstoffe, oder einfache wägbare Stoffe, nennt man solche, die wir noch nicht in andere Bestandtheile zu zerlegen im Stande gewesen sind. Damit ist aber nicht gesagt, daß man sie gar nicht in andere Bestandtheile zerlegen kann, daß sie absolut einfach sind. Bestehen sie aus noch einfacheren Grundmaterien, so sind uns diese wahrscheinlich noch unbekannt, und die Kräfte, die sie zusammenhalten, zu groß, als daß wir sie durch irgend ein Mittel, das uns zu Gebot steht, überwinden könnten, und sie erscheinen uns folglich als einfache Körper. Ein Theil der Grundstoffe zeichnet sich durch eigene, bestimmte, äußere Charaktere aus, und wir nennen diese Metalle, andere dagegen besitzen diese Charaktere nicht, und wir nennen sie deshalb Nichtmetallische. Nach dieser Hauptverschiedenheit theilt man sie in zwei große Abtheilungen, in nichtmetallische, die man auch mit einem Worte Metalloide nennt, und in Metalle.

Tafel der Grundstoffe.

Metalloide oder nicht metallische Stoffe.	Metalle. Brennbare, undurchsichtige Stoffe, welche die Wärme und die Electricität leiten, und durch Polieren einen eigenthümlichen Glanz annehmen.
---	---

Sie unterscheiden sich im All-
gemeinen von den Metallen durch
das Unvermögen, die Electricität

und die Wärme zu leiten, und haben ein geringes spezifisches Gewicht, welches nicht dreyimal größer als dasjenige des Wassers ist.

Es sind ihrer dreyzehn:

Sauerstoff,
Wasserstoff,
Stickstoff,
Schwefel,
Selen,
Phosphor,
Chlor,
Brom,
Jod,
Fluor,
Kohle,
Bor,
Kiesel.

Von diesen zeichnen sich die drey ersten dadurch aus, daß sie nicht anders als in Gasgestalt dargestellt werden können, und nur in Verbindung mit andern Stoffen in flüssiger oder fester Gestalt auftreten.

Hinsichtlich ihres chemischen Verhaltens theilt man die Metalle in Sauerstoff und in brennbare Körper, d. i. in solche, die sich mit dem Sauerstoff vereinigen können, woben die meisten das Feuer hervorbringen, die wohlbekannte Erscheinung der Verbrennung.

Es sind ihrer ein und vierzig. Sie zerfallen in folgende Gruppen:

1. Metalle, deren Oxyde Alkalien und Erden bilden:

Kalium,
Natrium,
Lithium,
Baryum,
Strontium,
Calcium,
Magnesium,
Aluminium,
Beryllium,
Yttrium,
Zirkonium,
Thorium.

2. Metalle, die vorzugsweise Säuren bilden:

Arfenik,
Chrom,
Molybdän,
Antimon,
Tantal,
Tellur,
Titan,
Vanadium,
Wolfram,
Osmium,
Gold.

3. Metalle, welche vorzugsweise Salzbasen bilden:

Zink,
Cadmium,
Zinn,
Eisen,
Mangan,
Cerium,
Kobalt,
Nickel,
Kupfer,
Uran,
Bismuth,
Blei,

Quecksilber,
Silber,
Rhodium,
Iridium,
Palladium,
Platin.

Wir geben eine kurze Uebersicht ihrer wichtigsten Verhältnisse, damit auch Leser, welche der Chemie nicht kundig sind, in den Stand gesetzt werden, sich eine richtige Vorstellung ihrer Haupteigenschaften zu bilden, und bei den nachfolgenden Auseinandersetzungen uns ohne Schwierigkeit folgen zu können.

Der Sauerstoff, oder Oxygen, von oxy's, sauer, und gonnao erzeugen, ist einer der allerwichtigsten Stoffe, wo nicht der wichtigste, indem er einen Hauptbestandtheil der Luft und des Wassers ausmacht und sich, mit alleiniger Ausnahme des Fluors, mit allen andern Stoffen vereinigt. Seinen Namen hat er davon, daß bei seiner Verbindung mit vielen Stoffen zusammengesetzte Körper von saurer Beschaffenheit entstehen, zum Beispiel, wenn er sich mit Kohle verbindet, Kohlensäure, wenn er sich mit Schwefel vereinigt, Schwefelsäure gebildet wird. Er ist einer der wenigen Grundstoffe, welche Gasgestalt besitzen, und sie für sich unter jedem Drucke, in jeder Temperatur behaltem. Alle Körper, welche in der Luft brennen, brennen im Sauerstoff weit lebhafter und mit ungleich stärkerer Licht- und Wärme-Entwicklung. Verschiedene Metalle, welche, in der Luft erhitzt, nur Glühungserscheinungen zeigen, verbrennen im Sauerstoff mit starkem Licht; eine Stahlfeder zum Beispiel verbrennt darin mit glänzendem Funkensprühen. Er hat eine starke Neigung, sich mit andern Stoffen zu verbinden, und wirkt demzufolge ununterbrochen verändernd auf alle Substanzen ein, mit denen er in Berührung steht. Von den mineralischen Körpern, welche die Erdrinde zusammensetzen, enthalten die meisten mehr oder weniger Sauerstoff.

Der Wasserstoff, oder Hydrogen, von Hydr und gonnao, ist im reinen Zustande ebenfalls gasförmig, der leichteste bekannte Körper, vierzehnmal leichter als Luft, sehr brennbar, und wurde deshalb ehemals brennbare Luft genannt. Er ist außerordentlich entzündlich, verbrennt mit Sauerstoff unter

der größten Wärme-Entwicklung. Das Product der Verbrennung ist Wasser, in welchem Sauerstoff und Wasserstoff dem Gewichte nach in dem Verhältniß von 8 : 1 enthalten sind. Im Mineralreich kommt der Wasserstoff vorzüglich in Gestalt von Wasser, mit Sauerstoff verbunden, vor.

Der Stickstoff, auch Azot genannt, vom verneinenden α und zoo, Leben, wegen seiner Eigenschaft, lebende Wesen zu ersticken, ebenfalls ein gasförmiger Körper, der, mit Sauerstoff gemengt, die atmosphärische Luft bildet und ungefähr $\frac{1}{5}$ derselben ausmacht, zeichnet sich vorzüglich durch negative Eigenschaften aus. Er ist weder brennbar, noch unterhält er das Verbrennen, besitzt weder Geschmack noch Geruch, und verbindet sich unmittelbar mit keinem der andern Grundstoffe. Unter gewissen Verhältnissen aber mit Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff in Verbindung gebracht, bildet er einige der wichtigsten Zusammensetzungen; so mit Sauerstoff die Salpetersäure oder das Scheidewasser, die äzendste aller Flüssigkeiten; mit Wasserstoff das Ammoniak, eine flüchtige, höchst wirksame Lauge; mit Kohlenstoff und Wasserstoff die Blausäure, das tödtlichste Gift. Der Stickstoff, der charakteristische Grundstoff thierischer Substanzen, kommt im Mineralreich wenig vor, und vorzugsweise in den bezeichneten Verbindungen mit Sauerstoff und Wasserstoff.

Der Schwefel, dieser wohlbekannte Grundstoff, kommt häufig und vorzüglich im Mineralreich vor, und ist einer der wenigen, die man im reinen Zustande in der Natur findet. Mit Sauerstoff bildet er die Schwefelsäure, auch Vitriolöl genannt, welche im unorganischen Reiche sehr verbreitet ist, und mit Wasserstoff den Schwefelwasserstoff, die nach faulen Eiern riechende sogenannte Schwefelleberluft, welche die unter dem Namen Schwefelwasser bekannten Mineralwasser charakterisirt.

Das Selen, von Selene, der Mond, ist in seinen chemischen Verhältnissen dem Schwefel sehr ähnlich, kommt nur wenig und so viel man bis jetzt weiß, nur im Mineralreich, theils in Verbindung mit Schwefel, theils mit einigen Metallen, vor.

Der Phosphor, von Phosphoros, Lichtträger, wegen

seiner Eigenschaft, im Finstern zu leuchten, kommt in der Natur nicht rein vor, sondern muß künstlich bereitet werden. Er ist eine außerordentlich brennbare, bey gewöhnlicher Temperatur lichtgelblichweiße, feste Substanz, und bildet bey der Verbrennung Phosphorsäure, die einen Bestandtheil vieler Mineralien, der meisten Pflanzen und aller Thiere ausmacht, bei welchen sie sich vorzüglich in der Knochenerde, der erdigen Grundmasse des festen thierischen Gerüsts, vorfindet.

Das Chlor, von Chloros, gelbgrün, in seinem ursprünglichen Zustande ein Gas von bemerkter Farbe, findet sich in der Natur niemals im reinen, unverbundenen Zustande, sondern immer mit andern Stoffen vereint, und ist, in seiner Verbindung mit Natrium, im Steinsalz, von welchem es $\frac{1}{100}$ ausmacht, allgemein verbreitet. Es unterhält das Verbrennen sehr vieler Körper, namentlich vieler Metalle, wird durch gemeinschaftliche Wirkung von Druck und Kälte tropfbarflüssig, und ist besonders dadurch ausgezeichnet, daß es organische Farbstoffe schnell und völlig bleicht, riechende Ausdünstungen von kranken oder todtten Thieren und Pflanzen, so wie feuchenverbreitende Umstehungsstoffe, Miasmen und Contagien zerstört.

Das Brom, von Bromos, übler Geruch, ist eine bey gewöhnlicher Temperatur braunrothe, widrig riechende Flüssigkeit, und

Das Jod, von Jodes, veilchenblau, ist ein fester, crystallinischer, schwarzer Körper, der in der Wärme in sehr schönen veilchenblauen Dämpfen aufsteigt. Beyde kommen in geringer Menge im Mineralreich, namentlich im Steinsalz, vor, und wirken auf organische Farben ähnlich wie Chlor, aber weit schwächer. Das Jod zeigt sich sehr heilsam bey Drüsenleiden.

Das Fluor ist im reinen Zustande noch nicht bekannt, seine Existenz muß aber, nach der Analogie seiner Verbindungen mit denen des Chlors, Broms und Jods, vorausgesetzt werden. Es findet sich vorzüglich im Flußspath in Verbindung mit Calcium, und ist dadurch sehr ausgezeichnet, daß es, mit Wasserstoff verbunden, als Flußsäure sehr gefährlich wirkt, das Glas zerfrisst, und mit der sonst kaum bezwingbaren Kiesel-erde sich zu einer luftigen Verbindung vereint.

Die Kohle, oder der Kohlenstoff, im unreinen Zustande als Holzkohle oder Steinkohle so gut bekannt, erscheint auf dem höchsten Grade der Reinheit als Demant, welcher der härteste, glänzendste Körper der Natur ist. Im Mineralreich findet sich der Kohlenstoff in großer Menge, und überdieß tritt er als Hauptbestandtheil aller organischen Wesen auf, die er theils in Verbindung mit Wasserstoff und Sauerstoff, theils in Verbindung mit diesen und mit Stickstoff constituirt. Mit Sauerstoff verbrennend, bildet er die Kohlensäure, welche, an verschiedene Alcalien, Erden und schwere Metalle gebunden, im Mineralreich häufig vorkommt und in unermesslicher Menge im gemeinen Kalkstein vorhanden ist.

Das Bor oder Boron hat seinen Namen vom Borax, einem Salze, welches vorzüglich in einigen See'n in Tibet und China gefunden wird. In diesen ist es, mit Sauerstoff verbunden, als Boraxsäure enthalten, die an einigen vulcanischen Orten auch mit Wasserdampf aus dem Erdbinneren herausgetrieben wird. Das reine Boron, eine braune, pulverige Substanz, kann aus der Boraxsäure künstlich dargestellt werden, findet sich aber niemals rein in der Natur.

Das Kiesel, oder Silicium, von Silica, Kiesel-erde, ist die Grundlage des Quarzes, eines der häufigsten Mineralien der Natur. Es ist, wie Boron, ein braunes Pulver, nimmt in der Hitze Sauerstoff auf und verwandelt sich in weiße Kiesel-erde, welche im dichten Zustande den Bergkristall, Feuerstein und alle Abänderungen des Quarzes constituirt, und in die Zusammensetzung einer sehr großen Anzahl von Mineralien eingeht. Unauflösbarkeit und Härte machen die Kiesel-erde zum Hauptbestandtheil unseres Erdkörpers, als welcher dieselbe auch unverkennbar auftritt.

Kalium, Natrium und Lithium sind die metallischen Grundlagen von Kali, Natron und Lithion, welche als die wahren Alcalien oder Laugen angesehen werden und sich durch den alcalischen Charakter, so wie durch Schmelzbarkeit und Löslichkeit auszeichnen. In Verbindung mit Kohlensäure bilden Kali und Natron die zwei wohlbekannten alcalischen Substanzen, Pottasche und Soda. Lithion kommt nur in einigen wenigen

Mineralien vor, dagegen sind die Oxyde vom Kalium und Natrium im Mineralreich sehr verbreitet und in großer Menge vorhanden. Die silberweißen beiden Metalle schwimmen auf Wasser; eine bey Metallen gewiß höchst auffallende Eigenschaft. Sie üben aber eine so große Anziehungskraft gegen Sauerstoff aus, daß sie sich mit diesem allenthalben verbinden, wo sie ihn treffen, denselben aus der Luft anziehen, aus organischen Körpern sich aneignen und aus Wasser unter so starker Wärme-Entwickelung aufnehmen, daß sie, darauf geworfen, dasselbe unter Fischen zersehen, wobei Kalium sich entzündet und als rothe Feuerkugel umherschwimmt.

Baryum, Strontium, Calcium und Magnesium sind die metallischen Grundlagen der alkalischen Erden, welche sich von den Alkalien durch ihre Schwerlöslichkeit im Wasser und durch die Unauflöslichkeit ihrer neutralen kohlensauren Salze auszeichnen, so wie durch Strengflüssigkeit. Baryum, von *Barus*, schwer, und Strontium, von *Strontian*, einem Orte in Schottland, zeigen noch sehr entschiedene alkalische Eigenschaften, ziehen mit großer Begierde Kohlensäure an, werden darum im reinen Zustande in der Natur nicht gefunden, wohl aber in Verbindung mit jener, so wie in Verbindung mit Schwefelsäure.

Das Calcium, ein weißes, silberähnliches Metall, ist die Grundlage der allbekannten Kalkerde, welche im Mineralreich, mit Kohlensäure verbunden, in außerordentlicher Menge vorkommt, und auch mit Schwefelsäure vereinigt sehr häufig angetroffen wird. Sie findet sich überdies oft in Verbindung mit Phosphorsäure, und geht in dieser Gestalt, so wie als kohlensaures Salz, wesentlich in die Zusammensetzung der thierischen Körper ein, bildet die Thierknochen und die grenzenlose Mannigfaltigkeit von Thier-Gehäusen, Polypenröhren, Schnecken- und Muschel-Schalen. Der neutrale kohlensaure Kalk, Marmor, Kalkstein, Kreide, ist zwar im Wasser unlöslich, wird aber leicht unter Mitwirkung von Kohlensäure darin aufgelöst, und daher ziehen alle atmosphärischen Wasser, die kohlensäurehaltig sind, Kalk aus den Erdschichten aus und führen ihn in die Quellsquellen über, aus welchen er sich wieder als Einter, Tuff, Tropf-

stein absetzt, wenn die Kohlensäure aus dem Wasser entweicht, in welchem der Kalk durch ihre Vermittlung aufgelöst war.

Das Magnesium ist die metallische Grundlage der unter dem Namen Magnesia bekannten erdigen Substanz, die auch Bittererde heißt, weil sie mit Schwefelsäure ein bitter schmeckendes Salz, das Bittersalz, bildet. Die Bittererde besitzt die schwächste alcalische Eigenschaft, zieht, wie die Kalkerde, doch nicht so stark, die Kohlensäure an, und kommt deshalb nicht im reinen Zustande, sondern vorzüglich als kohlensaure Bittererde, in der Natur vor, weniger für sich, als in Verbindung mit kohlensaurem Kalk, mit welchem sie ein besonderes Gestein zusammensetzt, das in mächtigen und ausgedehnten Massen angetroffen wird.

Aluminium, Beryllium, Yttrium, Zirconium und Thorium sind die metallischen Grundlagen der eigentlichen Erden.

Aluminium, von alumen, Alaun, ist die Grundlage der Thonerde und verwandelt sich durch Aufnahme von Sauerstoff in diese. Sie kommt in der Natur am reinsten als Sapphir vor und ist, künstlich dargestellt, eine weiße, leichte und lockere Erde, die weder Geruch noch Geschmack besitzt, außerordentlich strengflüssig, im Wasser unauflöslich ist, aber eine starke Verwandtschaft zu ihm hat, so daß sie, durch Gläsen ausgetrocknet, aus der Luft bei feuchtem Wetter sehr viel Wasser anzieht und bis gegen 15 Procent an Gewicht zunimmt. Darauf beruht ihr wohlthätiger Einfluß auf die Ackererde, in welcher sie allgemein verbreitet ist, und welche, vermöge eines Thonerdegehaltes, die Feuchtigkeit aufnimmt und lange zurückhält, was das Gedeihen der Gewächse so sehr befördert. Die Thonerde kommt nach der Kieselerde am häufigsten in der Natur vor, macht einen Bestandtheil der meisten Mineralien und Gesteine aus, und setzt in Verbindung mit Kieselerde die verschiedenen Abänderungen von Thon zusammen, die eine so nützliche Anwendung finden. Sie kann am leichtesten aus dem unter dem Namen Alaun wohlbekannten Salze abgeschieden werden.

Beryllium ist die metallische Grundlage der eigenthümlichen Erde, welche in Verbindung mit Kieselerde den Beryll

constituirt, wovon der Name abgeleitet ist. Sie kommt auch in einigen andern Mineralien vor, bildet süß schmeckende Salze, und wird deshalb auch Glycinerde genannt, oder Säßerde.

Yttrium ist die Grundlage der, in einigen seltenen scandinavischen Mineralien vorkommenden Erde, welche ihren Namen, Yttererde, von dem ersten Fundorte der Mineralien erhalten hat, welche dieselbe enthalten, nämlich Ytterby in Roslagen.

Das Thorium ist die metakische Grundlage der Thorerde, welche erst in neuester Zeit in einem norwegischen Mineral aufgefunden worden ist.

Das Zirconium ist die Grundlage der Zirconerde, welche in Verbindung mit Kieselerde den Zircon zusammensetzt, und von diesem den Namen erhalten hat.

Die Metalle, welche vorzugsweise Säuren bilden, zeigen einen electronegativen Charakter und haben demzufolge eine schwache Anziehung gegen die Säuren.

Das Arsenik (Arsenikum) kommt mitunter in metallischer Form, weit häufiger jedoch im oxydirtten Zustande vor. Es ist durch eine stahlgraue Farbe, Flüchtigkeit und Oxydierbarkeit ausgezeichnet, vermöge welcher es an der Luft schnell Sauerstoff aufnimmt und schwärzgrau wird. Seine Dämpfe riechen widerwärtig nach Knoblauch. Arsenik ist das einzige Metall, das man nicht schmelzen, nicht flüssig machen kann. Es verflüchtigt sich bey 180° C., ohne zu schmelzen. Mit Sauerstoff bildet es zwey Säuren. Die sauerstoffärmere, arsenichte Säure, ist allgemein unter dem Namen weißer Arsenik bekannt, und in dieser Form eines der tödtlichsten Gifte. Die sauerstoffreichere Säure, Arseniksäure, ist noch giftiger, als der weiße Arsenik, und kommt nicht selten mit Metallsorben verbunden in der Natur vor. Mit Wasserstoff bildet Arsenik ein äußerst giftiges Gas, das Thiere, die davon einathmen, tödtet, auch wenn es weniger als $\frac{1}{10}$ der eingeathmeten Luft ausmacht. Wer auch nur ganz kleine Quantitäten von diesem Gase eingeathmet hat, wird von Angst, Müdigkeit, Erß, Erbrechen befallen. Der wackere deutsche Chemiker Gehlen, einer unerwarteten Entwicklung des Gases ausgesetzt, starb nach achtstägigen furchterlichen Leiden.

Das **Ehrom**, von **Chroma**, Farbe, wird nur im oxybirten Zustande gefunden und hat seinen Namen davon, daß es ausgezeichnet schön gefärbte Verbindungen bildet.

Das **Banadin** (**Vanadium**), nach **Banadis**, einem Beynamen der scandinavischen Göttin **Freya**, ist in neuester Zeit in **Taberger Eisensteinen** aufgefunden und später auch in einem **Bleyerze** aus **Mexico** und **Schottland** angetroffen worden. Es zeigt manche Uebereinstimmung mit **Ehrom**, ist aber ungleich seltener als dieses.

Das **Molybdän** findet sich in einem graphitähnlichen Minerale, welches man **Wasserbley** nennt und das immer nur in geringer Quantität vorkommt.

Das **Wolfram** kommt im oxybirten und gesäuerten Zustande in einigen wenigen Mineralien vor, namentlich im **Wolframierz**, von dem es den Namen hat, und im **Zungstein** oder **Schwerstein**, einem Steine, welcher seines großen specifischen Gewichtes wegen also benannt worden ist.

Das **Antimon** oder **Spießglanz** ist ein silberweißes, blätteriges Metall, und findet sich öfters in großen Quantitäten, gewöhnlich mit Schwefel verbunden, beinahe in allen Ländern. Die spießige Gestalt seiner Crystalle und sein Glanz gaben die Veranlassung zu seiner Benennung. Der Name **Antimon** (**Antimonium**) ist nach dem griechischen Worte **αντι** und dem französischen **imoine**, **Mönch**, gebildet, was darauf Bezug hat, daß ein künstliches Präparat dieses Metalls; **Cartheuser-Pulver** genannt, in früherer Zeit in Mönchklöstern unrichtig als Arzneimittel angewendet, vielen Mönchen Nachtheil, ja selbst den Tod brachte. Alle Antimonpräparate wirken stark brechen-erregend, und **Antimonoryd** ist der Hauptbestandtheil des **Brechweinstein**s.

Das **Tellur**, **Tellurium**, kommt selten in der Natur vor, in einigen siebenbürgischen, altätschen und ungarischen Erzen. Es ist durch Leichtflüchtigkeit und Flüchtigkeit ausgezeichnet.

Das **Tantal**, **Tantalum**, findet sich in einigen wenigen Mineralien, welche zu den seltensten gezählt werden. Es hat den Namen von seinem Entdecker, **Eleberg**, wegen der Eigenschaft seines Oxydes, von Säuren nicht aufgelöst zu werden,

erhalten, in welcher Hinsicht er dasselbe mit dem Tantalus verglich, der, nach der bekannten Fabel, bis an's Kinn im Wasser stand, ohne seinen brennenden Durst stillen zu können. Nach Columbia in America, wo man es zuerst in einem Minerale fand, ist es auch Columbium genannt worden. Man kennt es zur Zeit nur als schwarzes Pulver, welches unter dem Polierstahl Metallglanz annimmt.

Das Titan, Titanium, ist ein fast kupperrothes, außerordentlich hartes und glänzendes Metall, welches man in einigen wenigen Mineralien findet, die vorzugsweise im Grundgebirge angetroffen werden, und das auch öfters in Eisenerzen enthalten ist, bei deren Verschmelzung es sich in zierlichen Würfeln im Ofen ansetzt, oder beim Frischen in der Schlacke aussondert.

Das Osmium kommt im Platinsand theils als ein Bestandtheil der Platinkörner vor, theils in eigenen Körnern in Verbindung mit Iridium. Es ist ein dunkelgraues, zur Zeit nur in Pulvergestalt bekanntes, höchst strengflüssiges Metall, dessen Oxyd einen starken, sehr unangenehmen Geruch besitzt, was zu seiner Benennung, nach Osme, Geruch, Veranlassung gegeben hat.

Das Gold, Aurum, ein ganz bekanntes Metall, wird fast allenthalben gefunden, aber in der Regel nur in kleinen Quantitäten. Es kommt am häufigsten gebiegen vor und zeichnet sich durch seine Schönheit und den starken Widerstand aus, den es der Hitze und andern äußern Einflüssen entgegensetzt.

Die Metalle, welche vorzugsweise Salzbasen bilden, sind im Allgemeinen häufiger vorhanden und mit starker Anziehung gegen die Säuren begabt.

Das Zink, Zincum, ist ein leicht schmelzbares, bläulich-weißes Metall von blätterigem Gefüge, bei einer gewissen Temperatur dehnbar. In der Weißglühhitze destillirt es in verschlossenen Gefäßen über. Es kommt vorzüglich in Verbindung mit Schwefel und Kohlensäure vor.

Das Cadmium hat viele Aehnlichkeit mit dem Zink, kommt mit ihm verbunden vor, findet sich aber ungleich seltener. Es ist dicht und noch flüchtiger als Zink.

Das Zinn, Stannum; dieses wohlbekannte Metall ist seit den ältesten Zeiten bekannt und benützt. Es kommt nicht häufig vor und scheint auf wenige Gegenden der Erde, beschränkt zu seyn. Man findet es vorzüglich im oxydierten Zustande.

Das Eisen, Ferrum, ist von Alters her bekannt und unstreitig das wichtigste Metall. Es wird selten im gebiegenen Zustande gefunden, und fast nur in Massen, die aus der Luft niederfallen, in sogenannten Meteorsteinen. Im oxydierten und geschwefelten Zustande ist es dagegen in der ganzen Natur verbreitet. Seine Härte, Zähigkeit, Dehnbarkeit, Schweißbarkeit, seine magnetischen Eigenschaften, machen es zum nützlichsten aller Metalle, das wesentlich zur Cultur des Menschen beigetragen, und dessen Anwendung immerhin gleichen Schritt mit seiner Civilisation gehalten hat.

Das Mangan, Manganium, kommt oft in Verbindung mit Eisen, und in beträchtlicher Menge in vielen Mineralien vor, von welchen der Braunstein das bekannteste und reichste ist. Mangan verbindet sich mit Sauerstoff in mehreren Verhältnissen, und zieht denselben mit außerordentlicher Stärke an, so daß es sich schon bey gewöhnlicher Temperatur an der Luft und im Wasser oxydiert und daher sehr schwer im metallischen Zustande zu verwahren ist. Es ist lichtgraulichweiß und strengflüssig, so daß es sehr schwer zu einem größeren Korn geschmolzen werden kann.

Das Cerium, von Ceres, ist ein seltenes, sehr wenig bekanntes Metall, das man als graues Pulver darstellen kann und in einigen seltenen schwedischen und grönländischen Mineralien antrifft.

Das Uran, von Uranos, der Himmel, ist ebenfalls ein selten vorkommendes, höchst strengflüssiges Metall, das leicht als zimmetbraunes Pulver dargestellt, aber nicht wohl zu einem Korn geschmolzen werden kann.

Das Kobalt, Cobaltum, ist ein an wenigen Orten in größerer Quantität vorkommendes, graues Metall, dessen Oxyde die Gläser ausgezeichnet schön blau färbt, und das dieser Eigenschaft wegen sehr geschätzt ist. Man findet es auch in Meteorsteinen.

Das Nickel, Niccolum, kommt viel seltener vor als das Kobalt, gewöhnlich mit Arsenic verbunden, meistens als Begleiter von Kobalterzen. Auch ist es ein selten fehlender Bestandtheil meteorischer Massen, namentlich des Meteorereisens. Es ist silberweiß, sehr strengflüssig, und beynahe so stark magnetisch wie Eisen, so daß es, wie dieses, zu Magnethadeln verwendet werden kann.

Das Kupfer, Cuprum, hat seinen Namen von der Insel Cypren, woher es Griechen und Römer vorzugsweise erhielten, und wornach es im Alterthum Cyprium genannt wurde. Es ist ein allgemein verbreitetes, seit undenklichen Zeiten bekanntes Metall; dessen sich die ältesten Völker früher als des Eisens bedienten. Seine Dehnbarkeit, Zähigkeit, Geschmeidigkeit, seine Unveränderlichkeit in trockener Luft, machen es zu einem der wichtigsten Metalle.

Das Blei, Plumbum, ist, wie das Kupfer, ein längst bekanntes und allgemein verbreitetes Metall, das vorzugsweise in Verbindung mit Schwefel vorkommt, und durch seine Schwere, Weichheit, Dehnbarkeit und sein Verhalten gegen Luft und Wasser, ausgezeichnet ist.

Das Wismuth, Bismuthum, kommt weit seltener vor, und ist ein bläßröthlichweißes, crySTALLISIRBARES, blätteriges, sprödes, leichtflüssiges Metall, das sich in höherer Temperatur in verschlossenen Gefäßen überdestilliren läßt.

Das Quecksilber, Hydrargyrum, seit den ältesten Zeiten bekannt, ist vor allen andern Metallen dadurch ausgezeichnet, daß es bey der gewöhnlichen Temperatur der Luft flüssig oder geschmolzen ist, und erst bey einer Kälte von 40° C. erstarrt. Dann ist es weich, geschmeidig und gibt etwas Klang. Es kommt selten, und nur an einigen wenigen Orten, in größerer Quantität vor, theils im metallischen Zustande, theils mit Schwefel verbunden.

Das Silber, Argentum, ein allbekanntes Metall, hat die reinste weiße Farbe, und nimmt die schönste Politur an. Es ist sehr verbreitet, kommt am gewöhnlichsten mit Schwefel verbunden im Bleiglanz vor, und wird überdies nicht selten für sich

im metallischen Zustande, so wie mit Schwefel und andern Metallen vereinigt gefunden.

Das Platin kam erst im Jahr 1741 nach Europa, obgleich es lange schon in America gekannt war, wo man es für eine Art von Silber, spanisch Plata, hielt, und deswegen Platina nannte. Man hat es bis 1822 fast nur im Schuttlande Columbias und Brasiliens gefunden, seit dieser Zeit aber unter ähnlichen Verhältnissen auch am Ural. Das Platin zeichnet sich durch Luftbeständigkeit, Strengflüssigkeit, durch den Widerstand, den es Laugen und Säuren entgegensetzt, durch außerordentliche Dehnbarkeit und durch Schweißbarkeit aus, welche Eigenschaften es höchst schätzbar machen, und die nützlichsten Anwendungen desselben gestatten. Es ist der schwerste bekannte Körper.

Iridium, Rhodium und Palladium (von Iris-Regenbogen, wegen der Farbenmanchfaltigkeit, die einige seiner Salze zeigen; Rhoden Rose, nach der Farbe einiger Verbindungen, und Pallas, der griechischen Gottheit) sind sparsam vorkommende Metalle, welche sich im Platinsande finden. Iridium macht theils einen Bestandtheil der eigentlichen Platinkörner aus, theils bildet es, mit Osmium verbunden, den schweren grauen Sand, der nach seiner Zusammensetzung Iridosmin genannt wird. Das Rhodium kommt in den Platinkörnern vor. Das Palladium findet sich im gebiegenen Zustande in kleinen Schuppen im Platinsande, und kommt auch in den eigentlichen Platinkörnern vor.

Von der Verbindung der Grundstoffe unter einander.

Von den aufgeführten Stoffen kommen nur wenige in reinem, unvermishtem Zustand im Mineralreich vor; beynähe alle mineralischen Substanzen bestehen aus Verbindungen der Grundstoffe. Sie werden entweder aus zwey derselben gebildet, und erscheinen als eine einfach-binäre Verbindung, wie z. B. Schwefelkies, der aus Eisen und Schwefel besteht, oder sie werden durch mehrere Stoffe zusammengesetzt, von welchen immer wieder je zwey zu einer einfachen, binären Verbindung vereinigt sind, und zwey oder mehrere solche Verbindungen sind dann weiter zu einer gegliederten, einfach-binären Verbin-

eln Volum eines Stoffes mit 1, 2, 3, 4 u. s. w. Volum eines andern gasförmigen Stoffes. Da sich nun die Grundstoffe nicht bloß nach ihren einfachen Mischungsgewichten oder Maassen vereinigen, sondern auch nach vielfachen derselben, so müßte sich aus ihrer wechselseitigen Vereinigung eine unendliche Menge von Verbindungen ergeben, würde nicht das verschiedene electrische Verhalten der Körper, welches deren Verbindungsfähigkeit bedingt, engere Grenzen setzen. Die beiden entgegengesetzten Electricitäten bewirken zunächst die Verbindung von zwey Stoffen in einem bestimmten Verhältnisse, und sofort in mehreren anderen, bis sich die entgegengesetzten Electricitäten endlich wechselseitig neutralisiren, und sich ein electrisches Gleichgewicht herstellt, wobei sodann keine weitere Verbindung stattfinden kann. Zwischen sehr vielen Grundstoffen wird das electrische Gleichgewicht schon durch die erste einfache Verbindung nach der gleichen Zahl von Mischungsgewichten hergestellt, bey den meisten durch die zweyte, oder einige wenige einfache, so daß man annehmen kann, die Zahl der Verbindungen sey durch das relative electrische Verhalten der Körper in ziemlich bestimmte engere Grenzen eingeschlossen.

Die zusammengesetzten Körper werden nach dem Grade der Zusammensetzung in mehrere Ordnungen abgetheilt.

Die erste Ordnung umfaßt die Verbindungen der Grundstoffe unter einander, die Oxyde, Schwefelmetalle u. s. w., wohin z. B. Rothkupfererz aus Kupfer und Sauerstoff, Bleeglanz aus Blei und Schwefel bestehend, gehören.

Die zweyte Ordnung begreift die Verbindungen, welche durch Zusammensetzungen der ersten Ordnung gebildet werden, die Salze, die Verbindungen der Oxyde und der Schwefelmetalle unter einander, z. B. Bleivitriol aus Bleioxyd und Schwefelsäure, Magneteisenstein aus Eisenorydul und Eisenoryd, Kupferkies aus Schwefelkupfer und Schwefeleisen.

In der dritten Ordnung sind Verbindungen, welche aus zusammengesetzten Körpern der zweyten Ordnung bestehen, oder aus solchen und Körpern der ersten Ordnung, Doppelsalze, oder Salze mit Crystallwasser, wie Feldspath (kieselsaure Thonerde und kiesel-saures Kali) und Eisenvitriol (wasserhaltiges schwefelsaures Eisenorydul).

Die vierte Ordnung endlich umfaßt solche zusammengesetzte Körper, die aus Substanzen der dritten Ordnung und weiteren Verbindungen bestehen, wie z. B. die Doppelsalze mit Crystallwasser, der Alaun (schwefelsaure Thonerde und schwefelsaures Kali mit Wassergehalt), der Zeolith (kieselsaure Thonerde und kieselreiches Natron mit Wassergehalt),

Einfluß der Zusammensetzung auf die physischen Verhältnisse und die Form der Mineralien.

Wenn, wie schon bemerkt worden ist, die Eigenschaften einer zusammengesetzten Substanz verschieden sind von den Eigenschaften der Grundstoffe, welche dieselbe constituieren, und als eigenthümliche, der bestimmten Verbindung zukommende, betrachtet werden müssen; so folgt daraus der große Einfluß, den die Zusammensetzung auf die äußeren Verhältnisse der Mineralien ausübt. Härte und specifisches Gewicht oder Dichtigkeit der zusammengesetzten Substanz halten nicht das Mittel der Härte und der Dichtigkeit der Bestandtheile. In der Regel wird die Dichtigkeit vergrößert, der Umfang vermindert; letzterer bey Verbindungen gasförmiger Körper in einem bestimmten Verhältnisse, was bey Verbindungen flüssiger und fester Stoffe nicht der Fall ist. Nur selten wird die Dichtigkeit vermindert, der Umfang vergrößert, wie namentlich bey der Verbindung des Schwefels mit mehreren Metallen.

Bey der Verbindung durchsichtiger Körper mit undurchsichtigen entstehen bald durchsichtige (Zinkblende), bald undurchsichtige (Bleiglanz). Farben entstehen und verschwinden, Geschmack und Geruch verändern sich.

Von den Mineralien besitzen nur einige Geschmack, namentlich die sogenannten salzigen Körper. Man unterscheidet in der Mineralogie zusammenziehenden, styptischen (Eisenvitriol), süßlichen (Alaun), sauren (Borarsäure), salzigen (Steinsalz), laugenhaften (Natron), kühlenden (Salpeter), bittern (Bittersalz), urinösen (Calmiak), thonigen (Thone) Geschmack.

Deus allg. Naturg. I.

gleiche Weise vereinigt, in allen möglichen Verhältnissen, ohne daß die Crystallform wesentlich geändert würde, und treten in beliebigem Verhältnisse unter gleichen Umständen auch mit einander auf. Das Grünbley, basisches phosphorsaures Bleysorb, enthält häufig eine ansehnliche Quantität Arseniksäure, die sich bey diesem Minerale in unbestimmten Verhältnissen mit der Phosphorsäure vermischt, und sie auch völlig ersetzt, ohne daß dadurch die Form verändert wird.

Der Eisenspath, kohlensaures Eisenoxydul, nimmt unbestimmte Quantitäten von Bittererde, Kalkerde und Manganoxydul auf, und crystallisirt dabey gleichmäßig in Rhomboëdern, deren Winkel außerordentlich nahe mit einander übereinstimmen. Wohl aber weichen Farbe, Glanz, specifisches Gewicht, Durchsichtigkeit dabey größere oder kleinere Veränderungen. Auf ganz ausgezeichnete Weise sehen wir isomorphe Basen sich bey den kohlensauren Verbindungen vertragen, woraus eine große Zahl von Mineralien besteht. Der Granat bietet davon ein Beyspiel dar. Er besteht aus einem kohlensauren Doppelsalz; einem Doppelsilicat. Die Base des einen Salzes ist Thonerde oder das isomorphe Eisenoxyd, die Base des andern Salzes Kalkerde, Bittererde, Eisen- und Manganoxydul, welche theilweis isomorph sind. In diesen Salzen verhalten sich Thonerde und Eisenoxyd wechselseitig so, als ob jedes allein, bald sind sie beide zugleich vorhanden; das zweyte Salz treten Kalkerde, Bittererde, Eisen- und Manganoxydul substituierend auf. Einmal sind sie alle zugleich vorhanden, wie beyrn Almandin, andermal kommen deren nur drey mit einander vor, wie beyrn gemeinen Granat, wieder ein andermal sind deren nur zwey beyeinander, wie beyrn Almandin, oder erscheint gar nur eine dieser Basen, wie beyrn Grossular. Wie nun dieses auch seyn mag, die Crystallform bleibt dieselbe; die übrigen physischen Eigenschaften erscheinen aber dabey immer mehr oder weniger verändert. Der eisenoxydulreiche Edelstein ist schwarz und undurchsichtig, der manganoxydulreiche Mangangranat ist hyacinthroth und durchscheinend, der eisenoxydreiche gemeine Granat ist braun, und sein specifisches Gewicht liegt über 4,0; der kalkreiche, eisenarme Großular ist hellgrün und leichter, sein specifisches Gewicht

geht nicht über 3,6. So verhält es sich in der Regel bey allen Mineralkörpern, bey welchen vicariirende, isomorphe Bestandtheile vorkommen.

Der merkwürdigen Thatfache, daß Bestandtheile vicariirend auftreten, welche zuerst Fuchs beobachtet, und die nach Mitscherlich's folgenreicher Entdeckung eine so hohe Wichtigkeit erhalten hat, steht eine andere, von letzterem Chemiker gemachte Entdeckung ganz entgegen, wornach eine einfache oder zusammengesetzte Substanz Crystalle bilden kann, welche zwey verschiedenen Crystallsystemen angehören und durchaus nicht auf einander zurückgeführt werden können. So crystallisiert, nach Mitscherlich, der geschmolzene Schwefel bey'm Erkalten in Säulen, die dem zwey- und eingliedrigen Crystallsysteme angehören, wogegen der natürlich vorkommende, crystallisierte Schwefel in rhombischen Octaëdern crystallisiert, die zum ein- und einachsigen Systeme gehören; Schwefelkupfer, durch Zusammenschmelzen von Schwefel und Kupfer bereitet, crystallisiert in regulären Octaëdern; das in der Natur vorkommende, gleich zusammengesetzte Schwefelkupfer, der Kupferglanz, crystallisiert in Formen, die entschieden dem ein- und einachsigen Crystallisationsysteme angehören. Schmelzt man aber diese Crystalle, so gibt die Masse bey'm Erkalten ebenfalls reguläre Octaëder. Von künstlich erzeugten Verbindungen könnte man noch mehrere anführen, die ein gleiches Verhalten zeigen. Die Fähigkeit der Körper, in zwey verschiedenen, nicht auf einander zurückführbaren Formen zu crystallisieren, nennt man *Dimorphismus*, von *dis* doppelt und *morphizo* eine Gestalt haben.

Einen merkwürdigen Zusatz hat Mitscherlich's Entdeckung des Isomorphismus durch die entscheidenden Analysen von Berzelius erhalten, welche beweisen, daß es absolut gleichartig zusammengesetzte, hinsichtlich ihrer chemischen Constitution ganz identische Körper gibt, die völlig verschiedene chemische Eigenschaften und Crystallformen haben. Man nennt solche Körper *isomerische*, vom griechischen *isomeres* aus gleichen Theilen zusammengesetzt, und kann sie, im Gegensatz der isomorphen, auch *heteromorphe*, verschieden gestaltete nennen, von *heteros* verschieden und *morphao* Gestalt. Dahin ge-

hören die Weinsäure und Traubensäure, Pichigs Knallsäure und Wöhlers Ghansäure und mehrere andere. Bey diesen Körpern scheinen die kleinsten integrierenden Körpertheile eine verschiedene, gegenseitige Lage annehmen zu können, oder auch die Mischungsgewichte auf ungleiche Weise zusammen verbunden zu seyn.

Die chemische Untersuchung der Mineralien, Behufs ihrer Bestimmung, geschieht theils auf trockenem, theils auf nassem Wege. Bey der Untersuchung auf trockenem Wege, wendet man das Löthrohr an, das von den Metallarbeitern zum Löthen im Kleinen gebrauchte, etwas modificierte Instrument, wodurch man, vermittelt einer Dellampe, verschiedene Hitzegrade hervorbringt, denen man die Mineralien für sich oder in Verbindung mit andern Substanzen aussetzt. Die Erscheinungen, welche die Mineralien dabey zeigen, werden sehr schnell erhalten, sind höchst characteristisch, und in der Regel entscheidend. Löthrohrversuche können überdieß mit den kleinsten, kaum wägbaren Quantitäten angestellt werden, mit welchen jede andere chemische Untersuchung unmöglich ist, und sind deshalb bey allen analytischen Versuchen von Mineralien wohl unentbehrlich. Die Bestandtheile derselben lassen sich mit Hilfe des Löthrohrs ferner so leicht entdecken, daß dessen Anwendung allgemein empfohlen werden muß. Berzelius hat eine classische Anleitung zu Löthrohrversuchen geschrieben *), die der beste Führer bey solchen Arbeiten ist. F. v. Kobells Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockenem und nassem Wege **), können ebenfalls mit großem Nutzen gebraucht werden.

*) Die Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie, von Jacob Berzelius. Nürnberg, bey Schrag. 1828. 8°.

**) München 1833. 4°.

Zweiter Theil.

System.

Die Mineralien sind Theile des Erbelementes, welche durch die Einwirkung der andern Elemente Veränderungen erlitten, und sich dann wieder auf mannfaltige Weise verbunden haben. Sie zerfallen daher zunächst in 4 Classen.

Die Licht- oder Feuer-Mineralien sind sehr schwer, schmelzbar, undurchsichtig und glänzend: die Erze.

Die Luft-Mineralien verbrennen durch ihre eigene Hitze, und verwandeln sich in Luft oder Dunst, wie die Kohlen und der Schwefel: die Inflammabilien oder Brenze.

Die Wasser-Mineralien verbrennen nicht von selbst, lösen sich aber im Wasser auf: die Salze.

Die Erd-Mineralien verändern sich weder im Feuer, noch in der Luft, noch im Wasser, d. h. sie sind unschmelzbar, unverbrennlich und unauflöslich: die eigentlichen Erden.

I. Classe. Erden.

Erden, erdige Mineralien, sind diejenigen, welche weder durch das Wasser, noch durch die Luft verändert werden, auch in gewöhnlichem Glühfeuer nicht verbrennen. Unauflösbarkeit in Wasser und Strengflüssigkeit zeichnen sie aus.

Die Erden werden wieder durch die Mineralclassen verändert.

Die Kalkerde hat wegen ihrer ähnden Eigenschaft Aehnlichkeit mit den Metalkalchen;

die Talkerde wegen der Fettigkeit und Electricität mit den Brenzen;

die Thonerde wegen ihrer halben Auflösbarkeit im Wasser mit den Salzen;


die Kiesel Erde ist allein ganz unveränderlich, und daher die reine Erde.

I. Ordnung. Kiesel Erden.


1. Sippschaft des Quarzes.

1. Geschlecht. Quarz.

Die Grundform des Quarzes ist die nebenstehende, sechsseitige Doppelpyramide, Fig. 39, welche unter dem Namen des Hexagondodecaëders schon oben, S. 37. F. 3, dargestellt, und S. 51 genauer beschrieben worden ist. Sehr oft sind mit seinen Flächen diejenigen des ersten sechsseitigen Prismas g verbunden, so daß die Formen des Quarzes häufig



das Ansehen eines sechsseitigen, durch eine sechsflächige Pyramide zugespitzten Prismas haben, Fig. 40. Bald sind die Pyramiden-, bald die Prismenflächen vorherrschend, und darnach die Gestalten im Ganzen entweder mehr prismatisch oder mehr. pyramidal. Die Dodecaëderflächen sind glatt, die Prismasflächen gewöhnlich horizontal gestreift, parallel den Combinationskanten. Theilbarkeit nach den Pyramiden- und den Prismen-



flächen gewöhnlich sehr unvollkommen und unterbrochen. $\Phi. =$

7,0. Spec. Gew. 2,5 . . . 2,7. Die meisten Abänderungen haben ein spec. Gew. von 2,65. Bey unreinen Stücken ist es bald größer, bald kleiner.

Glasglanz, zuweilen in den Fettglanz geneigt. Durchsichtig . . . durchscheinend; durch fremde Beimengungen zuweilen undurchsichtig. Die Farbe ist vorherrschend weiß, und manche Stücke sind ganz wasserhell; es kommen aber auch Färbungen fast in allen Hauptfarben vor. Weiße und wasserhelle Stücke irrisieren oftmals. Der Bruch ist muschlig; bey unreinen Abänderungen splitterig. Im Dunkeln an einander geriebene Stücke leuchten. Besitzt doppelte Strahlenbrechung, die man am leichtesten durch zwey gegen einander geneigte Flächen erkennt.

Besitzt aus Kieselersde, welche der Chemiker auch Kieselsäure heißt, weil sie mit Laugen zusammenschmilzt, und sie dabey völlig sättiget. Sie ist aus dem Grundstoff Kiesel, S. 117, und aus Sauerstoff zusammengesetzt, und öfters mit Thon, Kalk, Eisenoxyd, Manganoxyd, organischer Substanz, verunreiniget. Für sich vor dem Löthrohr unschmelzbar; schmilzt aber mit Soda zu einem harten Glas.

Quarz kommt außerordentlich häufig in Crystallen vor, in crySTALLINISCHEN und derben Massen, in Aftercrystallen, eingesprengt, in Körnern und als Sand. Er ist über den ganzen Erdball verbreitet, von dem ein beträchtlicher Theil aus Quarz besteht. Die wichtigsten seiner zahlreichen Arten sind folgende:

1. Bergcrystall. Darunter begreift man die vollkommensten Quarzcrystalle, welche die höchsten Grade der Durchsichtigkeit besitzen. Sie haben gewöhnlich den prismatischen Typus, und erreichen bisweilen eine bedeutende Größe. Man hat deren wiederholt von der Schwere einiger Centner gefunden. In gerollten, abgerundeten Stücken mit rauher Oberfläche findet man den Bergcrystall in vielen Flüssen. Solche im Rhein vorkommende Stücke sind unter dem Namen der Rheinkiesel bekannt. Gelbgefärbte Stücke heißen Citrin, braune Rauchtopas, schwarze Morion.

Gewöhnlich sind die Crystalle gruppiert und zu Drusen verbunden. Sie schließen bisweilen haarfeine Crystalle von Epidot, Aesest, Hornblende, Rutil, Brauneisenstein, Eisenglanz (Haar-

steine) ein, oder feine Schuppen von Glimmer, Chlorit, selten Tropfen einer wässerigen, zum Theil sehr ausdehnbaren Flüssigkeit, oder einer öligen Substanz. Gar oft sind sie von Chlorit oder Glimmer überzogen.

Man findet den Bergcrystall vorzüglich im Grundgebirge, im Granit, Gneis und Glimmerschiefer, worinn häufig Quarzadern liegen, welche leere Räume einschließen, in denen die Quarzmasse freyer und reiner auscrystallisieren konnte. Solche bisweilen mit Bergcrystallen ausgeschmückte Höhlungen nennt man Crystallgewölbe, Crystallkeller. Sie liegen mehrentheils in sehr bedeutenden, oft fast unzugänglichen Höhen, und werden nur selten durch Verwitterung des Gesteins geöffnet, wie es 1784 bey dem Crystallkeller an den Courtes in der Montblanc-Kette der Fall war. Gewöhnlich werden sie durch die Crystallsucher entdeckt und geöffnet, welche, die Quarzadern verfolgend, Hammerschläge auf sie führen, und wo diese hohl tönen, einbrechen. Auf diese Weise wurden im verfloßnen Jahrhundert in den Alpen an mehreren Punkten am Gotthardt, auf der Grimsel, am Zinkenstok, im Hintergrunde des Lauteraargletschers Crystallkeller gefunden. Eines dieser Gewölbe war, nach Christoph Bernoulli's Erzählung ^{*)}, über 100 Fuß tief, und lieferte für 30,000 Gulden Crystalle, worunter mehrere von einigen Centnern waren. Oberhalb Naters in Oberwallis wurden, nach Ebel ^{**)}, zwischen 1770 und 1790 an einem Punkte 5,000 Pfund Crystalle gewonnen, unter denen sich einzelne Stücke von 7 — 14 Centner befanden. Auch in Salzburg, Steyermark, bey Disans im Dauphiné, auf Madagaskar, Grönland u.s.w., hat man Bergcrystalle unter ähnlichen Verhältnissen gefunden. Im Kalkstein kommt er selten und nur klein vor; so im Kalkstein am Säntis und hintern Dehrls in Appenzell, im Marmor von Carrara. In sehr zierlichen, kleinen Crystallen findet man ihn in Mergeln zu Bristol in England, bey Grenoble in Frankreich und Marmarosch in

^{*)} Geognostische Uebersicht der Schweiz. Basel 1811.

^{**)} Anleitung die Schweiz zu bereisen, zweyter Theil, dritte Auflage. Zürich 1809. S. 203.

Ungarn. Die Crystalle des letzteren Fundorts sind unter dem Namen der marmaroscher Demante bekannt.

Der Bergcrystall wird vorzüglich zu Schmuck verarbeitet, und mitunter zur Nachahmung des Diamantenschmucks verwendet; auch verarbeitet man ihn zu Ring- und Nadelsteinen, fertigt aus ihm Petschaften, Leuchter u. dergl. mehr. Unganze, rissige Stücke benutzt man zur Darstellung sehr reiner Glasflüsse, zu sogenanntem Straß, der durch Metallfarben den Edelsteinen ähnlich gemacht, und als Stellvertreter derselben gebraucht wird.

2. Amethyst. Stängelige, in Crystallenden auslaufende Individuen, welche gewöhnlich nur die Dodecaëderflächen zeigen, selten die Prismenflächen, und diese immer sehr untergeordnet; mit ihren Seiten verwachsen und zu Drusen vereinigt. Die Farbe ist oft ausgezeichnet viothlan, auch perlgrau, nellenbraun, graulich und grünlichweiß, und mitunter erscheinen fortificationsartige, die Stängel quer durchsetzende Farbenzeichnungen.

Der Name kommt vom griechischen Amethystos, nicht trunken. Die Alten hielten diesen Stein nämlich für ein Mittel gegen die Trunkenheit, und trugen ihn dagegen als Amulet.

Findet sich auf Gängen im Grundgebirge, in Achatkugeln der Mandelsteine und in Flüssen als Gerölle. Die schönsten, der Farbe nach, kommen aus Sibirien, Persien, Indien, Ceylon. Häufig kommt er in den Achatkugeln von Oberstein in Rheinpreußen vor; die Stücke aus den Achatkugeln von Cairngorram in Schottland lassen sich besonders gut verarbeiten. Zu Porfura in Siebenbürgen finden sich besonders tief gefärbte, und auf der irländischen Insel Man besonders große Amethyste.

Man verwendet den Amethyst vorzüglich zu Ring- und Nadelsteinen, und zu Petschaften.

3. Gemeiner Quarz. Stücke von unreineren Farben, geringeren Graden der Durchsichtigkeit und einem zum Fettglanz hinneigenden, zuweilen in diesen übergehenden Glasglanz. Der Bruch ist unvollkommen muschelig und oft splitterig. Die Crystalle sind gewöhnlich Hexagondodecaëder; die Prismenflächen kommen selten, und beynahe immer nur untergeordnet vor. Auch in Aftercrystallen nach Flußspath, Kalkspath, Gyps, Schwerspath,

durch Ausfällung gebildet; ferner stalactitisch, zellig, mit Eindrücken, zerhackt, verb, in Körnern und als Sand.

Der gemeine Quarz ist ganz außerordentlich verbreitet; ein Gemengtheil der meisten Gesteine des Grundgebirges, des Granits, des Gneises, des Glimmerschiefers, der Porphyre, er tritt als selbstständiges Gestein auf, bildet den Hauptbestandtheil aller Sandsteine, und erfüllt in unermesslichen Ablagerungen, als Geschiebe und Sand, Niederungen und den Grund vieler Thäler.

Man unterscheidet nach Glanz und Farbe gewöhnlich folgende Abänderungen:

a) Fettquarz. Durch Fettglanz ausgezeichnet. Zuweilen mit schöner rosenrother Farbe und durchscheinend, Rosenquarz (Zwiesel in Bayern), und bisweilen milchweiß, Milchquarz (Grönland).

b) Avanturin, brauner, rother oder gelber Quarz, von zahllosen kleinen Rissen und Sprüngen durchzogen, oder mit kleinen Glimmerschuppen erfüllt, die einen eigenthümlichen Schimmer bewirken. Kommt von Madrid und vom Ural.

c) Prasem. Mit lauchgrüner Hornblende durchwebter Quarz. Breitenbrunn im Erzgebirge. Wird zu verschiedenen Bijouteriewaaren verarbeitet.

d) Siderit, Saphirquarz; indig- und berlinerblau. Soling in Salzburg, Grönland, Norwegen.

e) Katzenauge; mit Amianth durchwebter Quarz, von vorherrschender gelblich- und grünlichgrauer Farbe und zartfasrigem Gefüge; auch matt roth, gelb und braun gefärbt. Durchscheinend, verb. Zeigt, wenn es halbkugelig geschliffen ist, einen eigenthümlichen Lichtschein, welcher an denjenigen erinnert, den das Auge der Katze unter gewissen Umständen wahrnehmen läßt. Die schönsten kommen aus Ceylon und Hindostan; rothe und braune von der Küste Malabar, minder schöne Stücke von Treseburg am Harz, und von Hof am Fichtelgebirge. Wird zu Schmuckstein verwendet.

f) Stinkquarz. Verb und crystallisirt. Gibt beym Zerbrechen einen brenzligen oder hepatischen Geruch aus. Gewöhnlich grau oder bräunlich. Die Crystalle sind bisweilen hohl und mit Thon oder Mergel ausgefüllt. Auf Lagern im Gneis zu

Chanteloud und Nantes in Frankreich; in einzelnen derben Massen im Gneise des Schwarzwaldes; in Crystallen, in Mergel eingewachsen, am Harzberge bey Hirschheim.

g) Faferquarz. Derber Quarz von feinstängelliger und faferiger Structur. Wettin bey Halle, Auvengur.

4. Chalcedon. Derb und crystallisirt in Rhomboëdern; d. i. in den Halbsädhnern des Hexagondodecaëders, auch in Afterscrystallen durch Ueberzug gebildet; ferner kugelig, traubig, nierenförmig, getropft in den mannigfaltigsten Gestalten, als Versteinerungsmittel; in Platten und stumpfedigen Stücken. Bruch flachmuschelig und splittetig; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Wenig glänzend, schimmernd; von verschiedenen Farben und Farbenzeichnungen. Die grauen, weißen, gelben und braunen Stücke heißen gemeiner Chalcedon. Sie sind theils einfarbig; theils gestreift mit mehreren Farben, theils gewolkt, und haben oft knob- oder baumsförmige Zeichnungen. Stücke, an welchen weiße und lichtgelbe Farbenstreifen mit dunkleren wechseln, tragen den Namen Onyx, was Fingerringel heißt; wechseln weiße Streifen mit grauen, so heißt der Stein Chalcedonyx; Stücke, mit knob- oder baumsförmigen Zeichnungen, nennt man Mocha-Stein. Der milchweiße, beynahe undurchsichtige, wird von den Künstlern Saphir genannt, und Stücke, welche Wassertropfen einschließen, heißen Hydrachalcedone oder Enhydrit.

Was findet den gemeinen Chalcedon vorzüglich in den Höhlungen der Mandelsteine des basaltischen Gebirges, so auf Island und den Färöern, bey Vicenza; sodann in den Mandelsteinen und Porphyren, welche in der unter dem Namen des Todtliegenden bekannten Gehirgsbildung vorkommen, wie bey Oberstein in Rheinpreußen, in der Gegend von Baden und Oppenheim am Schwarzwald, bey Chemnitz in Sachsen; ferner auf Bley-, Silber- und Eisengängen, wie in Ungarn, Siebenbürgen, Böhmen.

Der Farbe nach werden noch folgende Abänderungen unterschieden:

a) Plasma; lauch- und grasgrün gefärbter Chalcedon von flachmuscheligen Brüche. Diese schöne Abänderung hat sich bis

jezt nur verarbeitet zu Cameen und Intaglios in den Ruten Roms gefunden. Sein Fundort ist noch unbekannt. Diesem antiken Plasma sehr ähnlich ist der lauchgrüne Chalcedon, welcher in den Achtekugeln zu Oppenau am Schwarzwalde vorkommt.

b) Heliotrop; lauchgrün mit rothen Punkten. Kommt aus der Bucharei und aus Sibirien.

c) Carneol; blutroth, röthlichbraun und röthlichgelb; muscheliger, wachsglänzender Bruch. Ist durch eine organische Substanz gefärbt, die im Feuer zerstört wird. Der Stein verliert daher durch Glühens seine Farbe, und erscheint nachher grau, von fein vertheilter Kohle, die in seinem Innern liegt. Die schönsten Carneole kommen in stumpfkeiligen Stücken aus dem Orient. Auch in Sibirien, in den Mandelsteinen des Jassathals, in den Porphyren bey Oppenau am Schwarzwalde, in Böhmen, Sachsen, Ungarn, wird er gefunden.

5. Chrysopras; durch Nickeleyde apfelgrün gefärbter, durchscheinender, dichter Quarz, von splittertigem Bruch. Findet sich im Serpentingebirge zu Kosernitz, Grochau, Wäsendorf, in Schlesien. Wird häufig verarbeitet.

6. Feuerstein. Dichter Quarz von gelb- und flammfärblichem Bruch, durchscheinend, von grauer und gelben Farben, meist einfarbig; selten gewulst oder gestreift. Gibt sehr scharfkantige Bruchstücke. Gewöhnlich in kugelförmigen, knolligen Stücken, auch in Aftercrystallen nach Kalkspath gebildet, als Versteinigungsmittel; sodann in Platten und kleinen Lagern. Die knolligen Stücke sind in der Regel mit einer wässern, erdigen Rinde überzogen. Findet sich vorzüglich in der Kreide Englands, Frankreichs, Dänemarks, der Insel Rügen, Ostpreussens, Lithauens und des südlichen Rußlands. Ueberdies sind vieler Gattungen.

Dieser Quarzart wird ganz allgemein zu Feuersteinen verwendet; wovon sie den Namen hat, und wozu sie sich wegen der Scharfkantigkeit und flachen, scheibenförmigen Gestalt der Bruchstücke vorzüglich eignet. Der gelblichgrüne Feuerstein liefert gewöhnlich die gleichartigsten und dünnsten Scheiben, und wird deshalb, weil er sich leichter spalten und verarbeiten läßt als der dunkelgefärbte, diesem vorgezogen. Wir erhalten die meiste

ten Feuersteine aus Frankreich. Nach einer im Volk ziemlich verbreiteten Meynung würden die einzelnen Feuersteine aus der frischgegrabenen und dann noch welchen Masse geschnitten. Dies ist indessen ganz irrig. Die Verarbeitung der größeren, knolligen Stücke zu den kleinen Steinen für Flinten u.s.w. geschieht vermittelst eiserner Hämmer. Sie erfordert eine große Fertigkeit. Ein geschickter Arbeiter kann in einem Tage 200—400 Flintensteine anfertigen.

7. Hornstein. Dichter Quarz, gewöhnlich nur an den Kanten durchscheinend und im Bruche splitterig. Meist durch Eisen grün, roth oder braun gefärbt, und im Allgemeinen von unreinen, mit Grau gemischten Farben. Meist verb; auch in Afterscrystallen nach Kalkspath gebildet, in kugelligen und knolligen Stücken und als Versteinierungsmittel von Holz (Holzstein, Lithorylon). Durch Hornstein versteinerte Hölzer lassen, in dünne Platten geschnitten, noch recht schön die organische Structur wahrnehmen; der Bruch ist bey solchen Stücken öfters sehr schön muschelig.

Der Hornstein kommt auf Gängen im Erzgebirge, namentlich zu Schneeberg, vor; sodann in Knauern in verschiedenen Kalkformationen, insbesondere im Muschelkalk und im Corallenkalk des Jura. Dadurch versteinerte Hölzer findet man am Riffhäuser in Thüringen, bey Gernobach im Murgthal (Schwarzwald), in den rothen Conglomeraten des Todtliegenden; im Schuttländ bey Eberbach, Löwenstein in Württemberg; in Moorgründen bey St. Peter auf dem Schwarzwalde. Auch kommt Holzstein zu Schemnitz und an andern Orten in Ungarn, zu Irkutsk und Ekaterinenburg in Sibirien vor.

Man verarbeitet ihn zu Griffen an Waffen, zu Dosen u. dergl.

8. Eisentiesel. Ein durch Beymengung von reinem oder wasserhaltigem Eisenoxyd, roth; gelb oder braun gefärbter Quarz, undurchsichtig und durch den Metallgehalt schwerer. Bildet theils deutliche Crystalle, theils crystallischförmige, theils dichte Massen. Ein öfterer Begleiter von Eisenerzen auf verschiedenen Lagerstätten. Ausgezeichnete und sehr schön rothgefärbte Crystalle finden sich in den Mergeln am Fuße der Pyrenäen, in

jezt nur verarbeitet zu Cameen und Intaglios in den Kabinetten Roms gefunden. Sein Fundort ist noch unbekannt. Diesem antiken Plasma sehr ähnlich ist der lauchgrüne Chalcedon, welcher in den Achtekugeln zu Oppenau am Schwarzwalde vorkommt.

b) Heliotrop; lauchgrün mit rothen Puncten. Kommt aus der Bucharei und aus Sibirien.

c) Carneol; blutroth, röthlichbraun und röthlichgelb; muscheliger, wachsglänzender Bruch. Ist durch eine organische Substanz gefärbt, die im Feuer zerstört wird. Der Stein verliert daher durch Glähen seine Farbe, und erscheint nachher grau, von fein vertheilter Kohle, die in seinem Innern liegt. Die schönsten Carneole kommen in stumpfeckigen Stücken aus dem Orient. Auch in Sibirien, in den Mandelsteinen des Fassathals, in den Porphyren bey Oppenau am Schwarzwalde, in Böhmen, Sachsen, Ungarn, wird er gefunden.

5. Chrysopras; durch Nickeloryd apfelgrün gefärbter; durchscheinender derber Quarz, von splittigerem Bruch. Findet sich im Serpentingebirge zu Rosemitz, Grochau, Gläsenberg, in Schlesien. Wird häufig verarbeitet.

6. Feuerstein. Dichter Quarz von groß und flachmuscheligem Bruch, durchscheinend, von grauen und gelben Farben, meist einfarbig; selten gewulst oder gestreift. Gibt sehr scharfkantige Bruchstücke. Gewöhnlich in kugelförmigen, knolligen Stücken, auch in Aftercrystallen nach Kalkspath gebildet, als Versteinungsmittel; sodann in Platten und kleinen Lagern. Die knolligen Stücke sind in der Regel mit einer weißen, erdigen Rinde überzogen. Findet sich vorzüglich in der Kreide Englands, Frankreichs, Dänemarks, der Insel Rügen, Färlands, Lithauens und des südlichen Rußlands. Ueberdies in vielen Kalkbildungen.

Diese Quarzart wird ganz allgemein zu Feuersteinen verwendet, wovon sie den Namen hat; und wozu sie sich wegen der Scharfkantigkeit und flachen, scheibenförmigen Gestalt der Bruchstücke vorzüglich eignet. Der gelblichgrüne Feuerstein liefert gewöhnlich die gleichartigsten und dünnsten Scheiben, und wird deshalb, weil er sich leichter spalten und verarbeiten läßt als der dunkelgefärbte, diesem vorgezogen. Wir erhalten die mehr-

ten Feuersteine aus Frankreich. Nach einer im Volk ziemlich verbreiteten Meynung würden die einzelnen Feuersteine aus der frischgegrabenen und dann noch welchen Masse geschnitten. Dies ist indessen ganz irrig. Die Verarbeitung der größeren, knottigen Stücke zu den kleinen Steinen für Flinten u.s.w. geschieht vermittelst eiserner Hämmer. Sie erfordert eine große Fertigkeit. Ein geschickter Arbeiter kann in einem Tage 200—400 Flintensteine anfertigen.

7. Hornstein. Dichter Quarz, gewöhnlich nur an den Ranten durchscheinend und im Bruche splitterig. Meist durch Eisen grün, roth oder braun gefärbt, und im Allgemeinen von unreinen, mit Grau gemischten Farben. Meist verb; auch in Aftersynstallen nach Kalkspath gebildet, in kugeligen und knolligen Stücken und als Versteinierungsmittel von Holz (Holzstein, Lithoxylon). Durch Hornstein versteinerte Hölzer lassen, in dünne Platten geschnitten, noch recht schön die organische Structur wahrnehmen; der Bruch ist bey solchen Stücken öfters sehr schön muschelig.

Der Hornstein kommt auf Gängen im Erzgebirge, namentlich zu Schneeberg, vdt, sodann in Anuern in verschiedenen Kalkformationen, insbesondere im Muschelkalk und im Corallenkalk des Jura. Dadurch versteinerte Hölzer findet man am Riffhäuser in Thüringen, bey Gernsbach im Murgthal (Schwarzwald), in den rothen Conglomeraten des Todtkliegenden; im Schuttländ bey Eberbach, Löwenstein in Württemberg; in Moorgründen bey St. Peter auf dem Schwarzwalde. Auch kommt Holzstein zu Schemnitz und an andern Orten in Ungarn, zu Jezuz und Ekatherinenburg in Sibirien vor.

Man verarbeitet ihn zu Griffen an Waffen, zu Dosen u. dergl.

8. Eisenkiesel. Ein durch Bymengung von reinem oder wasserhaltigem Eisenoxyd, roth, gelb oder bräun gefärbter Quarz, undurchsichtig und durch den Mergelgehalt schwerer. Besteht theils deutliche Crystalle, theils crystallischförmig; theils dichte Massen. Ein öfterer Begleiter von Eisenerzen auf verschiedenen Lagerstätten. Ausgezeichnete und sehr schön rothgefärbte Crystalle finden sich in den Mergeln am Fuße der Pyreniden, in

den Hügeln von Chaluff im Dep. des Landes, bey St. Jago di Compostella, und sind unter dem Namen der Hyazinthe von Compostella bekannt. Schön crystallisirte Stücke finden sich auch zu Isferlohn.

9. Jaspis. Dichte, mit Thon und Eisenoryd, oder Eisenerost gemengte Quarzmasse. Undurchsichtig. Bruch muschelig. Von vorherrschenden rothen und braunen Farben.

Die ausgezeichnetste Abänderung ist die in kugeligen, ellipsoidischen und walzenförmigen Stücken vorkommende, welche den Namen Kugeljaspis trägt, und wenn sie braun gefärbt ist, auch ägyptischer Jaspis heißt. Die Kugeln besitzen gewöhnlich eine sehr dünne, schmutzig grüne Rinde, und zeigen im Innern ausgezeichnete Farbenringe, welche mit der Oberfläche der Stücke parallel laufen, was beweiset, daß sie nicht durch Rollung abgerundet, sondern ursprünglich kugelförmig gebildet worden sind. Dann und wann haben sie Höhlungen, worinn Kalkspathcrystalle sitzen, und mitunter sieht man kleine Versteinerungen darinn.

Der Hauptfundort des Kugeljaspis sind die Bohnerzgruben bey Biel unsern Schliengen, und bey Muggen unsern Müttheim im badischen Oberlande.

Der Bandjaspis kommt in verben Massen vor, die eine schöne, verschiedenfarbige Streifung zeigen. Man findet ihn vorzüglich schön in Sibirien.

Der gemeine Jaspis bricht auf Gängen mit Eisenerzen ein, und hat gewöhnlich eine gleichförmige, rothe, gelbe oder braune Farbe, und kommt in verben Stücken vor. Sachsen, Böhmen u.s.w.

Kieselschiefer; dichter mit Thonerde, Kalkerde, Eisenoryd, Eisenorydul und Kohle gemengter Quarz, im Großen unvollkommen schieferig, im Bruch muschelig, und theils von unreinen, grauen, rothen und grünen Farben (gemeiner Kieselschiefer), theils dunkel graulichschwarz, durch Kohle gefärbt, im Bruch splittiger oder eben (lydischer Stein). Er bildet Lager im Thonschiefer- und Grauwackengebirge, Schwarzwald, Harz, Sachsen, Schlessen u.s.w., und findet sich auch häufig im Schuttlande, wie z. B. unter den Geröllen des Rheins. Man

wendet ihn zum Straßenbau, zu Reibsteinen, und den schwarzen als Probierstein an.

Rieselfinter, Rieselstuf. Eine aus Wassern abgefehte Quarzmasse, welche in rindenförmigen Stücken, tropfsteinartig und öfters auch als Ueberzug von Pflanzentheilen vorkommt. Theils dicht und im Bruche muschelig, glasglänzend, an den Kanten durchscheinend; theils faserig, erdig, porös, undurchsichtig und matt. Im Allgemeinen von lichter graulich-, gelblich- und röthlichweißer Farbe. Eine beträchtliche Menge von Rieselfinter setzt sich aus dem heißen Wasser des Geysers auf Island ab. Auch in Kamtschatka, in Grönland, auf Teneriffa, bey Santa Fiora in Italien (Fiorit) sind Vorkommnisse von Rieselfinter bekannt.

Achat heißen Gemenge mehrerer Quarzabänderungen, namentlich Gemenge von Chalcedon, Jaspis oder Hornstein und Amethyst. Nach den verschiedenen Zeichnungen und Farbenschattierungen, welche die Gemengtheile durch ihre verschiedenartige Verbindungsweise hervorbringen, unterscheidet man: Band-, Röhren-, Punct-, Wolken-, Moos-, Landschafts-, Bestungs-, Trümmer-Achat u.f.w.

Solche Quarzgemenge kommen gewöhnlich in Kugeln und Nieren vor, die eine thonige Rinde haben und im Thonporphyr- oder Mandelsteingebirge liegen. Sie werden allgemein Achatkugeln genannt, zeigen häufig eine schichtenweise Aufeinanderfolge der Gemengtheile und sind nicht selten hohl. In diesem Falle ist ihr Inneres immer mit Quarzcrystallen ausgeschmückt. Oberstein in Rheinpreußen, Oppenau im Schwarzwalde, Baden unfern Rastadt sind reiche Achatfundorte. Er findet sich überdies in Schlessen, Böhmen, Ungarn, Sibirien; in Sachsen kommt er bey Runersdorf und Schlottmiz auf Gängen im Gneis vor.

Der Achat wird von allen Quarzvorkommnissen am meisten verarbeitet, und zwar vorzüglich zu kleinen Mörsern und Reibschalen, worinn man harte Substanzen pulvert, zu Dosen, Petschaften, Siegelsteinen und zu verschiedenen Bijouteriewaaren.

2. Geschlecht. Opal

Syn. Untheilbarer Quarz.

Wasserhaltiger, untheilbarer Quarz, ohne Crystallisationsfähigkeit; glasartig, spröde, etwas weicher als der wasserfreie Quarz, $H. = 5,5 \dots 6,5$; spec. Gew. $= 2,0 \dots 2,2$; nur durch Verunreinigung, Vermengung von schwerem Metallyd auf $2,3 \dots 2,5$ sich erhebend. Bruch muschelig; Glasglanz, öfters fettartig; Durchsichtigkeit in allen Graden; beynahe von allen Farben, öfters milchweiß, selten farblos. Manche Abänderungen zeigen im Innern ein lebhaftes Farbenspiel. Bildet knollige, traubige, getropfte Gestalten, und erscheint auch als Versteinerungsmittel von Holz. Gibt beim Glühen Wasser aus, und wird dabey matt und trübe. Man unterscheidet folgende Arten:

1. **Edler Opal**; milchweiß bis weingelb; halbdurchsichtig, mit lebhaftem Farbenspiel in glänzenden, rothen, blauen, gelben und grünen Farben. Verb, eingesprengt, in Schnüren oder Trümmern, und in Nestern im Trachyt und Thonporphyr, zumal in Ungarn, namentlich zu Ezerwenhza, auf den Färbern und in Mexico. Weniger schön bey Hubertsburg und Leisnig in Sachsen.

2. **Feueropal**; durch hyacinthrothe oder honiggelbe Farbe ausgezeichnet, ohne Farbenspiel. Findet sich im Trachyt zu Zimapan in Mexico und auf Eide, einer der Färber.

3. **Glasopal, Hyalith**; wasserhell, oder licht graulich-, gelblich- und röthlichweiß; glasglänzend; durchsichtig; traubige, tropfsteinartige Gestalten. Kommt im augitischen Mandelstein zu Thuringen am Kaiserstuhl (Breisgau), bey Frankfurt am Main, im Klingstein bey Walsch in Böhmen, im Trachyt zu Schemnitz in Ungarn, in Mexico vor u.f.w.

4. **Gemeiner Opal**; von lichten weißen, grauen, gelben und grünen Farben, selten roth; durchscheinend; fettartiger Glasglanz; verb, eingesprengt und tropfsteinartig. Im Trachyt, Serpentin und Basalt Ungarns, Sachsens, Schlesiens, der Rheingegenden u.f.w., insbesondere zu Tokai, Tefebanya und bey Eperies in Ungarn.

Der *Hydrophan*, auch *Weltange* genannt, ist gemeiner *Opal*, der begierig Wasser einsaugt, und dabey vorübergehend durchsichtig wird. Hauptfundort *Hubertsburg* in *Sachsen*.

5. *Halbopal*; begreift die weniger rein gefärbten Stücke von geringeren Graden der Durchsichtigkeit; graue, gelbe, braune, rothe und grüne Färbungen; oft gefleckt, gewölkt, gestreift; meist nur an den Ranten durchscheinend; fettartiger Glasglanz. Derb eingesprengt, tropffleinartig und in Holzgestalt (*Holzopal*). Die dadurch versteinerten Hölzer gehören zu den *Nadelhölzern*. Nach der Farbe heißt man gewisse Abänderungen auch *Wachsopal*, *Pechopal*. Findet sich vorzüglich im *Trachyt* und dessen *Conglomeraten* in *Ungarn* bey *Tokai*, *Schemnitz*, *Kremnitz*, *Eperies*, in den vulcanischen *Conglomeraten* bey *Hohentwiel* im *Heegau*, am *Wartenberge* unfern *Donaueschingen* und im *Dolrite* zu *Steinheim* bey *Hanau*. Der *Holzopal* wird vorzüglich bey *Oberkassel* und am *Querkstein* im *Siebengebirge*, bey *Mhrweiler* an der *Mhr* und bey *Telkebanya* in *Ungarn* gefunden.

6. *Menilit*, heißt der braune, beynahe undurchsichtige, matte, in knolligen Stücken im *Klebschiefer* zu *Meni-le-Montant* bey *Paris* vorkommende *Opal*.

7. *Jaspopal*, *Eisenopal*, nennt man einen durch *Eisenoxyd* rothgefärbten, und daran reichen, undurchsichtigen *Opal*, dessen spec. Gew. sich bis auf 2,5 erhebt. Findet sich zu *Tokai* und *Telkebanya* in *Ungarn*, zu *Koljwan* in *Sibirien* und bey *Constantinopel*.

8. *Cacholong*; milch-, gelblich- und röthlichweiß, undurchsichtig, wenig glänzend oder matt. Derb, nierenförmig und in Schnüren. *Bucharey*, *Island*, *Färder*.

Der edle *Opal* steht in hohem Werth. Man schleift ihn gewöhnlich rundlich oder linsenförmig (*en cabochon*), wodurch sein Farbenspiel erhöht wird. Am meisten werden die rothspielenden *Opale* geschätzt. Man bezahlt für kleine Ringsteine, wenn sie rein sind und 4 Gran wägen, 8—10 Gulden; größere Steine werden sehr theuer verkauft, und mit 1,000 Gulden und darüber bezahlt. *Trachytstücke*, welche eingesprengte Punkte von edlem *Opal* enthalten, werden unter dem Namen *Opal mutter* verarbeitet. *Wasserhelle*, kugelige *Opalithe* werden hin und wie-

der in Ringe gefaßt; der gemeine so wie der Halbopal werden zu Knöpfen, Dosen u. dergl. verarbeitet; der Holzopal zu Dosen, namentlich in Wien; der Eisenopal vornämlich in der Türkei zu Griffen an Waffen; der Cacholong von den Kalmücken zu kleinen Gefäßen und Bildern. Mit Wachs getränkter Hydropphan wird beym Erwärmen durchsichtig, gelb, und heißt Pyrophphan.


2. Eigenschaft des Demantes.

Repräsentiert das dem Kiesel so nahe stehende, reinste Carbon.

3. Geschlecht. Demant.

Syn. Diamant.

Crystallisiert in Formen des regulären Crystallisationsystems, und zwar am gewöhnlichsten in ausgezeichnet schönen, regulären



Octaëdern, Fig. 41, und Hexakisoctaëdern, Fig. 42, läßt sich nach der Richtung der Flächen der ersteren vollkommen spalten, und ist der härteste ($H. = 10$) und glänzendste aller Körper. Sein Glanz ist eigenthümlich. Spec. Gew. = 3,4 . . . 3,6. Die Oberfläche feiner Crystalle, unter welchen auch Würfel (s. Fig. 1. S. 36.), Rautendodecaëder (s. Fig. 9. S. 45.) und Tetraëder (Fig. 6. S. 39.) vorkommen, ist öfters rauh, beym Rautendodecaëder und Hexakisoctaëder häufig gekrümmt. Farblos und wasserhell, doch auch sehr oft gefärbt, grau, gelb, braun, schwarz, roth, grün, blau, im Allgemeinen licht. Vollkommen durchsichtig bis durchscheinend, letzteres bey dunkler Farbe. Besitzt ein außerordentliches Lichtbrechungs- und Farbenzerstreuungsvermögen, und zeigt deßhalb geschliffen ein ausgezeichnetes Farbenspiel. Spröbde; Bruch muschelig. Leitet die Electricität nicht; wird durch Bestrahlung stark phosphoreszierend.

Besteht aus reinem Kohlenstoff *); sehr schwer verbrennlich; im Brennpunct eines großen Brennspiegels, in der außerordentlichen Hitze der Flamme des Knallgases.

Man hat den Demant bisher noch nicht auf seiner ursprünglichen Lagerstätte, sondern nur lose in Crystallen und Körnern, oder eingewachsen in jugendliche Conglomerate, Breccien, überhaupt in Trümmergesteine gefunden. J. Franklin berichtet, daß man in der Gegend von Panna in Bundel Kund in Ostindien Diamanten in einem unserm buntem Sandstein und Keuper entsprechenden Sandsteingebilde findet. Theils in Conglomeraten und Breccien, theils im Schuttland der Flüsse kommt er in Ostindien zu Sumbhulpor, Visapur, Roalconda, Golconda, Hydrabad und an mehreren andern Orten vor. In Brasilien findet er sich im Gouvernement Minas Geraes ebenfalls in einem Trümmergestein, von den Einwohnern Cascachao genannt, gegenwärtig hauptsächlich zu Mandanga. Auch auf Malacca und Borneo hat man Demante gefunden, und in neuester Zeit selbst auf der Westseite des Urals und in Nordafrika.

Der Demant nimmt schon seit den ältesten Zeiten den ersten Platz unter den Edelsteinen ein. Er wird in Ostindien und Brasilien mit der größten Aufmerksamkeit aus dem Gebirgsschutt der Flüsse und aus Trümmergesteinen durch eine Wascharbeit gewonnen. Sehr schlecht gefärbte, rissige oder fleckige Steine werden in Splitter geschlagen, die man zu Griffeln verwendet, womit man in Glas graviert, Glas schneidet, harte Steine durchbohrt u.s.w.; oder in Pulver verwandelt, Demantbord, womit man den Demant selbst, oder andere sehr harte Edelsteine schleift. Die Kunst, ihn mittelst seines eigenen Pulvers zu schleifen, wurde erst 1456 erfunden. Die Gewichtseinheit, wonach man die Demante verkauft, ist das Karat **). Ein Karat roher Demante von beschriebener Art kostet 14 — 17 Gulden

*) Schon Newton hatte aus der Beobachtung der außerordentlich starken Strahlenbrechung des Demants den Schluß gezogen, daß er ein erhärteter, brennbarer Körper sey.

**) 24 Karat = 16 Loth = 1 Mark kölnisch; 1 Karat = $\frac{2}{3}$ Loth = 12 Grän.

reichtlich. Zum Schleifen geeignete rohe Demante werden mit 22 Gulden das Karat bezahlt. Der Preis schwererer Steine wird im Allgemeinen auf die Art bestimmt, daß man das Quadrat ihres Gewichtes mit der Summe multipliciert, die ein Karat kleiner roher Steine kostet. Es habe z. B. ein roher schleibar der Demant das Gewicht von 3 Karat, so kostet er, dem Gesagten zufolge, 9mal 22 Gulden, d. i. 198 Gulden.



Durch das Schleifen wird der Preis bedeutend erhöht. Geschliffene Demante haben theils eine tafelförmige Gestalt (Tafelsteine), theils eine pyramidale (Rosetten und Brillanten). Ihr Preis wird in der Regel bestimmt, indem man das Quadrat ihres Gewichtes, (d. i. die Zahl, die ihr Gewicht ausdrückt, mit sich selbst multipliciert, und die dabey erhaltene Summe) mit 90 multipliciert. Die dabey erhaltene Zahl zeigt den Werth in Gulden an. Die gewöhnliche Größe überschreitende Demante, ein Brillant von mehr als 5 Karat, wird schon mit mehr als 3,000 Gulden bezahlt, und weiterhin ist der Preis Sache des Liebhabers. Durch Schönheit der Form und vollkommene Klarheit ausgezeichnet ist der 136 Karat schwere Demant der französischen Krone, Regent genannt; der Demant der österreichischen Krone wiegt 139 Karat, der des Kaisers von Rußland 193 Karat, derjenige des mongolischen Kaisers 279 Karat — er ist auf fünf und eine halbe Million Gulden geschätzt — und der größte bekannte endlich ist der Demant des Raja von Matun auf Borneo, der mehr als 300 Karat hat. Alle diese großen Demante stammen aus Ostindien. Den größten brasilianischen Demant besitzt die Krone Portugall; er ist ein reiner octaëdrischer Crystall von 120 Karat.

3. Eigenschaft des Zircons.

Kiesel Erde mit Zirconerde und etwas Eisen.

4. Geschlecht. Zircon.

Die Crystalle gehören zum zwey- und einachsigen System, dessen einfachste Gestalt das quadratische Octaëder ist (Fig. 13. S. 48.). Sie sind gewöhnlich Combinationen von diesem mit



dem ersten und zweyten quadratischen Prisma, Fig. 43 und 44. Ihr Ansehen ist durch Vorherrschn der Prismenflächen meist säulenartig, selten pyramidenartig, wo alsdann die Flächen des ersten und zweyten quadratischen Prismas an den vorherrschenden Quadratoctaëdern, als Abstumpfungsflächen der Seitenkanten und Seitenecken auftreten. Theilbar nach den Flächen des ersten quadratischen Prismas, undeutlich nach den Octaëderflächen. Die Härte = 7,5; das spec. Gew. = 4,4 ... 4,6; spröde; Glasglanz, oft demantartig; durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend; farblos, jedoch selten, in der Regel grau, braun, gelb oder roth gefärbt, seltener grün. Bruch muschelig.

Zusammensetzung: Kieselsaure Zirconerde; 34,5 Kieselerde, 65,6 Zirconerde; als Einmischung 0,5 bis 2 Procent Eisenoryd, was färbt.

Für sich vor dem Löthrohr unschmelzbar.

Die intensiv rothen und pomeranzengelben Abänderungen heißen Hyacinth, die übrigen behalten den Namen Zircon. Man findet die verschiedenen Abänderungen dieses Geschlechts theils eingewachsen in Ephenit (von Stavårn bis Hakebalen, längs der Bucht von Christiania in Norwegen), in Gneis und Granit (Ismensee in Sibirien, New-Yersey in Nordamerica u.s.w.), in basaltische Gesteine (Erpailly in Frankreich, Jungfernberg im Siebengebirge, Vicenza), in körnigem Kalkstein in Mähren; theils lose in Crystallen und Körnern im Schuttlande, auf Ceylon, bey Madras, zu Dylapian in Siebenbürgen u. a. a. O. Manche brennen sich im Feuer völlig weiß, und sowohl solche, als die von Natur aus farblosen, wurden ehemals für Demante geringerer Qualität ausgegeben, und von den Steinschneidern Jargon

de Diamant, Jargon de Ceylon genannt. Die dunkelgefärbten, grünen und gelben sind noch als Edelstein geschätzt. Man bezahlt für Ringsteine von 4—5 Linien Größe 10, 20—40 Gulden. Die schönsten kommen immer noch aus Ceylon. Der Spacinch wird zu kleinen Ring- und Nadelsteinen, zum Einfassen, auch bey feinen Waagen und Uhren als Hülse angewendet.



II. Ordnung. Thonerden.

Durch Thonerde, Glycinerde oder Yttererde characterisirte Mineralien.

1. Gipschaft der Thonedelsteine.

1. Geschlecht. Korund.

Drey- und einachsiges Crystallsystem. Die Crystalle sind gewöhnlich Hexagonododecaëder (Fig. 3. S. 37.), oftmals mit einer horizontalen Endfläche, Fig. 45, oder Combinationen des Dodecaëders mit den Flächen des ersten sechsseitigen Prismas, g, mit der horizontalen Endfläche c und mit den Rhomboëderflächen r, Fig. 46. Theilbar nach den abwechselnden Dodecaëderflächen (Rhomboëder). Ist nach dem Demant der härteste Körper, $H. = 9,0$; spec. Gewicht $= 3,9 \dots 4,0$. Glasglanz; durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend, manchmal mit einem sechsstrahlig sternförmigen, inneren Lichtschein. Selten farblos, meist graubraun, roth und blau; Bruch muschelig. Ist erhärtete Thonerde, öfters



mit Kiesel-erde gemengt, durch Eisen gefärbt. Für sich vor dem Löthrohr schmelzbar.

Findet sich theils in Crystallen und Körnern, theils in deren Stücken, und wird nach Farbe, Durchsichtigkeit und Theilbarkeit in folgende Abänderungen unterschieden:

1. **Sapphir**; dazu rechnet man die schön blau, gelb und roth gefärbten Stücke, auch die farblosen, von den höchsten Graden der Durchsichtigkeit und einem starken Glasglanz. Die blauen heißen ausschließlich Sapphir, und wenn die Crystalle kleine sechsseitige Prismen sind, Salamstein. Die gelben Stücke nennt man auch orientalischen Topas, die violblauen orientalischen Amethyst, die rothen tragen den Namen Rubin.

Diese Abänderungen kommen vorzugsweise im Schuttlande, im Sande der Flüsse vor, zumal auf Ceylon, in Siam und China, auch in den basaltischen Gesteinen des Siebengebirgs (Nuegstein) und bey Cassel am Rhein.

2. **Korund und Demantspath**; dazu rechnet man die deutlich theilbaren, unrein gefärbten, wenig durchscheinenden Stücke, welche in eingewachsenen, oft rauhen Crystallen und dicken Massen in crystallinischen Gesteinen zu Campo Longo, auf Ceylon, in China, zu Baltimor, am Jlimensee u. a. a. D. vorkommen.

3. **Smirgel**; darunter begreift man verbe Stücke von febrniger Structur, die eine bläulichgraue oder schmutzig smaltblaue Farbe haben, und lose auf Naxos, unsern Smyrna, mit Magneteisen vermengt in Spanien, in Talkschiefer eingewachsen am Ochsenkopf bey Schwarzenberg in Sachsen gefunden werden.


Die rein und tief gefärbten, rothen Korunde, Rubine, sind hochgeschätzt, und werden wie Demant bezahlt. Die blauen, Sapphire, stehen in geringerem Werthe; man bezahlt für einen dunkeln Sapphir von 24 Grän 700—800 Gulden. Beide werden gewöhnlich brillantiert geschliffen. Kleine Rubine und die blauen Stücke mit sechsstrahligem Lichtschein (Sternsapphir) schleift man rundlich. Farblose und blaßblaue, durchsichtige Korunde werden von Pritchard in London zu Linsen kleiner Microscope verwendet; weniger reine Stücke benutzt man als Hülsen bey Cylinderröhren, man bohrt die Ziehlöcher bey Drahtzügen durch sie, gebraucht sie zum Schleifen und Schneiden harter Steine, und namentlich so den Smirgel; zum Schleifen und Polieren der Demante aber namentlich den unter 2 aufgeführten Demantspath.

2. Geschlecht. Smaragd.

Die Crystalle gehören ebenfalls zum drey- und einachsigen System, und sind in der Regel einfache, sechsseitige Prismen mit horizontaler Endfläche; solche Prismen mit den Flächen des zwey-



ten sechsseitigen Prismas, Fig. 47, oder eine Verbindung dieser Gestalt mit den Flächen des Hexagondodecaeders, Fig. 48, und jederzeit säulenartig, ja oftmals sehr lang gestreckt. Die Prismenflächen sind gewöhnlich gestreift. Theilbarkeit ziemlich vollkommen parallel der horizontalen Endfläche, und deshalb brechen lange Crystalle so leicht in dieser Richtung ab.



$\rho = 7,5 \dots 8,0$; spec. Gew. $= 2,6 \dots 2,8$; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; selten farblos, meist blau, grün und gelb gefärbt. Spröde. Besteht in 100 Theilen aus 70,6 Kiesel Erde, 16,7 Thonerde, 12,7 Glycinerde; beygemengt sind gewöhnlich Eisenoryd und Chromoryd, welche die Farbe geben. Für sich vor dem Löthrohre kaum schmelzbar.

Man unterscheidet die Abänderungen dieses Geschlechts auf folgende Weise:

1. Smaragd; begreift die intensiv grün gefärbten, smaragd- bis grasgrünen Abänderungen, mit niedriger, säulenförmiger Gestalt und glatten Flächen. Gewöhnlich in einzelnen Crystallen eingewachsen, in Glimmerschiefer, im Pinzgau in Tyrol, bey Kofseir am rothen Meer; auf Gängen im Thon- und Hornblendeschiefer im Tunkathal bey Neucarthago in Peru.

2. Beryll; umfaßt die Abänderungen von den übrigen Farben, die langgestreckten Crystalle mit gestreiften Seiten- und glatten Endflächen, die öfters gruppiert, durch einander gewachsen und bisweilen schmutzig gefärbt und beynahe undurchsichtig


find. Gemeiner Beryll. Die durchsichtigen, häufig blaß smalteblau gefärbten Crystalle heißen edler Beryll, Aquamarin.

Kommt vorzüglich im Granit auf Gängen und Nestern von Quarz vor, namentlich in Sibirien zu Nertschinsk, Miask, Murfinsk, von woher Berylle in alle Sammlungen der Welt gelangt sind; sodann lose im Schuttlande bey Rio Janeiro in Brasilien und in Aberdeenshire in Schottland. In Granit eingewachsen findet er sich zu Brodbo und Finbo in Schweden, zu Chanteloub bey Limoges, in der Gegend von Lyon, bey Zwißel in Bayern, in Connecticut und Massachusetts in Nordamerika und an mehreren andern Orten.


Die unter dem Namen Smaragd bekannte, dunkelgrüne Abänderung wurde von jeher als Edelstein hoch geschätzt. Die schönsten kommen immer noch aus Peru. Man bezahlt für einen reinen Stein von 4 Grän 40—55 Gulden, von 8 Grän 110 bis 115 Gulden, von 15 Grän 600—700 Gulden. Der lichtgrüne und blaue Beryll wird weniger geschätzt. Für einen reinen Stein von 1 Karat bezahlt man in der Regel 3—5 Gulden. Die unreinen, gemeinen Berylle werden zur Darstellung der Glycinerde und ihrer Verbindungen benützt.

3. Geschlecht. Topas.

Seine Crystalle gehören zum ein- und einachsigen System (s. S. 57.), und sind im Allgemeinen säulenartig. Eine gewöhnliche Combination ist die des Rhombenoctaëders o mit den Flä-



chen des verticalen rhombischen Prismas g, an welchen die Flächen $\frac{g}{2}$ als Zuschärfungen der scharfen Seitenkanten auftreten, Fig. 49, (brilliantische Topase). Eine andere ist, der vorige Crystall mit der horizontalen Endfläche c, den Flächen eines zweyten rhombischen Octaëders o², den Flächen des zweyten horizontalen Prismas f und den Flächen eines dritten Octa-



ders 0,3, Fig. 50. (Eine gewöhnliche Form der sächsischen Topase vom Schneckenstein.) Man erkennt die sächsischen Topase leicht an der bey ihnen immer vorkommenden, und oft sehr ausgebildeten, horizontalen Endfläche *c*, die brasilianischen an den stark entwickelten Flächen *o*, die sibirischen an den vorherrschenden Prismenflächen $\frac{g}{2}$ und den stark ausgebildeten Flächen des zweyten horizontalen Prismas *f*. Die Fläche *c* gewöhnlich rauh; die Flächen *g* vertical gestreift.

Theilbarkeit sehr vollkommen parallel der horizontalen Endfläche *c*; unvollkommen nach *f* und nach *g*. $H. = 8,0$; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6; farblos, grün, gelb und roth; durchsichtig, bis an den Ranten durchscheinend; Glasglanz; spröde; besteht aus kiesel-saurer und fluß-saurer Thonerde, und enthält in 100 Theilen 31,2 Kiesel-erde, 54,5 Thonerde, 11,3 Fluß-säure. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar; der gelbe brennt sich roth; Splitter überziehen sich in starker Hitze mit vielen kleinen Blasen.

Wird durch Reiben, Druck und Erwärmen electrisch.

Man unterscheidet die Abänderungen dieses Geschlechtes folgendermaßen:

1. Topas, edler Topas; begreift die crystallisierten Stücke, mit glattflächigen, theils aufgewachsenen, theils zu Drusen verbundenen Crystallen, von den reinsten Farben und den höchsten Graden der Durchsichtigkeit, auch derbe Stücke von solcher Beschaffenheit. Findet sich in großer Menge in honiggelben und röthlichen, losen Crystallen in Brasilien, im Fluße Ita-Inga, auch in Aberdeenshire in Schottland; sodann eingewachsen in einem quarzigen Gneis, dem sogenannten Topasfels, zu Schneckenstein im sächsischen Voigtlande und auch auf den Zinnerzlagerrstätten im Erzgebirge, ferner in Sibirien mit Beryll zu Murzinsk, Miasch und Odontschelon. Außer diesen Hauptfundorten sind noch manche andere unbedeutendere bekannt.


2. **Phyſalitſch und Pyrophyſalitſch;** dazu rechnet man verbe, ſtängelige Maſſen, und große, unförmliche Kryſtalle mit rauher Oberfläche, von geringem Glanz und geringer Durchſichtigkeit, gelblichweißer und ſtrohgelber Farbe. Findet ſich zu Brodbo und Finbo in Schweden im Granit eingewachſen.

3. **Pycnit, Stangenſtein;** ſtängelige, verbe Maſſen und bündelförmige Aggregate ſtängeliger Priſmen, von gelblich, röthlich- und grünlichweißer Farbe; durchſcheinend. Eingewachſen in einem granitiſchen Geſtein auf den Zinnerzlagerrſtätten von Altenberg und Schladenwalde im Erzgebirge.

Der Topas iſt ein beliebter Edelſtein. Am meiſten ſchätzt man die rothen, die dunkel honig- und weingelben und die pomeranzengelben. Für Steine letzterer Art zahlt man, wenn ſie 8—9 Linien meſſen, 110—150 Gulden; die rothen von gleicher Größe werden mit 180—190 Gulden bezahlt. Man ſucht dieſe häufig künstlich, durch Brennen der gelben braſſiliſchen zu bereiten. Die farbeloſen und die blauen ſind weniger geſchätzt; letztere heißen auch orientaliſche Aquamarine. Die unreinen Abänderungen werden zum Schleifen anderer Steine verwendet.

4. Geſchlecht. Chryſoberyll.

Seine Kryſtalle gehören zum ein- und einachſigen System. Die gewöhnliche Geſtalt iſt eine Combination der Octaëderflächen o mit den Flächen des verticalen Priſmas g, den Flächen a und b, welche die erſten und zweyten Seitenkanten des Priſmas g abſtumpfen, und den Flächen f, welche einem horizontalen Priſma





angehören, Fig. 51. Oefters auch haben die Kryſtalle die Geſtalt einer dicken Tafel, Fig. 52, gebildet durch die Flächen a, b und f. Oefters Zwillinge, Theilbarkeit unvollkommen nach b, noch unvollkommener nach a. $\rho = 3,5$; ſpec. Gew. = 3,7 bis 3,8; Glasglanz; grün,

spargel- und olivengrün, ins Grünlichweiße und Gelblichgrüne; durchsichtig bis halbdurchsichtig, oft mit bläulichem oder milchweißem, wogendem Lichtschein, der am schönsten bey rundlichem Schliff hervortritt. Darauf bezieht sich der Name *Cymophan*, der ihm auch beygelegt worden ist, vom griechischen *Cyma*, Woge und *phaino*, scheinen. Bruch muschelig; spröde. Besteht aus kiesel-saurer Thonerde und Beryllerde-Aluminat, in 100 Theilen aus 5,66 Kiesel-erde, 75,49 Thonerde und 18,85 Beryllerde, mit Beymischung von Titanorpd und Eisenorpd, das färbt. Färbt sich vor dem Löthrohre unschmelzbar; löst sich in Boraxglas vollkommen zu einem klaren Glase auf.

Der Chrysolith ist bisher vorzüglich in losen Crystallen, Körnern und Geschieben im Flußsande auf Ceylon, in Pegu und Brasilien gefunden worden; im Gneis eingewachsen bey Haddam in Connecticut und Saratoga in New-York. Reine, durchsichtige Chrysolithe von schöner Farbe, und zumal die mit einem bläulichen Lichtschein, werden sehr geschätzt. Schöne Steine von 5—8 Linien werden mit 2—300 Gulden bezahlt.

5. Geschlecht. Granat.


Reguläres Crystallsystem. Die gewöhnlichste einfache Form



ist das Rhombendodecaëder, Fig. 53; häufig erscheint auch das Icositetraëder (s. S. 45. Fig. 10.), Fig. 54.

Die gewöhnlichste Combination ist diejenige dieser beiden Gestalten, Fig. 55, bey welcher d die Dode-

caëder-, o die Icositetraëderflächen sind. Bey diesen Combinationen kommen alle Grade des gegenseitigen Vorherrschens beider Gestalten vor, so daß sie bald mehr den Typus des Dodecaëders, bald mehr jenen des Vierundzwanzigflächners haben. Theilbarkeit nach den Dodecaëderflächen, wenig vollkommen. $\rho = 6,5$



bis 7,5; spec. Gew. = 3,4 bis 4,2; Glas- bis Fettglanz; durchsichtig in allen Graden; immer gefärbt, vorherrschend roth, auch grün, gelb, braun, schwarz; spröde; Bruch muschelig bis uneben.

Zusammensetzung: kiesel-säure Thonerde allein oder gemengt mit kiesel-säurem Eisenoryd, in Verbindung mit den Silicaten von Kalk, Bittererde, Eisenorydul oder Manganorydul. Die meisten Granate schmelzen vor dem Löthrohr, und öfters zu einer magnetischen Kugel.

Man unterscheidet folgende Gattungen:

1. Almandin. (Edler, orientalischer Granat.) Colom-bin-, kirsch-, bräunlich- und blutroth; ρ . = 7,5; spec. Gewicht = 4,0 bis 4,1; durchsichtig bis durchscheinend. Bruch muschelig. Meist crystallisirt, selten derb in krummschaligen Stücken; besteht aus kiesel-säurer Thonerde und kiesel-säurem Eisen- und Manganorydul. Findet sich in Gneis und Glimmerschiefer eingewachsen bey Fahlun in Schweden, Schlanders im oberen Etschthal, Wittichen im Schwarzwalde und an vielen Orten in den Alpen. Auf Ceylon und in Pegu findet man im Flussande die schönen, durchsichtigen Trisitetraëder, welche auch den Namen syrische Granaten haben, eigentlich sirianische Granaten, von Sirian, einer Stadt, in Pegu, wohin sie zu Märkte gebracht werden.

2. Pyrop. Von blutrother Farbe; durchsichtig; spec. Gew. = 3,7 bis 3,9. Selten in Crystallen, Würfeln; gewöhnlich in Körnern, eingewachsen, im Serpentin zu Böhlig und lose im Schuttlande, wie bey Weronitz in Böhmen. Ist durch einen Gehalt an Chromoryd ausgezeichnet.

3. Caneelstein. Hyacinthroth und oranicngelb; ρ . = 7,0 bis 7,5; spec. Gew. = 3,5 bis 3,6; crystallisirt und in Körnern; fettartiger Glasglanz. Besteht aus kiesel-säurer Thonerde, verbunden mit kiesel-säurem Kalk und kiesel-säurem Eisenorydul. Findet sich in Crystallen, zu Drusen verbunden, auf der Alpe Mussa in Piemont, in losen Körnern auf Ceylon und in Aegypten, derb in Ross-shire in Schottland und zu Malsjö in Wermeland.

4. Grossular. Spargelgrün und apfelgrün, ins Graue

und Weiße verlaufend; Glasglanz; durchscheinend. $\rho. = 7,5$; spec. Gew. $= 3,6$; in Crystallen und körnigen Stücken. Silicat von Thonerde und Eisenoryd mit Kalksilicat. Findet sich am Wilui in Kamtschatka in Serpentin eingewachsen, auf Le Selle am Monzoni in körnigem Kalkstein.

Dieser Gattung steht der Allochroit sehr nahe, der wohl nur eine Art derselben ist, und sich zu Giallebof bey Drammen in Norwegen und zu Berggießhübel in Sachsen findet. Er besteht aus Thonerde- und Eisenorydsilicat, verbunden mit Kalk- und Manganorydulsilicat.

5. Melanit. Schwarz; undurchsichtig; schwacher Glasglanz; Dodecaëder mit abgestumpften Kanten; $\rho. = 7,5$; spec. Gew. $= 3,6$ bis $3,7$; die Crystalle vom microscopisch Kleinen an bis zur Größe einer Haselnuß. Besteht aus Thonerdesilicat, verbunden mit Kalk-Silicat und etwas Eisenorydul und Manganorydulsilicat. Findet sich in vulcanisches Gestein in Crystallen eingewachsen bey Frascati und Albano unfern Rom, in Auswürflingen des Vesuv, und am Kaiserstuhl im Breisgau.

6. Mangangranat, Braunsteinkiesel. Hyacinth-roth, durchscheinend an den Kanten; starker Glasglanz; Härte $6,5$; spec. Gew. $= 3,6$ bis $3,7$. Kleine Crystalle, Tricostetraëder, mit gestreiften Flächen. Besteht aus Thonerde-Silicat, verbunden mit Kalk-, Eisenorydul- und vorwaltendem Manganorydulsilicat. Eingewachsen im Granit der Gegend von Aschaffenburg und in Pensylvanien.

7. Rothhoffit, Eisengranat. Gelb, braun und roth; Glasglanz, immer stark in den Fettglanz geneigt. $\rho. = 7,0$; spec. Gew. $= 3,8$ bis $3,9$. Derb und crystallisirt. Findet sich zu Altenau, Longbanushytta und Lindbo in Schweden.

8. Gemeiner Granat. Von verschiedenen braunen, gelben und rothen Farben, geringem, fettartigem Glasglanz, geringer Durchsichtigkeit. $\rho. = 7,5$; spec. Gew. $4,0$ bis $4,3$; derb und crystallisirt. Besteht aus Eisenoryd- und Thonerde-Silicat, womit die Silicate von Kalk, Eisenorydul, Manganorydul verbunden sind. Ist der gewöhnlichste Granat, den man im Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer beynahe in allen Ländern findet. Alpen, Sachsen, Böhmen, Ungarn, Schweden,

Schwarzwald u.s.w. Der sogenannte Pechgranat, Eolophonit, dessen Crystalle und Körner häufig ein geflossenes Ansehen haben, findet sich in Kalkspath eingewachsen zu Arendal in Norwegen.

Die Gattungen Almandin und Pyrop werden als Schmucksteine geschätzt. Der dunkelcolombinrothe Almandin wird orientalischer Granat genannt. Reine Steine von mehreren Linien sind selten, und werden deßhalb immer gut bezahlt. Für Steine von 8—10 Linien bezahlt man 500—1,000 Gulden. Der Pyrop wird occidentalischer Granat, auch böhmischer Granat genannt, und ist am meisten geschätzt. Er wird in Böhmen aus dem Schuttland ausgewaschen und der Größe nach sortiert. Die Kleinern werden roh dem Gewichte nach, lothweise verkauft; größere aber, von denen 24—32 auf ein Loth gehen, einzeln, stückweise. Schon seltener sind sie, so groß, daß 16 ein Loth ausmachen; ein höchst seltener, kostbarer Fund ist ein Pyrop von $\frac{1}{2}$ Loth. Für einen reinen, brillantiert geschliffenen Pyrop von 8—10 Linien Größe bezahlt man 5—10 Louisd'or.


Man verarbeitet den Pyrop theils in Böhmen, theils zu Waldkirch unfern Freiburg. Der rothe Stein wird vermittelt eines Demantspalters durchbohrt, dann auf Sandstein geschliffen und hierauf poliert. Schmutzig gefärbte, rissige Granate werden gepulvert, geschlämmt und als Smirgel benützt.

6. Geschlecht. Vesuvian.

Spez. Idocras, pyramidaler Granat.

Zwey- und einkräftiges Crystallisationsystem. Die Crystalle

Fig. 56.



sind gewöhnlich eine Combination des Quadratoctäders mit dem ersten quadratischen Prisma, zuweilen auch mit diesem und dem zweyten, s. Fig. 43. S. 150, und der horizontalen Endfläche *a*, Fig. 56. Theilbarkeit nach *g*, unvollkommen. $D = 6,5$; spec. Gew. = $3,2$ bis $3,4$; Glas- und Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; immer ge-

färbt, vorherrschend grün, auch gelb, braun, selten blau; spröde, Bruch uneben unvollkommen muschelig. Der Habitus der Crystalle ist in der Regel kurz säulenförmig, seltener langgestreckt fängelig, oder durch Vorherrschen von c tafelförmig.

Besteht aus Thonerde- und Eisenoxyd-Silicat, verbunden mit Kalksilicat, und ist somit gerade so zusammengesetzt wie ein Granat. Der blaue ist durch Kupfer gefärbt, und deshalb auch Eyprian genannt worden. Schmilzt vor dem Löthrohre.

Kommt theils in eingewachsenen und aufgewachsenen Crystallen vor, Monte Somma am Vesuv, Blui in Kamtschatka, Monzoni im Fassathal, Drawitza in Ungarn, Frugard in Finland; theils in verben, fängeligen Stücken, Eger unsern Carlsbad (Egeran), Egg in Norwegen, Souland in Telemarken (Eyprian). Wird mitunter zu Ring- und Nabelsteinen verarbeitet, und unter dem Namen vesuvische Gemmen und Chrysolith verkauft.

7. Geschlecht. Dichroit.

Ein- und einachsiges Crystallisations-system. Die Crystalle haben gewöhnlich das Ansehen eines sechsseitigen Prismas, das mit einer sechsflächigen, an den Ecken abgestumpften Pyramide versehen ist, sind Combinationen der

Fig. 57.



Flächen des rhombischen Prismas g mit den Abstumpfungsfächen seiner scharfen Kanten b, mit den Flächen des Rhombenocäders a, den Flächen eines verticalen Prismas f und der horizontalen Endfläche c, Fig. 57. Der Habitus der Crystalle ist kurz säulenartig. Theilbarkeit nach g und b, unvollkommen.

$D. = 7,0$ bis $7,5$; spec. Gew. $= 2,5$ bis $2,7$; Glasglanz, im Bruche fettartig; gelblich und bläulichgrau, viol-, indig- und schwärzlichblau; durchsichtig bis durchscheinend; zeigt ausgezeichneten Dichroismus (Doppelfarbe), worauf sich der Name bezieht. Parallel der Achse blau, rechtwinklig auf dieselbe grau.

Besteht aus Thonerde-Silicat, verbunden mit Bilsilicat von

Eisenorydul und Bittererde. Schwer schmelzbar. Findet sich theils in Crystallen und eingewachsenen Körnern bey Capo de Gates in Spanien, Bodenmais in Bayern, auf einem Lager mit Kupfer- und Schwefelkies zu Arendal in Norwegen, Orjerfvi in Finland, auf Grönland, in Brasilien; theils in Geschieben, auf Ceylon. Durchsichtige Stücke werden geschliffen, und tragen den Namen Luchs- oder Wassersapphir. Man bezahlt für einen reinen, schön blauen Stein von 8—10 Linien 60—70 Louisd'or.

8. Geschlecht. Staurolith.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind gewöhnlich verticale, rhombische Prismen *g* mit der zweyten Seitenfläche (eine Abstumpfungsfläche der scharfen Seitenkanten) *b*, der horizontalen Endfläche *c* und den Flächen des ersten

Fig. 58.



Fig. 59.





Fig. 60.



horizontalen Prisma *d*, Fig. 58. Der Habitus der Crystalle ist immer säulenartig, theils dick und kurz, theils langgestreckt. Sehr oft kommen Zwillinge-Crystalle vor. Zwey Prismen von beschriebener Beschaffenheit durchkreuzen sich unter einem rechten Winkel,

Fig. 59, oder unter 120° , Fig. 60. Darauf bezieht sich der Name, von dem griechischen *Stauros*, Kreuz, und *Lithos*, Stein, gebildet. Die Durchwachsung unter 120° wiederholt sich bisweilen, wodurch ein sechsstrahliger Stern erzeugt wird. Theilbarkeit nach *b* vollkommen. Die Oberfläche der Crystalle gewöhnlich rauh.

ρ . = 7,0 bis 7,5; spec. Gew. bis = 3,4 3,8; Glasglanz, fettartiger; durchscheinend bis undurchsichtig; bräunlichroth, röthlich- und schwärzlich-

braun. Bruch muschelig bis uneben. Spröde. Basisches Silicat von Thonerde und Eisenoxyd. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar.

Hat sich bis jezt nur in Crystallen gefunden, eingewachsen in Gneis, Glimmer-, Talk- und Thonschiefer, am Gotthardt, am Grainer im Zillerthal, zu Winkelsdorf in Mähren. In losen Crystallen, nach der Verwitterung des Glimmerschiefers in Menge umherliegend, und vorzüglich als Zwilling, bey Guimper und Laminé, Dep. Finisterre; auch zu Oporto in Portugal, St. Jago de Compostella in Spanien, Sebes in Siebenbürgen. Die sonderbare Benennung des Minerals, Basler Taufstein, hat gar keinen Bezug auf sein Vorkommen bey Basel, oder seine Verwendung daselbst, und ist, der Himmel weiß wie, wahrscheinlich aus dem früher für viele Mineralien gebrauchten Namen Basaltstein, Baselstein entstanden.

2. Eigenschaft des Schörls.

1. Geschlecht. Schörl.

Syn. Turmalin.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Grundform Rhomboöder. Die Crystalle sind gewöhnlich Combinationen des Rhomboöders r mit einem stumpferen Rhomboöder r' mit der horizontalen Endfläche c und den Flächen des ersten oder zweyten sechsseitigen Prismas g oder a , zu weilen mit beiden, wobey öfters von einem derselben nur die Hälfte der Flächen vorhanden ist, Fig. 61.

Fig. 61.



Öfters sind die Crystalle an den Enden ungleich ausgebildet. Manchmal erscheinen auch zwölffseitige Prismen, und diese sind öfters in Verbindung mit dem ersten oder zweyten sechsseitigen Prisma, oder mit beiden, und bilden in diesem Fall schiefe Abstumpfungen der Combinationsecken jener beiden Prismen. Dadurch werden 24seitige Prismen gebildet, die schon ein beynahe cylinderförmiges Aussehen haben; dieß ist auch um so mehr der Fall, wenn zwey 12seitige Prismen mit den beiden 6seitigen in Combination erscheinen. Gar oft ist von einem 6seitigen Prisma nur die Hälfte der Flächen vorhanden, wobey die Crystalle einem

Seitigen Prisma ähnlich sind. In der Regel haben sie säulenförmige Gestalt, zeigen sich gar oft langgestreckt, stängelig (woher der Name Stangenschörl) und nadelförmig, seltener kurz, dick und durch Vorherrschen von *c* tafelförmig, oder durch Vorherrschen von *r* rhomboëdrisch. Die Oberfläche der Prismen ist in der Regel stark vertical gestreift. Theilbarkeit rhomboëdrisch, unvollkommen.

H. = 7,0 . . . 7,5; spec. Gew. = 3,0 bis 3,3; Glasglanz; weiß, gelb, braun, grün, blau, roth, schwarz; nur grün und roth zuweilen, lebhaft. Durchsichtig in allen Graden. Dichroismus, parallel und rechtwinkelig auf die Achse. Bruch muschelig bis uneben; spröde. Wird durch Erwärmen electrisch, und bey ganzen Crystallen polarisch. Zusammensetzung noch nicht genau ausgemittelt. Jedenfalls Silicat von Thonerde, verbunden mit Silicaten von Alkali, Kali, Natron oder Lithon, und Silicaten von Kalk, Bittererde und Eisenorydul, nebst einem Gehalt an Borsäure.

Man unterscheidet zwey Gattungen.

1. **Schörl, Kali-Turmalin.** Dazu rechnet man die unter Aufblähen schmelzbaren, gelben, weißen, braunen, schwarzen und grünen Crystalle und die herben, stängeligen Stücke, welche in Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Dolomit eingewachsen vorkommen; grün, Campolongo am Gotthardt, Massachusetts, Brasilien, Ceylon; gelb Windisch-Kappel in Kärnthen; braun an genannten Orten, in Pegu und auf Madagaskar; weiß, selten an der Grimsel und am Gotthardt; schwarz ziemlich allgemein. Grönland, Devonshire, Bodenmais liefern große Crystalle. In herben großen Massen bricht er auf einem Kupfergange am Monte Muslatto bey Predezzo im Fassathal.


2. **Apyrit, Lithon- (und Natron-) Turmalin, Rubellit.** Begreift die unschmelzbaren, rothen, grünen und blauen Crystalle; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Die rothen Crystalle erscheinen manchmal in der Richtung der Achse blau; an den Enden ungleich gefärbt, an einem Ende roth, an dem andern grün; immer langgestreckt, oftmals gekrümmt, und bisweilen außen grün, innen roth. Findet sich in Quarz eingewachsen zu Roczna in Mähren, zu Mursinsk und Miasz in Sibirien, in Brasilien und zu Utö in Schweden.

Der Schörl gewährt ein besonderes Interesse durch sein merkwürdiges electrisches Verhalten. Holländische Schiffer, welche ihn zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts aus Ceylon mitbrachten, machten die Bemerkung, daß er in heißer Asche die Eigenschaft erlangt, an einem Ende Aschentheile anzuziehen, an dem andern dagegen diese abzustößen. Davon erhielt er den Namen Aschenzieher. Wie man denselben zur Bestimmung der doppelten Strahlenbrechung und zur Ausmittlung der Achsen derselben anwendet, ist oben, S. 100, angeführt worden. Keine, schön grün gefärbte Stücke, die gewöhnlich aus Brasilien kommen, werden zu Schmucksteinen verarbeitet. Man bezahlt für einen Stein von einem Karat 3 Gulden bis einen Ducaten.

2. Geschlecht. Axinit.

Crystallsystem ein- und eingliederig. Grundform ein- und eingliederiges Octaëder (S. 63.). Die Gestalten sind, wie bey diesem Crystallsystem überhaupt, sehr unsymmetrisch. Eine ge-

Fig. 62.



wöhnlichere Combination, Fig. 62, vereinigt in sich die Flächen des verticalen Prismas g, g' , die Fläche c als die Basis, die Fläche o , eine Fläche des ein- und eingliederigen Octaëders, die Fläche a , Abstumpfungsfläche der Ecke A des Octaëders und die Fläche $2d'$, die Fläche eines zweyten verticalen Prismas. Von der scharfen Beschaffenheit einzelner Kanten seiner Crystalle hat das Mineral, nach dem griechischen Worte *axine*, Weil, den Namen erhalten. Theilbarkeit nach c unvollkommen.

$\delta. = 6,5$ bis $7,0$; spec. Gew. $= 3,2$ bis $3,3$; Glasglanz; nekkenbraun ins Graue und Grünliche; durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend; Bruch kleinmuschelig bis uneben; spröde; wird durch Erwärmen zum Theil polar electrisch. Zusammensetzung noch nicht genau bekannt. Silicat von Thonerde, verbunden mit Silicaten von Kalk, Eisen- und Manganoxydul, und

einer borsauren Verbindung. Schmilzt leicht unter Aufblähen zu einem dunkelgrünen Glase. Findet sich theils crystallisirt, gewöhnlich in Drusen, auf Lagern und Gängen in crystallinischen Gebirgsbildungen, Bourg d'Oisans im Dauphiné, Landsend in Cornwall, Chamouny, Thum in Sachsen, daher auch der Name Thumerstein; theils derb und eingesprengt, zu Treseburg am Harze.

2. Geschlecht. Epidot.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Grundform das Octaëder Fig. 27. S. 59. Die Crystalle sind gewöhnlich säulenartig, nicht sehr lang gestreckt, und haben den Haupttypus der

Fig. 63.




Fig. 63. Die Prismenflächen häufig stark gestreift, wodurch schiffartige Säulen gebildet werden. Oefters auch Zwillinge. Theilbarkeit nach g sehr vollkommen. $H. = 6,0$ bis $7,0$; spec. Gew. $= 3,2$ bis $3,5$. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen perlmutterartig. Selten farblos; beynähe immer grau, grün oder roth gefärbt. Halbdurchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend. Spröbde. Zusammensetzung: Si-

licat von Thonerde (und Eisenoryd, Manganoryd), verbunden mit Silicat von Kalk oder Eisenorydul.

Man unterscheidet folgende Gattungen:

1. Kalk-epidot, Zoisit, Silicat von Thonerde, mit Kalk-Silicat. Schmilzt schwer zu einem gelblichen Glase. Grau, Mittelfarbe zwischen bläulich und rauchgrau. Schwach durchscheinend, oder nur an den Kanten. $H. = 6,0$; spec. Gew. $= 3,2$. In großen, eingewachsenen Crystallen oder in derben, stängeligen Stücken. Unfern Vaireuth im Fichtelgebirge, Saualpe und Nödelgraben in Kärnthen, Bacheralpe in Steiermark, Sterzing in Tyrol.

2. Eisenepidot, Pistazit. Silicat von Thonerde, mit Silicat von Eisenorydul. Schmilzt schwer zu einem grünen Glase. Grün, pistazfengrün (wovon der Name) ins Gelbe und Schwarze. Zeigt die höchsten Grade der Durchsichtigkeit. Dieses

Geschlechtes. Starker Glasglanz. $\rho = 7,0$; spec. Gew. = 3,4. Crystallisiert, theils in großen einzelnen, theils in nadelförmigen bündeln und büschelförmig oder verworren gruppierten Crystallen; auch in verben, stängeligen, faserigen, körnigen und dichten Stücken. Findet sich vorzugsweise im crystallinischen Grundgebirge eingesprengt, öfters im Granit, Syenit, Grünstein, Gneis; theils auf Eisenerzlagern, wie zu Arendal in Norwegen, Norberg und Langbanshytta in Schweden; theils auf gangartigen oder lagerartigen Gebilden mit Granat, Quarz, Kalkspath, Hornblende, zu Schriesheim an der Bergstraße, Breitenbrunn und Sießhübel in Sachsen. Die büschelförmig gruppierten Crystalle finden sich vorzüglich auf Gängen zu Allemont im Dauphiné, auf der Musaalpe, zu Floss in der Pfalz. Mitunter findet man die Gattung auch in Blasenräumen vulcanischer Gesteine, namentlich im Fassathal in Tyrol; die sandige Abänderung (Storja) kommt in den Goldseifen bey dem siebenbürgischen Dorfe Muska vor.

3. **Manganepidot** (piemontesischer Braunstein). Silicat von Thonerde und Manganoryd mit Kalk-Silicat. Schmilzt leicht unter Aufstoßen zu einem schwarzen Glase. Röthlichbraun und röthlichschwarz. $\rho = 6,5$; spec. Gew. = 3,4 3,5. Undurchsichtig, oder nur in Splintern durchscheinend. Gewöhnlich in verben, stängeligen Stücken. Findet sich zu St. Marcel, Val d'Aosta in Piemont.

3. Gipschaft des Zeoliths.

1. Geschlecht. Zeolith.

Syn. Mesotyp.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind in

Fig. 64.





Fig. 65.



der Regel lang, stängelig und gewöhnlich eine Combination des Hauptoctaeders *o* mit dem verticalen rhombischen Prisma *g*, Fig. 64, womit öfters noch die Seitenfläche *b*, Fig. 65, vereinigt ist. Gar oft sind die Crystalle äußerst

gart, nadel- und haarförmig (Nadelzeolith). Theilbarkeit parallel g vollkommen.

$\rho = 5,0$ bis $5,5$; spec. Gew. $= 2,1$ bis $2,25$. Glanz; farblos, gelblich, graulich, röthlich gefärbt, auch braun, ockergelb, pfirsichbläthe-, fleisch- und ziegelroth. Durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend. Spröde, Bruch uneben. Manche Stücke werden durch Erwärmung polar electrisch. Zusammensetzung: wasserhaltiges Silicat von Thonerde, verbunden mit Kalk- oder Natron-Silicat. Bläht sich in der Hitze auf, und schmilzt zu weißem Email. Bildet gepulvert. mit Salzsäure eine Gallerte.

Es werden folgende Gattungen unterschieden:

1. Natronzeolith, Natrolith. Wasserhaltiges Thonerde-Silicat mit Natron-Silicat. Farblos und gefärbt. Verliert in der Hitze über 9 Proc., wird undurchsichtig und schmilzt sodann ruhig. Spec. Gew. $= 2,24$ $2,25$. Wird durch Erwärmen nicht electrisch. Löst sich in Klee säure auf.

Ist die gewöhnliche, häufig in Blasenräumen vulcanischer Gesteine, namentlich im Basalt und Klingstein vorkommende Zeolithgattung, deren Crystalle oft in Bündel und Kugeln vereinigt sind, und ausgezeichnet schön auf Island und zu Clermont in der Auvergne vorkommen. Am Hohentwiel, Hohenkrähen und Mägdeberg im Hegau kommen die gelben und rothen Natrolithe sehr häufig auf Trümmern und in Schnüren im Klingstein vor. Man findet diese Gattung ferner am Kaiserstuhl im Breisgau, bey Auffig in Böhmen, im Fassathal in Südtirol, auf den Färbern u.s.w.

2. Kalkzeolith, Ekolezit. Fast immer farblos. Spec. Gew. $2,2$. Wird beym Erhitzen sogleich undurchsichtig, krümmt sich wurmförmig, und schmilzt in starker Hitze zu einem sich stark aufblähenden, stark leuchtenden und sehr blasigen Glase. Löst sich in Klor säure nur zum Theil auf. Bildet nach dem Glühen mit Salzsäure keine Gallerte mehr. Verliert in der Hitze über 13 Proc. Wird durch Erwärmen stark electrisch. Kommt viel seltener vor als der Natrolith, aber mit diesem auf Island, Staffa und den Färbern.

3. Kalknatron-Zeolith, Mesolith. In den äußern


Verhältnissen dem gewöhnlichen Zeolith sehr ähnlich. Verliert durch Glühen 12 Proc. Wasser. Löst sich zum kleinern Theil in Klee säure auf. Findet sich zu Hauenslein in Böhmen.

2. Geschlecht. Stilbit.

Syn. Blätterzeolith. Henlandit.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind gewöhnlich tafelförmig und haben die Gestalt der Fig. 66. zusammengesetzt aus dem verticalen rhombischen Prisma g, der Seitenfläche h, den Schiefenflächen c, c' und d. Theilbarkeit sehr vollkommen nach c.

Fig. 66.




H. = 3,5 . . . 4,0; spec. Gew. = 2,2 . . . 2,3; meist gefärbt, gelblich-, graulich- und röthlichweiß, fleisch- und ziegelroth, auch grün und braun. Glasglanz, auf der ausgezeichneten Theilungsfläche Perlmutterglanz. Durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend. Zusammensetzung: Trisilicat von Thonerde mit Silicat von Kalk und 15 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blasigen Glase.

Findet sich gewöhnlich crystallisirt in einzelnen oder in zu Drusen versammelten Crystallen, auch verb und eingesprengt, vorzüglich im vulcanischen Gebirge in Mandelsteinen und Basalten, auf Island, den Färbern, auf den Hebriden (Mull und Skj), im Fassathal; seltener auf Erzgängen und Lagern, Andreasberg am Harz, Kongsberg und Arendal in Norwegen.

3. Geschlecht. Desmin.

Syn. Strahlzeolith.

Fig. 67.



Crystallsystem ein- und einachsig. Das Ansehen der Crystalle ist gewöhnlich rectangulär säulenartig; die gewöhnlichste Gestalt Fig. 67., eine Combination des Octaeders o mit der ersten und zweyten Seitenfläche a und b. Selten kreuzförmige Zwillingscrystalle. Theilbarkeit nach a vollkommen.

$\rho = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. = 2,1 bis 2,2. Glasglanz; auf der Spaltungsfläche Perlmutterglanz. Gewöhnlich gefärbt, gelblich, graulich, röthlichweiß, ockergelb, grau, braun, fleischroth. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Trisilicat von Thonerde mit Silicat von Kalk und 16 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blasigen Glase.

In der Regel crySTALLISIRT, theils in einzelnen Crystallen, theils garbenförmig gruppiert oder in Drusen versammelt, auch verb., körnig und stängelig. Findet sich meistens in Begleitung von Stilbit an den bey diesem genannten Orten, überdieß in Schottland und zu Dravicza in Ungarn.

4. Geschlecht. Analcim.

Reguläres Crystallsystem. Die Crystalle sind theils Würfel, Fig. 1. S. 36., theils Trisitetraëder, Fig. 54. S. 158., und Combinationen von beiden, Fig. 8. S. 42. Theilbarkeit nach den Würfelflächen unvollkommen.

$\rho = 3,5$; spec. Gew. = 2 \dots 2,2, oft weiß mit Grau, Gelb, Grün, Blau, Roth, auch fleischroth. Glasglanz, oftmals perlmutterartig. Durchsichtig bis durchscheinend. Disilicat von Thonerde mit Disilicat von Natron und 8 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem klaren, etwas blasigen Glase.


Findet sich vorzüglich im vulcanischen Gebirge in Mandelsteinen, in Basalt, Klingstein, Trachyt. Die schönsten Crystalle kommen von der Seisseralpe in Südtirol, wo man am Eipitbach und am Abfall gegen Kastluth öfters faustgroße Crystalle, und auf Triole Palle die Combination des Würfels und Trisitetraëders findet; überdieß kommt er vor am Kaiserstuhl im Breisgau, bey Auffig in Böhmen, zu Dumbarton in Schottland, auf den Färbern, am Monte Somma am Vesuv, auf den Hebriden u.s.w., seltener auf Erzlagern und Gängen, zu Andreasberg und Arendal.

5. Geschlecht. Chabasit.

Drey- und einachsiges Crystallsystem. Die Formen sind hemiedrisch, Rhomboëder und Combinationen des Hauptrhomboëders r , mit dem ersten stumpfere $\frac{r}{2}$ und dem ersten spitzer-

ren 2 r', Fig. 68. Häufig Zwillinge: die zwey Rhomboëder

Fig. 68.



haben die Hauptachse gemeinschaftlich, eines ist am andern um 60° verdreht. Die Flächen des Hauptrhomböders sind gewöhnlich federartig gestreift. Theilbarkeit nach r nicht vollkommen.

H. = 4,0 bis 4,5; spec. Gew. =

2 ... 2,2; selten farblos, meist grau-

lich-, gelblich-, röthlichweiß oder röthlichgrau. Glasglanz. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus Bisilicat von Thonerde, mit Bisilicat von Kalk, Natron oder Kali und 20 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blasigen, farblosen Glase.

Findet sich theils crySTALLISIRT, theils derb von körniger Structur, in Blasenräumen vulcanischer und plutonischer Gesteine, zu Auffsig in Böhmen, auf Island, den Hebriden, Färöern, zu Oberstein bey Zweibrücken, auf der Seisser Alpe und am Monzoni oberhalb der Campigui-Wiese.

6. Geschlecht. Laumontit.

CrySTALLSYSTEM zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind gewöhnlich rhombische Prismen mit schiefer Endfläche, Fig. 28. S. 61., an welchen bisweilen noch die Seitenflächen a und b als Abstumpungsflächen der Kanten, und statt der Endfläche c

Fig. 69.



zwey Flächen eines schiefen Prismas o vorkommen, Fig. 69. Theilbarkeit nach der Abstumpungsfläche der scharfen Kante.

H. = 2,0, sehr zerbrechlich; spec. Gew. = 2,3; farblos oder gelblich- und graulichweiß. Glasglanz, auf der Spaltungsfläche Perlmutterglanz. Durch-

scheinend. Besteht aus Bisilicat von Thonerde mit Bisilicat von Kalk und 16 Proc. Wasser. Bildet mit Salzsäure eine Gallerte; fließt in der Hitze ruhig zu einem halbdurchscheinenden, blasigen Glase. Ist der Verwitterung sehr unterworfen. Theils crySTALLISIRT, theils in stängeligen, derben Stücken. Findet sich zu Huelgoet in der Bretagne in Thonschiefer, in vulcanischem Ge-

stein zu Antrim in Irland, auf den Färðern und Hebriden u. a. a. O. Wegen seiner Verwitterbarkeit und Zerbrechlichkeit schwer aufzubewahren.

7. Geschlecht. Kreuzstein.

Syn. Harmotom.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind gewöhnlich Combinationen des Rhombenoctaëders o mit den Seitenflächen a und b, Fig. 70., und häufig Zwillinge; beide Individuen durchkreuzen sich, haben die Hauptachse gemein, und eines ist gegen das andere um diese Hauptachse durch 90° verdreht, Fig. 71. Die Oberfläche von b parallel den Combinationskanten mit o gestreift. Theilbarkeit nach a und b, vollkommen nach a.

Fig. 70.





Fig. 71.



$D. = 4,5$; spec. Gew. $= 2,1 \dots 2,4$; farblos, oft graulich-, gelblich-, röthlichweiß, auch fleisch-, ziegel- und blutroth. Glasglanz. Halb durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus Bisilicat von Thonerde mit Bisilicat von Baryt, oder mit Bisilicat von Kalk und Kali und 15–16 Proc. Wasser.

Man unterscheidet zwey Gattungen.

1. Baryt-Kreuzstein. Spec. Gew. $= 2,3$ bis $2,4$; wird von Salzsäure nicht aufgelöst. Findet sich auf


Erzgängen zu Andreasberg am Harze, Kongsberg in Norwegen, Strontian in Schottland, und im Porphyrgebirge zu Oberstein bey Kreuznach.

2. Kali-Kreuzstein. Spec. Gew. $2,15$; bildet mit Salzsäure eine Gallerte. Kommt im vulcanischen Gebirge am Kaiserstuhl im Breisgau, zu Annerode bey Gießen, am Stempel bey Marburg vor. Beagonit, Gismondin, Phillipsit, Abrazit gehören zum Kali-Kreuzstein.

8. Geschlecht. Prehnit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind theils tafelartig, eine Combination des verticalen Prismas *g* mit der geraden Endfläche *c*, welche vorherrscht, Fig. 72, theils säulenartig, wenn die *g* Flächen vorherrschen, und oft in Combination mit Seitenflächen. Theilbarkeit nach *c* ziemlich vollkommen.

Fig. 72.



$\rho. = 6$ bis $7,0$; spec. Gew. = $2,8$ bis $3,0$, theils farblos, theils grau in verschiedenen Nuancen. Glas-

glanz, auf *c* Perlmutterglanz. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Wird durch Erwärmung electrisch. Besteht aus kiesel-saurer Thonerde mit anderthalb kiesel-saurem Kalk und etwas Eisenoxydul, und enthält über 4 Proc. Wasser. Schmilzt in starker Hitze unter Anschwellen zu einem blasigen Glase.

Man unterscheidet zwei Abänderungen.

1. Blätteriger Prehnit; begreift die Crystalle und die dicken, körnigen Stücke. Die Crystalle sind oft fächerartig und garbenförmig gruppiert, in eine Masse zusammengefloßen, wodurch wulstartige Stücke entstehen. Diese Abänderung wurde zuerst aus dem südlichen Africa, aus dem Lande der Namaquas, nach Europa gebracht, und später ausgezeichnet zu Ratschinges in Tyrol, zu Bourg d'Oisans im Dauphiné, zu Lemmi in Piemont, Schwarzenberg im Erzgebirge, Luz und Ba-reges in den Pyrenäen gefunden.

2. Faseriger Prehnit. Kommt in kugelförmigen, nierenförmigen und stalactitischen Stücken mit drusiger Oberfläche und auseinanderlaufend strahligem und faserigem Gefüge vor, in vulcanischen Gesteinen im Fassathal bei Sotio i Gassl, auf den Inseln Mull und Skye, und im plutonischen Porphyr zu Reichenbach bey Oberstein.

Seltene Vorkommnisse, welche auch in die Zeolithfamilie gehören, sind: der Brewsterit, Epistilbit, Levyn, Omelinith, Thompsonit, Pectolith, Olenit, Edingtonit, Mesole, Mesolin.

4. Eigenschaften des Glimmers.

1. Geschlecht. Zweyachsigter Glimmer.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind schiefe, rhombische und sechsseitige Prismen, meistens tafelförmig. Theilbarkeit ausgezeichnet nach der Grundfläche.

ρ . = 2 bis 2,5; spec. Gew. 2,86 . . . 3,1. Elastisch, Farblos und gefärbt; gelblich-, graulich-, röthlich-, grünlich- und silberweiß, grau, braun, bronzegelb, grünlichgrau, schwarz, auch rosenroth und pfirsichblüthroth. Glasglanz, auf der ausgezeichneten Theilungsfläche ein höchst ausgezeichneter Perlmutterglanz, metallähnlich, wenn er mit gelber und weißer Farbe verbunden ist. Durchsichtig in allen Graden. Zeigt zwey Achsen doppelter Strahlenbrechung, nämlich im polarisirten Lichte concentrische Farbenringe, von einem dunkeln Strich durchschnitten.

Die Zusammensetzung ist noch nicht genau ermittelt. Vorwiegend ist Thonerde- und Eisenoryd-Silicat, damit verbunden ein Silicat von Kali oder Lithon, nebst einem Gehalt an Fluor. Man unterscheidet zwey Gattungen.

1. Kali-Glimmer, gemeiner Glimmer. Schmilzt vor dem Löthrohr etwas schwer. Theils crystallisiert, wobey gewöhnlich viele tafelförmige Crystalle zu einem einzigen über einander geschichtet, oder zu fächerartigen Aggregaten vereinigt sind, theils in crystallinischen, blätterigen, strahligen Parthien, in kugelförmigen Gestalten, auch in zwillingartigen Zusammensetzungen, was durch eine federartige Streifung der Spaltungsflächen angedeutet wird. Allverbreitet. Ein wesentlicher Gemengtheil der gewöhnlichsten crystallinischen Gesteine, des Granits, Gneises, Glimmerschiefers; er gelangt bey deren Zersetzung in den Grus und Sand, welcher daraus entsteht, bey deren mechanischer Zerkleinerung in die dabey gebildeten Schuttmassen, und findet sich auf solche Weise häufig im Sande so wie in Sandsteinen und verschiedenen Krümmern. Ausgezeichnet großblättriger Kaliglimmer findet sich bey Zwiesel in Bayern, in Finland, Grönland, Sibirien, bey Skutterud und Fausse in Norwegen.

Die großen sibirischen Glimmertafeln kommen unter dem

Namen Marienglas in den Handel. Sie werden in Sibirien selbst häufig in dünne Blätter gespalten, und sodann zu Fenster Scheiben benutzt. Auf kleine Blättchen klebt man solche Insekten auf, die sich der Kleinheit wegen nicht wohl an Nadeln spießen lassen. Bisweilen benutzt man die feinen, mit Sandkörnern untermengten, Glimmerschuppen als Streusand, welcher nach der Farbe Silber- oder Goldsand genannt wird. Gar oft haben Farbe und Glanz des Glimmers Unkundige zu der Meynung geführt, daß er edles Metall, Gold oder Silber, enthalte, was Betrüger mitunter zum Schaden der Leichtgläubigen benutzen. Die Enttäuschung bleibt nicht aus. Darauf spielt der Name Razensilber, Razengold an.

2. Lithon-Glimmer, Lepidolith. Schmilzt sehr leicht, und färbt dabey die Spitze der Flamme purpurroth. Crystallisirt, und in crystallinischen Gestalten, wie der gemeine Glimmer. Ofters rosenroth, pfirsichbläthroth und gränlich. Besteht aus Thonerde- und Eisenoryd-Silicat, mit Lithon, Kali und Fluorgehalt. Die blätterige Abänderung des Lithonglimmers kommt vorzüglich auf den Zinnerzlagerrstätten des Erzgebirges, dann in Cornwall, zu Klein-Chursdorf bey Penig in Sachsen, auf Utd, Elba und bey Clatharinenburg vor. Die feinschuppige und feinkörnige Abänderung, welche den Namen Lepidolith trägt, findet sich vorzüglich bey Rozna und Jglau in Mähren. Man verarbeitet sie hin und wieder zu Dosen, kleinen Vasen, und benützt sie zur Darstellung von Lithon.

2. Geschlecht. Einachsiger Glimmer.

Crystallsystem drey- und einachsfig. Die Crystalle sind gewöhnlich kurze, tafelarige, sechsseitige Säulen mit horizontaler Endfläche, und Ofters combinirt mit den Flächen eines Hexagonododecaeders. Theilbarkeit höchst vollkommen nach der horizontalen Endfläche.

$\rho = 2 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 2,8 \dots 2,88$; Glasglanz, auf der Theilungsfläche metallähnlicher Perlmutterglanz; durchsichtig in dünnen Blättchen. Zeigt eine Achse doppelter Strahlenbrechung, im polarisierten Lichte farbige Ringe, welche von einem schwarzen, rechtwinkligen Kreuze durchschnitten sind.

Gefärbt, in der Regel dunkel, schwärzlichgrün, gränlichschwarz, pechschwarz, nelfenbraun und schwärzlichbraun. Besteht ebenfalls aus vorwaltendem Silicat von Thonerde und Eisenoryd, verbunden mit einem beständigen Magnesiagehalte (Magnetit-Glimmer), mit Kali und Fluor. Sehr schwer schmelzbar an den dünnsten Kanten zarter Blättchen. Findet sich viel seltener als der zweyachsigste Glimmer, theils in Crystallen, theils in crystallinischen Parthien, vorzüglich in vulcanischen Gesteinen, Basalten, Doleriten, Laven, am Vesuv; in Grundgebirgsgesteinen in Sibirien, zu Monroe in New-York. Es scheint, daß die meisten schwarzen und grünen Glimmer zu diesem Geschlecht gehören. Man untersucht sie am leichtesten mittelst Turmalin-Tafelchen. Siehe S. 100.

2. Geschlecht. Chlorit.

Crystallsystem drey- und einachsig. Die Crystalle sind gewöhnlich sehr dünne, sechsseitige Tafeln, oft zu cylindrischen und kegelförmigen Gestalten gruppiert. Theilbarkeit nach der Grundfläche höchst vollkommen.

$\rho = 1 \dots 1,5$; spec. Gew. $= 2,8 \dots 2,9$. Grün; berg-, lauch-, oliven-, schwärzlichgrün. Durchsichtig bis durchscheinend; Perlmutterglanz auf der Spaltungsfläche. Biegsam (nicht elastisch). Zusammensetzung noch nicht genau ermittelt. Kiesel-, Thon-, Bittererde und Eisenorydul sind die Hauptbestandtheile nebst 12 Proc. Wasser. Schmilzt nur an sehr dünnen Kanten.

Man unterscheidet mehrere Abänderungen; blätterigen, gemeinen, schieferigen, erdigen Chlorit. Der erste begreift die Crystalle, die gewöhnlich gruppiert sind; der zweyte die dicken, schuppigen Stücke; der dritte die Abänderungen von schieferiger Structur, Chloritschiefer, und der vierte endlich jene Stücke, bey welchen ein loser oder kein Zusammenhang der Theile statt findet. In einzelnen Crystallen kommt er seltener vor, dagegen in großen Massen als schieferiger Chlorit, mächtige Gebirgsmassen im Grundgebirge bildend; Aillerthal im Tyrol, Leoben in Steyermark, Gotthardt in der Schweiz, auf den Hebri- den, zu Erbsendorf im Fichtelgebirge; schuppigförmige Abänderungen

finden sich auf den Eisenerzlagerstätten am Låberg und zu Danemora in Schweden, zu Arendal in Norwegen, und auf den Kupferlagerstätten zu Dognaska in Ungarn; der erdige Chlorit überzieht häufig die Bergcrystalle, so wie Drusen von Periklin, Feldspath, Arinit u.s.w., und ist auch öfters in Crystallen derselben eingeschlossen. Ueberdies findet man den Chlorit mehrfältig als Gemengtheil von Gesteinen, von Granit, Schaalstein, Gneis, Glimmerschiefer.

3. Geschlecht. Talk.

Crystallsystem drey- und einachsig, wie man aus den bis jetzt bekannten dünnen sechsseitigen Tafeln entnehmen kann, in welchen das Mineral crystallisirt, die sich aber zu einer genauen Bestimmung nicht eignen. Theilbarkeit sehr vollkommen parallel der Basis der Tafeln. Zeichnet sich durch die geringe Härte aus, 1 ... 1,5, durch Biegsamkeit, fettiges Anfühlen und einen höchst vollkommenen Perlmutterglanz. $\rho = 2,6 \dots 2,8$. Sehr milde. Immer leicht gefärbt; graulich-, gelblich-, grünlichweiß, spargel-, apfel- und lauchgrün. Durchsichtig bis durchscheinend, mit zweyachsig, doppelter Strahlenbrechung. Besteht aus einem Talkerde-Silicat, worinn ein Theil Kiesel Erde oftmals durch Thonerde vertreten wird. Vor dem Löthrohr unschmelzbar, leuchtet aber stark, blättert sich auf und wird spröde.

In wohlansgeordneten Crystallen hat man den Talk bis jetzt nicht gefunden. Die Crystalle sind meistens feilsförmig verschmälert, und bilden, fächerartig verbunden, häufig nierenförmige und traubige Aggregate von breitstrahliger Zusammensetzung. Oft kommt der Talk herb vor, in großblättrigen Massen, am häufigsten aber in schuppigen, blätterigen oder schieferigen Aggregaten, als Talkschiefer, in welcher Gestalt er große Gebirgsmassen zusammensetzt.

Schöne Stücke Talk finden sich am Grainer in Tyrol, im Urserenthale am Gotthardt, in Salzburg, Steyermarl und in mehreren Gegenden Schottlands. Die Alpen sind das Gebirge, welches den Talk in allen Abänderungen aufweist. Der Talkschiefer findet sich in denselben, namentlich am Gotthardt und in Graubünden an vielen Stellen.

Der weiße Talc wird zur Bereitung von Schminken und Pastellfarben, auch zum Polieren verwendet.

Der sogenannte Topfstein, *Lapis ollaris* der Römer, ist ein Gemenge von Talc, Chlorit und Glimmer, welches sich an vielen Orten in den Alpen findet. Die wichtigsten Fundorte sind: am großen Bernhardt und bey Arnen im Wallis, im Urserenthal am Gotthardt, im Pcecia-, Maggia- und Lavezzarathal im Tessin, im Malenkertthal nördlich von Sondrio und zu Prosto bey Chiavenna. In der Schweiz heißt dieß Gemenge Giltstein, auch Lavezstein nach dem Lavezzarathal. Man verarbeitet es vielfältig zu Geschirren und Töpfen, die im Feuer sehr gut halten, wenn sie keinen Stößen ausgesetzt sind, ferner zu Bodenplatten, Dachplatten und Ofensteinen. Aus Topfstein gebaute Ofen werden sehr hart und dauern Jahrhunderte. Nach Chr. Bernoulli sieht man zu Libbes im Wallis einen solchen Ofen, der die Jahrzahl 1000 trägt.

4. Geschlecht. Pinit.

Syn. Giesekit.

Erystallsystem drey- und einachsig. Die immerhin an der Oberfläche rauhen, gewöhnlich matten Erystalle sind sechs- und zwölfsseitige Prismen mit der horizontalen Endfläche, selten mit Flächen eines Hexagondodecaëders. Theilbarkeit parallel der Endfläche vollkommen. $\rho. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gewicht = 2,7. Schwacher Fettglanz. Undurchsichtig, oder an den Kanten durchscheinend. Farbe häufig braun, röthlich- und schwärzlichbraun, auch schwärzlich- und olivengrün, gränlich-, gelblich- und bläulich-grau. Außen oftmals roth. Milde. Gewöhnlich in eingewachsenen Erystallen, selten in kleinen Partien verb oder eingesprengt. Besteht aus einem Silicat von Thonerde und Eisenoxyd, verbunden mit einem Trisilicat von Kali, Natron, Magnesia, Eisen- und Manganoxydul. Brennt sich weiß, und schmilzt an den Kanten zu einem blasigen Glase.

Findet sich vorzüglich im Gneis und Granit. Früher auf den Pinitstollen zu Schneeberg, gegenwärtig zu St. Pardoux in der Auvergne, bey Freiberg im Breisgau, bey Heidelberg, zu Schneeberg in Sachsen, auch in Schottland, Cornwall und Nordamerika.

5. Stippschaft des Leucits.

1. Geschlecht. Leucit.

Syn. Amphigone Hy.

Reguläres Crystallsystem. Die Crystalle sind Tricostetraeder (Fig. 10. C. 45.), die, weil sie dem Leucit eigenthümlich sind, auch den Namen Leucitoeder tragen. Theilbarkeit nach den Dodecaederflächen, welche die Ecken E, Fig. 10., gerade abstumpfen, sehr unvollkommen. $\rho = 5,5 \dots 6,0$; spec. Gew. = $2,4 \dots 2,5$. Glasglanz. Die Oberfläche der Crystalle ist indessen oft rauh und matt. Durchsichtig bis durchscheinend. Farbe licht, graulich-, gelblich-, röthlichweiß, worauf sich der Name bezieht (leucos, weiß), auch asch-, rauch- und gelblichgrau. Bisilicat von Thonerde, verbunden mit Bisilicat von Kali. Für sich unschmelzbar; schmilzt aber bey Kalzaufsaß.

Findet sich theils in Crystallen, theils in rundlichen Körnern, die beide im Innern oft wie zerborsten aussehen, in vulcanische Gesteine eingewachsen, namentlich in ältern Lavas, am Vesuv, in der Gegend von Frascati, Albano, am Capo di Bove in der Nähe von Rom, am Kaiserstuhl im Breisgrau, und zu Rieden am Saacher See.

2. Geschlecht. Haüyn.

Syn. Rosean, Spinellan.

Reguläres Crystallsystem. Die Crystalle sind Kantendodecaeder, Fig. 53. C. 158, Combinationen dieser Gestalt mit dem regulären Octaeder und mit dem Leucitoeder. Theilbarkeit nach den Dodecaederflächen, am vollkommensten bey den blauen Abänderungen. $\rho = 5,5 \dots 6,5$; spec. Gew. = $2,2 \dots 2,4$. Glasglanz äußerlich; innerlich Fettglanz. Halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Blau, braun und schwarz; himmel-, smalte-, berliner-, indig- und schwärzlichblau; nelfen-, castanien- und schwärzlichbraun bis pechschwarz. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, verbunden mit einem Silicat von Kali oder Natron und Kalk. Darnach kann man zwey Gattungen unterscheiden.

1. **Kalthaun**, italienischer Haun; schmilzt für sich zu einem farblosen, blässigen Glase. Meistens eingewachsen in Körnern und eingesprengt in kleinen, körnig zusammengesetzten Massen, selten in Crystallen. Findet sich bis jetzt nur in Italien, bey Albano, Marino, am Capo di Bove, in Laven und an der Somme am Vesuv, so wie in Auswürflingen dieses Feuerberges.

2. **Natronhaun**, deutscher Haun, Spinellan und No-sean; schmilzt schwer an den äußersten Ranten; der Spinellan schmilzt leichter und unter starkem Blasenwerfen. Findet sich in Crystallen und Körnern im Trachyt des Saacher Sees, so wie in dem sogenannten rheinischen Wühlstein, Basanit, zu Niedermendig, Weyen, Lönnestein u.s.w.

3. Geschlecht. Lasurstein.

Syn. *Lapis lazuli*.

Reguläres Crystallsystem. Die selten vorkommenden Crystalle sind Rautendodecaëder mit rauher Oberfläche. Theilbarkeit nach den Flächen desselben ziemlich vollkommen. $\rho = 5 \dots 6,0$; spec. Gew. = $2,3 \dots 2,4$. Farbe lasurblau, himmelblau, schwärzlichblau. Glasglanz. Durchsichtig bis durchscheinend an den Ranten. Gibt ein schönes blaues Pulver. Meist verb. Enthält häufig gelbe, metallische Punkte von Schwefelkies und einzelne Glimmerblätter. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, Natron und Kalk, und ist durch eine Schwefelverbindung gefärbt. Entwickelt deshalb mit Salzsäure Schwefelwasserstoff, verliert die Farbe und bildet damit eine Gallerte. Schmilzt unter Aufblähen schwer zu einem weißen Glase.

Findet sich in Sibirien an den Ufern der Eljudenka, in der kleinen Bucharei, in Tibet und in China. Der Lasurstein wird zur Aufertigung einer überaus schönen und beliebten Malerfarbe, zur Bereitung des theuren Ultramarins verwendet, dessen künstliche Darstellung Ch. Gmelin in Tübingen mit edler Uneigennützigkeit in neuester Zeit gelehrt hat. Man verarbeitet ihn ferner zu verschiedenen Bijouteriewaren, zu Schalen, Dosen, Ringsteinen u.s.w., und zu architektonischen Verzierungen, die man in ausgezeichneter Schönheit in dem Pallaste zu Bartholomäus bey

Petersburg, in der Jesuitenkirche zu Venedig und im Vatican zu Rom sieht.

4. Geschlecht. Sodolith.

Reguläres Crystallsystem. Die Crystalle sind Rautendodecaëder, zuweilen mit Octaëder- oder Tricostetraëderflächen combinirt. Theilbarkeit nach den Dodecaëderflächen, vollkommen. $S. = 5,5 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 2,2 \dots 2,3$; Glasglanz; Farbe licht, graulich-, gelblich-, grünlichweiß bis blgrün, auch gelblich- und aschgrau. Durchscheinend. Besteht aus einem Silicat von Thonerde und Natron, verbunden mit Chlor-Natrium. Schmilzt zu einem farblosen Glase. Gelatinirt mit Säuren.

Kommt theils in Crystallen vor mit glatten aber unebenen, gekrümmten Flächen und zugerundeten Kanten, gewöhnlich mehrere mit einander verwachsen, theils in rundlichen Körnern, endlich auch verb in körnig zusammengesetzten Stücken. Man fand den Sodolith zuerst auf Grönland am Rangerbluarsuk-Fjord auf einem Lager im Glimmerschiefer, später sodann in den Auswürflingen des Vesubs an der Fossa Grände und in den vulcanischen Gesteinen des Baacher Sees.

5. Stoppfchaft des Stapoliths.

1. Geschlecht. Stapolith.

Syn. Schmelzstein, Mejonit, Paranthine, Dippre.

Crystallsystem zwey- und einachsig. Die Crystalle sind quadratische Prismen, in Combination mit dem quadratischen Octaëder, haben die größte Ähnlichkeit mit denen des Vesuvians, S. 161, sind aber in der Regel durch starkes Vorherrschen der Prismenflächen langgestreckt und stabartig, worauf sich der Name bezieht. Die Oberfläche der Prismen ist oft vertikal gestreift, und nicht selten rauh. Theilbarkeit nach den Prismenflächen. $S. = 5 \dots 5,5$; spec. Gew. $= 2,6 \dots 2,8$. Glasglanz, auf den Theilungsflächen perlmutterartig; durchsichtig in allen Größen; selten farblos, gewöhnlich gefärbt aber meist eräbe, weiß, grau, grün und roth. Silicat von Thonerde mit einem Bisilicat

von Kalk und Natron. Schmilzt zum bläulichen, trüben Glase. Verwittert und wird dabey undurchsichtig.

Man findet den Skapolith theils in Crystallen, theils in stängeligen und körnigen Aggregaten, und unterscheidet nach den Verhältnissen der Crystallisation, der Farbe und Durchsichtigkeit folgende Abänderungen:

Mejonit; begreift die farblosen, durchsichtigen, vollkommen ausgebildeten Crystalle, von kurz-säulenförmiger Gestalt, oder die körnigen Aggregate, die in Drüsenhöhlen in dem vulcanischen Gesteine des Monte Somma am Vesuv vorkommen.

Skapolith, auch **Wernerit** genannt, umfaßt die grünen, grünen und rothen Varietäten, die gewöhnlich in langstängeligen Crystallen, auch in dicken, körnigen und stängeligen Aggregaten vorkommen. Sie finden sich auf Eisenerz- und Kalklagern im Fenninavischen Gneisgebirge zu Årendal, Longbanshytta, Malssjö, Pargas, auch zu Franklin und Warwic in Nordamerika, und zu Sterzing in Tyrol.

Der dünnstängelige, röthlichweiße Dipyrit oder Schmelzstein findet sich bey Mauldon in den Pyrenäen.

2. Geschlecht. Nephelin.

Crystallsystem drey- und einachsfig. Die Crystalle sind gewöhnlich sechsseitige Prismen mit der horizontalen Endfläche, meist kurz säulenartig, oder dick tafelförmig. Theilbarkeit nach der Endfläche, unvollkommen nach den Seitenflächen. $\rho = 5,5 \dots 5,0$; spec. Gew. = $2,5 \dots 2,6$. Glasglanz, auf den Theilungsflächen Fettglanz. Durchsichtig, bis an den Ranten durchscheinend. Farblos und gefärbt, grau, grün und roth. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, verbunden mit einem Silicat von Natron und Kalk. Schmilzt schwer zu einem bläulichen, farblosen Glase, aber nicht zu einer vollkommenen Kugel. Bildet mit Salzsäure eine Gallerte. Wird in Salpetersäure trübe und wolkig, woher der Name Nephelin, vom griechischen *nephelos*, Wolke. Man unterscheidet eigentlichen Nephelin, welcher in kleinen Crystallen und körnigen Stücken in Dolomitblöcken am Monte Somma, im basaltischen Gesteine am Cap di Bone, in einigen älteren Laven in der Gegend von Rom, im

Dolerit des Rapsbuckels im Odenwald, und im Basalt des Läßelberges am Kaiserstuhl im Breisgau gefunden wird, und

Glaskolith oder Fettstein, welcher in derben, theilbaren Massen von grüner und rother Farbe bey Laurvig und Fredrikssdärn in Norwegen, im Spenit eingewachsen vorkommt.

Zum Nephelin gehören auch die von italienischen Mineralogen voreilig Davyn, Cavolinit und Deubantit genannten Mineralien.

3. Geschlecht. Chlaskolith.

Syn. Hohlspath, Macle.


Crystallsystem nicht genau bestimmt, wahrscheinlich ein- und einachsfig. Findet sich in eingewachsenen, langgestreckten Prismen, die, sonderbarer Weise, in der Richtung der Achse hohl, und mit der Masse des umgebenden Gesteins (Thonschiefer) erfüllt sind. Von dieser Ausfüllung laufen oft vier dünne Blättchen derselben Substanz nach den Kanten des Prismas, so daß der Querschnitt desselben wie ein Kreuz oder wie ein griechisches X

erscheint, Fig. 73. Zuweilen liegt auch an jeder Ecke eine prismatische Ausfüllung, Fig. 74, und mitunter kommen auch zusammengesetztere Ausfüllungen vor. Diese seltsame und in ihrer Art einzige Erscheinung ist wahrscheinlich eine Folge einer zwillingartigen Zusammensetzung. Bisweilen sind die Crystalle cylindrisch zugedrückt.

Fig. 73.



Fig. 74.



Theilbar nach den Prismenflächen. $\rho = 5 \dots 5,5$; spec. Gew. = $2,9 \dots 3,0$. Glasglanz, schwacher, fettartiger. Durchscheinend an den Kanten. Meist grünlich, gelblich, röthlichweiß, gelb oder grau. Besteht aus basisch-kieselsaurer Thonerde.

Für sich unschmelzbar. Die schwarzen Partien; brennen sich weiß; die Masse gibt mit Kobaltsolution die blaue Färbung.

Dieses durch die bezeichneten Ausfällungsverhältnisse sehr interessante Mineralgeschlecht findet sich vorzugsweise in Thonschiefer eingewachsen zu Gefrees im Fichtelgebirge, zu St. Jago di Compostella in Spanien, im Departement Morbihan in Frankreich und im Luchon- und Gistainthal in den Pyrenäen.

7. Sippschaft des Wavellits.

1. Geschlecht. Wavellit.

Syn. Lasionit, Hydrargillit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle, im Allgemeinen selten, sind gewöhnlich nabelsförmig und undeutlich, verticale Prismen mit Rhombenoctaëderflächen. Die nabelsförmigen Individuen sind gewöhnlich zu kugelförmigen, traubigen und nierenförmigen Aggregaten verbunden, deren Inneres eine strahlige oder sternförmige Anordnung der Theile zeigt. Theilbarkeit nach den Prismenflächen.

$\rho = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. = $2,2 \dots 2,3$; Glasglanz und Perlmutterglanz; durchsichtig ... durchscheinend. Gewöhnlich granlich-, gelblich-, grünlichweiß. Besteht aus basisch-phosphorsaurer Thonerde mit 26—28 Procent Wasser. Schmilzt auf Kohlen, unter Abgabe von Wasser, zu einer schneeweißen Masse auf, schmilzt aber nicht.

Findet sich auf Klüften im Thonschiefer zu Barnstaple in Devonshire, auf Gängen im Granit zu St. Austle in Cornwall, im kieseligen Thonschiefer am Duintsberg bey Giesen, im Sandstein zu Bbirow bey Beraun in Böhmen, zu Amberg, und in großen nierenförmigen Stücken zu Villa ricca in Brasilien und in einigermaßen deutlichen Crystallen zu Striegis bey Frankenberg in Sachsen. (Striegisan.)

2. Geschlecht. Lazulith.

Syn. Blauspath.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle, selten deutlich, sind spige, rhombische Octaëder, in Combination mit verti-

calen rhombischen Prismen. Weist mit einander und mit Quarz verwachsen, und zu körnigen Aggregaten verbunden.

Theilbarkeit nach der kürzeren Diagonale. $H. = 5 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 3,0 \dots 3,1$; Glasglanz; durchscheinend bis undurchsichtig. Gewöhnlich blau, berliner-, indig-, smalteblau, bläulich- und grünlichweiß, seltener grau oder braun. Besteht aus gewässerter, basisch-phosphorsaurer Thonerde, und ist durch Eisen gefärbt. Brennt sich weiß, schmilzt nicht.

Findet sich am Radelgraben bey Werfen in Salzburg auf Quarztrümmern im Thonschiefer, bey Voralpe in Steyermark auf Quarzlagern in Glimmerschiefer, ferner bey Kriegbach in Obersteyermark und am Rathausberge in Salzburg. Wird hin und wieder zu Dosen verarbeitet.

3. Geschlecht. Türkis.

Syn. Kalait.

Ohne Crystallform und Theilbarkeit. Bildet kugelige, nierenförmige, stalactitische und kleine derbe Stücke.

$H. = 6,0$; spec. Gew. $= 2,8 \dots 3,0$; Glasglanz, schwacher; durchscheinend an den Ranten bis undurchsichtig. Bruch muschelig. Himmelblau bis spangrün. Besteht aus einem Gemenge von phosphorsaurer Thonerde mit phosphorsaurem Kalk und Kieselerde, und ist durch kohlensaures Kupfer oder Kupferorydhydrat gefärbt. Gibt beym Glühen Wasser aus und zerspringt, wird braun, schmilzt nicht.

Soll bey Nichapur in Persien auf Trümmern in einem quarzigen Gestein und als Geschiebe im Schuttlande vorkommen. Bey Jordansmühle in Schlesien und bey Delsitz im Voigtlande wurden Varietäten desselben in neuester Zeit im Kiesel-schiefer gefunden.

Der Türkis war schon den Alten bekannt. Man schätzte ihn der schönen Farbe, Härte und Politurfähigkeit wegen als Schmuckstein, und bezahlte für reine, grünlichblaue Stücke, von 5—6 Linien Größe, 100—240 Gulden. Statt seiner werden häufig Stücke fossiler, durch Kupferoryd gefärbter Thierzähne ausgegeben (abendländischer Türkis, Turquoise odontolitho), die man in der Gegend von Niassk in Sibirien findet. Sie unter-

scheiden sich durch geringere Härte und das eigenthümliche Gefüge vom ächten Türkis.

4. Geschlecht. Amblygonit.

Bildet selten eingewachsene, rauhe, rhombische Prismen, gewöhnlich dagegen crystallinische, blätterige Massen, theilbar nach den Flächen eines rhombischen Prismas.

$\rho = 3,0$; spec. Gew. = 3,0. Glasglanz; durchscheinend bis halbdurchsichtig. Grünlichweiß ins Berg- und Celadongrüne. Besteht aus halbphosphorsaurer Thonerde und Lithon. Schmilzt leicht.

Findet sich selten im Granit zu Klein-Chursdorf bey Penig in Sachsen.

5. Geschlecht. Kryptolith.

Wie jetzt nur verb., in blätterigen Stücken; theilbar nach dreym auf einander rechtwinkelfigen Richtungen. $\rho = 2,5 \dots 3,0$. sp. G. = 2,9 ... 3,3. Glasglanz, auf der vollkommenen Theilungsfläche perlmutterartig; durchscheinend; schnee-, gelblich- und röthlich-weiß, selten bräunlich. Besteht aus flusssäurer Thonerde und flusssäurem Natron. Außerordentlich leicht schmelzbar; schon in der Flamme des Kerzenlichtes. Hat den Namen, weil es dem Eis ähnlich, von dem griechischen Worte Kryos, Eis.

Findet sich im Gneis am Arksuttfjorde in Grönland, in Begleitung von Quarz, Bleiglanz und Eisenspath.

8. Gipschaft des Feldspaths.

1. Geschlecht. Feldspath.

Syn. Orthoklas, Orthose, orthotomer Feldspath, adularer Felsit-Granmit.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Flächen der Grundgestalt, des zwey- und eingliedrigen Octaëders, Fig. 27. S. 59, erscheinen an den Feldspathcrystallen immer untergeordnet, als Flächen eines hinteren schiefen Prismas, dagegen sind Prismenflächen und schiefe Endflächen vorherrschend. Eine ge-

wöhnliche Combination ist, Fig. 75, die des verticalen Prismas

Fig. 75.






Fig. 76.



des Hauptoctaëders, g , mit dem verticalen Prisma $\frac{g}{2}$, der schiefen Endfläche c , der zweyten Seitenfläche b und der hintern Endfläche $2d'$; eine andere, Fig. 76, eine Combination des verticalen Prismas g , der zweyten Seitenfläche b , der schiefen Endfläche c , des hinteren schiefen Prismas o' , und den hinteren schiefen End-

Fig. 77.



flächen d' und $2d'$. Oefters kommen auch schiefe, rechtwinkelige, vierseitige Prismen vor, Fig. 77, welche durch die Seitenflächen a und b , und durch die schiefe Endfläche c gebildet werden.

Fig. 78.





Fig. 79.



Sehr oft kommen Zwillingsscrystalle vor, zu deren Bildung der Feldspath eine sehr große Neigung hat. Die Geseze, nach welchen die Individuen mit einander verbunden sind, bieten ein großes Interesse dar, und weisen theils Durchwachsungen, theils Juxtapositionen nach. Eine häufig, namentlich beym Feldspath von Karlsbad und Elnbogen in Böhmen vorkommende Zwillingbildung zeigt Fig. 78 und 79. Zwey Individuen, Fig. 75 (ohne $\frac{g}{2}$), sind paarweise, parallel

b, um 190° an einander verdreht, dergestalt verbunden, daß an den Zwillingen entweder die rechts von c, oder die links von c gelegenen Flächen b allein erscheinen, wodurch zwey gleiche, aber nur verkehrt ähnliche Körper hervorgebracht werden. Zwillinge dieser Art, mit vorherrschenden b Flächen, so wie einfache Gestalten, sind öfters in Gesteine, zumal in Granite und Porphyre eingewachsen, und erscheinen in der Regel säulenartig, seltener tafelförmig. Die Flächen der verticalen Prismen sind oft vertical, die der schiefen Endfläche d' horizontal gestreift. Theilbarkeit parallel c sehr vollkommen, bereits eben so parallel b; Spuren parallel g. $\rho. = 6,0$; spec. Gew. 2,5 ... 2,58; im verwitterten Zustande bis auf 2,0 herabsinkend. Glasglanz, auf der Theilungsfläche nach c perlmuttartig; durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Bisweilen Farbenwandlung in der Richtung einer Fläche, die mit b (rechts) einen Winkel von $101\frac{1}{2}^\circ$ macht. Farblos und gefärbt, und zwar letzteres gewöhnlich, graulich, gelblich, grünlich, röthlichweiß, grau, fleischroth und ziegelroth, selten spangrün. Spröde. Bruch uneben bis muschelig. Besteht aus dreysach-kieselsaurer Thonerde mit dreysach-kieselsaurem Kali, und enthält von letzterem $16\frac{1}{2}$ Procent. Ist der Verwitterung unterworfen. Schmilzt schwer an den Kanten zu einem halbklaaren, blässigen Glase; wird mit Kobaltsolution an den geschmolzenen Kanten blau.

Man unterscheidet folgende Arten:

1. *Adular*; begreift die reinsten Abänderungen, die gewöhnlich in aufgewachsenen Crystallen, Combinationen der Flächen g und c, oder dieser mit d', seltener in derben Stücken, auf Gängen und in Höhlungen von Grundgebirgs-Gesteinen vorkommen. Sehr oft von Bergcrystall und Chlorit begleitet, von letzterem häufig überzogen oder durchdrungen. Zeigt bisweilen einen eigenthümlichen, innern Perlmutterchein (*Mondstein*), und ist mitunter avanturinartig (*Sonnenstein*). Findet sich vorzüglich in den crystallinischen Gesteinen der Alpen der Schweiz, Tyrols, Salzburgs, sodann im Dauphiné, zu Arendal in Norwegen, am Monte Somma bey Neapel (Eispath) und auf Ceylon.

2. *Gemeiner Feldspath*; umfaßt die weniger reinen, weniger glänzenden und in geringerem Grade durchsichtigen Ab-

Änderungen, besitzt bisweilen Farbenwandelung (Frederiksværn in Norwegen), crystallisirt in verschiedenen Formen, bildet häufig Zwillinge, auch derbe, crystallinische Massen, groß, grob- und feinkörnige, zeigt alle die oben angeführten Färbungen, und wird, wenn er spangrün ist, Amazonenstein genannt. Rissige, durchsichtige Stücke heißt man glasigen Feldspath.

Diese Art ist in älterem Gebirge allverbreitet, und macht einen wesentlichen Gemengtheil des Granites, des Gneises, des Syenites aus, charakterisirt in einzelnen Crystallen eingewachsen die mehrsten Porphyre, und kommt im Grundgebirge oft auf Gängen vor. Ausgezeichnete Abänderungen finden sich zu Karlsbad und Elnbogen in Böhmen, zu Bischoffsheim im Fichtelgebirge, am Gotthardt, zu Baveno in Oberitalien, zu Frederiksværn (der farbenwandelnde), Arendal, Drammen in Norwegen, auf Utten und am Bipsberge in Schweden, und in Sibirien (Amazonenstein).

3. Feldstein; dicht, untheilbar, im Bruche splinterig; schimmernd oder matt, nur an dünnen Ranten durchscheinend. Von wenig lebhaften, in der Regel unregelmäßigen Farben. Unterscheidet sich vom Hornstein, dem er manchmal sehr ähnlich sieht, durch Schmelzbarkeit und geringere Härte. Bildet die Grundmasse vieler Porphyre, einen Gemengtheil des Klingsteins, des Weißsteins und mehrerer anderer Gesteine.

Der Feldspath ist ein sowohl seines Vorkommens und seiner Verbreitung, als seiner Nützlichkeit wegen, sehr wichtiges Mineral. Er liefert bey seiner Verwitterung einen sehr fruchtbaren Boden, nußbar zu verwendende Thonarten, und wird von den Chinesen längst schon als Zusatz zur Porcellanmasse benützt, so wie nunmehr allgemein zur Glasur dieses wichtigen Kunstproducts. Der Amazonenstein wird in Catharinenburg zu Ringsteinen und Dosen, hin und wieder selbst zu Vasen verarbeitet, von welchen sich zwey sehr schöne im kaiserlichen Cabinette zu St. Petersburg befinden. Der Sonnenstein wird als Schmuckstein sehr geachtet, minder der Mondstein.

2. Geschlecht. Ryakolith.

Syn. Sanidin, glasiger Feldspath, zum Theil.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die Crystalle, Fig. 75 und 76 ganz ähnlich, weichen in den Winkeln von den Feldspathcrystallen ab, sind sehr rissig, voller Sprünge, und haben daherwegen früher auch den Namen glasiger Feldspath erhalten. Theilbarkeit wie bey dem Feldspath, und ebenso die Härte. Spec. Gew. = 2,61. Glasglanz, durchsichtig . . . undurchsichtig. Farblos und grau. Besteht aus dreyfach-kieselsaurer Thonerde mit dreyfach-kieselsaurem Kali und Natron, und unterscheidet sich chemisch vom Feldspath durch den Natrongehalt, und dadurch, daß er von Säuren stark angegriffen wird. Vor dem Löthrohr ist er in dünnen Splittern, wie es scheint, etwas leichter schmelzbar als der Adular, wobey er noch stärker, wie dieser, die Flamme gelb färbt.


Findet sich nur im vulcanischen Gebirge, in Laven und trachytischen Bildungen, und darauf bezieht sich der Name, vom griechischen *ryax*, Lava, und *lithos*, Stein. Die Hauptfundorte sind der Vesuv und die Eifel, und hier zumal die Umgebungen des Laacher Sees, wo er in Blöcken mit Augit, Horn, Titanit, Magneteisenstein, Zirkon, als vorwaltende Masse auftritt. Auch scheinen die glasigen Feldspathe der Trachyte vom Drachenfels und dem Mont d'or zum Ryakolith zu gehören, und ohne Zweifel wird man diesen noch in vielen andern vulcanischen Gebirgen auffinden.

3. Geschlecht. Albit.

Syn. Kieselspath, Tetartin.

Crystallsystem ein- und eingliederig. Die seltenen, einfachen

Fig. 8



Crystalle zeigen gewöhnlich die Combination, Fig. 80, worinn die Schließfläche *c*, die Flächen des verticalen Prismas *g* und *g'*, die erste Seitenfläche *a* und die Flächen *o* und *x* auftreten.

In der Regel kommen nur Zwillinge vor von der Beschaffenheit der

Fig. 81.




Fig. 81. Die Zusammensetzungsfläche liegt parallel g' , die Umdrehungsachse ist senkrecht auf derselben, und die Umdrehung $= 180^\circ$. Oefters wiederholt sich die Zusammensetzung mehrfach. Theilbarkeit nach der Fläche c am deutlichsten, weniger deutlich nach g und g' . $\rho. = 6,0 \dots 6,5$; spec. Gew. $= 2,6 \dots 2,63$. Glasglanz, auf der vollkommensten Theilungsfläche

Perlmutterglanz. Durchsichtig bis durchscheinend. Farblos und gefärbt, dieses öfters, und zwar bläulich-, grünlich-, graulich-, gelblich-, röthlichweiß, fleischroth und isabellgelb. Besteht aus dreyfach-kieselsaurer Thonerde mit dreyfach-kieselsaurem Natron. Der Natrongehalt beträgt 9—11 Procent. Schmilzt wie Feldspath. Voraglas das durch Nickeloryd braun gefärbt ist, behält seine Farbe, wenn man Albit einschmelzt, während es bey dem Einschmelzen von Feldspath blau wird.

Crystallisiert und verb, in blätterigen, gebogen strahligen, bisweilen blumig gruppierten Massen. Vertritt in manchem Granite die Stelle des Feldspaths, so im Granite vom Hausacker bey Heidelberg, vom Wildthal bey Freiburg, Thurnsdorf und Penig in Sachsen, von Siebenlehn und Vorstendorf bey Freiberg, namentlich in sogenannten Schriftgraniten; in strahligen Partien in den Graniten von Brodbo, Finsbo, Kimito in Schweden, zu Roczna in Mähren, Chesterfield in Nordamerica. Bei Zell im Zillertal und zu Gasteln in Salzburg hat man ihn auf Quarzgängen gefunden, zu Arendal in Begleitung von Pistazit und überdieß in Schlesien, zu Wiasl, Kerasbinsk und Nertschinsk in Sibirien und an vielen anderen Orten.

4. Geschlecht. Periklin.

Crystallsystem ein- und eingliederig. Eine der gewöhnlichsten und einfachsten Crystallformen ist in Fig. 82 dargestellt, eine Combination des verticalen Prisma's g und g' mit der schiefen Endfläche c , der

Fig. 82.



Seitenfläche *b* und der Fläche *x*. Einfache Crystalle sind selten, und es gibt fast keinen Crystall, der nicht Spuren einer Zwillingbildung an sich trüge, und diese gibt sich zu erkennen durch doppelte Streifung auf der Endfläche *c* und durch optisches Hervorbrechen einzelner Theile des einen Individuums auf den Seitenflächen des andern. Die hervorspringenden Theile bilden charakteristische stumpf aus- oder einspringende Winkel, welche durch den Lichtreflex sehr bemerklich sind. Die Crystalle sind meist niedrig mit vorherrschender *c* Fläche.

Theilbarkeit sehr vollkommen nach *e*, weniger nach *g'*, und noch weniger nach *g*. $\rho = 6,0$; spec. Gew. = 2,53 ... 2,57. Glasglanz; auf *c* und *g'* als Theilungsflächen, Perlmutterglanz; durchscheinend, bis an den Kanten durchscheinend; meist trüber als Albit. Farblos und gefärbt, graulich, gelblich, röthlichweiß. Besteht aus dreysachkieselsaurer Thonerde mit dreysachkieselsaurem Natron und Kali. (18,93 Thonerde, 67,94 Kieselerde, 9,98 Natron, 2,41 Kali.) Dünne Splitter schmelzen zu einem blässigen, halbdurchsichtigen Glase.

Findet sich theils crySTALLISIRT, theils derb in großkörniger Zusammensetzung, ausgezeichnet am Gotthardt, auf der Saualpe in Kärnthen, zu Pfunders in Tyrol, derb bey Böblitz im Erzgebirge, endlich als Gemengtheil von Porubrandesteinen.

5. Geschlecht. Labrador.

Crystallsystem ein- und eingliederig. Ein beobachteter Crystall hat Aehnlichkeit mit Fig. 75, und dieß ist der einzige bekannte. Sonst nur derb, in blätterigen Stücken; theilbar, sehr deutlich nach *g'*, am vollkommensten parallel der schiefen Endfläche, unvollkommen nach *g*. Die große Neigung, welche dieses Geschlecht zur Zwillingbildung hat, verräth sich sogar bey verben. Massen, durch das parallel gestrichelte Ansehen der Flächen, oder eine bandartige Streifung, welche in die allerkleinste Linirung übergeht. Die Zusammensetzung theils wie beym Albit, theils parallel der schiefen Endfläche.

$\rho = 6,0$; spec. Gew. = 2,68 ... 2,72; Glasglanz; durchscheinend an den Kanten und in dünnen Splittern. Ausgezeichnete Farbenwandlung, mit glänzend blauer, grüner, seltener gelber und rother Farbe, in der Richtung der *g* Fläche, wenn das

Licht unmittelbar auf sie fällt, in der Richtung der g' Fläche, wenn das Licht durch diejenige g Fläche einfällt, welche mit der Fläche g' einen stumpfen Winkel macht. Sehr glänzend zeigt sich diese Farbenwandlung, wenn die bezüglichen Flächen angeschliffen sind, dabey macht sich die Zwillingstructur auffallend bemerklich durch dunkle, parallele, mehr oder weniger breite Streifen, welche zwischen den farbigen Stellen liegen, und die erst alsdann farbig werden, wenn man die Richtung der Fläche ändert, während nur die übrigen Stellen sich verdunkeln.

Besteht aus einfach-kieselsaurer Thonerde mit dreysach-kieselsaurem Kalk und Natron, und ist somit ein Kalk-Natron-Feldspath. (26,50 Thonerde, 11 Kalk, 4 Natron, 55,75 Kieselerde.) Verhält sich vor dem Löthrohr wie Feldspath. Löst sich in concentrirter Salzsäure auf.

Findet sich in Gesechieben und stumpfseitigen Stücken auf der Paulsinsel an der Labradorküste in Nordamerica, in Ingermannland und bey Peterhof in Finnland. Im körnigen und dichten Zustande bildet er den feldspathigen Gemengtheil vieler Gesteine, wie der mehren Syenite, vieler Grünsieine und Dolerite, und einiger Meteorsteine.


Der Labrador ist seiner Farbenwandlung, so wie seines Vorkommens wegen, ein sehr wichtiges Mineralgeschlecht. Man verwendet ihn zu Ring- und Nadelsteinen, Dosen und Wasen.

6. Geschlecht. Anorthit.

Syn. Christianit.

Crystallsystem ein- und eingliedrig. Die Crystalle ähneln denen des Albits und sind kurz säulenartig. Eine gewöhnliche

Fig. 83.



Combination ist in Fig. 83 dargestellt. Selten kommen Zwillinge vor, nach dem Gesez der Albitzwillinge gebildet. Theilbarkeit vollkommen nach c und g . ρ . = 6,0; spec. Grw. = 2,65 ... 2,76. Glasglanz, auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz; farblos; durchsichtig. Besteht aus einfach-kieselsaurer Thonerde mit einfach-kieselsaurem Kalk und Kali,

ist ein Kalk-Kali-Feldspath und löst sich in Salzsäure noch leichter auf als Apakolith. (34,46 Thonerde, 20,8 Kalk- und Talkerde, 2 Kali, 44,49 Kieselerde.)

Findet sich zur Zeit einzig am Monte Somma bey Neapel in Dolomitblöcken in kleinen Crystallen und in kleinen, zerbröckelten, körnigen Massen.

7. Geschlecht, Petalit.

Crystallsystem wahrscheinlich ein- und eingliederig. Man nimmt dieß nach der Theilbarkeit an, welche nach zwey sich unter $141\frac{1}{2}^{\circ}$ schneidenden Flächen, nach der einen weit vollkommener als nach der andern, statt findet, und überdieß in einer Richtung, nach welcher der scharfe Winkel der beiden ersten Theilungsflächen abgestumpft wird. Crystalle sind noch nicht beobachtet worden. $\rho = 6,0 \dots 6,5$; spec. Gew. = $2,4 \dots 2,45$; Glasglanz, auf der vollkommensten Theilungsfläche perlmutterartig, auf dem Querbruch fettartig. Durchscheinend. Verb in großförmigen oder blätterigen Stücken. Phosphorescirt beim Erwärmen mit blauem Lichte. Besteht aus dreysach-kieselsaurer Thonerde mit dreysach-kieselsaurem Lithon, und ist somit ein Lithon-Feldspath. (17,41 Thonerde, 5,16 Lithon, 74,17 Kieselerde.) Schmilzt wie gewöhnlicher Feldspath. Mit Flußspath und doppelt-schwefelsaurem Kali vermischt, und damit zum Schmelzen erhitzt, färbt er die Löthrohrflamme purpurroth.

Findet sich bis jetzt nur verb, von Feldspath, Schörl und Lepidolith begleitet, auf einem Lager im Grundgebirge auf der Insel Utö in Schweden. Neuerlich will man ihn auch am Ontariosee in Nordamerica gefunden haben.

8. Geschlecht. Oligoklas.

Die sehr seltenen Crystalle ähneln der Fig. 75. S. 189, und das Crystallsystem ist wahrscheinlich das ein- und eingliederige. Theilbarkeit nach den Flächen eines schiefen, rhomboëdischen Prismas, am vollkommensten nach der Endfläche. $\rho = 6,0$; spec. Gew. = $2,64 \dots 2,66$; Glasglanz, auf der vollkommensten Theilungsfläche perlmutterartig, auf dem Querbruch fettartig; durchscheinend an den Kanten; farblos, ins Graue und Grüne

geneigt, auch gelblichgrün. Gewöhnlich berbe, blätterige Massen. Besteht aus doppelt-kieselsaurer Thonerde und dreifach-kieselsaurem Natron, mit einem kleinen Gehalt an Kali, Kalk und Bittererde. (24 Thonerde, 8,11 Natron, 63,70 Kieselerde.) Schmilzt leichter als Feldspath und schwillt auf, ehe er schmilzt. Findet sich vorzüglich im granitischen Gneis der Gegend von Stockholm, bey Arendal und Saurwig in Norwegen, zu Hohe-Tanne unterhalb Freiberg und zu Strauchhahn bey Rodach im Coburgischen im Basalt.

9. Geschlecht. Spodumen.

Syn. Triphan.

Bis jetzt nur verb gefunden in theilbaren Stücken, die sich nach den Seitenflächen eines rhombischen Prismas spalten lassen; das Crystallsystem wahrscheinlich ein- und einachsfig. $\rho = 6,5 \dots 7,0$; spec. Gew. = $3,1 \dots 3,2$; Glasglanz; durchscheinend bis an den Kanten durchscheinend. Farblos und gefärbt, grünlichweiß, bl. und apfelgrün, grünlichgrau und berggrün. Besteht aus doppelt-kieselsaurer Thonerde und doppelt-kieselsaurem Lithon. (28,77 Thonerde, 5,6 Lithon, 63,3 Kieselerde.) Schmilzt für sich zu einem klaren, beynahe ungefärbten Glase, färbt, mit Flußspath und doppelt-schwefelsaurem Kali gemengt eingeschmolzen, die Löthrohrflamme purpurroth.

Findet sich im Grundgebirge, mit Quarz, Schörl und anderen Feldspathen verwachsen, in berben Massen auf Utben in Schweden, bey Sterzing und Eisens in Tyrol, zu Sterling in Massachusetts, bey Dublin in Irland, und zu Pearhead in Schottland.

10. Geschlecht. Andalusit.

Syn. Feldspath apyra.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle sind rhombische Prismen mit horizontaler Endfläche, und oft treten auch Flächen eines horizontalen Prismas auf, welche die Ecken abstumpfen. Der Habitus der Crystalle ist lang säulenartig, ihre Oberfläche meist rauh und uneben, mit Glimmerblättchen bedeckt. Theilbarkeit nach den Prismenflächen. $\rho = 7,5$; spec. Gew.

= 3,0 ... 3,2. Glasglanz, schwacher, auf dem Querbruch fettartig; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Perl- und aschgrau, fleisch- und pfirsichblüthroth, röthlichbraun und graulichviolett. Crystallisiert, die Crystalle auf- und zusammengewachsen, seltener eingewachsen; verb in fädigen und körnigen Massen. Besteht aus zweydrittel-Kieselsaurer Thonerde. (60,5 Thonerde, 38,5 Kieselerde.) Für sich unschmelzbar; wird mit Kobaltsolution blau.

Wurde zuerst in Andalusien gefunden, daher der Name. Kommt in schönen Crystallen zu Eisens in Tyrol vor, auch zu Herzogau und Lahmerwinkel in Bayern, zu Jglau in Mähren; auf Elba, in Schottland und Nordamerica.

11. Geschlecht. Bildstein.

Syn. Agalmatolith.

Findet sich nur in verben, untheilbaren Stücken. $\rho = 2,0$; spec. Gew. = 2,8; Fettglanz, schwacher. Durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Immer gefärbt, blaugrün, gelb, roth und braun; die Farben wechseln häufig in Flecken und Streifen. Wird durch Reiben mit einem harten Körper etwas glänzender. Fühlt sich etwas fettig an. Bruch splitterig. Läßt sich schneiden. Besteht aus dreysach-Kieselsaurer Thonerde. (24,54 Thonerde, 72,40 Kieselerde, 2,85 Eisenoryd.) Schmilzt kaum an den dünnsten Splintern. Wir erhalten dieses Mineral fast einzig aus China, und zwar immer verarbeitet zu Figuren, Götzenbildern, Vasen. Es scheint dort im Grundgebirge vorzukommen. Auch wird Nagayag in Ungarn als Fundort angegeben. In Eisens in Tyrol kommen bisweilen weiche Crystalle mit Andalusitform vor, welche dem Bildstein sehr nahe stehen.

Der Feldspath-Gipschaft schließen sich an: der Catrobit oder Dipleit, bis jetzt nur auf der Insel Amtof, an der nordamericanischen Küste Labrador, gefunden, aus einfachen Silicaten von Thonerde, Kalk und Kali bestehend; der Saussurit, als Gemengtheil des Gabbro, in losen Blöcken dieses Gesteins zuerst von dem berühmten Saussure am Ufer des Genfersees beobachtet, und später auch am Bacher in Steyermarl, im Saalfelder Thal in Wallis u. a. v. a. D. gefunden, ein Silicat von

Thonerde mit einem Bisulfat von Kalk und Natron; ferner der Weisfit und der Triclasit von Fahlun.

9. Sippschaft des Cyanits.

1. Geschlecht. Cyanit.

Cyn. Disthen, Rhätizit.

Crystallsystem ein- und eingliederig. Die Crystalle sind lange, säulenförmige, etwas breite rhomboidische Prismen mit schiefer Endfläche und Abstumpfungen der Prismenkanten. Häufig Zwillinge, die Zusammensetzungsfläche parallel der breiteren Seitenfläche, die Umdrehungsachse senkrecht darauf. Dadurch entstehen rinnenartig einspringende Kanten. Die Crystalle oftmals gekrümmt und öfters (die Gotthardter) auf eine merkwürdige Weise mit den Crystallen des Stauroliths verwachsen zu einem zwitterartigen Ganzen. Oberfläche der Prismenflächen theils vertical, theils horizontal gestreift. Theilbarkeit vollkommen nach der breiteren, weniger vollkommen nach der schmälern Seitenfläche, unvollkommen nach der Endfläche. $H. = 5 \dots 7$; verschieden auf verschiedenen Flächen, und auf der breiteren Prismenfläche selbst nach verschiedenen Richtungen. Glasglanz, auf der breiteren Seitenfläche Perlmutterglanz. Spec. Gew. = $3,5 \dots 3,7$; farblos und gefärbt; milchweiß, bläulichgrau, himmelblau, berlinerblau, seladongrün (Cyanit); oder graulich-, gelblichweiß, ocker- gelb, ziegelroth, bläulich- und (durch eingemengten Graphit) schwärzlichgrau (Rhätizit). Durchsichtig bis durchscheinend. Durch Reiben werden einige Crystalle positiv-, andere negativ-electrisch (deshalb, und wegen der verschiedenen Härte, der Name Disthen, von *dis*, zweifach, und *sthenos*, Kraft). (64 Thonerde, 36 Kieselerde.)

Besteht aus halb-kieselsaurer Thonerde. Brennt sich in strengem Feuer weiß, ohne zu schmelzen, und wird dann mit Cobaltsolution schön blau.

Findet sich theils in einfachen Crystallen, theils in Zwillingen, eingewachsen, ferner verb in blätterigen, stängeligen und faserigen Massen, insbesondere im Glimmer, Talk- und Thonschiefer

der Alpen, von Granat und Staurolith begleitet. Gotthardt, Campo longo, Simplon, Pfitsch und Grainer in Tyrol, Bacher in Steyermark, Sauvalpe in Kärnthen; im Weißstein bey Penig in Sachsen; zu Gängerhof bey Karlsbad in derben, blätterigen Massen, dann zu Kiasl und Catharinenburg in Sibirien, in Norwegen, Schottland, endlich in sehr großen, mitunter 1 Fuß messenden, Crystallen in Pennsylvanien.

Zum Spangit ist auch der Fibrolith oder Faserkiesel, auch Bucholzit genannt, zu rechnen, der aus einem innigen Gemenge von Rhätizit und Quarz besteht.

2. Geschlecht. Saphirin.

Bildet derbe, crystallinische, theilbare Massen von saphirblauer Farbe, die sich ins Grüne zieht; Glasglanz; durchscheinend; $\rho. = 7 \dots 8$; spec. Gew. $= 3,4$. Besteht aus viertelkieselsaurer Thonerde, verbunden mit einem Aluminat der Bittererde. (68,1 Thonerde, 14,5 Kieselerde, 16,8 Kalkerde, 3,9 Eisenoxydul.) Für sich unschmelzbar; wird mit Cobaltsolution schön blau.

Bis jetzt nur zu Fischenaas auf Grönland im Glimmerschiefer eingewachsen gefunden.

3. Geschlecht. Sillimanit.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die häufig sehr dünnen und zu Büscheln zusammengehäuften Crystalle sind rhombische Prismen mit einer schiefen Endfläche, häufig gestreift, mitunter etwas gekrümmt oder gedreht. Theilbarkeit nach der Richtung der größeren Seitenkante. $\rho. = 6 \dots 6,5$; spec. Gew. $= 3,4$. Glasglanz auf dem Bruche, Fettglanz auf den Crystallflächen. Durchsichtig bis durchscheinend an den Ranten. Farblos, gelblich, grau und braun. Besteht aus kieselsaurer Thon- und Zirconerde. Schmilzt weder für sich, noch mit Borax, auch wird er nicht von Säuren angegriffen. Findet sich in einem Quarz gange im Gneis innerhalb der Stadt Saybrook in Connecticut, Nordamerica.

10. Gipschaft des Gadoinit.

1. Geschlecht. Gadoinit.

Die Crystalle sind schiefe, rhombische Prismen, welche dem zwey- und eingliedrigen Crystallsystem angehören und sich höchst selten finden. Spuren von Theilbarkeit. $\rho = 6,5 \dots 7,0$; spec. Gew. = $4,0 \dots 4,3$. Glasglanz, oft fettartig. Beynahe undurchsichtig. Farbe schwarz, braun und gelb. Bruch muschelig splinterig. Meist eingesprengt und verb. Besteht aus kieselhafter Yttererde und kieselhafter Cer- und Eisenoxydul. (45 Yttererde, 17,91 Ceroxydul, 11,43 Eisenoxydul, 25,9 Kieselerde.) Schmilzt in strengem Feuer. Ein seltenes Mineral. Findet sich im Granit zu Brodbo, Finbo, Korarvet und Ytterby in Schweden.

2. Geschlecht. Orthit.

Bildet lange und schmale, geradstrahlige Massen und runde Körner. $\rho = 8,0$; spec. Gew. = $3,28$. Aschgrau und schwarz, durch Verwitterung braun. Glasglanz; undurchsichtig; Bruch muschelig. Wasserhaltiges Silicat von Thonerde, mit den Silicaten des Eisen-, Mangan- und Ceroxyduls, der Kalk- und Yttererde verbunden. (Orthit von Finbo: 14 Thonerde, 36,25 Kieselerde, 11,42 Eisenoxydul, 1,36 Manganoxydul, 17,39 Ceroxydul, 4,69 Kalkerde, 3,80 Yttererde und 3,7 Wasser). Schmilzt unter Auflochen zu einem schwarzen, blasigen Glase. Ebenfalls selten. Findet sich zu Finbo, auf Schepsholmen bey Stockholm, zu Linköping in Schweden und zu Hitterön in Norwegen.

3. Geschlecht. Allanit.

Syn. Cerin.

Die Crystalle gehören zum ein- und einachsigen System und sind geschobene, viersseitige Prismen, mit Abstumpfung der Seitenkanten und einer Zuschärfung an den Enden durch Flächen zweyer übereinander liegender horizontaler Prismen. Theilbarkeit nach dem rhombischen Prisma. $\rho = 5 \dots 6,0$; spec. Gew. = $4,0 \dots 4,2$. Glanz metallisch, fettartig; durchscheinend in dünnen

Spalttern ... undurchsichtig. Farbe bräunlich- und grünlichschwarz. Besteht aus kiesel-saurer Thonerde mit kiesel-saurer Kalkerde und kiesel-saurem Cer- und Eisenorydul. (A. von der Bastnäsgrube: 30,17 Kiesel-erde, 11,31 Thonerde, 9,12 Kalkerde, 28,79 Cer-orydul, 20,72 Eisenorydul.) Schmilzt zur schwarzen, dem Magnete folg-samen, Kugel. Findet sich gewöhnlich verb., auf Grön-land und auf Bastnäsgrube zu Riddarhyttan in Schweden.

4. Geschlecht. Yttrotantalit.

Die Crystalle sind, nicht näher bestimmte, rhombische Pris-men, mit unvollkommener Theilbarkeit nach ihren Flächen. $H. = 6,0 \dots 6,5$; spec. Gew. $= 3,3 \dots 3,8$; Metallglanz, unvoll-kommener, öfters fettartig; durchscheinend an den Ranten bis undurchsichtig. Bräunlich und eisen-schwarz, ins Gelblichbraune. Haselnuß-große oder kleinere eingewachsene Stücke. Blätterig oder körnig. Besteht aus zwey Drittel tantal-saurer Yttererde. Ist gewöhnlich mechanisch gemengt mit tantal-saurem Kalk und Uran, und bisweilen mit Wolfram und Tantalit, wie aus nach-stehender Analyse ersichtlich ist, welche Berzelius bekannt ge-macht hat, und wornach der bräunliche Yttrotantalit besteht aus: 60,12 Tantal-säure, 29,78 Yttererde, 1,04 Wolfram-säure, 1,55 Eisenoryd, 0,62 Uranoryd, 0,50 Kalk.

Eines der seltensten Mineralien. Findet sich sehr sparsam zu Finbo, Ytterby, Korarsvet in Schweden, und soll auch in Grönland vorkommen.

5. Geschlecht. Polymignit.

Die Crystalle sind langgezogene, rhombische Prismen, durch ein Rhomben-octaëder zugespitzt, mit vorherrschenden Seitenflächen. Spuren von Theilbarkeit. $H. = 6,5$; spec. Gew. 4,8. Metall-glantz; undurchsichtig; schwarz. Ist durch die große Zahl seiner Bestandtheile ausgezeichnet, worauf sich der Name bezieht. Berzelius fand darinn: 11,5 Yttererde, 12,20 Eisenorydul, 4,20 Kalkerde, 2,70 Manganoryd, 5,0 Ceroryd, 14,14 Zircon-erde, 46,30 Titansäure, nebst Spuren von Kiesel-erde, Bittererde, Kali und Zinnoryd. Vor dem Löthrohr unveränderlich.

Die Steinschneider nennen den Obsidian isländischen Achat und verarbeiten ihn zu kleinen Spiegeln, zu Dosen, Knöpfen und verschiedenen kleinern Bijouteriewaaren. Auf Acenston und in Mexico wird er zu schneidenden Instrumenten verwendet. Die Mexicaner bezeichnen einen Berg, von welchem ihre Urvorderen den zu schneidenden Werkzeugen tauglichen Obsidian bezogen, mit dem Namen Messerberg. In den Umgebungen eines alten mexicanischen Tempels werden gegenwärtig sehr viele einzelne, kurze, Messerklingen ähnliche, Stücke ausgegraben.

4. Geschlecht. Bimsstein.

Blasige, schwammige Masse, wahrscheinlich durch längeres Schmelzen des Obsidians an der Luft, gebildet, und zuweilen vollkommen einem blasigen Glase ähnlich. So sehr vonellen und Blasen erfüllt, daß ihr Raum denjenigen der Bimssteinsubstanz oft mehreremal übertrifft, woher die scheinbare Leichtigkeit, und die bey einem Mineralkörper auffallende Eigenschaft herrühret, daß er auf Wasser schwimmt. Im gepulverten Zustande hat er ein spec. Gew. von 2,19 bis 2,20, und sinkt mithin im Wasser unter. $\rho = 6,0$. Glasglanz in den Perlmutterglanz und Seidenglanz geneigt. Durchsichtig bis durchscheinend an den Ranten. Farblos, grau, gelblich, selten bräunlichschwarz. Sehr spröde. Fühlt sich rauh an. Besteht aus einer Verbindung von sechsfach-kieselsaurer Thonerde mit sechsfach-kieselsaurem Natron und Kali, und ist bisweilen durch Eisen und Mangan gefärbt. (Der von Lipari enthält 77,5 Kiesel-erde, 17,5 Thonerde, 3,0 Natron und Kali, 1,75 Eisen und Mangan.) Schmilzt zu einem blasigen Glase.

Findet sich nur im vulcanischen Gebirge, und bereits auf allen Vulcanen, zuweilen auf der Oberfläche von Obsidianströmen. Ist ein gewöhnlicher Auswürfling vieler Vulcane, und wird von ihnen manchmal in erstaunlicher Menge ausgeworfen, dergestalt, daß wenn die Feuerberge sich in der Nähe des Meeres befinden, dieses weithin mit Bimssteinstücken bedeckt wird. Als Auswürfling der alten, erloschenen Feuerberge der Eifel, liegt Bimsstein, in dem Busen zwischen Wendorf und Neuwied, und rückwärts

bis hinter Sayn allenthalben auf den Feldern umher. Man gebraucht ihn zum Schleifen und Polieren, und im zerstoßenen Zustande auch zum Filtrieren:

12. Gipschaft des Diaspors.

1. Geschlecht. Diaspor.

Derbe, crystallinische, körnige oder blätterige Masse, mit Theilbarkeit nach der Richtung eines rhombischen Prismas und nach einer Abstumpfungsfäche der scharfen Seitenkanten. Crystallsystem vielleicht ein- und eingliedrig. $\rho = 5,5$; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6. Glasglanz auf den Theilungsflächen. Bruch uneben, fettglänzend. Durchsichtig bis durchscheinend in zarten Blättchen. Farblos, gelblich und röthlich, durch einen dünnen Ueberzug von Eisenrost oder Eisenoryd. Besteht aus Thonerde-Hydrat. (Heß fand im Ural'schen 85,44 Thonerde, 14,56 Wasser.) Zerknistert beym Glähen, und zerfällt in kleine Schuppen; gibt Wasser aus, wird mit Cobaltsolution schön blau.

Der Fundort des schon längere Zeit die Aufmerksamkeit des Naturfreundes erregenden Minerals war bis vor einigen Jahren unbekannt, wo Dr. Fiedler nachwies, daß es bey dem Dorfe Kosoiobrod, unweit Ekatharinenburg, in Sibirien, in einem Marmerbruch Gänge in körnigem Kalkstein bildet.

2. Geschlecht. Wörthit.

Zur Zeit nur in crystallinischen, blätterigen, theilbaren Massen bekannt. $\rho = 7,5$; spec. Gew. = 3,0; durchscheinend; Glanz auf den Theilungsflächen perlmutterartig. Besteht aus Thonerde-Hydrat und kieselhaurer Thonerde. (40,79 Kieselerde, 54,45 Thonerde, 4,76 Wasser.) Kommt im scandinavischen Granit mit Skapolith vor.

3. Geschlecht. Pyrargillit.

Derb, dicht; zuweilen in Stücken, die einem vierseitigen Prisma mit abgestumpften Kanten ähnlich sind. Oft mit Chloritschuppen durchzogen. $\rho = 3 \dots 3,5$; spec. Gew. = 2,5.

zu 24,6 verhalten, oder Bistillate, worin diese Erden sich zu einander verhalten wie 59 zu 41, oder wie 57 zu 43. Alle Thone werden durch Glühen hart, so daß sie am Stahle Funken geben, und bilden hernach mit Wasser keinen bildsamen Teig mehr. Sie ziehen sich in der Hitze insgesammt stark zusammen, schwinden. Die Thone von Stourbridge, Rouen, Högens, Eöln, Großallmerode können als Repräsentanten der wichtigsten, reineren Thonabänderungen betrachtet werden. Letzterer enthält im Durchschnitt 37,8 Kiesel Erde, 27,88 Thonerde, 33,96 Wasser und 0,18 Eisenoryd.

Nach den verschiedenen Graden der Reinheit des Thons unterscheidet man:

1. Töpferthon, Pfeifenthon; begreift die reinsten Abänderungen, welche auch mit dem Namen Weißerde bezeichnet werden, und sich in der Regel, selbst bey grauer Färbung, weiß brennen.

Außer den genannten Fundorten können noch als ausgezeichnete Gränzstadt im Elsaß, Balg und Oberweiler unfern Baden am Schwarzwald, Lenne im Braunschweigischen, Weilburg in Nassau, Audennes bey Namür in Belgien, Devonshire in England angeführt werden. Häufig ein Begleiter der Braunkohlenlager.

2. Lehm. Leimen.

Unreiner, ockergelber, gelblichgrauer oder brauner Thon, der sich, vermöge seines Eisengehaltes, welcher in der Regel ziemlich groß ist, roth brennt und in strengem Feuer zu einer grünen Schlacke schmilzt. Enthält gewöhnlich Quarzförner eingemengt, die man schon durch das Gefühl unterscheidet, und öfters auch Körner von kohlensaurem Kalk, die sich durch das Ausbrausen der Masse zu erkennen geben, wenn man sie mit einer Säure übergießt. Zerfällt im Wasser.

3. Letten.

Unreiner Thon, von, durch kohlige Theile bewirkter, grauer, und zwar vorherrschend bläulichgrauer, Farbe und schieferigem Gefüge, was oftmals von eingemengten Glimmerblättchen herzuführen scheint. Saugt in Menge Wasser ein, bildet damit eine

sehr zähe, fett anzufühlende Masse, hält das Wasser fest zurück, zieht sich beim Austrocknen stark zusammen und wird hart.

Die bezeichneten Abänderungen des Thons, namentlich die unreineren, sind ganz allgemein verbreitet, von den älteren Gebirgsbildungen an bis herauf zu den jüngsten, bis zu den heutigen Alluvionen der Wasser, und namentlich sind die unreineren Abänderungen in allen Thälern und Niederungen anzutreffen, so daß es unnöthig ist, weitere specielle Fundorte anzuführen.

Die Zusammensetzung der Thone ist, wie schon bemerkt, von der Art, daß man keine Mischung nennen kann, welche für alle gilt. Dieß hat seinen Grund in ihrer Entstehungsweise. Sie werden vorzüglich und fortwährend bey der Zersetzung selbstspaltiger Gesteine, des Granits, des Gneises, des Porphyr's u.s.w., auch bey der Zersetzung von Thonstein und der Zerstörung von Sandsteinen gebildet.

Der Thon ist eines der nächlichsten Mineralien. Die reinsten Abänderungen werden zu Steingut, Fayence und feinerem Töpfergeschirr, so wie zu Tabackspfeifen, verwendet, und wenn sie kalk-, bittererde- und eisenfrey sind, oder davon nur sehr wenig enthalten, zur Anfertigung feuerfester Steine und Schmelzgefäße, zuiegeln für Stahl-, Eisen-, Messing-, Glaschmelzen u.s.w. Fette, reine Thone werden auch zum Waschen, Walken der Lächer, zum Raffinieren des Zuckers, und alle feuerfesten Thone, im gebrannten Zustande, mit großem Vortheil zu Wassermörtel, statt Traß, verwendet. Mit etwas Eisenseile vermengt, und mit Essig zu einem Brei gemacht, geben die reinen, fetten Thone einen sehr guten Kitt für Eisenverbindungen, der starke Hitze aushält.

Der Lehm wird vorzüglich zur Anfertigung von Ziegeln, Backsteinen, irdenen Ofen, gemeinen Ziegeln, gewöhnlicher Töpferwaare, zu Kitt, als Mauerspeise bey Ofen und Feuermauern und zur Formerey auf Gießereyen benützt. Der magere Lehm wird bey dem Pfist-Bau verwendet. Der Fett, welcher kein Wasser durchläßt, wird vorzugsweise zum Ausschlagen von Wasserbehältern, Riansalen, Dämmen benützt und kann, mit einem mageren Thon vermengt, auch in der Ziegeley, so wie zu Töpfergeschirr gebraucht werden. Ein vorzüglich aus Thon bestehender Boden ist naß, kalt, schwer und der Cultur im Allgemeinen un-

günstig. Dagegen ist gebrannter Thon und Lehm für solche Böden ein vortreffliches Düngungsmittel.

2. Geschlecht. Thonstein.

Syn. Verhärteter Thon.

Verb. $H. = 3,0 \dots 5,0$; spec. Gew. $= 2,2 \dots 2,7$. Matt, undurchsichtig. Hängt wenig oder nicht an der Zunge; fühlt sich mager an. Bruch uneben und flachmuschelig, zuweilen feinerdig. Structur im Großen öfters schieferig. Farbe weiß, grau, roth, braun, anrein, in vielen Nuancen, oft wolkig, gestreift, gefleckt, geadert. Besteht aus Gemengen von Tri- und Dillitact der Thonerde, mit einem mehr oder weniger großen Eisengehalt. Man unterscheidet:

1. Gemeinen Thonstein.

Begreift die leichteren, licht gefärbten, eisenarmen, strengflüssigen Abänderungen, welche häufig als Grundmasse von Porphyren und Mandelsteinen erscheinen (Thonsteinporphyre), Schwarzwald, Sachsen, Südtirol, und mitunter auch große Lager in der Gebirgsbildung des Todtliegenden bilden; die Gegend von Chemnitz in Sachsen, Böhmen in Südtirol, Baden im Schwarzwalde können als ausgezeichnete Fundorte gelten.

2. Eisenthon.

Umfaßt die eisenreichen, dunkler gefärbten, schwereren und etwas schmelzbareren Abänderungen, die sich vorzüglich im vulkanischen Gebirge, am Kaiserstuhl im Breisgau, an der Pferdefuppe an der Rhön und in der Bildung des Todtliegenden an den obengenannten Punkten finden.

Beide Abänderungen werden als Bausteine benutzt.

3. Geschlecht. Porzellanerde.

Syn. Kaolin.

Setzen in Afterscrystallen. In der Regel verb und eingesprengt. Zerreiblich. Spec. Gew. $= 2,21$. Matt, undurchsichtig, abfärbend. Hängt wenig an der Zunge; fühlt sich sanft und mager an. Farbe weiß ins Graue und Rothe geneigt. Bruch erdig. Scheint aus einem Gemenge von Thonerde-Silicaten zu bestehen, da die Analysen derselben von einem und demselben Fund-

örte unter einander abweichen. Der Kieselergehalt variiert von 43—63 Procent; der Thonerdegehalt von 25—37 Procent. Einige Porzellanerden enthalten etwas Eisen, und mehrere einen Kalkgehalt von 1—3 Procent. Für sich unschmelzbar.

Findet sich, höchst wahrscheinlich als ein Zerfetzungsproduct von Feldspathen, in Nestern, Gängen und Fagern im Granit, Gneis und Glimmerschiefer, und ist das Hauptmaterial zur Anfertigung des Porzellans, welches die Portugiesen, nach Entdeckung des Seeweges nach Ostindien, zuerst aus China, wo es längst schon dargestellt wurde, nach Europa brachten. Die Porzellanerde von An bey Schneeberg in Sachsen ist die erste, welche (im Jahr 1709) in Europa entdeckt wurde, und zwar durch den Apothekerhelffen Böttger, der 8 Jahre früher, bey Gelegenheit seiner Versuche Gold zu machen, wobey er die rothe Erde von Orylle bey Meissen zu Ziegeln gebrauchte, die Verfertigung des Porzellans entdeckt hatte. Schon im Jahr 1710 wurde die Porzellanerde von An in der Albrechtsburg zu Meissen, woselbst die erste europäische Porzellanfabrik entstand, verarbeitet. Weitere interessante Fundorte sind: Passau in Bayern, Saint Yrieix bey Limoges, Saint Tropez im Var-Departement, Menbe im Lozre-Departement, auch hat man Porzellanerde in Ungarn, England, Rußland gefunden, und in China muß sie ebenfalls in Menge vorkommen.

4. Geschlecht. Cimosit.

Verb; matt; undurchsichtig. $\rho = 1,0 \dots 2,0$; spec. Gewicht = 2,0. Bruch erdig. Fühlt sich sanft an. Weiß, ins Graue und Rothe geneigt. Zerfällt im Wasser, stoßt Luftblaschen aus, und bildet einen bildsamen Teig. Saugt Fett ein. Hat die Zusammensetzung eines wasserhaltigen Thonerde-Trisilicates. (23 Thonerde, 63 Kieselerde, 12 Wasser, 1,25 Eisenoxyd.) Schmilzt für sich nicht.

Findet sich auf der griechischen Insel Argentiera (früher Cimosit), und wird von den dortigen Einwohnern, so wie von denen der übrigen Inseln des Archipelagus, heute noch, wie im Alterthum, statt Seife zum Waschen benutzt. Auch dient der

Gimolit zum Waschen der Tücher, und vortrefflich zum Ausziehen der Fettflecken.

5. Geschlecht. Collyrit.

Derb; matt; schwach an den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. $\rho = 1 \dots 2,0$; spec. Gew. = 2,1. Bruch feinerdig, im Großen flachmuschelig. Fühlt sich etwas fettig an. Hängt stark an der Zunge. Weiß ins Röthliche und Grauliche. Wird in Wasser erst durchscheinend und zerspringt hernach. Besteht aus wasserhaltiger, drittel-kieselsaurer Thonerde (45 Thonerde, 14 Kieselerde, 42 Wasser). Eintert im strengsten Feuer an den Kanten etwas zusammen. Findet sich gangweise im Porphyr zu Schemnitz in Ungarn, und im Sandstein zu Weissenfels in Sachsen.

6. Geschlecht. Steinmark.

Syn. Sächsische Wundererde.

Derb, auch kugelig und als Ueberzug, mitunter locker, feinerdig und flauhartig. $\rho = 2,5$; spec. Gew. = 2,4. Matt; undurchsichtig. Bruch im Kleinen feinerdig, im Großen flachmuschelig. Fühlt sich fein und fettig an; wird durch den Strich glänzend. Hängt stark an der Zunge. Weiß, perlgrau, lavendelblau, ziegel- und fleischroth, auch ockergelb. Oefters gefleckt oder streifig. Besteht aus einem wasserhaltigen Siliccat der Thonerde (36,5 Thonerde, 45,25 Kieselerde, 14,1 Wasser, 2,75 Eisenoryd). Brennt sich weiß, schmilzt aber nicht. Phosphoreszirt mitunter beym Reiben.

Nach dem Zustande der Aggregation unterscheidet man festes und zerreibliches Steinmark. Es findet sich im Thonsteinporphyr zu Rochlitz, auf den Zinnerzlagernstätten zu Ehrenfriedersdorf, Altenberg u.f.w., im Steinkohlengebirge zu Planitz bey Zwitzkau, zu Böhlig im Serpentin, bey Auerbach im Voigtlande in Höhlungen des Topasfelsens, am Harz auf Brauneisensteingängen. Zu Böhlig wird es zum Polieren des Serpentin's benutzt. Ehemals war es in den Apotheken unter dem Namen sächsische Wundererde (*terra miraculosa Saxoniae*) zu finden.

7. Geschlecht. Bergseife.

Derb; matt; undurchsichtig. Leicht und sehr weich. Fühlt sich sehr fettig an; wird durch den Strich fettig glänzend. Bruch feinerdig; färbt nicht ab, schreibt aber. Hängt stark an die Zunge. Zerfällt im Wasser und wird zähe. Bräunlichschwarz. Besteht aus einem wasserhaltigen Bisilicat von Thonerde (26,5 Thonerde, 44 Kieselerde, 20,5 Wasser, nebst 5,0 Eisenoryd und 0,5 Kalk). Sintert in strengem Feuer etwas zusammen.

Findet sich am Nordabhang des Thüringerwaldes bey Waltershausen in dünnen Lagern, abwechselnd mit Thon und Lehm geschichtet, und bey Rabenscheid im Dillenburgischen als Lager im Basalt. Auch werden Bilin in Böhmen und die Insel Skye als Fundorte genannt. In Thüringen wird die Bergseife, bekannt unter dem Namen Volkseife, zum Waschen grober Zeuge angewendet.

8. Geschlecht. Wallerde.

Derb; weich; matt; spec. Gew. = 2,19. Schwach an den Ranten durchscheinend bis undurchsichtig. Fühlt sich sehr fettig an, hängt wenig oder nicht an der Zunge; Bruch uneben und erdig, im Großen flachmuschelig. Zuweilen etwas schieferige Structur. Wird durch den Strich fettig glänzend. Farbe grün, grau, weiß, roth. Saugt Oel und Fett ein; zerfällt im Wasser und bildet eine sehr feine, breyartige, jedoch nicht bildsame Masse. Besteht aus einem wasserhaltigen Trisilicat von Thonerde und Eisenoryd (10 Thonerde, 53 Kieselerde, 9,75 Eisenoryd, 24 Wasser, nebst 1,75 Kalk- und Bittererde, und einer kleinen Einmengung von Kochsalz). Brennt sich weiß und schmilzt zu einem weißen, blasigen Glase.

Findet sich zu Rosswien in Sachsen, bey Feistritz u. e. a. O., am Becher in Steyermark, bey Nimptsch in Schlesien, in Mähren, zu Ryegate in England und an einigen andern Orten. Sie ist das Hauptmaterial zum Walken der Lächer, und eignet sich dazu aus dem Grunde am besten, weil sie die fettigen Theile vortrefflich aussaugt und vermöge der Eigenschaft, im Wasser sich sehr fein zu zertheilen, bey dem Walken sehr gut dazu dient;

die Wollenfäden zusammenzufügen, wodurch die Tücher dichter werden und diejenige Beschaffenheit erlangen, welche sie von den gewöhnlichen Wollenzengen unterscheidet. Man wendet die Wallerde auch zum Waschen wollener Tücher und zum Ausziehen von Fett an.

9. Geschlecht. Bol.

Syn. Lemnische Erde.

Derb und eingesprengt. $\rho = 2,0$; spec. G. = 1,9 ... 2,0; matt; undurchsichtig, selten durchscheinend an den Ranten, Bruch muschelig. Braun in verschiedenen Nuancen, graulich-gelb, ziegelroth und olgrün. Fühlt sich fettig an, wird durch den Strich fettig glänzend. Hängt an der Zunge. Zerspringt im Wasser mit Knistern in kleine Stücke, und zerfällt nach und nach zu einem feinen Pulver. Wasserhaltiges Bisilicat der Thonerde, gewöhnlich durch Eisenorydhydrat gefärbt. Wackenrober fand im Bol vom Salsbühl bey Dransfeld in Hannover 41,9 Kieselerde, 20,9 Thonerde, 24,9 Wasser und 12,2 Eisenoryd. Brennt sich roth und schmilzt an den Ranten zu einer grünen Schlacke.

Findet sich theils im vulcanischen Gebirge auf Klüften und Spalten des Basalts, Dolerits, Klingsteins, theils auf eine ähnliche Weise im Föhhgebirge. Im Alterthum schon war der Bol von Lemnos (dem heutigen Stalimene) bekannt. Er findet sich ferner zu Dransfeld unfern Göttingen, zu Liegnitz und Striegwitz in Schlessen, am Kaiserstuhl im Breisgau, bey Siena in Oberitalien, in Sachsen und Böhmen. In früherer Zeit galt er als Arzneimittel. Er wurde mit Wasser zu einem Teig angemacht, aus dem man Kugeln und runde Zeltchen formte, denen ein aufgedrucktes Siegel erst so recht den eigentlichen Werth erteilen mußte. Daher der Name Siegelerde (*terra sigillata*). Der Bol von Siena wird unter dem Namen *terra di Siena* als Farbmaterial benutzt. Man verwendet ihn weiter zum Grundieren bey der Holzvergoldung, mit Leinöl zu einem Teige angemacht als Kitt, im geschlämmten Zustande als Poltermittel für Glas, Metalle und Steine. Mitunter wird er auch zur An-

fertigung von Formen zum Metallguss und von Gefäßen und Pfeifenköpfen verwendet.

10. Geschlecht. Gelberde.

Verb. matt, undurchsichtig, feinerdig. Weich und zerreiblich; spec. Gewicht = 2,2. Fühlt sich sanft und mager an. Färbt ab. Hängt an der Zunge. Zerfällt im Wasser unter Zischen zu einem Pulver und stößt Luftbläschen aus. Besteht aus wasserhaltiger, kieselaurer Thonerde und kieselurem Eisenoryd. (Kühn fand in der Gelberde von Amberg 33,23 Kieselurde, 14,21 Thonerde, 37,55 Eisenoryd, 13,24 Wasser.) Brennt sich roth. Wird als Farhematerial benutzt, theils roh, theils geschlemmt oder gebrannt, und ist auch unter dem Namen Ockergelb bekannt.

III. Ordnung. Zalkerden.

Durch Zalkerde charakterisirte Mineralien.

1. Sippschaft der Zalkedelsteine.

1. Geschlecht. Spinell.

Reguläres Crystallsystem. Die Crystalle sind Octäeder, Rhombodocäeder, Combinationen dieser beiden Gestalten, zu deren Flächen bisweilen auch noch diejenigen eines Kristallträhers treten. Theilbarkeit nach den Octäederflächen, schwierig. $H. = 8,5$; spec. Gew. 3,4 ... 3,8; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbe roth, ins Blaue, Grüne, Gelbe und Braune verlaufend, auch schwarz. Das Pulver weiß. Besteht aus einem Aluminat der Bittererde, d. h. aus einer Verbindung von Bittererde und Thonerde, worinn letztere die Rolle einer Säure spielt. Genau bezeichnet ist die Verbindung sechsachthausige Bittererde, wosy das Eisenorydul mehr oder weniger an der Stelle der Bittererde auftritt. Für sich unschmelzbar.

Man unterscheidet zwei Gattungen, die sich durch Farbe und Zusammensetzung auszeichnen.

1. Gemeiner Spinell, Talk-Spinell. Begreift die lichter gefärbten Abänderungen, worinn die Talkerde vorherrscht. Roth in verschiedenen Nuancen. Oft carminroth, und daraus ins Coschenill-, Kermesin- und Kirschrothe, so wie ins Blaue und Grüne verlaufend, oder ins Hyacinth- und Blutrothe, und endlich ins Gelbe und Braune. Die coschenillrothen Abänderungen verlaufen sich ins Rosenrothe und Weiße. Blaue und weiße Färbungen kommen indessen selten vor, am seltensten sind grüne Spinelle. Durchsichtig bis durchscheinend. Spec. Gew. 3,5—3,7. Rothe Spinell enthält, nach Bauquelin, 8,78 Bittererde, 82,47 Thonerde und 6,18 Chlorsäure. Die blauen Abänderungen enthalten schon einige Procente Eisen. Schmilzt nicht.

Findet sich vorzüglich auf Ceylon und in Pegu, theils eingewachsen in Dolomit, Kalk und Gneis, theils lose im Sande. Die blauen Abänderungen kommen eingewachsen in Kalkstein zu Aker in Schweden vor.

2. Ceylonit, Eisen-Spinell. Begreift die dunkel gefärbten, schwereren Abänderungen. Schwarz und braun. Die Crystalle nicht selten mit rauher Oberfläche, und häufig in Drusen. Durchscheinend an den Kanten. Spec. Gew. = 3,7 ... 3,8. Ist chemisch durch vorwaltenden Eisengehalt ausgezeichnet. Enthält nach Laugier: 13,0 Bittererde, 16,5 Eisenoryd, 65 Thonerde, 2,0 Kalk. Schmilzt nicht, wird aber in strengem Feuer blau.


Der schwarze Ceylonit, der auch Pleonast genannt wird, findet sich ebenfalls auf Ceylon, wovon er den Namen hat, so dann am Vesuv, in Auswürflingen älterer Eruptionen, am Monzoni im Gassathal, endlich bey Barwick in New-York in ungewöhnlich großen Crystallen von 3—4 Zollen.

Der rothe Spinell ist ein geschätzter Edelstein, und unter dem Namen Rubin-Spinell bekannt. Der blässere, weniger geachtete, heißt Ballas-Rubin (Rubis balais). Man bezahlt für einen schönen, hochrothen Spinell von 24—30 Grän 400 bis 500 Gulden.

2. Geschlecht. Chrysolith.

Cra. Voribot.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Eine der gewöhnlichsten
Fig. 84.



Combinationen ist in Fig. 84 dargestellt, eine Combination des Hauptoctaëders o, mit dem verticalen Prisma g, dem ersten horizontalen Prisma d, dem zweyten horizontalen Prisma 2f, der ersten und der zweyten Seitenfläche a und b und der geraden Endfläche c. Letztere ist öfters rauh und matt, die Oberfläche von a gewöhnlich vertical gestreift. Die Crystalle sind meistens kurz säulenartig; an den Enden herr-

schen in der Regel die Flächen des horizontalen Prismas; nur selten sind die Crystalle durch Vorherrschens der geraden Endfläche tafelförmig. Theilbarkeit nach b deutlich, nach a unendlich.

H. = 5,0 ... 7,0; spec. Gew. = 2,8 ... 3,5; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbe grün, braun, roth. Bruch muschelig. Oft auch körnig und in Körnern.

Besteht aus einem Silicat von Talkerde, welches mit einem Silicat des Eisenoxyduls verbunden ist, mit Spuren von Nickeloryd und Chromoryd.


Man unterscheidet zwei Gattungen.

1. Talk-Chrysolith, Chrysolith und Olivin. Begreift die grünen, härteren und schwereren Abänderungen, in deren Zusammensetzung das Eisenoxydul höchstens $\frac{1}{2}$ von der Menge der Talkerde beträgt. Pistazien-, oliven- und spargelgrün, selten gelb oder braun. Starker Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. H. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. 3,3 ... 3,5. In Crystallen von obiger Form, auch in derben Stücken von körniger Zusammensetzung (Olivin). Stromeyer fand im Chrysolith 50,15 Talkerde, 9,19 Eisenoxydul, 39,73 Kieselnde, 0,82 Nickeloryd und 0,09 Manganorydul. Schmilzt nicht vor dem Löthrohr und behält in der Hitze Durchsichtigkeit und Farbe. Wird von Säuren angegriffen.

Findet sich theils in losen Crystallen, und kommt so aus Aegypten, Natolien und Brasilien, theils in kugelförmigen, körnigen Stücken (Olivin) eingewachsen im Basalte, für den er ganz charakterisirt ist, und im Dolomite. Crystallförmig findet man ihn in den Olivinkauern der Basalte der Eiffel, des Habichtswaldes, Böhmens, Sachsens und der Inseln Palma und Bourbon. Selten kommt er im Syenit von Elfdalen vor. Ganz merkwürdig ist sein Vorkommen im Meteoreisen, wie im pallassischen Eisen. Nach Rose ist auch der sogenannte crySTALLisirte Obsidian vom Messerberg bey Real de Monte in Mexico nichts anderes als crySTALLisirter Chrysolith.

2. Eisen-Chrysolith, Hyalosiderit. Dazu rechnet man die eisenreichen, braunen und rothen, leichteren und schmelzbareren Abänderungen, die sich auch durch eine besondere Flächencombination auszeichnen, welche durch Fig. 88 dargestellt ist.

Fig. 88.



Die Flächen des Octaëders *a* sind sehr zurückgedrängt, die Flächen des verticalen Prismas *g* und des zweiten horizontalen Prismas *2f* dagegen vorherrschend, die Endfläche *e* fehlt, ebenso die erste Seitenfläche *a*; die zweite Seitenfläche *b*, und die Flächen des ersten horizontalen Prismas *d* sind zurückgedrängt; zwischen *g* und *h* liegen aber die Flächen *s* eines neuen verticalen Prismas. Die Crystalle sind ge-

wöhnlich sehr klein und kommen nur eingewachsen vor. Farbe röthlich und gelblichbraun, auch hyacinthroth. $D. = 3,0$; spec. Gew. $= 2,9$; die Oberfläche ist gewöhnlich messinggelb und goldgelb, oder kunt stahlfarbig angelaufen und stark metallisch glänzend; im Innern Glasglanz, etwas fettartig. Durchscheinend an den Kanten. Einzelne Crystalle wirken auf die Magnethadel. Auch derb, körnig zusammengesetzt, und eingeprengt. Enthält beynähe ebensoviel Eisenoxydul als Talkerde und etwas Kali. Im Eisenchrysolith von Sasbach am Kaiserstuhl fand ich 32,40 Talkerde, 29,71 Eisenoxydul, 31,63 Kiesel-erde, 0,48 Mangan-oxyd, 2,2 Thonerde, 2,78 Kali, nebst Spuren von Kalk und

Chromorph. Bildet mit Säuren eine Gallerte. Wird in der Hitze schwarz, dem Magnete folgsam, und schmilzt sofort zu einer schwarzen Schlacke.

Findet sich im Ganzen selten. Der Hauptfundort ist der Kaiserstuhl im Breisgau, wo er im basaltischen Mandelstein von Sasbach und im Dolerite von Ihringen vorkommt.

Beide Gattungen unterliegen der Verwitterung ganz besond. aber der Chrysolith, dessen größerer Gehalt an Eisen oxyd wohl die Ursache davon ist.

Der Chrysolith wird als ein geringeres Edelstein geschätzt. Schön gefärbte, größere Diviniförmige werden öfters zu Schmucksteinen verwendet. Dieses Mineralgeschlecht, ist überdies wegen seines Vorkommens im Meteoriten von großem Interesse, und für den Geognosten von Wichtigkeit, weil man es in allen Basalten findet, und häufig auch in Doleriten, basaltischen Conglomeraten und Tuffen, und selbst in einigen Eyeniten.

Dem Chrysolith steht der Chondroit nahe. Seine Crystalle, sechsseitige Prismen mit einer Zuschärfung an den Enden, sollen dem zwey- und eingliedrigen Crystallsystem angehören. $\rho = 3,5$; spec. Gew. $= 3,1$; Glasglanz, fettartiger, durchsichtig bis durchscheinend; sehr und pomeranzengelb ins Hyacinthrothe, auch grün. Bruch muschelig. Kommt gewöhnlich in eingewachsenen Körnern vor. Besteht aus einfach-klefsaurem Bittererde und halb-klefsaurem Bittererde (54 Bittererde, 22,66 Kieselerde, 4,08 Phosphorsäure, und enthält überdies 2,10 Kali, 2,23 Eisenoxyd und 1,0 Wasser). Findet sich zu New-Yersey in Nordamerika, zu Pangas in Finland, zu Åler in Schweden, zu Boden bey Marienberg in Sachsen.

2. Eigenschaften des Spectakels.

1. Geschlecht. Talkerdehydrat.

Syn. Magnesiadhydrat.

Die Crystalle sind niedrige, sechsseitige Prismen des dreh- und einschigen Crystallsystems, welche eine vollkommene Spaltbarkeit nach der Richtung der Endfläche besitzen. $\rho = 1,9 - 1,5$

spec. Gew. = 2,3; Perlmutterglanz auf der Theilungsfläche; äußerlich fettartiger Glasglanz; durchscheinend, oft nur an den Kanten. Fühlt sich etwas fett an. In dünnen Blättchen biegsam. Farbe weiß ins Grüne. Hängt etwas an der Zunge. Kommt gewöhnlich verb., in blätterigen und strahligen Massen vor. Die Zusammensetzung ist durch den Namen angezeigt. (68,34 Bittererde, 30,90 Wasser, nebst etwas Eisen- und Manganoxyd.) Reagiert schwach alkalisch, gibt beim Glähen Wasser aus, wird undurchsichtig, schmilzt aber nicht. Färbt sich mit Cobaltsolution unter längerer Erhitzung fleischroth. Kommt auf schmalen Gängen im Serpentin vor, zu Hoboken in New-Yersey, zu Porisay in Schottland und auf Unst, einer der Shetland-Inseln.

2. Geschlecht. Speckstein.

Syn. Seifenstein, spanische Kreide.

Astercrystalle, gewöhnlich nach Quarz- und Kalkspathformen gebildet, selten nach Feldspath-, Besuvian- oder Staurolithgestalten. Ohne Theilbarkeit, dicht. ρ . = 1,6 ... 2,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,8; fettartig glänzend oder matt; durchscheinend an den Kanten. Die weiße Farbe ist vorherrschend; oft aber auch grau, gelb, grün, roth und bisweilen mit dendritischen Zeichnungen. Wird durch Reiben fettglänzend und fühlt sich fettig an, etwa wie trockene Seife. Schreibt. Hängt nicht an der Zunge. Vollkommen milde. Bruch uneben oder splitterig. Besteht aus dreifach-kieselsaurer Bittererde, welcher etwas Bittererdehydrat eingemengt ist, und eine kleine Quantität Eisen, welche färbend wirkt. (Speckstein von Baireuth nach Lychneil: Talkerde 30,80, Kieselserde 65,64, Eisenoxyd 3,61, nebst etwas Wasser. Der grüne enthält bisweilen etwas Chromoxyd.) Wird beim Erhitzen unter Abgabe von Wasser erst grau oder schwarz, hart, brennt sich aber bald weiß, und schmilzt in starker Hitze zu einem blasigen Glase.

Findet sich bisweilen im Serpentin, öfters jedoch auf Erz-lagerstätten. Die bekanntesten Fundorte sind Bunsfiedel und Gypsersgrün bey Baireuth, zu Sahla in Schweden, Jöbblitz in

Sachsen; überdieß kommt er in Piemont, Schottland, Frankreich, China vor, und wohl noch in mehreren andern Ländern.

Man benutz den Speckstein zum Polieren weicher Steine und der Gläser, zum Zeichnen auf Tuch — Kleidermacher und Sticker — zu Schnitzwerk, zur Verminderung der Friction, zu Stöpseln auf Glasgefäße, die einer stärkeren Hitze ausgesetzt werden. Die Säge, welche man damit auf Glas macht, hängen so fest an, daß sie, nach dem Abwischen mit einem Tuche, wieder zum Vorschein kommen, wenn man die beschriebene Stelle anhaucht.

Der Seifenstein aus Cornwallis, Soap rock, enthält 15,5 Procent Wasser und eine Beymischung von kiesel-saurer Thonerde; er wird zur Porzellanfabrication benützt.

3. Geschlecht. Serpentin.

Syn. Ophit, Picrolith, Marmalith.

Die beobachteten Crystalle, dem ein- und einachsigen System angehörig, kurze achseitige Prismen, gehören nicht ausgemacht dem Serpentin an. Gewöhnlich verb. $\rho. = 3,0$; spec. Gew. $= 2,5 \dots 2,6$; durchscheinend bis undurchsichtig; Fettglanz, schwacher. Farbe vorherrschend grün in verschiedenen Nüancen; auch weiß, gelb, braun und roth. Mehrere dieser Farben finden sich öfters zusammen, in gefleckten, geaderten, gestramten Zeichnungen. Bruch schalig oder splinterig; milde. Wird durch Reiben glänzender. Findet sich öfters auch in körnigen, blätterigen, stängeligen und faserigen Stücken. Besteht aus doppelt-kiesel-saurer Bittererde, die mit doppelt-gewässerter Bittererde verbunden ist. Die Bittererde ist oft von Eisenorydul, seltener von Kalk, und bisweilen auch von Cerorydul ersetzt. (Serpentin von Gullsjö in Schweden, nach Mosander, 44,20 Bittererde, 42,34 Kiesel-erde, 12,38 Wasser.)

Gibt beym Glühen Wasser aus, schwärzt sich, brennt sich in offenem Feuer weiß, und schmilzt in starker Hitze an dünnen Ranten zu einem Email.

Die reinsten Abänderungen kommen auf Erzlagerrstätten und in körnigem Kalkstein vor, so zu Gullsjö, Sahlq und Fahlun in Schweden, zu Hoboken und Massachusetts in Nordamerica, zu

Prebazzo in Südtirol, am Isler in Graubünden und an einigen Stellen in Piemont. In der Gegend von Penig in Sachsen findet er sich in Adern und undeutlichen Crystallen in dem dort herrschenden Weißstein. Man bezeichnet diese reineren Abänderungen, welche durch helle Farben, muscheligen Bruch und größere Durchsichtigkeit ausgezeichnet sind, mit dem Namen edler Serpentin. Dieser ist häufig mit Asbest, Pikrosmin, Magnet- und Chromeisen; Thon, Diabase kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Bittererde vermengt, wodurch unreinere, dunkler gefärbte, nur an den Ranten durchscheinende Abänderungen gebildet werden, die man mit dem Namen gemeiner Serpentin belegt. Dieser gemeine Serpentin ist sehr verbreitet, findet sich beynahe in allen Gebirgen, Harz, Erzgebirge, Riesengebirge, Böhmerwald, Fichtelgebirge, Schwarzwald, Vogesen, Alpen u.s.w., in größeren und kleineren Gängen und Erden, im Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Thonschiefer, Kalkstein u.s.w. Die weicheeren Abänderungen des gemeinen Serpentin lassen sich gut schneiden und drehen, und werden mehrfältig verarbeitet, vornehmlich zu Gefäßen, und namentlich zu Böblitz in Sachsen.

4. Geschlecht. Pikrosmin.

Crystallinische Massen. $\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $2,5 \dots 2,8$; Perlmutterglanz in den Glasglanz geneigt; durchscheinend an den Ranten bis undurchsichtig. Farbe grün, einerseits ins Weiße, anderseits ins Schwarze geneigt. Sehr milde. Verb. in theilbaren Stücken von körniger, blätteriger oder dünnfädiger Zusammensetzung. Besteht aus wasserhaltiger, doppeltkieselsaurer Bittererde. (Enthält nach Magnus: 53,34 Bittererde, 54,88 Kieselerde, 7,3 Wasser, nebst 1,39 Eisenoryd, etwas Thonerde und Manganorydul.) Für sich unschmelzbar.

Findet sich auf der Grube Engelsburg bey Presnitz in Böhmen auf einem Lager im Grundgebirge, begleitet von Magnet-eisenstein und Braunsptz. Zum Pikrosmin scheinen einige Abänderungen des sogenannten gemeinen Asbests zu gehören, namentlich diejenige von Böblitz in Sachsen. Auch hat es den Anschein, daß dieses Mineral bisweilen in vorwaltender Masse in Serpentin vorkommt, und einige derselben beynahe ganz zur

sammensetzt. Jedenfalls ist eine nahe Verwandtschaft des Mikrosmins mit dem Serpentin unverkennbar.

5. Geschlecht. Meerschaum.

Verb; auch sollen Asterscrystalle nach Kalkspathformen vorkommen. $\rho. = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. $= 1,2 \dots 1,6$; matt, undurchsichtig, milde, weiß, ins Gelbe, Graue und Rothe geneigt. Bruch feinerdig, im Großen öfters flachmuschelig; hängt stark an der Zunge; fühlt sich wenig fettig an. Besteht aus wasserhaltiger, dreifach-Kieselsäurer Bittererde. (Enthält nach Echnell: 27,80 Bittererde, 60,87 Kieselerde, 11,29 Wasser, nebst Spuren von Eisenoxyd und Thonerde.) Brennt sich im Glasbälbchen, unter Abgabe von Wasser, schwarz, in offenem Feuer aber wieder weiß, schrumpft zusammen, und schmilzt an dünnen Ranten zu einem weißen Email.

Findet sich in Lagern vorzüglich in Livadien und Natolien, unfern Madrid und Toledo in Spanien, zu Rhodus in Mähren, zu Quinch in Frankreich, so wie in Portugal, Cornwallis und in der Krinn. Der Meerschaum wird ganz allgemein zur Verfertigung von geschätzten Pfeifenköpfen verwendet. Zu diesem Zwecke soll er gepulvert, mit Wasser zu einem Teig geknetet, und sofort in entsprechende Formen eingebracht werden.

5. Sippschaft des Magnesits.

1. Geschlecht. Magnesit.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Die Crystalle sind kleine Rhomboëder mit einem Endantenwinkel von $107^{\circ} 22'$. Diese Gestalt, die Grundgestalt des Geschlechtes, ist bis jetzt die einzige beobachtete. Theilbarkeit sehr vollkommen nach den Rhomboëderflächen. $\rho. = 4,0 \dots 4,5$; spec. Gew. $= 2,9 \dots 3,2$; Glasglanz, bisweilen perlmutterartig; durchsichtig bis durchscheinend an den Ranten. Farbe weiß und grau, häufig ins Gelbe fallend, auch gelb und braun. Bruch muschelig oder splinterig. Besteht aus einfach-Kohlensäurer Bittererde, und enthält gewöhnlich einige Procents Eisenoxyd, so wie etwas Mangan.

oxydul, welche beide, wie S. 182 bemerkt worden ist, die Bittererde, ohne wesentlichen Einfluß auf die Form auszuüben, enthalten. Doch ist der Winkel des Rhomboëders je nach dem Gehalte an Eisenoxydul variabel. Braust mit Säuren auf; reagiert nach dem Glühen alkalisch. Löst sich in Schwefelsäure auf.

Findet sich vorzüglich in zwey Abänderungen.

1. Späthiger Magnesit, Magnesitspath, Talkpath, Brünnerit.

Erythallisiert und derb, vollkommen theilbar, in körnigen und blätterigen Massen. Spec. Gew. = 3,0 ... 3,2. Zeigt Glanz und Durchsichtigkeit des Geschlechts am vollkommensten. Von den verschiedenen, oben bezeichneten Farben. Zusammensetzung des Talkspaths vom Gotthardt, nach Stromeyer, 42,40 Talkerde, 49,67 Kohlensäure, 6,47 Eisenoxydul, 0,62 Manganoxydul.

Findet sich vorzüglich in schieferige, talkerhaltige Gesteine, Talkschiefer, Chloritschiefer, Topfstein eingewachsen, namentlich am St. Gotthardt, am Grainer, im Zillerthal und zu Hall in Tyrol, zu Dovrefjeld in Norwegen.

2. Dichter Magnesit, Giobertit.

Dicht, matt, undurchsichtig, Bruch flachmuschelig oder splintterig; bisweilen erdig, weich und zerreiblich. Spec. Gew. = 2,9. Kugelige, nierenförmige, knollige Stücke, oftmals mit traubiger Oberfläche. Weiß. Der dichte Magnesit von Sasbach am Kaiserstuhl enthält 48 Talkerde, 52 Kohlensäure. Ueberhaupt scheinen die dichten Abänderungen des Magnesits durchaus reiner als die theilbaren zu seyn. Findet sich vorzüglich in plutonischen und vulcanischen Gebirgsbildungen, im Serpentin zu Baumgarten und Kosmitz in Schlesien, Kraubat in Steyermark, Grubschitz in Mähren, Hoboken in Nordamerica, Salem in Indien; im basaltischen Mandelstein zu Sasbach am Kaiserstuhl.

2. Geschlecht. Hydromagnesit.

Syn. *Magnesia alba*.

Pulverförmig, erdig, matt, undurchsichtig, weich und zerreiblich. Ist gerade so zusammengesetzt, wie die künstliche Mag-

nesta alba der Apotheken; enthält 42,41 Talkerde, 36,82 Kohlensäure, 18,53 Wasser und einige fremde Beymischungen, und ist somit eine Verbindung von kohlensaurer Talkerde mit Talkerdehydrat.

Findet sich, in Begleitung von Magnesit, im Serpentin bey Hoboken und Staten-Island, unfern New-York in den vereinigten Staaten und zu Kumi auf Negroponte in Griechenland.

3. Geschlecht. Mesitinspath.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Rhomboëder mit dem Endkantenwinkel von $107^{\circ} 14'$; Theilbarkeit nach dessen Flächen. Die Crystalle zeigen öfters die Combination der Grundform mit dem ersten sechsseitigen Prisma und der horizontalen Endfläche. Sie hat, wegen der ganz unbedeutenden Größe der Prismenflächen, ein linsenförmiges Ansehen. $H. = 4,0$; spec. Gew. = 3,3; Glasglanz; durchscheinend bis durchsichtig, und dann deutliche doppelte Strahlenbrechung. Farbe dunkelgraulich und gelblichweiß, ins Gelblichgraue. Die Oberfläche der Crystalle öfters von Eisenocker überzogen. Besteht aus gleichen Mischungs- gewichten kohlensaurer Talkerde und kohlensauren Eisenoxyduls.


Findet sich zu Traversella in Piemont, in Begleitung von Bergcrystall und sogenanntem Bergleder. Der Name soll anzeigen, daß das Mineral in der Mitte stehe zwischen Magnesit- spath, $107^{\circ} 22'$, und Eisenspath, $107^{\circ} 0'$.

4. Sippschaft des Boracits.

1. Geschlecht. Boracit.


Reguläres Crystallsystem, hemiedrisch. Die beiden Tetra-

Fig. 86.



der, die Halbfächner des regulären Octaëders, nach welchen eine undeutliche Theilbarkeit bemerkt wird, kommen häufig in Combination mit dem Würfel und dem Rautendodecaëder vor. Fig. 86 stellt eine gewöhnliche Combination der Würfelflächen *a*, der Hemioctaëderflächen *o* und der Dodecaëderflächen *d* vor,

Fig. 87.



in welcher die Würfelflächen vorherrschen; in Fig. 87 ist eine Combination des rechten Hemioctaëders *o* und des Würfels *a* dargestellt, in welcher die Flächen des Hemioctaëders vorherrschen. Der Habitus der Crystalle ist, je nachdem die einen oder die andern Flächen vorwalten, verschieden.

$\rho = 7$; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Glasglanz bis Dementglanz. Oft farblos, auch graulich, gelblich und grünlich; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Doppelte Strahlenbrechung durch die Tetraëderflächen, als merkwürdige Ausnahme, da sie sonst bey den Gestalten des regulären Systems nicht vorkommt. Bruch muschelig oder uneben. Wird durch Erwärmung in der Richtung der Achsen, welche senkrecht auf dem Tetraëder stehen, polarisch electrisch. Bis jetzt nur in Crystallen vorgekommen. Besteht aus zweydrittel-borarsaurer Kalkerde (30,3 Kalkerde, 69,7 Borarsäure). Schmilzt unter Aufschwellen zu einer Kugel, welche während der Abkühlung crystallisiert, wobey die Oberfläche aus Crystallnadeln zusammengesetzt erscheint. Mit einem Flussmittel aus 1 Theil Flußpath und $4\frac{1}{2}$ Theil saurem schwefelsaurem Kali zusammengeschmolzen, färbt er die Flamme schön grün, was den Gehalt an Borarsäure anzeigt.

Findet sich bis jetzt nur an zwey Orten; in Gyps eingewachsen am sogenannten Kalkberg und Schlibstein bey Lüneburg, und am Segeberg in Holstein.

2. Geschlecht. Hydroboracit.

Verb. in crystallinischen, strahligen und blätterigen Massen, weiß, durch Eisen stellenweise röthlich. Blätterigem Gyps ähnlich. $\rho = 2,0$; spec. Gew. = 1,9 annäherungsweise; in dünnen Blättchen durchscheinend. Die ganze Masse ist durchlöchert wie wurmstichiges Holz, die Höhlungen sind mit einem salzigen Thon ausgefüllt. Ist ein wasserhaltiges Doppelsalz von zweydrittel-borarsaurer Kalk- und Kalkerde. Besteht aus 49,92 Borarsäure, 10,43 Kalkerde, 13,29 Kalkerde und 26,33 Wasser. Schmilzt leicht zu einem klaren, farblosen Glase. Färbt die

Bohrrohrflamme grün, wenn es mit dem obengenannten Fluß zusammengeschmolzen wird. In Säuren löslich; aus der gesättigten Lösung crySTALLISIRT beim Erkalten Borarsäure. Findet sich am Caucasus.

3. Geschlecht. Wagnerit.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die selten deutlichen Crystalle sind prismatisch, flächenreiche Combinationen verticaler und horizontaler Prismen dieses Crystallsystems, mit zwey- und eingliedrigen Octaëdern. Theilbarkeit nach den Flächen eines geschobenen, vierseitigen Prismas. $\rho. = 5,0 \dots 5,5$; spec. Gew. $= 3,0 \dots 3,1$; Glasglanz starker; halbdurchsichtig. Oberfläche der Prismen vertical gestreift. Bruch uneben bis splitterig. Farbe weingelb. Nur crySTALLISIRT. Besteht aus einer Verbindung von zweydrittel-phosphorsaurer Bittererde mit einfach-fluhsaurer Bittererde, Schmilzt für sich schwer. Die Dämpfe, welche das Mineral bey Behandlung mit Schwefelsäure in der Wärme entwickelt, greifen Glas an. Findet sich im Höllengraben bey Weeren im Salzburgerischen in einem mürben, thonschieferartigen Gesteine.

Anhang. Nephrit.

Syn. Beilstein, Punnamstein.

Findet sich verb in stumpfackigen Stücken. $\rho. = 7,0$; spec. Gew. $= 2,9 \dots 3,0$; schimmernd und matt. Farbe lauchgrün, ins Grasgrüne, Graue und Weiße verlaufend. Bruch splitterig; Structur im Großen öfters schieferig. Besteht nach Kastenrs Analyse aus einem thonerdehaltigen Bisilicat der Bittererde und des Eisenoxyduls (31,0 Bitterde, 4,49 Eisenoxydul, 50,50 Kiesel-erde, 10,0 Thonerde, 2,75 Wasser und etwas Chromoxyd). Schmilzt bey strengem Feuer in Splintern zu einem weißen, blaugen Glase.

Der Nephrit kommt gewöhnlich schon verarbeitet aus China, Persien und Aegypten nach Europa; auch findet er sich im Gebiete des Amazonenflusses in Südamerica, im Lande der Topajaz, weshalb er mitunter auch Amazonenstein genannt wird. Sein näheres Vorkommen ist noch unbekannt.

Die antike *pietra d'Egitto* ist Nephrit, und derselben sehen manche dunkelgrüne, geschnittene Steine sehr ähnlich, die man in den Ruinen von Rom findet. Im Alterthum wurde der Nephrit als ein Heilmittel gegen Hüftweh betrachtet (daher der Name *Lapis ischiaticus*) und als Amulet getragen. Den sogenannten Beilstein brachte zuerst Förster von der im Süden von Neu-Seeland gelegenen Insel Tawai Punamu nach Europa. Die Einwohner jener Insel bediegen ihn zu Hacken, Meißeln u.s.w. Der asiatische Nephrit wird häufig zu Messerheften, Dolch- und Säbelgriffen verarbeitet, und kommt gewöhnlich in dieser Gestalt aus der Türkei zu uns.

IV. Ordnung. Kalkerden.

Mineralien, welche durch Kalkerde, Baryt- oder Strontianerde charakterisirt sind.


1. Eigenschaft des Kalks.

1. Geschlecht. Kalk.

Syn. Kalkspath, kohlensaurer Kalk.

Erythallsystem hemiedrisch drey- und einachsigt. Grundform ein Rhomboëder mit dem Endkantenwinkel von $105^{\circ} 5'$. Der Kalk zeigt die ausgebreitetste Erythallreihe. Kein anderes Mineralgeschlecht besitzt eine so große Anzahl einfacher und zusammengesetzter Gestalten. Man kennt deren gegenwärtig schon gegen sieben Hundert! Darunter sind allein nahe zu dreyßig verschiedene Rhomboëder, welche mit dem Grundrhomboëder auf die, S. 53, angegebene Weise zusammenhängen. Aus dieser Mannichfaltigkeit wählen wir einige wenige der gewöhnlichsten und interessantesten Gestalten aus.

Fig. 88.



Das Grundrhomboëder, Fig. 88, kommt selten selbstständig vor, dage-

Fig. 89.



Fig. 90.




Fig. 91.




Fig. 92.





Fig. 93.



Fig. 94.



gen außerordentlich häufig das erste stumpfere $\frac{r}{2}$, Fig. 89, und das zweyte spitzere $4r$, F. 90. An den verschiedenen Rhomboëdern bildet die gerade Endfläche c öfters die gerade Abstumpfungs-Fläche des Endes. Eine Combination derselben mit den Flächen des Hauptrhomböders r , wobei sie so groß ist, daß sie bis zu den Seitenkanten des Rhomböders reicht, ist in F. 91

dargestellt. Die Combination hat Aehnlichkeit mit einem Octaëder, aber nur 2 Flächen, welche gleichzeitige Dreiecke sind, nämlich c , die übrigen Flächen, Rhomböderflächen r , sind gleichschenkelige Dreiecke. Häufig kommen Verbindungen von Rhombödern vor. Fig. 92 ist eine Combination des ersten stumpfen Rhomböders $\frac{r}{2}$ mit dem

Hauptrhomböder r ; Fig. 93 eine Combination des zweyten spitzeren Rhomböders $4r$ mit dem Hauptrhomböder r ; Fig. 94 eine Combination des ersten stumpferen Rhomböders $\frac{r}{2}$ mit

dem ersten sechsseitigen Prisma g . Häufig kommen auch Skalenoëder vor, siehe S. 55, welche aus dem Didoktaëder, S. 51, durch Verschwinden der Hälfte ihrer Flächen entstehen, Fig. 95. Sie finden sich oft mit Rhomboëdern und mit den Prismenflächen g in Combination. Fig. 96 ist eine Combination des Skalenoëders $3z$ mit dem Hauptrhomoëder r ; Fig. 97 Combination des

Fig. 95.




Fig. 96.




Fig. 97.




Fig. 98.



Fig. 99.



Skalenoëders $3z$ mit dem zweiten spitzen Rhom-
boëder $4r$; Figur 98
Combination des Skale-
noëders $3z$ mit dem er-
sten sechsseitigen Prisma
 g und den Flächen $2x$,
welche einem Skalenoëder
angehören, dessen Kanten
dieselbe Lage haben, wie
diejenigen des Hauptrhom-
boëders. Gar oft kommt
auch das sechsseitige Pris-

ma g mit der horizontalen Endfläche c . Dieses Prisma, Fig. 99, er-
scheint theils langgestreckt, theils als dicke oder dünne, zuweilen fast

papierfeine Tafel. Ofters kommen auch Zwillinge vor, zu deren

Fig. 100.



Fig. 101.





Fig. 102.



parallel einer Fläche des ersten stumpferen Rhomboëders $\frac{r}{2}$, F. 89, statt; und von zwey rhomboëdrischen oder skalenoëdrischen Gestalten parallel einer Prismenfläche g, Fig. 102. Ueberdies erscheinen

die verschiedenartigsten Gruppierungen. Die Oberfläche der Krystalle ist gewöhnlich eben, doch auch oft gekrümmt; die horizontale Endfläche c meist rauh und matt, oder schwach perlmutterglänzend. Die Skalenoöder und das zweite sechsseitige Prisma, so wie das erste stumpfere Rhomboöder, gewöhnlich gestreift.

Theilbarkeit parallel den Flächen des Hauptrhomboëders höchst vollkommen, bisweilen krummflächig. $H. = 30$; spec. Gew. = 2,5 ... 2,73; Glasglanz herrschend; die Endfläche c meist perlmutterglänzend. Durchsichtig in allen Graden, mit ausgezeichnete doppelter Strahlenbrechung. Häufig farblos, oft aber auch grau, gelb, grün, selten blau und roth gefärbt. Die Farben sind in der Regel licht und unrein. Bisweilen dunkelbraun und schwarz von Einmengungen kohligter oder bituminöser Substanzen herrührend. Bruch muschelig, selten wahrnehmbar. Spröde. Besteht aus einfach-kohlensaurer Kalkerde (56,42 Kalk-

erde, 43,57 Kohlensäure; öfters mit kleinen Mengen kohlensaurer Bittererde, kohlensauren Eisen- und Manganoxyduls). Braust mit Säuren, und löst sich in Salzsäure leicht auf. Brennt sich in starker Hitze ähend, und gibt bey fortgesetztem Glähen ein weißes, blendendes Licht aus.

Die höchst mannichfaltigen Abänderungen dieses allgemein verbreiteten und mächtige, himmelanstrebende Gebirge zusammensetzenden Mineralgeschlechtes werden nach Structurverhältnissen und Beymengungen auf folgende Weise unterschieden:

1. Deutlich crySTALLisirte und vollkommen theilbare Abänderungen, Kalkspath.

Die Crystalle sind gewöhnlich aufgewachsen, zu Drusen, Büscheln u.s.w. verbunden, seltener, um und um ausgebildet, und auf die mannichfaltigste Weise gruppiert. Eine mit Sandkörnern vermengte Abart heißt quarziger Kalkspath (*Chaux carbonatée quarzifère, grès cristallisé de Fontainebleau*). Eine Zusammensetzung stängeliger Individuen wird mit dem Namen stängeliger Kalkspath bezeichnet, und eine durch kohlige oder bituminöse Theile dunkel gefärbte Abart, welche beym Reiben einen unangenehmen Geruch ausgibt, bituminöser Kalkspath genannt.

Der Kalkspath findet sich in allen Gebirgsformationen, und häufig auf Erzgängen im älteren Gebirge. Die schönsten und mannichfaltigsten Abänderungen liefern England (Derbyshire und Cumberland), der Harz (Andreasberg und Iberg), das Erzgebirge (Freiberg, Bräunsdorf, Tharand, Joachimsthal, Przibram), der Schwarzwald (St. Blasien, Münsterthal, Donaueschingen, Wiesloch), Frankreich (Paris, Chalanches, Poitiers), Ungarn (Schemnitz). Die berben, wasserhellen, vollkommen durchsichtigen Abänderungen mit ausgezeichneter doppelter Strahlenbrechung finden sich auf Island (Isländischer Doppelspath.)

2. Körnige Abänderungen; körniger, blätteriger Kalk, salinischer Marmor.

Groß- bis feinkörnige Aggregate. Verb und in stalaktitischen Formen. Wenig glänzend, Glanz im Mittel zwischen Glas- und Perlmutterglanz. Weiße Farbe herrschend, ins Graue,

Gelbe, Blaue, Rothe und Grüne geneigt; gewöhnlich einfarbig. Durchscheinend, bisweilen nur an den Kanten.

Findet sich in großen Massen, die mächtige Städte und Lager bilden, vorzüglich im Grund- und Uebergangsgebirge, selten im vulcanischen Gebirge. Berühmt sind, ihrer Schönheit wegen, der könlige Kalk von Carrara in den Apenninen, der grobkörnige von der Insel Paros im griechischen Archipelagus, und der Marmor vom Pentelicon und Symettus in Attica. Ueberdies kommen schöne reine Abänderungen in den östlichen Alpen vor, zu Schlanders und Laas im Vinschgau, zu Predazzo im Fassathal, bey Poschiavo in Graubünden u.s.w., ferner in Sachsen, Böhmen, Schlessen, Scandinavien (Sahla, Gielkebeck, Norberg) und in den meisten größeren Gebirgen.

3. Dichte Abänderungen. Dichter Kalkstein.

Derb und als Versteinerungsmasse. Bruch splitterig, im Großen öfters flachmuschelig ins Ebene verlaufend. Matt, undurchsichtig oder nur an den Kanten durchscheinend. Öfters dick und geradschieferig (Kalkschiefer), seltener geradstängelig (stängeliger Kalkstein) und dann und wann keilsförmig stängelig, so daß losgetrennte Stücke die Gestalt eines Nagels haben (Nagelkalk).

Enthält häufig Versteinerungen, und bisweilen Schalen fossiler Muscheln, welche mit lebhaften rothen und grünen Farben spielen (Opalisirender Muschelkalk, Eumachello, Helmintholith). Die graue Farbe ist herrschend; überdies erscheint der dichte Kalk mit den verschiedensten Färbungen, mit lichten granlich- und gelblichweißen, gelben, rothen, braunen und schwarzen Farben und mit den mannichfaltigsten Farbenzeichnungen. Die durch Kohle schwarz gefärbten Abänderungen tragen den Namen Lucullan und Anthrakolith. Einige gelblich- und granlichweiß gefärbten Kalksteine bestehen nahezu aus reiner kohlensaurer Kalkerde; die dunkler gefärbten enthalten dagegen immer Beymengungen, die grauen kohlige und bituminöse Theile, die schwarzen feinzertheilte Kohle, die gelben, braunen und rothen Eisen, und überdies mehr oder weniger Thonerde, Bittererde, Kieselserde und Manganoryd. Gibt der Kalkstein vermöge seines Bitumengehaltes beim Reiben einen unangenehmen Geruch aus,

so heißt er *Stinkstein*. Ist die Verbindung seiner Theile locker, so wird sein Ansehen erdig, und er färbt ab; besitzt er dabey eine weiße Farbe, so nennt man ihn *Kreide* (Pommern, Dänemark, Frankreich, England). Erscheint der Kalk noch mehr aufgelockert, schwammig, flockig, stambartig; wobey ein verhältnißmäßig großes Stück eine sehr geringe Schwere zeigt, so belegt man ihn mit dem Namen *Bergmilch*. Ist er so stark mit Thon vermengt, daß er beym Beseuchten einen thonigen Geruch ausgibt, und bey der Auflösung einen Rückstand von mehreren Procenten hinterläßt, so wird er mit dem Beywort *mergelig* bezeichnet, und wenn er 10 Procent oder darüber Thon enthält, *Mergel* genannt. Sein Ansehen ist in diesem Fall erdig; dabey ist er bald fest (*Mergelstein*), bald zetreiblich (*Mergelerde*), und bildet theils größere Lagermassen, theils knollige und kugelige Stücke. Diese sind oftmals von Kalkspathadern durchzogen, welche, wenn die Witterung auf solche Knauer einwirkt, sich aus der Mergelmasse gleichsam herausheben, da sie den atmosphärischen Einflüssen stärker widerstehen, und dabey leistenartig hervorragen (*Ludus Holmontii*). Durch eine Beymischung von feinem Sand und etwas Thon wird der Zusammenhang der Kalktheile lockerer, es entstehen kleine Zwischenräume, Poren, und der Kalk erlangt die Eigenschaft Wasser, unter Ausstoßen von Luftbläschen, begierig einzusaugen (*Saugkalk*). Der *Kalktuff*, *Duckstein*, *Travertino* ist ein Absatz aus kalkhaltigen Wassern. Er ist undurchsichtig, matt, im Bruche erdig, porös, schwammig, und erscheint theils verb, theils in den mannichfaltigsten stalactitischen Formen und in Gestalten organischer Substanzen, über welche sich die Luffmasse abgesetzt hat. Häufig ist er röhrenförmig (*Weinbruch*, *Osteocolla*), moosartig, vielfach durchlöchert, zellig. Gewöhnlich schließt er Blätter, Stengel, zuweilen auch Muscheln und Thierknochen ein. Graue und gelbe Farbe ist herrschend. Findet sich in allen Kalkgebirgen.

Die verschiedenen Abarten des dichten Kalkes sind ganz allgemein verbreitet.

4. Faserige Abänderungen. *Faserkalk*.

Gleichlaufend, theils gerade-, theils krummfaserig. Wenig

perlmutterartig oder seidenartig glänzend. Schwach durchscheinend, öfters nur an den Ranten. Von verschiedenen Farben, die durch Eisen, Mangan, Kobalt, Nickel, Kupfer hervorgebracht sind. Findet sich theils auf schmalen Gängen, in Trümmern und Schnüren, theils als Ueberzug und in stalactitischen, staubensförmigen, röhrenförmigen, kugeligen und nierenförmigen Gestalten. Ein großer Theil der vesteren Abfälle aus kalkigem Wasser besitzt diese Structur. (Kalksinter.) Findet sich in Schnüren im dichten Kalkstein in allen Kalkgebirgen, jedoch immer nur in kleinen Mengen und weit seltener als Kalkspath.

5. Schalige Abänderungen. Schalige Zusammen-
setzung; frummschalig, ins Blättrige übergehend; verb; in dünnen Blättchen oder an den Ranten durchscheinend; weiß, ins Gelbliche und Grauliche, selten ins Röthliche oder Grünliche (Schiefer-
spath). Findet sich auf Gängen zu Schwarzenberg in Sachsen, Rangach im Schwarzwalde, Rongsberg in Norwegen, Nertschinsk in Sibirien, auch in Mexico und Nordamerica.

Diese schalige Abänderung setzt oftmals freie Kugeln zusammen, die aus concentrischen Schalen bestehen, einen kleinen festen Kern von Quarz oder einem Stückchen Kalkspath haben und durch eine kalkige Masse zusammengekittet sind (Erbsenstein). Die Farbe ist gelblich weiß. Die Kugeln haben einen Durchmesser von 1 bis 2 Linien. Findet sich bey Karlsbad in Böhmen, Laybach in Krain, und Felsö-Lelocz am Neitrafluß in Ungarn. Oefters zeigen sich große Kalkmassen aus sehr kleinen kugeligen, schalig zusammengesetzten Körnern gebildet, die mehr oder weniger plattgedrückt, sphäroidisch, nicht selten walzenförmig, und durch eine Mergelmasse zu einem festen Gestein verkittet sind (Rogenstein Dolith). Als deutlicher Kern der einzelnen kleinen schaligen Kugeln erscheint ein Quarz- oder Kalkkorn, ein Stückchen einer Muschel oder irgend eines andern fremdartigen Mineralkörpers. In früherer Zeit wurde der aus schaligen Körnern zusammengesetzte Kalk für versteinerten Fischrogen gehalten. Daher der Name Rogenstein. Findet sich in vielen Kalkgebirgen, insbesondere im Jura.

Der Kalk ist eines der nützlichsten Mineralien. Die reinsten Abänderungen, den Kalkspath, wendet man als Flußmittel bei verschiedenen metallurgischen Proben, zur Glasfabrication, zur Entwicklung der Kohlensäure u.s.w. an. Der übrige Kalk, unter dem Namen salinischer Marmor bekannt, wird vorzüglich zu Werken der bildenden Kunst und zu architectonischen Arbeiten verwendet. Die schönen Werke antiker plastischer Kunst bestehen vorzüglich aus parischem Marmor, der etwas grobkörniger ist, als der carrarische Marmor, den die Bildhauer der neueren Zeit verarbeiten. Canovas, Thorwaldsens Meisterwerke sind aus carrarischem Marmor geschaffen. Aus dem grobkörnigen Marmor von Schlanders im Vinschgau ist des patriotischen Sandwirth Hofers Denkmal zu Innsbruck construirt. Die antiken Statuen haben eine gelbliche Farbe, was daher rührt, daß sich aus der geringen Menge Eisens, das dem parischen Marmor beigemengt ist, unter längerem Einfluß der Witterung, an der Oberfläche etwas Eisenrost bildet, der fein eingemengt die weiße Farbe des Marmors in's Gelbliche nanciert. Der dichte Kalkstein wird ganz allgemein als Baumaterial verwendet, zu Treppenstufen, Thürstöcken, Fensterbelleidungen, Bodenplatten. Die unreineren Abänderungen benützt man zu Mauersteinen, Pflastersteinen und zum Straßenbau. Dichter Kalkstein von größerer Reinheit, Gleichförmigkeit und einer bestimmteren Farbe, der sich vermöge seiner Härte poliren läßt, wird im gemeinen Leben ebenfalls Marmor genannt. (Nassau, Harz, Untersberg in den bayerischen Alpen.) Nach Farbe und Farbzeichnung erhält dieser dichte Marmor noch besondere Namen, insbesondere in Italien, woselbst man auch vielfältig in Ruinen Arbeiten aus dichtem Kalk angetroffen hat. Nero antico, rosso und giallo antico bezeichnen den schwarzen, rothen und gelben dichten antiken Marmor. Man unterscheidet ferner Blumen- (marmo fiorito), Landschafts- (marmo paesino), Trümmer- (marmo brocciato), Ruinen-Marmor (marmo ruderato) u.s.w. Besonders geschätzt ist der Florentiner Ruinen-Marmor, der, angeschliffen und poliert, wirklich mehr oder weniger das Ansehen von Ruinen und aufgethürmten Felsmassen hat. Die gelblichgraue Grundmasse ist von vielen sehr feinen Rissen durchzogen, auf welchen eisenreiche Wasser eingestiegt sind, die sich,

vermöge der schiefrigen Struktur des Gesteins, von den Rissen aus seitwärts und häufig von einem Risse bis zum andern ausgebreitet haben. Wie nun diese Wasser abdunsteten, blieb das Eisen als Oxydhydrat zurück und färbte die Stellen, über welche das Wasser sich ausgebreitet hätte, dunkelbraun. Vielfältige Verschiebungen der durch Risse getheilten Stücke vermehren noch die Unterbrechungen heller und dunkler gefärbter Stellen. Man sieht diesen Ruinenmarmor häufig wie Bilder in Rahmen gefaßt. Dünnschieferige Kalksteine werden auch zur Bedachung verwendet. (Umgegend von Eichstädt in Franken.) Dickschieferige Abänderungen, die ein feines und gleiches Korn besitzen und eine ganz gleichförmige Härte, werden zur Lithographie benützt. Die ausgezeichnetsten in dieser Hinsicht sind die weltbekannten Solenhofer Platten. Viele Abänderungen von dichtem Kalk werden als Flußmittel beim Eisen- und Blei-Ausschmelzen gebraucht; die Kreide ist ein allbekanntes Farb- und Schreibmaterial und wird überdies bei der Sodafabrication aus Glaubersalz, zum Versetzen des Bleiweißes, zum Putzen von Metall und Glas, zur Neutralisation von Säuren, in Verbindung mit Leinöl zu Glaserkitt u.s.w. verwendet. Der Kalktuff wird zu leichten Mauern benutzt. Der gebrannte Kalk wird vorzüglich zum Mörtel und zur Laugebereitung gebraucht; überdies benützt man ihn zur Glasfabrication, zur Darstellung von Chloralkali, Kalkmilch, Kalkwasser, zum Enthaaren u.s.w. Der mergelige Kalk und mehr noch der Kalkmergel, welcher 20 bis 25 Procente Thon enthält, eignet sich, nachdem er gebrannt ist, vortrefflich zu hydraulischem, d. i. zu solchem Mörtel, der in Wasser erhärtet, und ist deshalb bei allen Wasserbauten mit großem Nutzen zu verwenden.

2. Geschlecht. Arragon.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Grundform, das Rhombenoctaëder, kommt nie für sich, sondern immer nur in Combinationen vor. Eine gewöhnliche Combination ist in umstehender Fig. 103 dargestellt. Die Octaëderflächen o, mit dem verticalen rhombischen Prisma g, der zweiten Seitenfläche h, und dem horizontalen Prisma f; dieselbe Combination ohne die

Octaëderflächen zeigt Fig. 104; eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g , mit der Seitenfläche b , dem spitzeren Rhombenoctaëder a' und den horizontalen Prismen d' und f zeigt Fig. 105. Der Habitus der Crystalle ist bey dieser Com-

Fig. 103.




Fig. 104.






Fig. 105.



bination immer pyramidal, bey den andern, wenn die Prismenflächen g und b vorwalten, säuleförmig.

Eine sehr große Neigung zur Zwillingbildung ist Ursache, daß man nur selten einfache Individuen antrifft. Die Zusammensetzungsfläche ist parallel einer Prismenfläche g , die Umdrehungsachse senkrecht auf derselben. Der einfachste Fall einer solchen Zwillingbildung ist derjenige, daß zwey Individuen, wie Fig. 104, nach erwähntem Gesetze mit einander verbunden

Fig. 106.



sind, Fig. 106, wobei die Fläche $b b'$ einen einspringenden Winkel von $116^\circ 16'$, die Flächen $f f'$ einen solchen von $144^\circ 4'$ machen. Häufig wiederholt sich diese Zusammensetzung viele Male und so, daß alle successiven Zusammensetzungsflächen parallel sind, wodurch aggregirte Crystalle gebildet werden, in welchen die Individuen abwechselnd dieselbe Stellung haben, wie in Fig. 106; die

mittleren Individuen werden aber oft so schmal, daß sie als

dünne Blätter erscheinen, und dann erhält der zusammengesetzte Crystall das Ansehen eines einfachen Individuums, auf dessen Flächen jedoch Furchen und Streifen hervortreten, welche den Durchschnittslinien der Zusammensetzungsfläche parallel sind und die abwechselnden Individuen bezeichnen, Fig. 107. Eine andere

Fig. 107.





Fig. 103.



gewöhnliche Zwillingbildung ist in Fig. 108 dargestellt. Zwei Zwillinge AB und CD sind so mit einander verbunden, daß ihre beiderseitigen Zusammensetzungsflächen in eine Ebene fallen; dabei bleibt ein rhombisch prismatischer Zwischenraum E, welcher

durch Fortsetzung ihrer Substanz erfüllt wird. Dadurch entstehen sechsseitige Säulen mit 4 Winkeln a von $116^{\circ} 16'$ und 2 Winkeln b von $127^{\circ} 27'$. Die Flächen der Zwillinge sind häufig rauh und gestreift, oftmals zerfressen, diejenigen der einfachen Gestalten gewöhnlich glatt.

Teilbarkeit nach der kleinen Diagonale des rhombischen Prismas ziemlich deutlich; weniger nach g und f . $H. = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 2,9 \dots 3,0$; durchsichtig bis durchscheinend. Farblos und gefärbt, gelblich, graulich, röthlichweiß, grau, gelb, grün, violett. Bruch muschlig, fettartig glänzend.

Erscheint auch kugelig, nierenförmig, zackig, verb; sodann in stängeligen, strahligen und faserigen Aggregaten.

Besteht aus einfach kohlensaurer Kalkerde, welcher, jedoch nicht immer, kohlensaurer Strontian, in unbestimmten Verhältnissen, bis zu $4\frac{1}{2}$ Procent, beigemengt ist. Der Arragonit bietet uns somit die höchst interessante Thatsache dar, daß der Kalk (als Kalkspath, und als Arragonit ganz gleich zusammengesetzt) in zwei, zu verschiedenen Crystallsystemen gehörigen Formen crystallisiert, und somit eine dimorphe oder heteromorphe Mineral-Substanz ist; s. S. 133.

Man unterscheidet den Kalkspath vom Arragonit sehr

leicht durch das verschiedene Verhalten in der Rothglühhitze; darinn schwillt der Arragonit an, blättert sich auf und bildet zuletzt eine pulverförmige, wenig zusammenhängende Masse. Legt man ein Stückchen Kalkspath und ein Stückchen Arragonit neben einander in ein Glasrohr und erhitzt beide, so daß sie gleich heiß werden, so bemerkt man am Kalkspath durchaus keine Veränderung, während der Arragonit schon ganz zerfallen ist. Bei dieser Veränderung erleidet der Arragonit keinerlei Zersetzung, sondern bloß eine Umänderung in der Anordnung seiner kleinsten Theile, eine Auflockerung. Mitscherlich hat einen in vesuvischer Lava sitzenden Arragonitcrystall beobachtet, dessen äußere Schichte durch Einwirkung der Hitze der Structur nach in Kalkspath umgewandelt worden ist, während die innere Masse Arragonit blieb, wobei der ganze Crystall seine Form behielt. Wir sehen also, daß der kohlensaure Kalk unter gewissen Bedingungen bald als Kalkspath, bald als Arragonit crystallisirt. Härte und specifisches Gewicht sind größer beym Arragonit als beym Kalkspath, demnach scheint es, daß die Kalktheilchen, wenn sie den ersten bilden, sich stärker verdichten, als wenn sie sich zu letzterem vereinigen.

Der Arragonit, dieses sowohl hinsichtlich seiner eigenthümlichen Gestalten, als seiner Kalkspathmischung sehr interessante Mineralgeschlecht, findet sich in sehr verschiedenen Gebirgsbildungen. Auf Gängen und Erzlagerstätten im älteren Gebirge zu Leogang in Salzburg, Schwaz in Tyrol, Joachimsthal in Böhmen, Nerstschinsk in Sibirien; im Föhngebirge zu Molina in Arragonien (woher der Name) und Mingranilla in Valencia, (von da stammen vorzüglich die Zwillinge, sechsseitige Prismen, durch Fig. 108 im Grundriß dargestellt); Saalfeld, Emsdorf in Thüringen, Iberg am Harz, Steyermarl (hier finden sich namentlich die spießigen wasserhellen Crystalle); im vulcanischen Gebirge in Böhmen (Egiezow, woher die schönsten einfachen Crystalle Fig. 103 und 104 und die Zwillinge Fig. 106 und 107 kommen, Teplitz, Waltersch), Baden (Burgheim am Kaiserstuhl), in der Eifel, in Frankreich und am Thüringerwalde.

Zum Arragonit rechnet man auch einen Theil des Sprudelsteins von Carlsbad und die durch ihre zackige oder corallenartige

Gestalt und schneeweiße Farbe ausgezeichnete sogenannte Eisenblüthe, ein Zersetzungsproduct von Eisenstein, das zu Eisenerz in Steyermark, Hüttenberg in Kärnthen und Horsowiz in Böhmen vorkommt.

3. Geschlecht. Plumbo-Calcit.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Rhomboëder von $105^{\circ} 5'$; Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform. Die bisher bekannten Crystalle haben die Gestalt der Grundform. $\rho. = 2,5$; spec. Gew. $= 2,92$; Glasglanz perlmutterartiger; durchsichtig bis durchscheinend; weiß. Besteht aus einfach-kohlensaurem Kalk, mit welchem eine kleine Menge einfach-kohlensauren Bleypoxyds verbunden ist (92,2 kohlensaurer Kalk, 7,80 kohlensaures Bleypoxyd, was einer Verbindung von 30 Mischungsgewichten Kalk-Carbonat mit 1 Mischungsgewicht Bleyp-Carbonat entspricht). Wird beym Glühen bräunlichroth, und gibt auf Kohle ein Bleysorn. Löst sich in Salzsäure mit brausen auf; die concentrirte Lösung setzt nadel förmige Crystalle von Chlor-Bley ab. Findet sich gewöhnlich derb in der Halde einer alten Grube zu Wanlockhead in Schottland.

Dieses Mineralgeschlecht gibt den interessanten Beweis, daß das kohlensaure Bley, welches gewöhnlich in Formen crystallisirt, welche dem ein- und einachsigen Crystallisationsysteme angehören, und mit denen des Arragonits übereinstimmen, auch in einer zum drey- und einachsigen Crystallsystem gehörigen rhomboëdrischen Form vorkommt.

4. Geschlecht. Dolomit.

Syn. Kalktalkspath, Bitterkalk, Braunspath.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Grundform ein Rhomboëder mit dem Endkantenwinkel von $106^{\circ} 15'$. Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform. Die Crystalle haben in der Regel die Gestalt der Grundform; überdieß kommen zwey spitzere Rhomboëder vor und ein stumpferes, wie beym Kalkspath, und Combinationen: eines spitzeren Rhomboëders mit der

horizontalen Endfläche, Fig. 109; des Grundrhomboëders r mit

Fig. 109.



Fig. 110.



einem spitzeren $4r$ und mit der horizontalen Endfläche c , Fig. 110, und des stumpferen Rhomboëders mit der horizontalen Endfläche. Die Crystallflächen, namentlich die Flächen des Grundrhomboëders r , sind häufig sattelartig gekrümmt, was Veranlassung gegeben hat, solche Crystalle sattelförmige Einsen zu nennen. Die horizontale Endfläche ist gewöhnlich conver.

$\rho. = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 2,9 \dots 3,0$; Perlmutterglanz bis Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. Farbe weiß, ins Gelbe, Rothe, Grüne, Braune und Schwarze. Die dunkeln Farben sind eine Folge der Verwitterung.

Kommt auch kugelig, nierenförmig, getropft und derb vor.

Besteht aus einer Verbindung von einfach-kohlensaurem Kalk mit einfach-kohlensaurer Bittererde, wober die isomorphen Carbonate von Eisen- und Manganorydul gewöhnlich zu einigen Procenten in die Mischung eingehen, öfters über 8 Procent betragen, und mitunter gegen 20 Procent ausmachen. Im reinen Zustand 54,3 kohlensaurer Kalk, 45,7 kohlensaure Bittererde; öfters ist jedoch der Gehalt an kohlensaurem Kalk größer. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Kalkspath; der eisen- und manganhaltige färbt die Flüsse grün und violblau und wird beim Erhitzen braun oder schwarz. Löst sich unter Erwärmung mit Brausen in Salzsäure auf, wenn er gepulvert ist; derbe Stücke brausen mit Salzsäure nicht auf.

Man unterscheidet nach der Structur und der chemischen Zusammensetzung folgende Abänderungen:

1. Deutlich crystallisierte und theilbare. Bitterspath, Rautenspath zum Theil, Braunspath.

Die Crystalle sind meist zu Drusen verbunden, auch kugelig und staudenförmig gruppiert. Die grünen Stücke tragen den Namen *Miemit*; diejenigen, welche vermöge eines Gehaltes von Eisen- und Mangan-Carbonat gelb, roth oder braun gefärbt sind, und deren Farbe an der Luft dunkler wird, heißen *Braunspath*. Die Zusammensetzung ist öfters stängelig bis faserig (stängeliger Bitterspath, *Miemit*, *Braunspath*).

Der Bitterspath findet sich zu *Sasbach* am *Kaiserstuhl*, zu *Glücksbrunn* bey *Gotha*, zu *Schweinsdorf* bey *Dresden*, *Schlackenwalde* und *Bilin* in *Böhmen*, *Miemp* in *Toscana*. Der *Braunspath* kommt auf vielen Erzgängen vor; im *Schwarzwald* auf Gängen im *Rinzig*, *Münster* und *Albthal* bey *St. Blasien*, im Erzgebirge zu *Freiberg*, *Schneeberg* und *Joachimsthal*, am *Harz* zu *Eggerfeld* und *Clausthal*, in *Ungarn* zu *Schemnitz* und *Kremnitz*, in *Siebenbürgen* zu *Kapnik*.

2. Körnige bis dichte. *Dolomit* und *Rauhwaacke*.

Derb, körnig bis höchst feinkörnig, manchmal vom Ansehen eines Aggregates kleiner rhomboëdrischer Crystalle. Die Theile bald fester bald lockerer verbunden. Die höchst feinkörnigen Abänderungen verlaufen ins Dichte. Die Farbe ist bey den körnigen Abänderungen vorherrschend weiß, ins Gelbliche und Grauliche, bey den feinkörnigen und dichten im Allgemeinen Grau oder Braun. In Höhlungen sitzen öfters weiße Bitterspathcrystalle. Die körnigen Abänderungen tragen den Namen *Dolomit*, und setzen große, weitverbreitete Gebirgsmassen zusammen. Dießliche *Alpen*, von *Bozen* bis ins *Friaul*; *Raibell* und *Bleyberg* in *Kärnthen*; *Campo longo* am *Gotthardt*; im deutschen *Jura* an vielen Stellen, zumal im *Wiesentthal* in *Franken* (*Muggendorf*, *Gailenreuth*); *Gerolstein* in der *Eifel*, *Liebenstein* am *Thüringerwald*, *Diez* und *Runkel* in *Nassau* u.s.w., und an mehreren dieser Orte, namentlich in den *Alpen*, in einer merkwürdigen Beziehung zu plutonischen und vulcanischen Gesteinen. Die dichten, grauen und braunen Abänderungen kommen vielfältig im *Flößgebirge* vor, insbesondere im Gebilde des *Muschelkalks*, des *Keupers* und des *Zeoliths*, und tragen den Namen *Flößdolomit* und *Rauhwaacke*.

Die weißen, körnigen, festen Dolomite wurden im Alterthum wie Marmor verarbeitet; heutzutage werden sie, wie die unreinen, als Baustein und Straßenmaterial verwendet. Die etwas thonigen Abänderungen können mit Vortheil zu Wassermörtel benutzt werden und sind in einigen Gegenden unter dem Namen schwarzer Kalk bekannt.

2. Gipschaft des Gypses.

1. Geschlecht. Gyps.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Grundform ein Octaëder, Fig. 27. S. 59. Die gewöhnlichsten Combinationen sind: Combination des Hauptoctaëders *o*, mit seinem verticalen Prisma *g*, und der zweyten Seitenfläche *b*, Fig. 111; Combination des vorderen schiefen Prismas *o* des Hauptoctaëders, mit dem verticalen Prisma *g* und der zweyten Seitenfläche *b*, Fig. 112. Ueberdieß kommen noch 9 andere verticale Prismen vor, welche aber zwischen den Endflächen *g* und *b* liegen, und eine schiefe Endfläche *c*, welche unter $87^{\circ} 5'$ gegen die Achse geneigt ist. Dadurch entstehen Gestalten, welche Fig. 113 ähnlich sind. Der

Fig. 111.




Fig. 112.





Fig. 113.



Habitus der Crystalle ist theils kurz säulenartig, theils lang und dünn säulenartig, oft nadelförmig, theils tafelartig durch Vorherrschen der Flächen *b*; endlich sind die Crystalle öfters linsen-

förmig. Oft sind zwei gegenüberliegende Flächen g sehr vorherrschend gegen die anderen.

Häufig kommen Zwillinge vor, und zwar nach folgenden Gesetzen: 1) Zusammensetzungsfläche parallel der ersten Seitenfläche, welche als Abstumpfungsfläche der Kante zwischen g und g auftritt, Umdrehungsachse senkrecht darauf. Nach diesem Gesetz sind sehr oft Individuen, wie Fig. 111 und 112, verbunden. Eine Zwillingbildung durch letztere ist in Fig. 114 dargestellt;

Fig. 114.





Fig. 115.




2) Zusammensetzungsfläche parallel der zweiten Seitenfläche b , Umdrehungsachse senkrecht auf derselben,

Fig. 115; 3) Zusammensetzungsfläche parallel einer Abstumpfungsfläche der Kante zwischen $o o$, Umdrehungsachse senkrecht auf derselben. Nach diesem Ge-

setze sind die Linsen zusammengesetzt, welche dadurch entstehen, daß die Flächen g verschwinden, und die Flächen o zum Theil mit den Flächen c , b und o' jederseits in eine convexe Fläche verfließen. Die Durchkreuzungszwillinge solcher linsenförmigen

Individuen zeigen ungefähr das Profil wie Fig. 116.

Fig. 116.



Die Oberfläche der verticalen Flächen ist gewöhnlich vertical gestreift, die Oberfläche von o parallel der durch sie gebildeten Endkante; diese, so wie die Combinationsecken von o mit g und c öfters zugearundet; c gewöhnlich uneben

und gekrümmt, und bisweilen mit o zu einer einzigen convexen Fläche zusammengefloßen.

Theilbarkeit nach b höchst vollkommen, die Theilungsfläche eben und glatt, viel weniger vollkommen nach der Richtung einer geraden Abstumpfungsfläche der Kanten zwischen gg und derjenigen zwischen oo.

$\rho = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. $= 2,2 \dots 2,4$; Glasglanz, auf b Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos und gefärbt, graulich-, gelblich-, röthlichweiß, grau, gelb, roth, braun; selten grün oder blau. Milde; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus wasserhaltiger einfach-schwefelsaurer Kalkerde (33 Kalkerde, 46 Schwefelsäure, 21 Wasser). Gibt im Kölbchen ehhigt Wasser aus, wird trübe und blättert sich. Schmilzt in strengem Feuer zu einem weißen Email; auf Kohle geschmolzen wird er zerlegt, zum Hepar, und riecht alsdann hepatisch, wenn er befeuchtet wird. Wenig in Wasser löslich (1 Theil Gyps braucht 462 Theile Wasser).

Man unterscheidet folgende Abänderungen.

1. Blätteriger oder späthiger Gyps, Frauen-eis. Begreift die crystallisirten und deutlich theilbaren Exemplare von den höchsten Graden des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Die Crystalle sind theils einzeln aufgewachsen oder eingewachsen, theils zu Gruppen oder in Drusen versammelt. Findet sich in den Kalk-, Mergel- und Thonbildungen aller Gebirgsformationen. Ausgezeichnete Crystalle kommen vor zu Ber in der Schweiz, zu Defflingen und bey Eandern am Schwarzwald, zu Hall in Tyrol, zu Saalfeld, Mannsfeld, Osterode, Nordhausen, Liebe bey Braunschweig, zu Orford und Newhaven in England, am Mont-Martre bey Paris, zu St. Jago de Compostella in Spanien u. a. v. a. D.

2. Faseriger Gyps, Federweiß. Faserige Structur; grob und zart, stets gleichlaufend faserig; die Fasern meist gerade, seltener krumm. Gewöhnlich weiß. Perlmutterglanz, durch die Structur seidenartig; durchscheinend. Bildet Schnüre und dünne Lagen in verschiedenen Gypsbildungen. Jena, Wimmelburg bey Mannsfeld, Heilsbrunn; Bamslach, Unabingen, Ewattingen am Schwarzwald; Ber im Badtland u. s. w.

3. Körniger und dichter Gyps. Grobkörnige, schuppige bis höchst feinkörnige, ins Dichte übergehende Zusammensetzung. Die letzte Abänderung trägt den Namen Maa-baster

wenn sie rein und weiß ist. Gewöhnlich sind die dichten Abänderungen mit Thon verunreinigt, grau. Bisweilen enthalten sie bituminöse Theile, und geben alsdann beym Reiben einen unangenehmen Geruch aus (Stinkgyps). Die dichte Abänderung setzt, untermengt mit der körnigen, die Hauptmasse der Gypsbildungen zusammen und ist allverbreitet. Alle früher genannten Fundorte gelten auch für den körnigen und dichten Gyps.

4. Schaumgyps, schuppiger Gyps. Besteht aus feinschuppigen Theilen, die lose verbunden sind. Findet sich als Anflug auf späthigem Gyps oder in diesen eingesprengt, am Mont-Martre bey Paris.

5. Gypserde, erdiger Gyps. Staubartige oder feinschuppige, lose verbundene Theile; schwach schimmernd. Findet sich auf Klüften und in Höhlungen der körnigen und dichten Abänderungen. Walkenried am Harz, Saalfeld in Thüringen, Jena u. c. a. D.

Der Gyps bildet gewöhnlich stockförmige Massen, die in Kalkstein-, Mergel-, Thon- oder Sandsteinlagern eingeschlossen sind, seltener kommt er auf Erzgängen vor, öfters dagegen in alten Grubenbauen, wo er durch Verwitterung von Kiesen sich unter unsern Augen noch fortbildet, und manchmal die Wandungen ausgehauener Räume mit seinen Crystallen überkleidet. Oefters kommt in den Gypsstöcken Steinsalz vor, bisweilen Glaubersalz und Schwefel.

Der Gyps ist eines der nützlichsten Mineralien. Die reinen feinkörnigen Abänderungen, welche den Namen Alabaſter tragen, werden in der Bildhauerey benützt. Die schönsten Alabaſterarbeiten kommen gegenwärtig aus der Gegend von Florenz, woselbst sich ein schön weißer, durchscheinender, sehr reiner Alabaſter findet. Eine ganz allgemeine Anwendung haben die überall verbreiteten Abänderungen in der Agricultur, vorzüglich beym Klee- und Wiesenbau. Bey der Porzellanfabrication wird der Gyps zur Glasur benützt. Im gebrannten Zustande gebraucht man ihn vorzüglich zu Abgüssen von Werken der bildenden Künſt, zu Modeln und zu Kitt, da er mit Wasser zu einer flüssigen oder breyartigen Masse angerührt, in kurzer Zeit erhärtet. Auch wird er zur

Stuckatur-Arbeit, zu Mörtel und zu vielen andern Zwecken verwendet.

2. Geschlecht. Anhydrit.

Son. Muriacit, Karstenit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die bekannten Combinationen sind: eine Combination des verticalen Prismas g, mit der ersten und zweiten Seitenfläche a und b, welche die Prismenkanten gerade abstumpfen, und mit der horizontalen End-

Fig. 117.





Fig. 118.



fläche c, Fig. 117, eine Combination der Flächen a, b, c mit den Flächen der drey rhombischen Octaëder o, o', o'', Fig. 118.

Oberfläche von c bisweilen rauch.

Theilbarkeit nach a und b sehr vollkommen, nach c ziemlich vollkommen. $H. = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. = $2,8 \dots 3,0$; Glasglanz, auf b bisweilen Perlmutterglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; farblos und gefärbt; bläulich-grau, smalteblau, violblau, fleischroth. Bruch unvollkommen muschelig splitterig. Gewöhnlich verb. Besteht aus wasserfreier, einfach-schwefelsaurer Kalkerde. (Im reinen Zustande 41,6 Kalkerde, 58,4 Schwefelsäure; im Anhydrit von Sulz am Neckar fand Klaproth: 42 Kalkerde, 57 Schwefelsäure, $\frac{1}{10}$ Kieselerde und $\frac{1}{10}$ Eisenoryd). Gibt im Kolben kein Wasser aus, oder nur eine Spur davon, die er aus der Luft aufgenommen hat; im Uebrigen verhält er sich wie Gyps.

Man unterscheidet:

1. Späthiger Anhydrit, würfeligcr Muriacit. Begreift die crystallisierten und deutlich theilbaren, groß- bis grobkörnig zusammengesetzten Abänderungen. Findet sich auf verschiedenen Steinsalzlagerstätten, oft mit Salz imprägniert. Hallau, Berchtesgaden, Hall in Tyrol, Aussee in Steyermark, Ber

in der Schweiz, Pesey und Montiers in Savoyen. Selten auf Erzgängen, Richelsdorf in Hessen, Lauterberg am Harz.

2. Strahliger und faseriger Anhydrit. Stängelige oder faserige Individuen in strahliger Zusammensetzung. Die weiße Farbe oft ins Graue und Blaue verlaufend. Sulz am Neckar, Tiede bey Braunschweig.

3. Krüftiger und dichter Anhydrit. Entsteht bey abnehmender Größe der Individuen aus Varietät 1. Setzt größere Stücke im Kalkgebirge zusammen, Der in der Schweiz, Oserode am Harz, und kommt in einzelnen, größeren oder kleineren Massen, auch mit Gyps und überhaupt unter Verhältnissen vor, die denen des Gypsvorkommens ähnlich sind. Der sogenannte Gefrösstein ist eine in darmförmig gewundenen Lagen vorkommende, dichte Anhydritabänderung von hellgrauer Farbe, welche auf den Salzlagerstätten zu Bochnia und Wielizka in Galizien vorkommt. Der sogenannte Vulpinit ist eine durch Kiesel Erde verunreinigte, schuppigkörnige Anhydritabänderung, die sich zu Vulpino, unweit Bergamo, in der Lombardey findet. Die vesteren blauen Abänderungen des Anhydrits werden mitunter geschnitten und poliert. Der Vulpinit ist in Italien unter dem Namen Marmo bardiglio di Bergamo bekannt und wird zu Tischblättern und Camin-Einfassungen verwendet.


Ein dem rothen, faserigen Anhydrit ähnliches Mineral, welches lange Zeit damit verwechselt worden ist, und sich schon durch salzigen Geschmack davon unterscheidet, ist unter dem Namen Polyhalit als eigenes Geschlecht aufgestellt worden. Es enthält 45 Gyps, 27 schwefelsaures Kali, 20 schwefelsaure Bittererde, 2 Kochsalz und 6 Wasser. Findet sich zu Ischel, Berchtesgaden, Auesee und Vic. Es schmilzt schon in der Flamme eines Kerzenlichtes.

3. Geschlecht. Pharmakolith.

Erythallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind in der Regel haar- und nadelförmig, unbestimmbar, höchst selten deutlich erkennbar, wohl ausgebildet. Eine beobachtete Combination des verticalen Prismas g , der zweyten Seitenfläche h , der schiefen Endfläche c und des schiefen Prismas o ist in

Fig. 119 dargestellt. Die Crystalle sind in der Richtung einer

Fig. 119.



Nebenchse verlängert; von den Flächen des Prismas *g* sind zwey gegenüberliegende sehr vorherrschend gegen die andern, gerade so wie es auch oft bey dem Gyps der Fall ist. Gewöhnlich sind die feinen Crystalle halbkugelig, traubig, stalactitisch gruppiert.

Theilbarkeit nach *b* sehr vollkommen.

$\rho. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. = $2,6 \dots 2,7$; Glasglanz, auf *g* Perlmutterglanz; farblos, grünlich-, gelblich-,

grünlich- und häufig röthlichweiß. Durchsichtig bis durchscheinend. Milde, in dünnen Blättchen biegsam. Desters erdig oder mehlartig, auch als rindeartiger Ueberzug. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-arseniksaurem Kalk und ist öfters durch eine Vermengung von arseniksaurem Kobalt röthlich gefärbt (25 Kalk, 50,54 Arseniksäure, 24,46 Wasser). Gibt im Kölbchen viel Wasser aus; entwickelt auf Kohle geschmolzen Arsenikgeruch; schmilzt in der Zange für sich zu einem weißen Email.

Findet sich als ein neueres Erzeugniß auf Arsenik- und Kobaltlagerstätten, auf Klüften und in alten Grubenbauen, wo dessen Bildung fortbauert. Grube Anton und Sophie bey Wittichen im Schwarzwald, Markirch in den Vogesen, Andreasberg am Harz, Riechelsdorf in Hessen, Joachimsthal in Böhmen.

Als verschieden vom Pharmakolith führt Haibinger einen arseniksauren Kalk unbestimmten Fundorts, den er in einer Edinburgher Sammlung fand, unter dem Namen *diatomes Gyps-haloid* auf. Es besteht aus 83,34 arseniksaurem Kalk und 16,66 Wasser.

Der sogenannte Pikropharmakolith unterscheidet sich durch einen kleinen Gehalt von arseniksaurer Bittererde. Er enthält nämlich 24,64 Kalkerde, 3,21 Bittererde, 46,97 Arseniksäure, 23,97 Wasser, und ist durch ein bißchen arseniksauren Kobalt geröthet. Findet sich zu Riechelsdorf in Hessen. Damit scheint der Roselit von Schneeberg in Sachsen nahe übereinzukommen.

3. Eigenschaft des Flußspaths.

1. Geschlecht. Fluß.

Syn. Flußsaurer Kalk.

Erythallsystem regulär. Die gewöhnlichste Gestalt ist der Würfel, überdieß kommen als selbständige, einfache Gestalten das Octaëder, das Rautendodecaëder und das Hexakisoctaëder vor. Siehe Fig. 1, S. 36. Fig. 5, S. 37. Fig. 9, S. 45. Fig. 11, S. 46. Häufig kommen Combinationen vor: des Würfels mit dem Octaëder, wobey bald die Flächen des einen, bald diejenigen des andern vorherrschen, Fig. 120 und 121; Combinationen des Würfels mit dem Dodecaëder d, F. 122; Combination des Würfels

Fig. 120.




Fig. 121.




Fig. 122.




Fig. 123.





Fig. 124.



mit dem Tetraëder $\frac{d}{3}$ (Pyramidenwürfel S. 47), Figur 123. Combination des Würfels und des Scoletetraëders $\frac{o}{2}$, Fig. 10, S. 45, dargestellt durch Figur 124;

Combination des Würfels und des Hexakisoctaëders, Fig. 125. Oefters sind Würfel zu Zwillingen verwachsen; die Zusammen-
setzungsfläche entspricht einer Octaëderfläche; die Umdrehungsachse
ist senkrecht darauf, Fig. 126. Die Oberfläche des Würfels ge-

Fig. 125.





Fig. 126.



wöhnlich glatt, aber öfters auch gestreift; beim Octaëder, Dodecaëder und Hexakisoctaëder meist rauh. Oefters sind die Crystalle verzogen, unvollständig ausgebildet, oder durch convexe Flächen begrenzt. Theilbarkeit sehr vollkommen nach den Flächen des regulären Octaëders. $H. = 4,0$; spec. Gew. $= 3,1 \dots 3,2$; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. Farblos und gefärbt, und zwar in den mannichfaltigsten und oft sehr schönen gelben, grünen, blauen und rothen Farben, unter welchen sich besonders das Violblaue, Weingelbe und Smaragdgrüne auszeichnen. Phosphoresciert in der Hitze mit grünem Lichte. Bruch muschelig oder uneben. Besteht aus Fluor-Calcium (52,43 Calcium, 47,57 Fluor). Entwickelt mit Schwefelsäure Dämpfe von Flußsäure, welche Glas anfressen. Schmilzt für sich in starkem Feuer zu einer unklaren Perle; sehr leicht und zu einer klaren Perle schmilzt er mit Gyps.

Man unterscheidet folgende Abänderungen:

1. Späthiger Fluß, Flußpath. Begreift die crystallisierten und theilbaren Abänderungen. Die Crystalle theils einzeln aufgewachsen, theils, und zwar häufiger, zu Drusen verbunden, mannichfaltig gruppiert und von äußerster Kleinheit bis zu 6 Zoll im Durchmesser und darüber. Derbe Massen zeigen

fters eine fbrnige, bisweilen auch eine fängelige oder fchalige Zufammenfetzung (fängeliger, fchaliger Flußfpath). Selten als Verfteinerungsmaffe von Erinoideen (Derbyshire). Zuweilen zeigt ein Crystall verschiedene Farben.

Findet fih vorzugsweife auf Erzgängen, felterner auf Lagern. So auf den Blei- und Silbergängen zu Annaberg, Marienberg, Freiberg, auf den Zinn- und Zinnwäldern zu Altenberg, Zinnwald und Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge; auf Blei-, Silber- und Kupfergängen zu Andreasberg und Lauterberg am Harz; beynahe auf allen Gängen im Schwarzwald, und namentlich im Mänsferthal und zu St. Blasien in ganz ausgezeichneten Drufen, und an ersterem Orte fters in der feltenen Gefalt, welche Fig. 125 darftellt; auf vielen Gängen in England, Cornwallis, Derbyshire, Cumberland, Northumberland, zu Kongsberg in Norwegen, am Gotthardt und im Chamouny, und überdieß finden fih einzelne Flußfpathcrystalle in verschiedenen Gebilden des Gföhsgebildes, in Sandfteinen und Mergeln, und hin und wieder auch in plutonifchen und vulcanifchen Maffen.

2. Dichter Fluß. Untheilbar; herb; durchfcheinend; fchimmernd oder matt. Bruch muschelig ins Splitterige übergehend. Bläulich- und grünlichgrau. Findet fih auf befonderen bis zu mehreren Fächern mächtigen Gängen am Harz, zu Marienne in Savoyen, zu Kongsberg in Norwegen, auf den Drefdgruben in Weftmanland in Schweden.

3. Erdiger Fluß. Erdige, flaubartige Theile; matt; fchmutzig blau. Marienberg in Sachfen, Welfendorf in Bayern, Cumberland, Durham und Devonshire in England, Katoska im Gouvernement Moskau. (Katoskit.)


Der Fluß ift eines der fchönften Mineralgeflechter fowohl hinfichtlich feiner Formen als der Reinheit feiner Farben. Den Namen hat er von der Eigenschaft, mit verschiedenen erdigen Stoffen vermengt, leicht zu fchmelzen. Diefes Eigenschaft wird allgemein benutzt, indem man ihn als Flußmittel verwendet, namentlich beim Blei-, Silber- und Kupferfchmelzen. Das Phosphoreszieren zeigen einige Abänderungen fo ausgezeichnet, daß man diefen, nach dem grünen Lichte, das fie ausftrahlen, den Namen Chlorophan gegeben hat. Schön gefärbte größere

Stücke werden bisweilen zu Tafeln, kleinen Dosen und Basen verarbeitet. Ganz allgemein wird der Fluß zur Darstellung der Flußsäure und flußsaurer Verbindungen und zum Glasätzen angewendet.

2. Geschlecht. Apatit.


Crystallsystem drey- und einachsig. Grundform ein Hexagonodocaeäder mit dem Endkantenwinkel von $142^{\circ} 20'$. Zeigt viele

Fig. 127.



manchmal auch noch die

Fig. 128.



Combinationen. Eine gewöhnliche Combination (Fig. 127) besteht aus den Flächen des Dodecaeders r und des ersten sechsseitigen Prismas g , und ist Fig. 40. E. 136 ähnlich; dazu kommt oft noch die horizontale Endfläche c ; öfters kommt auch das erste sechsseitige Prisma mit der horizontalen Endfläche vor, und damit sind Flächen des zweiten sechsseitigen Prismas verbunden. Durch Fig. 128 ist eine Combination des ersten sechsseitigen Prismas g , des Dodecaeders r , eines spitzeren Dodecaeders z und der horizontalen Endfläche c dargestellt. Uebrigens kommen noch einige stumpfere und spitzere Dodecaeder vor.

Die Crystalle sind gewöhnlich kurz säulenförmig, oder dick tafelförmig durch Vorherrschen der Flächen g oder c . Die Prismenflächen vertical gestreift; manche Crystalle wie gestossen. Theilbarkeit nach g und c , unvollkommen. $S. = 5,0$; spec. Gew. $= 3,15 - 3,25$; Glasglanz, oftmals ausgezeichneter Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend, zuweilen mit Dichroismus. Farblos, jedoch selten, gewöhnlich blau und grün, auch grau, roth und braun, ähnlich wie beim Flußspath. Bruch muschelig. Kommt auch herb vor, blätterig, körnig, faserig und erdig. Besteht aus 3 Attheilen zweydrittel-

phosphorsaurer Kalkerde und 1 Antheil Fluor- oder Chlor-Calcium. Chlor und Fluor treten gewöhnlich in schwankenden Verhältnissen als vicariirende Substanzen auf; bald herrscht dieses, bald jenes vor. Der Apatit mit vorwaltendem Fluorcalcium (Gotthardter, Ehrenfriedersdorfer) enthält 92,31 phosphorsauren Kalk und 7,69 Fluorcalcium; derjenige mit vorwaltendem Chlorcalcium enthält (Apatit von Snarum) 89,38 phosphorsauren Kalk, 10,62 Chlorcalcium. Schmilzt in strengem Feuer zu einem farblosen Glase. Löslich in Salpetersäure. Gibt mit Schwefelsäure glasähnliche Dämpfe aus; die Lösung in Salpetersäure wird durch Silberlösung gefällt. Der Gehalt an Phosphorsäure zeigt sich daran, daß das Mineral, mit Borsäure und Eisenbrant zusammengeschmolzen, eine spröde Kugel von Phosphoreisen gibt. Man unterscheidet folgende Abänderungen:

1. Späthiger Apatit. Begreift die Crystalle und die verben, blätterigen und körnigen Stücke. Findet sich öfters in Gesteine eingewachsen, im Gneis bey Freiburg im Breisgau, im Granit des Greifensteins in Sachsen, im Tuff des Gratners in Tyrol, im Glimmerschiefer von Snarum in Norwegen; in vulcanischen Gesteinen am Kaiserstuhl in Breisgau, am Laacher See, zu Albano bey Rom, zu Caprera bey Cadix. Grüne Crystalle haben den Namen Spargelstein erhalten. Oft kommt er auch auf Drusenräumen und Gängen vor, Gotthardt, Heiligenbluter Tauern (weiße und sehr durchsichtige Crystalle, flächenreich), auf den Zinnhängen zu Ehrenfriedersdorf, Zinnwald und in Cornwallis; auf Magneteisenerzlageru zu Arendal, Gellibara und Kringabrida in Scandinavien.

2. Faseriger Apatit. Phosphorit. Strahlig-faserige Textur; traubige, nierenförmige, stalactitische Stücke; gelblich- und graulich-weiß. Amberg in Baiern, Schlackenwalde im Erzgebirge, Logrosan in Estremadura.

3. Erdiger Phosphorit. Feinerdige, lose zusammenhängende Theile. Szigeth in Ungarn.

Der Apatit kommt auf den sächsischen und böhmischen Zinnsteingängen immer mit Flußpath vor. Sein Vorkommen mit Eisensteinen sieht der Eisenhüttenmann ungern, weil er, wenn er mit dem Erz in den Ofen gelangt, das Eisen brüchig macht.

4. Eigenschaft der Hornblende.

1. Geschlecht. Tafelspath.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Crystalle höchst selten, gewöhnlich verb mit blätteriger, langschaliger Zusammensetzung. Theilbarkeit nach zwey Flächen, die sich unter $95^{\circ} 20'$ schneiden, deutlich.

H. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 2,8 ... 2,9; Glasglanz, perlmutterartiger; halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Farblos und gefärbt, gelblich-, graulich-, röthlich-, bräunlichweiß. Bruch uneben; phosphorescirt durch Reibung und Erwärmung. Besteht aus doppelt-kieselsaurer Kalkerde (47,41 Kalkerde, 51,44 Kieselerde, mit etwas Eisen- und Manganoxydul). Schmilzt bey starkem Feuer zu einer halbklaren, farblosen Glasperle; bildet mit Salzsäure eine Gallerte.

Wurde zuerst zu Eziklova in Ungarn gefunden in körnigem Kalkstein und in Begleitung von Granat, später sodann im körnigen Kalkstein zu Pargas und Perheniemi in Finland und zu Wikum in Schweden, auch bey Auerbach an der Bergstraße, zu Willsborough in Pensylvanien und endlich zu Edinburgh in Schottland, woselbst er im vulcanischen Dolerit vorkommt. Beym Eisenschmelzen fallen Schlacken, welche hinsichtlich ihrer Zusammensetzung vollkommen mit dem Tafelspath übereinstimmen, und bey langsamer Abkühlung auch, blätterig werden, bisweilen selbst in tafelförmigen, sechsseitigen Prismen crystallisiren. Eine Thatfache, welche, in Bezug auf die Entstehung des Tafelspaths, nicht ohne Interesse ist.

2. Geschlecht. Augit.

Syn. Pyroxen.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Flächen der Grundgestalt des zwey- und eingliedrigen Octaëders, S. 59, erscheinen in Combinationen als schiefe vierseitige Prismen, die an den Enden der Crystalle liegen. Eine der allergewöhnlichsten Com-

binationen ist durch Fig. 129 dargestellt; sie besteht aus dem ver-

Fig. 129.





Fig. 130.



ticalen Prisma g, der ersten und zweyten Seitenfläche a und b und dem schiefen Prisma o, und zeigt sich besonders häufig beyrn Augit

der in vulcanischen Bildungen, in Basalten, Laven vorkommt. Fig. 130 stellt eine Combination vor, die aus dem verticalen Prisma g, der ersten Seitenfläche a, dem schiefen Prisma o und der schiefen Endfläche d besteht. Fig. 131 ist eine Combination des ver-

Fig. 131.






Fig. 132.



ticalen Prisma g, der ersten und zweyten Seitenfläche a und b, der Basis c und der schiefen Endfläche d'; Fig. 132 eine Combination des verticalen Prismas g, der er-

Fig. 133.



sten und zweyten Seitenfläche a und b, welche vorherrschen, eines zweyten verticalen Prismas, des Octaëders o und eines schiefen Prismas 2 o; Fig. 133 eine Combination des Prismas g, der beiden Seitenflächen a und b, welche vorherrschen; zwey anderer verticaler Prismen f und i und

der schiefen Endfläche d; Fig. 134 eine Combination des Pris-

Fig. 134.





Fig. 135.



mas g, der Seitenfläche a und b, des schiefen Prismas 2 o und der Endfläche d. Defter kommen auch Zwillinge vor, zumal der Gestalt Figur 127, die Zusammensetzungsfläche ist parallel a; die

Zwillinge haben das Ansehen von Fig. 135. Nicht selten sieht man auch Durchkreuzungen der Crystalle. Ihr Habitus ist gewöhnlich kurz und dick säulenartig, selten durch Vorherrschcn von Octaëderflächen pyramidal.


Theilbarkeit nach den Flächen des zur Grundgestalt gehörigen verticalen Prismas g ziemlich vollkommen; diese Theilungsrichtungen schneiden sich unter einem Winkel von $87^{\circ} 6'$; auch jedoch weniger vollkommen, theilbar nach a und b. $H. = 3,0 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 3,2 \dots 3,5$; Glasglanz; durchsichtig in allen Graden; farblos und gefärbt, verschiedenartig grün und schwarz; Bruch muschelig .., uneben. Besteht aus einer Verbindung von doppelt-kohlensaurer Kalkerde mit doppelt-kieselsaurer Bittererde, und enthält im reinsten Zustande 25,8 Kalkerde, 18,2 Bittererde und 56,0 Kieselerde. Eisen- und Manganorydul ersetzen häufig einen größeren oder geringeren Antheil von Kalk- oder Bittererde, und bisweilen sind einige Procente Kieselerde durch Thonerde ersetzt, namentlich bey den Augiten des vulcanischen Gebirges. Schmilzt für sich, mehr oder weniger aufwallend, zu einem theils farblosen, theils grau, braun oder schwarz gefärbtem Glase. Wird durch Schmelzen mit Phosphorsalz zerlegt; die thonerdhaltigen Augite des vulcanischen Gebirges werden aber ungleich schwerer, einige beynabe gar nicht davon zerlegt.

Man unterscheidet folgende Gattungen:

1. Diopsid (Baisalit). Die Crystalle haben den Typus der Fig. 132, und sind theils einzeln aufgewachsen, theils in Drusen versammelt. Farbe graulich-, grünlichweiß und perlgrau, häufig verschiedenartig grün; durchsichtig bis durchscheinend. Auch sehr in breitsfängeligen oder schalenartigen Zusammensetzungen mit zwillingförmig verbundenen Individuen. Findet sich vorzüglich auf der Alpe della Miasa in Piemont mit crySTALLISIRTEM Kalkstein und Talk, und zu Schwarzenstein in Tyrol, woher die länggezogenen, an den Enden abgebrochenen, durchsichtigen Prismen kommen, deren Flächen stark gestreift sind, und die öfters zwei Farben zeigen; auch am Gottshard in der Schweiz, zu Heiligenblut in Kärnten, Reichenstein in Schlessen, Wildenau, Breitenbrunn und Scheibenberg in Sachsen und am Balkalsee in Sibirien.

2. Sahlit (Malakolith). Die Crystalle besitzen den Typus der Fig. 133. Durchscheinend; schnee-, bläulich- und grünlichweiß, auch bis schwärzlichgrün; auch sehr in blätteriger Zusammensetzung. Findet sich vorzüglich in Schweden, zu Sahla, Norberg, Philippskär, Malsjö, Gullsjö, Svardsjö, zu Arendal in Norwegen, Orjersvi in Finnland, im Fassathal in Südtirol, zu Schwarzenberg und an einigen andern Orten in Sachsen und im Fichtelgebirge.

3. Fassat. Die Crystalle zeichnen sich durch ihre spitzpyramidale Gestalt aus, welche bey den übrigen Angiten nicht vorkommt. Sie ist durch Fig. 136 dargestellt. Auch bis schwärzlichgrün. Auch sehr in körniger Zusammensetzung. Findet sich am Monzoniberg im Fassathal.



4. Angit (gemeiner, basaltischer). Crystallisirt nach dem Typus von Fig. 129, 130, 131, 134. Gewöhnlich schwarz, auch schwärzlichgrün; undurchsichtig; theils in eingewachsenen Crystallen, die öfters ganz glatt, doch mitunter auch rauh, abge-

rundet und wie geflossen sind, theils in Körnern und größeren, derben, eingewachsenen Massen. Kommt häufig in Basalten, Doleriten und Laven vor, und bildet einen wesentlichen Gemengtheil der ersteren, ferner in Thonsteinen, Mandolsteinen, vulcanischen Porphyren. Ausgezeichnete Crystalle finden sich am Kaiserstuhl im Breisgau, am Monte Busaure im Fassathal, in den böhmischen und sächsischen Basaltbildungen, am Habichtswalde bey Cassel, in den vulcanischen Gesteinen der Auvergne, der Gegend von Frascati bey Rom und der Gegend von Edinburg, in den Laven des Vesuv, Aetna u.s.w. Von besonderem Interesse ist das Vorkommen des Augits in mehreren Meteorsteinen, wie in denen von Stannern und Juvenas.

5. Kalkolith (körniger Augit). Die Crystalle haben den Typus der Fig. 129, 130, 134, sind theils einzeln eingewachsen, theils in Drusen versammelt, oft rauh, wie geflossen, mit abgerundeten Kanten und Ecken und in Körner übergehend. Auch derb in körniger Zusammensetzung, aus welcher sich die einzelnen Individuen leicht abtrennen. Findet sich vorzüglich im Norden, zu Arendal in Norwegen, zu Evardsjö und Hällestä in Schweden, zu Pargas in Finnland, am Champlainsee in Nordamerika und auf Rund-Öe bey Grönland. Das Augitgestein, welches im Thal von Biedersjö und bey Portet im Thale Ballongue in den Pyrenäen größere Bergmassen zusammensetzt und Lherzolit- oder Augitfels genannt wird, nähert sich dem Kalkolith am meisten.

6. Hedenbergit. Derb; Theilbarkeit deutlich; blättrige und körnige Zusammensetzung. Schwärzlichgrün ins Braune verlaufend. Wird vom Magnete angezogen. Enthält 26 Eisenorydul, 21 Kalkerde, 3 Kalkerde, 49 Kieselerde. Findet sich, von Mangneteisenstein begleitet und damit gemengt, auf den Halben der verlassenen Marmorgrufva bey Tunaberg in Schweden.

7. Diabas. Selten in Crystallen nach dem Typus der Fig. 130. Theilbarkeit parallel der Abstumpfungsfläche der scharfen Seitenkanten des Prismas g sehr vollkommen, parallel den Flächen dieses Prismas unvollkommen; auf der ausgezeichneten Theilungsfläche metallähnlicher Perlmutterglanz; schwach durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten, außen Glasglanz,

geringer. Die Farbe variiert vom Lauchgrünen durch das Braune und Graue. Gewöhnlich verb, eingewachsen mit blätteriger Zusammensetzung, öfters groß und breitblättrig; bisweilen gebogen blättrig und frummschalig. Der ausgezeichnete Diassag von Prato unfern Florenz enthält: Kalkerde 19,0, Bittererde 14,9, Eisenorydul 8,6, Manganorydul 0,38, Thonerde 2,47, Kieselerde 53,2; andere Arten, z. B. der Diassag von der Hasle am Harz, derjenige aus dem Salzburgerischen, enthalten etwas mehr Bittererde. Die graulichen und bräunlichen Abänderungen zeigen auf der Haupttheilungsfläche öfters ein ausgezeichnetes, metallähnliches Ansehen; solche Abänderungen heißt man metallisirenden Diassag, *Diallage metalloïde*. Dieser ist ein wesentlicher Gemengtheil des Gabbro, eines ausgezeichneten Gesteins. Der Diassag findet sich in demselben in vielen Gebirgen, am Harz, im Schwarzwald, in Schlessen, im Toscanischen, auf Corsica n.s.w.


8. Bronzit. Verb; Theilbarkeit einmal ausgezeichnet in derselben Richtung, wie beym Diassag, und überdieß, etwas weniger vollkommen, nach zwey Richtungen, symmetrisch gegen die erste, unter einem Winkel von 134° geneigt, und nach einer vierten Richtung, welche senkrecht auf die erste ist, aber weniger leicht und deutlich als beym Diassag. Auf der ausgezeichneten Theilungsfläche Perlmutterglanz, schwach metallähnlich; diese Fläche ist der Länge nach gestreift, wodurch das Mineral ein faseriges Ansehen gewinnt, was Haüy's Name *diallage fibro-laminaire* andeutet. Die Theilungsflächen nach der zweyten und dritten Richtung sind glatt und spiegelnd, fettglänzend, gränlichbraun; die vierte Theilungsfläche ist oft kaum wahrzunehmen. $H. = 5,25 \dots 6,0$; spec. Gew. $3,2 \dots 3,3$; zeigt einen höhern Grad von Durchscheinheit als Diassag. Der Bronzit aus dem Ultenthal in Tyrol enthält Kalkerde 2,2, Bittererde 29,6, Eisenorydul 3,5, Manganorydul 0,6, Kieselerde 56,8. Er findet sich gewöhnlich in gebogen blättriger Zusammensetzung, in Olivinmassen am Stempel bey Marburg, in derben Stücken unfern Hof im Fichtelgebirge, am Gulsen bey Kraubat in Steyermark, auf der Seefeldapfe im Ultenthal in Tyrol.

9. Hypersthen (Paulit). Verb; Theilbarkeit wie beym

Bronzit; auf der Haupttheilungsfläche ein fast kupferrother, metallischer Schimmer. $\rho = 5,5$; spec. Gew. 3,38; graulich- und grünlichschwarz; in dünnen Splittern durchscheinend; außen glasartiger Glanz. Enthält Kalkerde 1,5, Bittererde 14, Eisenoryd 24,5, Kieselerde 54,25. Findet sich in blätteriger Zusammenfassung auf der Paulsinsel an der Küste von Labrador, als Gemengtheil eines Sphenites bey le Prese unfern Belladore im Beltlin, auf der Insel Skye, auf Bergens Halbinsel in Norwegen, auf Grönland. Man verarbeitet ihn, seines Farbenschimmers wegen, zu Dosen, Steinen für Borstennadeln und verschiedenen Bijouteriewaren. Die Steinschneider nennen ihn labradorische Parublen des

10. Akmit. Die Crystalle sind länggezogene, lanzettartige Prismen, die oft an den Enden verbrochen, gebogen und nicht selten fußlang sind. Fig. 137 stellt

Fig. 137.



eine Gestalt dieses Minerals dar, worinn die Prismenfläche g , die Seitenflächen a und b , die Octaederflächen c und die schiefen Prismenflächen o combinirt sind. Theilbarkeit wie beim Augit. $\rho = 6,0 \dots 6,5$; spec. Gew. $= 3,2 \dots 3,3$; Glasglanz; in sehr dünnen Splittern durchscheinend. Grünlichgrau bis bräunlichschwarz. Besteht aus Kalkerde 0,72, Eisenoryd 31,25, Manganoryd 1,08, Natron 10,4, Kieselerde 55,25. Wenn in den frischen Exemplaren das Eisen als Drydul gefunden wird, dann ist kein Zweifel, daß dieses die Bittererde-ersetzt

und die Kalkerde durch Natron vertreten, somit die Zusammensetzung ganz so wie beim Augit ist, mit welchem das Mineral, hinsichtlich der Structur- und Crystallisationsverhältnisse übereinstimmt. Findet sich in Schweden, unsern Bessberg's Eisengrube, in Egers Kirchspeer in Quarz eingewachsen, und in Norwegen im Sphenit bey Kleß, in der Nähe von Porsgrund.

3. Geschlecht. Hornblende.

Syn. Amphibol.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die Flächen der Grundgestalt, des zwey- und eingliederigen Octaëders o, erscheinen als Flächen eines vorderen, an den Enden liegenden, schiefen Prismas, in Combination mit einem verticalen rhombischen Prisma g von $124^{\circ} 30'$, damit ist gewöhnlich die Seitenfläche b ver-

bunden und die hintere schiefe Endfläche c, F. 138, eine gewöhnliche Combination der im vulcanischen Gebirge vorkommenden Hornblende; ebenso diejenige Fig. 139, wobey die Prismenflächen g mit der Seitenfläche b und einem hinteren schiefen Prisma f verbunden sind, und Fig. 140, worinn die Pris-

menflächen g mit der Seitenfläche b, dem vorderen schiefen Prisma o, einem hinteren schiefen Prisma f und der hinteren schiefen Endfläche c vereinigt sind. Die Crystalle, welche im Grundgebirge vorkommen, zeigen gewöhnlich die Combination des Prismas g mit dem hintern schiefen Prisma f,

Fig. 141, womit öfters noch die Seitenfläche a und die Fläche d, welche die Kante zwischen ff abstumpft, verbunden sind, Fig. 142. Mitunter kommen auch Zwillinge vor; die Individuen sind parallel der Fläche a verbunden.

Fig. 138.




Fig. 139.




Fig. 140.




Fig. 141.





Fig. 142.



Der Habitus der Crystalle ist theils kurz und dick säulenartig, theils lang- und dünn-, oft stangenartig säulenförmig. Die verticalen Flächen sind bisweilen gestreift, die Flächen f, g und a manchmal gekrümmt. Ganze Crystalle sind oftmals rauh oder wie angeschmolzen.

Theilbarkeit parallel g ausgezeichnet; unvollkommen nach a und b. $H. = 5,0 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 2,9 \dots 3,4$; Glasglanz, auf Theilungs- und Zusammensetzungsflächen fast immer perlmutterartig; durchsichtig in allen Graden; farblos und gefärbt, grau, grün, schwarz. Besteht aus dreysach-kieselsaurem Kalk, verbunden mit doppelt-kieselsaurer Bittererde und etwas Fluor-Calcium. Mangan- und Eisenorydul ersetzen theilweise die Kalk- und Bittererde, ein Theil Kieselerde ist öfters durch Thonerde ersetzt, und Fluor ist noch nicht in allen Abänderungen nachgewiesen. Eine der reinsten Abänderungen (Tremolit) besteht aus: Kalkerde 11,11, Bittererde 25,00, Eisenorydul 0,5, Kieselsäure 59,75, Flußsäure 0,94. Die schwarzen und grünen enthalten viel Eisenorydul; diejenigen, welche im vulcanischen Gebirge vorkommen, überdies noch bis zu 8 Procent Thonerde. Schmilzt vor dem Löthrohr zu einem Glase, welches je nach dem Eisengehalte, weiß, grün oder schwarz ist.

Es werden folgende Gattungen unterschieden:

1. Tremolit (Grammatit). Die Crystalle haben den Typus der Fig. 141 und 142, sind stängelig oder nabelsförmig, zuweilen gebogen, eingewachsen. Farbe licht, graulich, gelblich, grünlich, röthlichweiß, grau, grün und blaß violblau; halb durchsichtig bis durchscheinend; Glasglanz in den Perlmutterglanz geneigt, und bey zusammengefügten, dünnstängeligen Abänderungen seidenartig. Öfters auch verb, gewöhnlich mit divergirend (selten mit parallel-) strahliger und faseriger Zusammensetzung. Spec. Gew. $= 2,9$. Man unterscheidet gemeinen, glasartigen und asbestartigen Tremolit. Zu erstem rechnet man Crystalle und verbe, stängelige Massen von den geringsten Graden der Durchsichtigkeit; der glasartige Tremolit begreift Crystalle und verbe, stängelige Abänderungen von den höheren Graden der Durchsichtigkeit und reinerem Glasglanze; der asbestartige die

sehr dünnstängeligen oder faserigen Abänderungen mit Seidenglanz.

Findet sich im Grundgebirge des Gotthardt, in körnigem Kalk und Dolomit zu Campo longo, zu Pfitsch und Klausen in Tyrol, Gullsjö und Åker in Schweden, zu Långfeld im Erzgebirge, Dravtza und Dognazka im Banat, in Schottland, Nordamerika, und in weniger ausgezeichneten Stücken noch an mehreren andern Orten.

2. Strahlstein (Aktinot). Zeigt dieselben Formen, wie der Tremolit. Die Crystalle sind langgestreckt, oft nadel förmig und haarförmig, derbe Massen stängelig oder faserig. Die Zusammensetzung ist öfters büschelförmig, seltener parallel strahlig oder faserig. Graue Farbe in verschiedenen Nuancen, seltener braun oder grünlichgrau. Glasglanz oder Seidenglanz; durchscheinend. Man unterscheidet dieselben Abänderungen, wie beim Tremolit. Findet sich in talkigen Gesteinen eingewachsen am Gotthardt und im Zillertal; auf Eisenlagern zu Ehrenfriedersdorf, Raschau und Breitenbrunn in Sachsen, in Westmanland, Wärmeland u. a. G. Schwedens und zu Årendal in Norwegen.

3. Hornblende.

a) Basaltische Hornblende. Crystallisiert in den Formen Fig. 138, 139, 140. Die Crystalle sind dick- und kurzsäulenartig, eingewachsen, rundum ausgebildet, schwarz, undurchsichtig und zeigen öfters zugerandete Ecken und Kanten. Findet sich in vulcanischen Bildungen, insbesondere in sehr schönen Crystallen zu Kostenblatt und Eznuzin in Böhmen und am Capo de Gades in Spanien; in weniger schönen Crystallen und derben blätterigen Stücken findet er sich in der Eifel, im Siebengebirge, an der Rhön, auf dem Habichtswalde, am Kaiserstuhl, im Hegau u.s.w.

b) Gemeine Hornblende. Crystallisiert nach dem Typus von Fig. 141 und 142, erscheint auch häufig derb und eingesprenkt, mit blätteriger, körniger und strahliger Zusammensetzung; undurchsichtig oder nur an den Kanten durchscheinend; rabenschwarz, schwärzlichgrün bis dunkel lauchgrün. Tritt als we-

feinlicher Gemengtheit vieler Gesteine auf, namentlich der Gransteine und Syenite, erscheint als Hauptmasse eigenthümlicher Gesteine (Hornblendegesteine), welche größere Massen im Grund- und Uebergangsgebirge zusammensetzen, und öfters auf Lagerstätten verschiedener Mineralien und Erze. Die wichtigsten Fundorte sind Schriesheim an der Bergstraße, das Rensch- und obere Albtal im Schwarzwalde, das Ziller- und Pustertal in Tyrol, die Saualpe in Kärnthen (Karinthien), Arendal und Kongeberg in Norwegen, Pargas in Finnland (Pargasit), Fahlun in Schweden.

4. Anthophyllit. Bis jetzt nur verb. Theilbarkeit nach dem Prisma g. Zusammensetzung blätterig ober, theils gerade, theils keilförmig aus einander laufend stängelig. $D. = 3,0$; spec. Gew. $= 3,1$; Perlmutterglanz, zuweilen ausgezeichnet und beynahe metallähnlich auf den Theilungsflächen; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten; Farbe zwischen gelblichgrau und nelfenbraun. Besteht aus einem Bisilicat von Kalk- und Bittererde, verbunden mit einem Trisilicat des Eisenoxyduls, hat somit im Wesentlichen die Zusammensetzung der Hornblende. Eisenoxydul ersetzt einen Theil der Kalkerde. Findet sich bey Kongeberg und Modum in Norwegen, zu Helsingfors in Finnland, auf Grönland u. a. e. a. D.

Die beiden Geschlechter Augit und Hornblende zeigen sich öfters sehr regelmäßig und innig mit einander verwachsen, und bilden so Gemenge, die unter dem Namen Smaragdite, Omphaxite bekannt, und lange Zeit als einfache Mineralkörper betrachtet worden sind. Sie finden sich am Bacher in Steyermark, auf der Saualpe in Kärnthen, in der Gegend von Hof im Fichtelgebirge und an einigen andern Orten, und setzen mit Granat ein Gestein zusammen, das seiner ausgesuchten Bestandtheile wegen, den Namen Eklogit erhalten hat.

Daß häufige Zusammenvorkommen von Augit und Hornblende, und die eben erwähnte häufige regelmäßige Verwachsung beider, deuten bereits eine Verwandtschaft dieser Mineralgeschlechter an; weit mehr aber noch, und völlig klar, wird diese durch Folgendes herausgestellt:

In den Grünschiefern des Ural hat G. Rose Crystalle gefunden, welche die Gestalt des Augits und die Theilbarkeit der Hornblende besitzen. Solche Crystalle wurden

U r a l i t

genannt, weil sie sich so ausgezeichnet am Ural finden. (Dorfer Mostowaja, 30 Werst nördlich von Catharinenburg und Muldakajewsk bey Miasl.) Sie sind also der Gestalt nach Augit, der Theilbarkeit nach Hornblende. Sie finden sich auch in dem vulcanischen Gestein des Fassathals zwischen Boscampo und Predazzo, zu Mysore in Ostindien und zu Arendal in Norwegen. Der Uralit von Arendal zeigt noch das merkwürdige Verhältniß, daß bey ihm die Seitenflächen der Hornblende und des Augits zusammen vorkommen. Seine Crystalle erscheinen mit den Flächen g, a, b, d der Fig. 134, somit als eine Combination der Prismenflächen gg, die sich unter 87° schneiden, der ersten und zweyten Seitenfläche a und b und der schiefen Endfläche d. Sie sind schwärzlichgrün; ihre Flächen sind druckig durch Kanten, die unter einander und mit den Seitenkanten der Crystalle parallel laufen, und von kleinen Hornblendeprismen gebildet werden. Auf der Seitenfläche a, der Abstumpfungsfläche der scharfen Seitenkanten des Uralits, liegen die stumpfen Seitenkanten der Hornblendeprismen in einer Ebene; auf der Seitenfläche b liegen ihre scharfen Seitenkanten und auf den Seitenflächen g liegen die Prismen gleichfalls in einer Ebene, und parallel mit diesen Flächen. Die Spaltungsflächen des Uralits sind diejenigen der Hornblende, und mit ihnen spiegeln die Seitenflächen der kleinen Prismen und sie liegen somit denselben parallel. Die kleinen Hornblendecrystalle sind von derselben Farbe, wie die Uralite mit ihnen fest verwachsen und ohne Beschädigung derselben nicht wegzunehmen.

Diese innige Verbindung der Flächen von Augit- und Hornblendecrystallen beweist die nahe Verwandtschaft beider Geschlechter auf das vollkommenste. Sie wird auch noch dadurch bestätigt, daß die chemische Zusammensetzung beider Substanzen sich sehr ähnlich ist, daß ihre specifischen Gewichte gleich hoch hinaufgehen, daß sie sehr in regelmäßiger Verwachsung mit einan-

der vorkommen und so häufig einander begleiten. Die Unterschiede in der Form lassen sich durch die verschiedenen Umstände erklären, unter denen Augit und Hornblende sich bildeten. Augitform scheint sich bey schnellerer, Hornblendeform bey langsamerer Abkühlung zu bilden, und der ersteré, wenn beide zusammen vorkommen, immer zuerst zu gestalten. Die Uralite liegen in einem Gestein, das früher in geschmolzenem Zustand gewesen ist; als es aus der ersten Hitze sich schnell abkühlte, entstanden Augitformen, deren noch weiche Masse während der weiteren langsameren Abkühlung bis zur völligen Erkaltung die Theilbarkeit, d. i. die Structur der Hornblende, annahm. Das gewöhnliche Vorkommen der Hornblende und des Augits unterstützt diese Annahme. Die Hornblende kommt gewöhnlich im Sphenite vor, auch im Trachyte, und zwar in Gemeinschaft mit Quarz, Feldspath, Albit, Rhopalolith (dem glasigen Feldspath S. 191), d. i. mit lauter Substanzen, die man durch Schmelzung ihrer Bestandtheile nur bey der allmählichsten Abkühlung in Crystallen erhalten kann, was auch bey der Hornblende der Fall ist. Der Augit hingegen findet sich vorzüglich in vulcanischen Gesteinen, Basalt, Dolerit, Lava, mit Olivin, welchen man durch Zusammenschmelzung seiner Bestandtheile crystallisiert darstellen kann, und dessen Form man auch häufig unter den crystallisierten Frischschlacken antrifft, die sehr schnell erkalten. Schmilzt man Hornblende im Platiniegel, so erhält man eine crystallinische Masse, deren Individuen die Winkel des Augits besitzen; schmilzt man die Bestandtheile der Hornblende zusammen, so bekommt man bey der schnellen Abkühlung der Masse ebenfalls immer nur Crystalle mit der Form des Augits. Diese Thatsachen bestätigen wohl vollkommen die Annahme, daß Hornblende sich bey langsamer, Augit sich bey schneller Abkühlung bildet.

A s b e it.

Crystalle der Hornblende (des Strahlsteins, Tremolits) und, wiewohl seltener, des Augits (Diopsids und Sahlits) verlaufen sich nicht selten in zarte, nadelförmige und haarförmige, öfters biegsame crystallinische Gebilde, die der Länge nach mit einander verbunden sind und sich leicht von einander trennen lassen. Ag-

gregate solcher Gebilde, welche nicht selten von der größten Feinheit sind, heißt man Asbest. Man hat sie lange Zeit irrthümlich als Varietäten eines eigenthümlichen Geschlechts betrachtet. Sie erscheinen in folgenden Abänderungen:

1. *Amianth*, biegsamer Asbest, Bergflachs. Aeußerst feine, haarförmige Crystalle, in dicken Stücken der Länge nach mit einander verbunden, biegsam und elastisch, seidenglänzend, weich; fühlt sich fein an; halbdurchsichtig bis an den Ranten durchscheinend. Weiß ins Grüne, Gelbe und Braune. Findet sich in Gestalt von Schnüren und Trämmern, vorzüglich im Serpentin, seltener im Grünschiefer und anderen Hornblendegesteinen, oder im Gneis und Glimmerschiefer, öfters als Einschlus im Bergcrystall. Die Hauptfundorte sind Corsica, Piemont, Savoyen, der Gotthardt und Bourg d'Oisans im Dauphiné; überdieß kommt er aber noch in mehreren anderen Gebirgen vor.

2. *Gemeiner Asbest*. Umfaßt die gröberen und die haarförmigen, fester mit einander verbundenen Varietäten; spaltet in splitterige Stücke. Gewöhnlich nicht biegsam; lange, dünne Fasern sind in geringem Grade elastisch; nur an den Ranten durchscheinend; perlmutterglänzend. Zeigt bisweilen einen metallähnlichen Schiller (schillernder Asbest). Findet sich unter denselben Verhältnissen, wie der Amianth, nur ungleich häufiger, ist eine gewöhnliche Beimengung des Serpentin, kommt auch auf Eisen- und Kupferlagerstätten vor (Taberg und Sahla in Schweden), und findet sich an den obengenannten Orten, so wie in allen serpentinführenden Gebirgen.

3. *Bergkork*, Bergleder. Besteht aus filzartig ineinander gewebten Theilen, die sich nicht leicht einzeln erkennen und von einander abtrennen lassen; lappenartige Stücke; undurchsichtig; matt oder nur schimmernd. Ist öfters so porös, daß er schwimmt. Weiß ins Graue, Grüne, Gelbe, Braune. Findet sich theils auf Erzlagern an mehreren Stellen in Scandinavien, theils im Serpentin und anderen Gesteinen des Grundgebirges, am Gotthardt, in Tyrol, Mähren und Spanien.

sehen Mandelstein auf Disko-Inseln und Kudlisat bey Waggat in Grönland und auf den Färðern. (Oplafst Connel's.)

6. Eigenschaft des Schwerspath's.

1. Geschlecht. Baryt.

Syn. Schwerspath.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Flächen der Grundform, eines Rhombenocäders Fig. 24. S. 57, kommen nur untergeordnet bey den zahlreichen Crystallen dieses Geschlechtes vor, dagegen erscheinen vorherrschend entwickelt das erste verticale rhombische Prisma der Grundform von $100^{\circ} 40'$ und zwey horizontale Prismen, womit häufig eine gerade Endfläche verbunden ist. Die Crystallreihe des Schwerspath's, nach derjenigen des Kalkspath's die reichhaltigste und entwickeltste, zeichnet sich durch die geringe Zahl einfacher Gestalten aus, welche auftreten, und durch die große Mannfaltigkeit der Combinationen derselben, wodurch ein Reichthum von Crystallformen bedingt ist. Wir wählen die gewöhnlichsten Vorkommnisse aus.

Fig. 143. ist eine Combination des ersten verticalen Prismas g und der geraden Endfläche, erscheint sehr häufig und kann als Grundtypus aller rhombisch tafelartigen Crystalle gelten; Fig. 144 ist eine Combination des horizontalen Prismas f ,

Fig. 143.




Fig. 144.



eines ähnlichen Prismas d und der horizontalen Endfläche c , wobey die Flächen d vorherrschen; diese gleichfalls sehr häufige Combination ist als der Grundtypus aller rectangulär tafelar-

tigen Crystalle zu betrachten. Fig. 145 ist dieselbe Combination mit vorherrschenden Flächen des horizontalen Prismas f ; Fig. 146 ist eine Combination des verticalen rhombischen Pris-

Fig. 145.





Fig. 146.



mas g , des horizontalen Prismas d und der geraden Endfläche c ; sie bildet den Grundtypus der säulenartigen Crystalle, die in der Richtung einer Seitenachse des Prismas g in die Länge gezogen sind. Der Habitus der Crystalle ist immer säulen- oder tafelartig, ihre Oberfläche meist glatt.

Theilbarkeit vollkommen, parallel c und g ; $H. = 3 \dots 3,5$; spec. Gew. = $4,1 \dots 4,7$; Glas- bis Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos und gefärbt, grau, gelb, blau, roth, braun. Besteht aus einfach-schwefelsaurer Baryterde (65,7 Baryterde, 34,3 Schwefelsäure). Decrepitiert beim Erhitzen heftig; schmilzt sehr schwer. Enthält öfters Beimengungen von Gyps, schwefelsaurem Strontian, Eisenoxyd, Kiesel- und Thonerde.

Man unterscheidet folgende Varietäten:

1. Crystallisierte, deutlich theilbare; späthiger Baryt, Schwerspath. Umfaßt die Crystalle und die schaligen, verben Abänderungen. Die tafelartigen Crystalle sind meist sächer- und rosenförmig gruppiert. Die säulenartigen Crystalle sind oft langgezogen, nadelförmig und zu Bündeln verbunden. So gruppiert nennt man sie auch Strangenspath. Stücke, welche beim Zerbrechen einen hepatischen Geruch entwickeln, nennt man Hepatit. Der späthige Baryt findet sich vorzüglich auf erzführenden Gängen und Lagern im Grund- und Uebergangsgebirge, und ist einer der gewöhnlichsten Begleiter der Erze auf Gängen, so zu Freyberg, Marienberg, Joachimsthal im Erzgebirge, Příbram und Ries in Böhmen, Glausthal am

Harze, Münsterthal im Schwarzwald, Alstunmoor in England, Kopa in der Auvergne, Felsöbanya in Ungarn. An letzterem Orte erreichen die Crystalle von der Gestalt der Fig. 143 bisweilen eine Länge und Breite von einem Fuß, und eine Dicke von drey bis vier Zollen. Zu Hüttenberg in Kärnthén, Schriesheim bey Heidelberg und auf den Eisensteingängen bey Pforzheim und Neuenbürg im Schwarzwalde kommen große, derbe Massen von reinweißem Schwerspath vor.

2. Stängeliger oder faseriger Baryt. Stängelige Individuen, die in divergierender Zusammensetzung plattgedrückte Sphäroiden bilden, Bologneserspath. Findet sich im Thonmergel am Monte Paterno bey Bologna und zu Amberg in Bayern.

Faseriger Baryt. Von divergierend faseriger Zusammensetzung, findet sich in nierenförmigen Gestalten am Battenberg bey Altleiningen unsern Dürkheim in Rheinbaiern, auf Schurprinz zu Freyberg, zu Mies in Böhmen und zu Chaudfontains bey Bättich.

3. Körniger Baryt. Derbe Massen von klein- und feinkörniger Zusammensetzung. Findet sich auf Bleyglanzlagern zu Feistritz bey Pefau und zu Thal bey Fronleithen in Steyermark, sodann zu Servoz in Savoyen.

4. Dichter Baryt. Untheilbar; im Bruche splittig. Findet sich auf vielen Gruben des nördlichen Englands, wird in Derbyshire Sawl genannt, und kommt auch am Rammelsberg am Harz, bey Freyberg u. e. a. D. vor. Erdigen Baryt nennt man staubartige Barytheile, die zu Freyberg und Riechelsdorf vorkommen.

Bey Freyberg, Mitweyda, Memmendorf und Bischofpau findet sich theilbarer Baryt in nierenförmigen Stücken von krummblättrig-strahliger Zusammensetzung, den man krummschaligen Baryt heißt. Er enthält immer eine Beymischung von Kalk.

Die reinweißen, derben Schwerspathmassen werden gemahlen und dem Bleyweiß zugefetzt; auch gebraucht man sie zur Darstellung verschiedener chemischer Baryt-Präparate, von denen man einige als Reagentien und eines in der Arzneikunde anwendet.

2. Geschlecht. Cölestin.

Syn. Strontspath.

Erythallsystem ein- und einachsig, wie beym Baryt, und zeigt überhaupt, hinsichtlich der vorkommenden, einfachen Gestalten und ihrer Combinationen, sehr große Uebereinstimmung mit demselben. Das verticale rhombische Prisma *g* ist von demjenigen des Baryts nur um einige Grade verschoben und mißt $104^{\circ} 20'$.

Fig. 147.




Fig. 148.




Fig. 147 ist eine häufig vorkommende Combination des verticalen Prismas *g*, mit dem horizontalen Prisma *f* und der geraden Endfläche *c*; Fig. 148 ist eine Combination des verticalen Prismas *g*, mit den beiden horizontalen Prismen *f* und *d* und der Endfläche *c*. Der Habitus den Crystalle ist entweder säu-

lenartig durch Vorherrschen der Prismenflächen *f*, oder tafelartig durch Vorherrschen der Endfläche *c*. Die Flächen *f* sind nicht selten parallel der Combinationskante mit *c* gestreift.

Theilbarkeit parallel *c* und *g*; $H. = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. $= 3,6 \dots 4,0$; Glas. bis Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos, öfters ganz wasserhell; meist aber gefärbt, gewöhnlich bläulichweiß und bläulichgrau, auch smalter, himmel- und indigblau, selten röthlich oder grünlich. Besteht aus einfach-schwefelsaurer Strontianerde (56,5 Strontian, 43,5 Schwefelsäure). Decrepitiert in der Hitze, schmilzt zu einer milchweißen Kugel und mit Flußspath sehr leicht zu einem klaren Glase, das unter der Abkühlung emailweiß wird. Enthält öfters dieselben Bymengungen wie der Baryt, und verdankt die blaue Färbung der Einmengung einer schwarzen, kohlgigen und bituminösen Substanz.

Man unterscheidet die Abänderungen folgendermaßen:

1. Späthiger Cölestin. Begreift die auscrystallisir-

ten, oder strahlig und schalig zusammengesetzten Varietäten. Findet sich vorzugsweise im secundären Gebirge in den Kalk- und Gypsbildungen, und zwar in den schönsten Crystallen im Süden Siciliens in den dortigen schwefelführenden Gypsbildungen bey Sirgenti, im Val Mazzara, bey Cataldo u. a. a. O., sodann auf der Strontianinsel im Eriesee in Nordamerica, wo mitunter 4—5 Pfund schwere Crystalle vorkommen. Schalige Abänderungen finden sich im Mergel bey Narau in der Schweiz, bey Achdorf unfern Donaueschingen am Schwarzwalde, am Süntel im Hannoverschen, bey Mendon unfern Paris, zu Bristol in England. Strahlige Abänderungen kommen an der Seisser Alpe in Südtirol und zu Rörthen in Hannover vor. Im vulcanischen Gebirge findet er sich im Vicentinischen bey Montecchio maggiore; zu Scharfenberg bey Weissen kommt er auf Erzgängen im Eysenit in halb blauen, halb blgrünen Crystallen vor.

2. Faseriger Edlestin. Plattenförmige Stücke von parallel und öfters gebogen faseriger Zusammensetzung. Findet sich in Mergellagen des Muschellalks zu Dornburg unfern Jena, mit schöner himmel- und smalteblauer Färbung; auch zu Bristol und Frankstown in Nordamerica.

3. Dichter Edlestin. Dichte, durch Einmischung von kohlensaurem Kalk verunreinigte Edlestinmasse, von gelblich- und grünlichgrauer Farbe, knolliger oder sphäroidischer Gestalt. Findet sich am Mont-Martre bey Paris.

Man benützt den Edlestin zu Strontianpräparaten, von welchen der salpetersaure Strontian zur Hervorbringung eines ausgezeichnet schönen rothen Feuers verwendet wird.

3. Geschlecht. Witherit.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystallreihe hat viele Aehnlichkeit mit derjenigen des Arragons. Nebenstehende Fig. 149 ist eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von $118^{\circ} 30'$, mit der zweyten Seitenfläche b und dem horizontalen Prisma f. Solcher horizontaler Prismen kommt öfters noch eines, bisweilen auch zwey mit dem Prisma f zusammen vor; eine andere Combination des Prismas g mit der Seitenfläche b, dem horizontalen Prisma f und den Octaëder-

Fig. 149.



flächen σ , ist der gewöhnlichen Gestalt des Quarzes, Fig. 40. S. 136, ähnlich. Große Neigung zur Zwillingbildung und analog derjenigen des Arragons. Deutliche Crystalle sind indessen selten; gewöhnlich finden sich stängelige Zusammensetzungen in kugelförmigen, traubigen und nierenförmigen Gestalten, mit strahligem Gefüge und rauher oder drüsiger Oberfläche.

Theilbarkeit nach g und b ; $\rho. = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. $= 4,3$; Glasglanz, innen fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend; farblos und gefärbt, gelblichweiß, gelblich und graulich; phosphoreszirt durch Erwärmung; ist innerlich genossen warmblütigen Thieren, zumal Nagethieren, ein Gift. Besteht aus einfach-kohlensaurer Baryterde (77,6 Baryterde, 22,4 Kohlen-säure). Schmilzt leicht zu einem klaren Glase, das unter der Abkühlung emailweiß wird; löst sich in Salzsäure unter Aufbrausen. Findet sich vorzüglich in England im Kohlenkalkstein der Grafschaften Durham und Cumberland und auf Bleigängen im Bergkalk zu Anglezarke in Lancashire, auch in Gropshire, Westmoreland, Flintshire, sodann bey Mariazell in Steyermark auf Eisenspathlagerstätten, und zu Leogang in Salzburg, zu Szlana in Ungarn.

Er wird in einigen Gegenden Englands als Rattengift angewendet.

4. Geschlecht. Baryto-Calcit.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind verticale rhombische Prismen, durch die Flächen eines andern Prismas an den scharfen Seitenkanten zugespitzt, durch eine Schiefendfläche und eine schiefe Prismenfläche an den Enden begrenzt. Theilbarkeit nach den Flächen des ersten verticalen Prismas und der Schiefendfläche. $\rho. = 4,6$; spec. Gew. $= 3,6$; Glasglanz, in den Fettglanz geneigt; durchsichtig bis durchscheinend; Farbe weiß ins Grauliche und Gelbe. Besteht aus einer Verbindung von einfach-kohlensaurem Baryt mit einfach-kohlen-

saurem Kalk (65,9 kohlensaurer Baryt, 33,6 kohlensaurer Kalk). Unschmelzbar. Löst sich in Salzsäure unter Aufbrausen. Die Auflösung gibt mit Schwefelsäure einen Barytniederschlag; ist aller Baryt durch Schwefelsäure gefällt, so erhält man mit kohlensaurem Ammoniak noch einen Kalkniederschlag.

Findet sich von Schwerspath begleitet zu Alston-Moor in Cumberland.

5. Geschlecht. Strontianit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die selten gut ausgebildeten Crystalle sind verticale rhombische Prismen mit der zweiten Seitenfläche b und einer horizontalen Endfläche; dazu treten meistens noch die Flächen der Grundform, eines rhombischen Octaëders, und eines horizontalen Prismas, so daß die Gestalt viele Ähnlichkeit mit Fig. 48. S. 154 hat. Der Habitus der Crystalle ist immer säulenartig und oft nadelförmig. Zwillingbildung wie beim Arragon. Die gerade Endfläche oft rauh.

Theilbarkeit parallel dem rhombischen Prisma ziemlich, parallel b weniger deutlich. $H. = 3,5$; spec. Gew. = $3,6 \dots 3,7$; Glasglanz, innen fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend. Farblos und gefärbt, oft gelblich und graulich, auch spargel- und apfelgrün. Phosphoresziert durch Erwärmung. Besteht aus einfach-kohlensaurer Strontianerde (70 Strontianerde, 30 Kohlensäure). Schmilzt an den äußersten Kanten, schwillt blumenkohlartig auf und gibt ein glänzendes Licht. Löst sich in Salzsäure mit Aufbrausen. Die trockene Salzmasse löst sich in Weingeist, der, damit beladen, mit purpurrother Flamme brennt.

Die häufig nadelförmigen Crystalle dieses Minerals sind gewöhnlich gruppiert, zu Garben und Büscheln verbunden; auch kommen derbe Massen von divergierend feinstängeliger Zusammenfassung vor. Findet sich auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge, zu Strontian und Leadhills in Schottland, Leogang in Salzburg, Bräunsdorf in Sachsen, Popayan in Peru.

7. Eigenschaften des Titanits.

1. Geschlecht. Titanit.

Syn. Sphen, Renalstein.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Der Habitus der Crystalle ist sehr mannfaltig, theils pyramidal, theils und öfters säulen- oder tafelartig. Wir wollen zwey der gewöhnlicheren und einfacheren Gestalten auswählen, welche den verschiedenartigen Habitus repräsentieren. Fig. 150 ist eine Combination

Fig. 150.





Fig. 151.



des verticalen Prismas g mit der Basis c und den schiefen Endflächen d und $\frac{d}{2}$; Fig. 151 ist eine Combination des rhombischen Prismas g mit Flächen eines zweyten äh-

lichen Prismas g' , der Basis c und den schiefen Endflächen d und $\frac{d}{2}$. Große Neigung zur Zwillingbildung, zumal bey den tafelartigen Crystallen Fig. 150, theils durch Juxtaposition theils mit Durchkreuzung und von mannfaltiger Bildung.

Theilbarkeit parallel g und c ; $H. = 5,5$; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6; Glasglanz, oft fettartig, bisweilen demantartig; durchsichtig bis undurchsichtig; von verschiedenen gelben, grünen und braunen Farben; manchmal sind verschiedene Theile eines Crystalls von verschiedener Farbe. Besteht aus einer Verbindung von dreysach-kieselsaurem Kalk mit anderthalb-titansaurem Kalk (42,1 Kalkerde, 27,5 Kieselsäure, 40,4 Titansäure). Schmilzt an den Kanten unter einiger Anschwellung zu einem dunkeln Glase. Wird vom Phosphorsalz schwer aufgelöst; die Kugel wird durch reducirendes Blasen, zumal bey Zinnzusatz, blau.

Der Titanit findet sich in der Regel crystallisirt, und, wenn derb, immer in deutlich erkennbarer Zusammensetzung. Die tafelförmigen Crystalle, wie Fig. 150, sind gelb und grün; die säulenförmigen Crystalle, wie Fig. 151, sind gewöhnlich braun oder grau.

Findet sich vorzüglich auf Drusenräumen von Quarzgängen im älteren Gebirge, zumal in schönen Crystallen bey Dissentis in Graubünden mit Adular, sodann im Zillertal in Tyrol, im Chamounithal am Montblanc, in Salzburg, auf einem Eisenerzlager zu Arendal in Norwegen; in Grundgebirgsgesteine eingewachsen in Granit, Sphenit, Grünstein, Sneis, zu Markirch im Elsaß, bey Weinheim an der Bergstraße, im Plauischen Grund bey Dresden, auf der Stubayalpe in Tyrol, auf der Saualpe in Kärnten, zu Hafnerzell bey Passau, Frederiksværn in Norwegen; sodann in vulcanischen Gesteinen am Lacher See, am Kaiserstuhl und bey Aulsg in Böhmen.

2. Geschlecht. Pyrochlor.

Reguläres Crystallsystem. Die Crystalle sind reguläre Octaeder, oft sehr klein, immer eingewachsen mit dem sie umschließenden Gestein (Sphenit) fest verbunden.

Theilbarkeit nicht beobachtet. $\rho. = 5,0$; spec. Gew. $= 4,2$; Glanz, glas- und fettartig; nur in dünnen Splittern durchscheinend; Farbe dunkelbraun bis schwarz. Derbe Körner zeigen muscheligen Bruch. Besteht aus einer Verbindung von titansaurem Kalk mit titansaurem Eisen-, Mangan-, Cer- und Uranoxydul; der sibirische enthält überdieß 5 Procent Thorerde. Schmilzt äußerst schwierig zu einer schwarzen Schlacke. Wird durch Erhitzen gelb, was seine Benennung veranlaßte.


Findet sich theils in Crystallen, theils in Körnern, im Sphenit eingewachsen bey Frederiksværn in Norwegen und in Sibirien.

3. Geschlecht. Datolith.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Von den beobachteten Gestalten, welche zum Theil als sehr verwickelte Combina-

tionen erscheinen, wählen wir eine der gewöhnlichsten aus, welche durch Fig. 152 dargestellt ist, eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von $77^{\circ} 30'$ mit einem zweyten rhombischen Prisma g' von $116^{\circ} 9'$, mit der ersten Seitenfläche a , der schiefen Endfläche c , den Flächen des schiefen Prismas o und des horizontalen Prismas f . Der Habitus der Crystalle ist gewöhnlich kurz säulenartig. Die verticalen Prismen gewöhnlich vertical gestreift.

Fig. 152.



Theilbarkeit parallel g und a sehr unvollkommen; $H. = 5,0 \dots 5,5$; spec. Gew. $= 3,0 \dots 3,4$; Glasglanz, innen Fettglanz; durchscheinend; farblos, öfters aber gefärbt, grünlich, gelblich, röthlich, graulichweiß bis grünlichgrau, seladongrün und honiggelb. Besteht aus einer Verbindung von dreysach-s Kieselsaurem Kalk mit einfach-borarsaurem Kalk und etwas Wasser (35,67 Kalkerde, 37,36 Kieselerde, 21,26 Borarsäure und 5,7 Wasser). Gibt bey starkem Glühen im Köbchen etwas Wasser aus; schmilzt unter starkem Aufschwellen zu einem klaren Glase. Mit dem Fluß aus 1 Theil Flußspath und $4\frac{1}{2}$ Theilen doppelt-schwefelsaurem Kalk zusammengeschmolzen, färbt er die Löthrohrflamme schön grün.

Kommt theils crystallisirt, in aufgewachsenen und zu Drusen verbundenen Crystallen, theils derb in körnigen, festverwachsenen Zusammensetzungen vor, auf Magneteisensteinlagern zu Arendal und auf Utoen, auf kleinen Gängen im Gränstein des Wäschgrundes bey Andreasberg am Harze, auf Kalkspatbgängen im Sandstein zu Sonthofen, in Blasenräumen der Mandelsteine der Seisseralpe, bey Klausen in Tyrol und zu Edinburg.

Der Botryolith, welcher sich in kleintraubigen und nierenförmigen Gestalten, von höchst feinfaseriger Zusammensetzung, ebenfalls zu Arendal auf Magneteisensteinlagern findet, weicht in der Zusammensetzung vom Datolith ab. Er enthält 39,5 Kalkerde, 36,0 Kieselerde, 18,5 Borarsäure, 6,5 Wasser und

1,0 Eisenoxyd, und ist demnach eine Verbindung von kiesel-saurem Kalk mit halb-bor-saurem Kalk.

4. Geschlecht. Schwerstein.

Syn. Tungstein, Scheelkalk.

Crystallsystem zwey- und einachsig. Die Grundgestalt, ein quadratisches Octaëder, Fig. 13. S. 49, kommt oft selbstständig vor; damit ist öfters verbunden ein stumpferes Octaëder, dessen Flächen an den Enden des ersteren eine flache vierflächige Zuspitzung bilden; die Flächen des stumpferen Octaëders kommen auch allein in Combination mit einer horizontalen Endfläche vor, und die Gestalt hat, wenn die Endfläche vorwaltet, das Ansehen einer vierseitigen Tafel; auch erscheint öfters eine Combination der Grundform mit einem spitzeren Octaëder und der horizontalen Endfläche, welches das Ansehen der Fig. 14. S. 49 hat. Zuweilen kommen auch Zwillinge vor, Octaëder zu einem einzigen Individuum vereinigt, dessen Streifung der Flächen die Zusammensetzung andeutet. Der Habitus der Crystalle ist gewöhnlich octaëdrisch, seltener tafelförmig.

Heilbarkeit nach den Flächen der Grundform und des spitzeren Octaëders; Spuren nach der Endfläche. Diese Fläche ist gewöhnlich rauh; die Flächen der Grundform öfters unregelmäßig gestreift. $H. = 4,0 \dots 4,5$; spec. Gew. $= 6,0 \dots 6,1$; Fettglanz; bisweilen glas- oder demantartig; durchsichtig fast in allen Graden; farblos und gefärbt, grau, gelb, braun; phosphoresziert stark durch Erwärmung. Besteht aus einfach-wolfram-saurem Kalk (19,4 Kalkerde, 80,42 Wolframsäure). Schmilzt an dünnen Kanten zu einem halbdurchsichtigen Glase. Wird von Phosphorsalz in der äußeren Flamme zu einem klaren ungefärbten Glase aufgelöst, das in der inneren, reducierenden Flamme grün und bey der Abkühlung schön blau wird.

Findet sich meistens crystallisiert in einzelnen aufgewachsenen oder in Drusen versammelten Crystallen, oft auch knospenartig gruppiert; seltener verb., nierenförmig, mit körniger Zusammensetzung.

Kommt im Erzgebirge und in Cornwallis auf Zinnerzlagerstätten mit Quarz, Glimmer und Wolfram vor, so zu Zinnwalde;

Schladenwalde, Ehrenfriedersdorf, Pengosly Crost-mine; zu Rib-darhytta, und am Bispsberg in Schweden findet er sich auf Mag-neteisensteinlagern, zu Pößing in Ungarn auf einem goldführenden Lager im Granit.

II. Classe. Salze.

Salze, salzige Mineralien, sind solche, welche sich durch Auflöslichkeit in Wasser und einen eigenthümlichen Geschmack auszeichnen.

I. Ordnung. Erbsalze.

Salze, welche eine Erbe enthalten.

1. Sippschaft des Alauns.

1. Geschlecht. Alaun.

Syn. Alaunsalz.

Reguläres Crystallsystem. Die gewöhnlichste Gestalt ist das reguläre Octaëder Fig. 5. S. 37, und der Würfel Fig. 1. S. 36; beide Gestalten kommen auch mit einander combinirt vor, wie dieß Fig. 4. S. 37, und Fig. 120 und 121. S. 251 darstellen; auch erscheint eine Combination des Octaëders mit den Dodecaëder- und Würfelflächen, welche Fig. 14. S. 49 ähnlich ist. Die Oberfläche der Crystalle ist gewöhnlich glatt.

Theilbarkeit nach den Octaëderflächen, unvollkommen; ρ . = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 1,7 ... 1,8; Glasglanz; durchsichtig in hohen Graden; farblos, selten und nur durch Verunreinigung gefärbt. Bruch muschelig; Geschmack säßlich und zusammenziehend; in Wasser völlig auflöslich. Besteht aus einer Verbindung von 3 Antheilen einfach-schwefelsaurer Thonerde mit 1 Antheil einfach-schwefelsauren Kalis oder Ammonials und 24 Antheilen Wasser. Nach dieser verschiedenen, chemischen Zusammensetzung unterscheidet man zwey Gattungen.

1. **Kali-Alaun.** Die in der Natur vorkommenden Crystalle sind Octaëder. (Obige Beschreibung bezieht sich zunächst auf künstliche Crystalle.) Gewöhnlich in dicken Stücken von stängeliger oder faseriger Zusammensetzung, oft in stalactitischen, knolligen Gestalten, bisweilen in haarförmigen Crystallen und öfters als mehrlartiger, erdiger Beschlag, durch Ausblähung entstanden.

Enthält 10,8 Thonerde, 10,1 Kali, 33,7 Schwefelsäure und 45,4 Wasser. Gibt im Kölbchen Wasser aus aber kein Sublimat, schmilzt auf Kohle unter Ausblähen, und läßt eine trockene erdige Masse, welche in der Glühheize einen schwefeligen Geruch ausgibt.

Der Kali-Alaun findet sich vorzüglich als Ausblähung auf der Oberfläche von Gesteinen, welche Schwefelkies eingemengt enthalten, auf schieferigen Thonen und Thonschieferabänderungen, welche darnach den Namen Alaunschiefer tragen, auf Gneis, auf den Schieferthonen des Steinkohlengebirges und jüngerer Flöhbildungen, beynähe in allen bekannten Gebirgen. Die sogenannten Alaunschiefer, von Schwefelkies mehr oder weniger durchdrungene Schieferthon-Massen, in welchen sich bey der Verwitterung des Kiesel Alaun erzeugt, kommen vorzüglich zu Andrarum und Garphytta in Schweden, zu Christiania in Norwegen, zu Reichenbach in Schlessen vor. Zu Duttweiler und im Aveyron-Departement findet sich Kalialaun als eines der vielen Producte des dortigen unterirdischen Kohlenbrandes. Diesem Vorkommen ähnlich ist dasjenige an vielen vulcanischen Orten, in Klüften und Spalten der Lava, wie an der Solfatara, an der Grotta di alume bey Neapel, am Monte nuovo, sodann auf den Liparischen Inseln Vulcano und Stromboli. Auf der ersteren kommen öfters schöne Crystalle vor, so auch zu Wechelstein bey Saalfeld in einem Lehm lager.

2. **Ammoniak-Alaun.** Zur Zeit nur dach in plattenförmigen Stücken von gleichlaufend gerade- und krummstängeliger oder faseriger Zusammensetzung. Enthält 12,34 Thonerde, 4,12 Ammoniak, 33,58 Schwefelsäure, 44,96 Wasser. Gibt im Kölbchen Wasser aus, bläht sich; es steigt ein Sublimat von schwefelsaurem Ammoniak auf, das im ausgetriebenen Wasser

größtentheils wieder gelöst wird, und man bemerkt einen schwefeligen Geruch.

Findet sich in schmalen Lagen zwischen Braunkohle zu Tschermig in Böhmen.

Im vulcanischen Gebiete der griechischen Insel Milo kommt ein Alaun vor, der 14,98 Thonerde, 40,31 Schwefelsäure, 1,39 Natron und 40,94 Wasser enthält, und demzufolge als eine weitere Gattung, als Natron-Alaun, betrachtet werden kann, und in den östlichen Gegenden der Cap-Colonie findet sich ein schneeweißes, haarförmiges Salz, welches 11,51 Thonerde, 3,69 Talkerde, 2,16 Manganoryd, 36,77. Schwefelsäure, 45,74 Wasser enthält, und somit gleichfalls als eine weitere Gattung, als Talkerde-Mangan-Alaun, angesehen werden muß.

Der Alaun wird allenthalben, wo er in der Natur in größerer Menge vorkommt, zur Darstellung des künstlichen Alauns gewonnen und verwendet, den man als wichtiges Beizmittel in der Färberei, zur Bereitung von Lackfarben, in der Weißgerberei, beim Leimen des Papiers, in der Arzneykunde u.s.w. benutzt.

2. Geschlecht. Alaunstein.

Syn. Alumit.

Crystallsystem hemikratisch drey- und einachsig. Die Crystalle sind kleine Rhomboëder mit dem Endantenwinkel von $92^{\circ} 50'$, an welchen bisweilen eine horizontale Endfläche vorkommt; oft krummflächig und drüsig gruppiert. Die Oberfläche glatt, oft mit Eisenrost überzogen.

Theilbarkeit nach der horizontalen Endfläche ziemlich vollkommen; Spuren nach den Rhomboëderflächen. $\rho. = 5,0$; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; Glasglanz, etwas perlmutterartig auf der horizontalen Endfläche; durchsichtig in hohen Graden; farblos, auch graulich, gelblich, röthlich gefärbt. Ist ein basischer Kali-Alaun, ein basisch-schwefelsaures Thonerdealkali, mit eingemengtem Thonerdehydrat und enthält 42,2 Thonerde, 9,9 Kali, 33,1 Schwefelsäure und 14,8 Wasser. Unschmelzbar; löst sich nach vorangegangnem Glähen zum größten Theil in Wasser auf. Findet sich auf Gängen und Drusenräumen crystallisiert, auch

derb in fbrniger, ins Dichte übergehender Zusammensetzung, in einer Gebirgsart von ähnlicher, aber nicht ganz gleichförmiger Zusammensetzung, die man *Alaunfels* heißt, und die außerdem noch Quarz, Schwefelkies und Manganerz einschließt. Die Hauptfundorte sind Tolfa bey Civita-Vecchia im Kirchenstaate und Montione im Herzogthum Piombino. Der dortige Alaunfels scheint durch Wirkung vulcanischer, schwefeliger Säure auf feldspathige Gesteine entstanden zu seyn. Ueberdies kommt er in Ungarn bey Tokaj, in Frankreich am Mont d'Or und in Griechenland auf den Inseln Milo und Nipoligo vor.

Der Alaunstein wird sammt dem ihn umschließenden Alaunfels sehr vortheilhaft zur Darstellung desjenigen, sehr geschätzten, Alauns benützt, der unter dem Namen des römischen bekannt ist. Das berühmte Alaunwerk zu Tolfa, welches seit 1458 arbeitet, erzeugt davon gegenwärtig allein jährlich an 100,000 Centner.

3. Geschlecht. Aluminit.

Crystallformen unbekannt. Bildet kleine, knollige Stücke von nierenförmiger Gestalt, die aus locker verbundenen, erdigen, etwas crystallinischen Theilen zusammengesetzt sind. Auch derb, in Adern und als Ueberzug. Weich und zerreiblich; $\rho = 1,0$; spec. Gew. = 1,6 ... 1,7; undurchsichtig; im Sonnenlichte unter der Loupe schimmernd; schneeweiß; milde, im Bruche feinerdig; hängt schwach an der Zunge. Ist wasserhaltige, basische, brittelschwefelsaure Thonerde (29,87 Thonerde, 23,37 Schwefelsäure, 46,76 Wasser). Gibt im Röhrchen anfangs Wasser, und in der Glühhitze schwefeligen Geruch aus.

Wurde zuerst zu Halle, im Garten des Pädagogiums in einer Lettenschicht gefunden, dann unter ähnlichen Verhältnissen bey dem Dorf Morl unweit Halle; später sodann auch auf Klüften in der Kreidebildung bey Epernay in Frankreich und bey Newhaven in Sussex, England.

II. Ordnung. Laugensalze.

Enthalten eine Lauge, ein Alkali.

1. Sippschaft des Steinsalzes.

1. Geschlecht. Steinsalz.

Crystallsystem regulär. Die gewöhnlichste Form ist der Würfel, an welchem bisweilen die Dodecaëderflächen, als gerade Abstumpfungsflächen der Kanten, erscheinen. Bey künstlichen Crystallen tritt auch das Octaëder und der Würfel mit den Flächen des Tetraëder aus, Zuschärfungsflächen der Kanten, eine Combination, die den Namen des Pyramidenwürfels trägt. Der Habitus der natürlichen Crystalle ist immer würfelförmig.

Theilbarkeit nach den Würfelflächen, sehr vollkommen; $\rho = 2,5$; spec. Gew. $= 2,2 \dots 2,3$; Glasglanz, etwas fettartiger; durchsichtig in hohen Graden; farblos und gefärbt, grau, gelb, roth, selten blau; Bruch muschelig; Geschmack rein salzig. Besteht aus Chlor-Natrium (60,3 Chlor, 39,7 Natrium). Verknistert beym Erhitzen, schmilzt auf Kohle, dringt in sie ein und raucht dabey. Löst sich in Wasser leicht und vollkommen auf.

Die Crystalle kommen theils einzeln, theils zu Gruppen und Drusen verbunden vor; oft erscheint das Steinsalz auch in stalactitischen Gestalten, sodann derb in großen Massen und eingesprenkt, ferner in groß- und feinkörniger, strahliger und faseriger Zusammensetzung. Das Steinsalz findet sich im Flözgebirge, von seinen ältesten Bildungen an, bis hinauf zu den jüngsten, und selbst im tertiären Gebirge, theils in Stöcken, theils als Ausfällung von Spalten, bald ziemlich rein, bald mit Thon, Gyps, Kalk gemengt und damit öfters wahre Trümmergebilde zusammensetzend, so zu Auesee, Ischl, Hallein, Berchtesgaden, Hall in Tyrol, Ber in der Schweiz, Dürheim, Rappennau in Baden, Schwenningen, Sulz, Jartfeld, Hall in Württemberg, Wimpfen im Darmstädtischen, Wie in Lothringen, Bochnia und Wieliczka in Galizien. In Cordova in Spanien ragt ein mächtiges

tiger massiver Steinsalzfelsen, von einigen Hundert Fuß Höhe, frey aus Thon-, Mergel- und Sandsteinschichten hervor. Ferner findet er sich in England, Polen, Siebenbürgen, Nord- und Südamerika, in Arabien, im Innern von Africa, in Asien, an der Ostküste Neuholands und an vielen andern Orten. Oefters kommt es in Quellen aufgelöst vor, die man alsdann Salzspolen heist, wie in Westphalen, Sachsen, Hessen u.s.w. Auch kommt das Steinsalz in Wassern der Seen aufgelöst vor, wie in Aegyten, in der Krimm um Baku, in Mexico, aus denen es sich theils am Rande, theils auf dem Grunde, bey der Verdunstung des Wassers, absetzt. Im vulcanischen Gebirge kommt das Steinsalz in Schländen, Spalten der Feuerberge, in Laven und in Gassen, oft in sehr naher Beziehung zu den vulcanischen Agentien vor. Als Ausblähung auf der Oberfläche erscheint es in einigen Steppenländern, am caspischen Meere und am Aralsee, in der Wüste am Nordabfall des africanischen Hochlandes, in der Ebene von Dankali in Habesch, welche mit lockeren Salzausblähungen auf eine Strecke von vier Tagereisen so völlig und so gleichförmig bedeckt ist, daß sie einer unabsehbaren Schneefläche ähnlich sieht. Endlich verdient das allgemeine Vorkommen des Steinsalzes, im aufgelösten Zustande, im Meerwasser erwähnt zu werden.

Die Benützung dieses wichtigen Minerals als Speisesalz ist allgemein bekannt. Weiter muß bemerkt werden seine Verwendung zum Einsalzen, zur Aufbewahrung organischer Substanzen, zur Fabrication von Salzsäure, Glaubersalz, Soda, Darstellung von Chlor, zur Glasur, seine Anwendung bey der europäischen Amalgamation, vielen metallurgischen Arbeiten, seine Benutzung in der Landwirthschaft, bey der Glasfabrication u.s.w. Selten hat jedoch das natürlich vorkommende Steinsalz eine solche Reinheit, daß man es geradezu, ohne weitere Behandlung, zu den verschiedenen technischen Zwecken gebrauchen könnte. Gewöhnlich wird es durch Auflösung in Wasser und nachfolgende Crystallisation zuerst gereinigt. Als eine Curiosität wollen wir hier noch anführen, daß in den trockenen, salzreichen Districten Africas das Steinsalz sogar als Baustein, zum Häuserbau verwendet, angetroffen worden ist.

2. Geschlecht. Digestivsalz.

Syn. Chlorkalium.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind kleine Würfel, parallel den Flächen theilbar. $\rho. = 3,0$; spec. Gew. = 1,8; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; weiß, bisweilen durch Verunreinigung gelb, roth, grün. In Wasser löslich; Geschmack salzig. Besteht aus Chlor-Kalium (53 Kalium, 47 Chlor). Crepitiert und schmilzt in der Hitze. Die Lösung in Wasser gibt mit Weinsäure einen Niederschlag. Findet sich theils in Crystallen, theils in stalactitischen Gestalten, von Steinsalz begleitet, in den Schläuden und Spalten der Vulcane, in Sprüngen und Höhlungen der Lava, und sowohl mit dieser, als mit vulcanischem Sand vermengt, und aus diesen durch Wasser ausziehbar. So namentlich am Vesuv.

3. Geschlecht. Salmiak.

Crystallsystem regulär. Die sehr selten deutlich ausgebildeten natürlichen Crystalle sind Octaëder oder Würfel, mit Theilbarkeit nach den Octaëderflächen. $\rho. = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. = 1,4; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos und, durch Verunreinigung, gefärbt, grau, gelb, röthlich, grünlich, schwärzlich. Leicht in Wasser löslich; Geschmack brennend, weinds. Besteht aus salzsaurem Ammoniak (68,2 Salzsäure, 31,8 Ammoniak). Verflüchtigt sich in der Hitze ohne zu schmelzen; entwickelt, mit gebranntem Kalk zusammengerieben, den erstickenden Geruch von Ammoniak; die wässrige Lösung wird durch Silber- und Platinsolution gefällt.

Kommt vorzüglich in flockigen, haar- und federförmigen Gestalten und aus solchen bestehenden Aggregaten, sodann in kugelförmigen, traubigen, stalactitischen Gestalten und als erdiger, mehrartiger Ueberzug und Beschlag, in den Cratern und Spalten der Vulcane und der Solfataren, sodann auf der Oberfläche und in Spalten von Lava und unter den Produkten von unterirdischen Kohlenbränden vor. So am Ätna, am Vesuv, auf den liparischen Inseln u.s.w. Das bedeutendste und interessanteste Salmiakvorkommen ist das durch Fr. v. Humboldt

geschilderte, im Centrum von Asien. Dort liegen am nördlichen Abfall des Himmelgebirges, der Vulkan Peshan, die große Solfatara von Urumtsch mit einem Umfang von 5 geographischen Meilen, und ein kleiner Hügel, in deren Spalten Salmiak zu vesten, dicken Rinden sublimirt, und zwar in solcher Menge, daß die Einwohner des Landes mit demselben Handel treiben und nicht selten dem Kaiser von China ihren Tribut darin einrichten. Die Bucharen bringen dieses Salz von dorthier in großer Quantität nach Sibirien.

2. Eigenschaft der Soda.

1. Geschlecht. Soda.

Sda. Natürliches Mineralalkali, Natronsalz;
Nitrum der Alten.

Crystallsystem zwey- und eingliederig, wie es künstliche Crystalle darthun, welche die Gestalt haben, die Fig. 111. St. 144. ähnlich ist. Die natürlichen Vorkommnisse erscheinen in crystallinischen Crusten oder berben, dicken, plattenförmigen Massen, die sich aus Wassern absetzen, oder auf Gesteinen als weißlicher Beschlag liegen.

Eigenschaft nach der Richtung der Aeste zwischen α o, so dann, weniger vollkommen, nach g und b; $\rho = 1,0 \dots 1,5$; spec. Gew $= 1,4 \dots 1,5$; Glasglanz; durchsichtig; farblos oder grünlich und gelblich gefärbt durch Verunreinigung; leicht im Wasser löslich; Geschmack scharf, laugenhaft. Bruch muschelig. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-kohlensaurem Natron (21,7 Natron, 15,3 Kohlensäure, 63,0 Wasser). Verliert an der Luft Wasser, verwittert, wird an der Oberfläche mehlig. Gibt beim Erhitzen Wasser aus, schmilzt auf Kohle leicht und zieht sich in dieselbe hinein. Schmilzt mit Kieselerde zu einem Glas. Kommt vorzugsweise als Absatz aus den Wassern kleiner Seen in Aegypten vor, die deshalb Natronseen heißen, und unter ähnlichen Verhältnissen in Tibet, Persien, China, der Tatarey; sodann als Auskühlung auf der Erdoberfläche in einigen Ergäthen von Italien, Bohmen und insbesondere in der Ebene von Debrezsin in Ungarn, und hier in solcher Menge, daß dasselbst jährlich

mehrere Tausend Centner gesammelt werden. In Mexico findet sich die natürliche Soda als Ausblühung eines salzhaltigen Thons, *Lagunesquetti* genannt.

Die Soda ist ein sehr nützliches Mineralproduct, und wird im gereinigten Zustande vorzüglich zur Glas- und Seifenfabrication, in der Färberey und zu vielen anderen chemisch-technischen Darstellungen benutzt. Der Ueberlieferung nach holten die Völker des Alterthums ihren Bedarf daran in Aegypten, namentlich die Phönizier, welche, mit einer Ladung Soda einst an den Ufern des sandigen Belus anlandend, als sie bey der Zubereitung von Speisen in einem Kessel über Feuer, diesen auf Erbsenstübe gesetzt hatten, die Veranlassung gemacht haben sollen, daß der Sand mit ihr zu einem Glase zusammenschmilzt. Auf diese Weise sey die Bereitung des Glases entdeckt worden. Plinius, Naturgeschichte Buch 24, Abtheilung 65.

2. Geschlecht. Trona.

Syn. Uras, kralliges Natron.

Crystallsystem: zwey- und einkrystallig. Die seltenen Crystalle sind in der Richtung einer Nebenachse verlängerte, verticale, rhombische Prismen, ähnlich Fig. 147. S. 275 (ohne die Fläche c). Theilbarkeit parallel einer schiefen Endfläche sehr vollkommen. Gewöhnlich findet sich das Mineral in dichten, krystallin zusammengefügten Massen.

$\rho = 2,5 \dots 2,7$; spec. Gew. $= 2,1$; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos oder gelblichgrün; Bruch uneben. Leicht in Wasser auflöslich; Geschmack scharf laugenhaft. Verwittert an der Luft nicht. Besteht aus wasserhaltigem, anderthalb-kohlensaurem Natron (38 Natron, 40 Kohlensäure, 22 Wasser). Descepihert beym Erhitzen, gibt Wasser und Kohlensäure aus, und schmilzt, wie Natron, für sich leicht, und mit Kieselerde zu einem Glase.

Findet sich in großer Menge in Nord-Africa, in der Provinz Sufena, als Uebersug des Bodens, sodann in Japan als Salzkruste auf der Oberfläche eines warmen Sees, auch in dem doppeltkohlensauren. In America kommt dieses Salz in Louisiana unter dem Namen Uras in dem Wasser eines Sees


vor, der bey dem indianischen Dorfe Lagunita, eine Tagreise östlich von Meriba, liegt. Das Salz scheidet sich bey der Verdunstung des Wassers in rindenförmigen Stücken ab, die sich auf den Boden des Sees senken, und von da von den Indianern während zwey Monaten der heißen Jahreszeit durch Untertanzen und Ausgraben gefördert wird. Während dieser Zeit werden 1,000—1,600 Centner gewonnen. Die Benützung ist dieselbe wie die der Soda. Wegen seiner Luftbeständigkeit soll es in Afrika selbst zu Bauern verwendet seyn. So wird angegeben, daß der Baustein der nunmehr in Trümmern liegenden Festung Koffe-Tona sey. Die Indianer in Columbien benützen dieses Salz vorzüglich zur Bereitung eines bestebten Kaumittels, welches bey geringem Urar-Zusatz den Namen Moo dolce hat, bey größerer Gekalt aber Chimoo heißt. Man wendet dazu noch den eingebleichten rothen Saft an, der aus frischen, in der Sonnenwärme gegohrenen Tabaksblättern erhalten wird und Anvir heißt.

3. Geschlecht. Gay-Lüssit.

Gay. Kohlensaurer Natron-Kalk.

Crystallsystem zwey- und einkleberig. Die Crystalle sind eine Combination eines rhombischen Prismas g mit der schiefen Endfläche c und den beiden schiefen Prismen f und o , und der hintern schiefen Endfläche c' , Fig. 153. Durch das Vorwalten der Flächen f sind die Crystalle gewöhnlich sehr in die Länge gezogen, so daß die Flächen g sehr zurücktreten oder ganz verschwinden.

Fig. 153.



Teilbarkeit nach g und c deutlich;
 $\rho = 2,0 \dots 2,0$; spec. Gew. $= 1,0 \dots 2,0$; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; farblos oder gelblich und grünlichweiß. Wenig in Wasser auflöslich. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von einfach-kohlensaurem Kalk und einfach-kohlensaurem Natron (21,39 kohlensaurer Kalk, 24,96 kohlensaures Natron, 32,65 Wasser mit einer Vermengung von Thon). Wird bey

Gefügen unklar und verceptiliert; schmilzt auf Kohle schnell zu einer undurchsichtigen Kugel, die sich nun nicht weiter schmelzen läßt und alkalisch reagiert.

Hat sich bis jetzt nur in Crystallen gefunden, zu Lagunitas in Columbien, in einem Thone eingebettet, der in einem Ursee liegt. Die Indianer nennen die Crystalle, wegen ihrer häufig pyramidenartigen Gestalt, „Clavos,“ d. i. Nägel.

4. Geschlecht. Zinkal.

Syn. Borax.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind gewöhnlich verticale Prismen *g*, in Verbindung mit der ersten und zweiten Seitenfläche *a* und *b*, mit der hinteren schiefen Endfläche *d'* und dem vorderen schiefen Prisma *o*, ähnlich Fig. 131. S. 257, mit Weglassung der Fläche *c*. Der Habitus ist kurz säulenartig, die Säulen oft platt durch Vorherrschen der Flächen *a*. Auch Zwillinge, parallel *a* zusammengesetzt. Theilbarkeit nach den Prismenflächen *g* und den beiden Diagonalen des Prismas.

$\rho = 2 \dots 2,5$; spec. Gew. = $1,5 \dots 1,7$; wasserhell, auch graulich, gelblich, grünllich; Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; schmeckt süßlich und alkalisch. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-borsaurem Natron, und enthält 36,52 Borsäure, 16,37 Natron, 47,11 Wasser. Bläht sich in der Hitze außerordentlich stark auf zu einer schwammigen Masse, und schmilzt hernach zum klaren Glase; unter Zusatz von etwas Schwefelsäure wird die Böhrohrflamme beym Schmelzen des Glases grün gefärbt.

Findet sich in Crystallen und Körnern an den seichten Ufern einiger thibetanischen Binnenseen, und wird durch Reinigen in den vielgebrauchten Borax umgewandelt.

5. Geschlecht. Cassolin.

Syn. Borsäure.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle erscheinen in Gestalt von Schuppen und Blättchen, oder zu stalactitischen und rindenartigen Aggegraten verbunden.

zerreiblich; spec. Gew. = $1,48$; farblos, auch gelblich;

perlmutterglänzend; durchscheinend; Geschmack säuerlich und bitterlich; fühlt sich etwas fettig an. Besteht aus wasserhaltiger Borsäure, und enthält 56 Borsäure und 44 Wasser. Schmilzt in der Hitze leicht zu einem ungefärbten, blasigen Glase. Löst sich in Weingeist; die angezündete Lösung brennt mit grüner Flamme.

Findet sich auf der liparischen Insel Vulcano in einer durch den Crater gebildeten Felsenhöhle, aus der heiße Quellen entspringen, die Decke und die Wände der Höhle überkleidend, sodann in Wasser aufgelöst in den Lagunen von Sasso bey Siena, und endlich am Rande und auf dem Boden jener Lagunen, verunreiniget mit Schlamm und einigen Salzen. Wird zur Bereitung von Borax benutzt.

2. Eigenschaft des Salpeters.

1. Geschlecht. Kalisalpeter.

Syn. Salpeter.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die bis jetzt nur künzlich dargestellten Crystalle sind der Fig. 40. S. 136, sodann den Figuren 103, 104. S. 238, und überhaupt den Crystallen des Arzons und des Strontianits sehr ähnlich, und sogar in den Abwinklungen, welche hier wie dort vorkommen.

Eigenschaft parallel g und h, Fig. 104, unvollkommen. $\rho = 2,0$; spec. Gew. = 1,9 ... 2,0; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos, auch graulichweiß; leicht in Wasser löslich; Geschmack salzig-kühlend. Bruch vollkommen muscheligg. Luftbeständig. Besteht aus einfach-salpetersaurem Kali (46,57 Kali, 53,43 Salpetersäure). Schmilzt leicht und verpufft auf glühender Kohle.

Findet sich theils in haar- und nadel förmigen Crystallen, theils in flockigen oder mehrlartigen Parthien als Beschlag, theils endlich in zerbrochen, klein zusammengefügten Stücken von krusten- oder rindenartiger Beschaffenheit.

Kommt als Ausblähung der Erdoberfläche in mehreren verschiedenen Ebenen warmer Länder vor, wie in Ungarn, Spanien,

Virginien, Ostindien und Nord-Africa; sodann in Sibirien, hauptsächlich auf Ceylon und in Bengalen, wo'er aus einem salzigen selbstpathigen Gestein ausgezogen wird.

Der Salpeter hat eine mehrfältige, sehr nützliche Verwendung, und ein großer Theil desselben wird künstlich aus dem natürlich-vorkommenden unreinen dargestellt (ostindischer Salpeter). Außer seiner allgemeinen Anwendung zur Pulverfabrication und den verschiedenartigsten Feuerfäßen, wird er auch noch insbesondere in der Arzneykunde, und auf die mannfaltigste Weise zu chemisch-technischen Arbeiten benützt.

2. Geschlecht. Natronsalpeter.

Syn. Salsesalpeter.

Crystallsystem drey- und einachsfig hemiedrisch. Die Crystalle sind Rhomboëder mit Endkanten von $106^{\circ} 30'$. Theilbarkeit nach den Rhomboëderflächen sehr vollkommen.

$\rho. = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. $= 2,0$; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos oder lichtgraulich; in Wasser löslich; Geschmack salzig kühlend; luftbeständig. Besteht aus einfach-salpetersaurem Natron (36,75 Natron, 63,25 Salpetersäure). Schmilzt wie Kalisalpeter und verpufft auf Kohle, aber schwächer.

Kommt in Peru im Districte Atacama, in der Nähe des Hafens Yquique, schichtenweise in Thon vor, und zwar auf eine Erstreckung von mehr als 50 Stunden. Der Natronsalpeter wird nunmehr schon ziemlich allgemein statt des Kalisalpeters zur Darstellung von Salpetersäure angewendet, bildet einen wichtigen Handelsartikel, und ist aus Seesläbten um den Preis von 12 Gulden pr. Centner zu beziehen.

3. Geschlecht. Kalksalpeter.

Syn. Mauersalpeter.

Die Crystalle sind äußerst feine, haar- und nadel förmige Prismen, noch nicht näher bestimmt. Sie sind weich und zerreiblich, zu Flocken vereinigt oder in der Form eines crystallinischen Pulvers. Glasglanz; durchscheinend; farblos oder grau-

lich; leicht im Wasser löslich; Geschmack scharf und bitter. Besteht aus einfach-salpetersaurem Kalk (34,9 Kalkerde, 65,1 Salpetersäure). Verpufft auf glühenden Kohlen und hinterläßt einen erdigen weißen Rückstand, der nach stärkerem Glühen alkalisch, und überhaupt wie Kalk reagiert.

Findet sich, zumal in heißen Ländern, häufig als Ausblühung der Erdoberfläche, in Spanien, Africa, Virginien, Lima, und ferner mit Kalisalpeter in dem Gestein der Höhlen von Bengalen und Ceylon, das damit gewöhnlich noch stärker als mit Kalisalpeter imprägniert ist. Das gepulverte, Kalisalpeter enthaltende Gestein wird mit kalihaltiger Holzasche vermengt, mit Wasser ausgelaugt und die concentrirte Lauge sofort zur Crystallisation gebracht.


Auch die Talk- oder Bittererde trifft man in der Natur hin und wieder in Verbindung mit Salpetersäure an, und man hat somit noch weiter einen Talksalpeter zu unterscheiden.

4. Stippschaft des Glaubersalzes.

1. Geschlecht. Glaubersalz.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die flächenreichen Crystalle, welche man bisher unter den künstlich erhaltenen genauer kennen gelernt hat, sind gewöhnlich eine Combination,

Fig. 154.



welche durch Fig. 154 dargestellt ist, nämlich des verticalen rhombischen Prismas *g* mit den Seitenflächen *a* und *b*, den Flächen der schiefen Prismen *o* und *f* und den Flächen *c* *c'*. Der Habitus der Crystalle ist in der Regel säulenartig, seltener pyramidal,

wenn die schiefen Prismen vorherrschen, und immer in der Richtung einer Nebenachse verlängert. Theilbarkeit parallel *a* vollkommen; $\rho. = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. = $1,4 \dots 1,5$; Glas-

glanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos, wasserhell oder graulich; leicht in Wasser löslich; Geschmack fühlend und salzig bitter; verwittert an der Luft. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Natron (13,39 Natron, 24,84 Schwefelsäure, 55,77 Wasser). Gibt im Röhrchen, selbst im verwitterten Zustande, noch Wasser aus; im frischen Zustand schmilzt es im Crystallisationswasser. Beym Glähen auf Kohle gibt es Hepar.

Kommt theils als ein Begleiter des Steinsalzes vor, zu Ischel, Nussee, Hallstadt, Hallein, theils im Gypse, wie zu Mählingen im Canton Aargau und zu Hasmersheim am untern Neckar, theils endlich als Ausblähung der Erdoberfläche, wie in der Salzebene von Astracan, in Aegypten u.s.w. Auch hat man es schon auf vesuvischer Lava gefunden. Vielfältig kommt es in Wasser aufgelöst, in Mineralwässern, vor. Carlsbad, Schlit, Gmünd u.s.w., und in den salzigen Seen Ungarns, Aegyptens u.s.f.

2. Geschlecht. Ihenarbit.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle sind kleine Rhombenoctaeder, an denen eine Endfläche und Flächen eines rhombischen Prismas vorkommen, an einander gereiht, gruppiert. Theilbarkeit parallel der Endfläche. H. unbestimmt; spec. Gew. = 2,73; Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; meist ins Röthliche; wird in feuchter Luft undurchsichtig und beschlägt mit einem weißen Pulver; im Wasser löslich; die Lösung reagiert schwach alkalisch. Besteht aus wasserfreiem, einfach-schwefelsaurem Natron, und hat eine kleine Beymischung von Soda (98,78 schwefelsaures Natron, 0,22 Soda). Gibt beym Erhitzen etwas Feuchtigkeit aus und schmilzt in stärkerer Hitze. Zieht im gepulverten Zustande sehr begierig Wasser an, erwärmt sich dabey und backt zu verstandhängenden, crystallinischen Krusten zusammen.

Findet sich zu Salines d'Espartines, 5 Meilen von Madrid, auf dem Boden eines Bassins, aus welchen im Winter salzhaltige Wasser hervordringen, die im Sommer, beym Verbunnen, das Mineral theils in Crystallen, theils in crystallini-


igen Massen absetzen. Wird zur Glasfabrication und zur Sodabereitung benutzt.

3. Geschlecht. Glauberia.

Syn. Brongniartin.

Erystallsystem zwey- und eingliederig. Die Erystalle sind gewöhnlich eine Combination des verticalen rhombischen Prismas *g* mit der schiefen Endfläche *c* und den schiefen Prismenflächen *f*, Fig. 155. Durch Vorherrschen der Endfläche *c* sind die Erystalle meist etwas dick tafelartig. Die Oberfläche von *f*, auch von *c*, parallel ihren Combinationseanten stark gestreift.

Fig. 155.



Theilbarkeit nach *c* vollkommen; nach *g* unvollkommen. $\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $2,7 \dots 2,8$; Glasglanz,

fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Farbe weiß, ins Graue, Gelbe, Rothe, meist unrein; Geschmack schwach salzig; zum Theil in Wasser löslich. Besteht aus einer wasserfreyen Verbindung von einfach-schwefelsaurem Natron mit einfach-schwefelsaurem Kalk (51 schwefelsaures Natron, 49 schwefelsaurer Kalk). Deerepittiert beym Erhitzen im Glasblöthen mit Festigkeit. Schmilzt bey anfangender Gläthitze zu einem klaren Glase. Auf Kohle heftig erhitzt wird er zum Separ; das Schwefelnatrium zieht sich in die Kohle, der Kalk bleibt als eine weiße Kugel zurück.

Findet sich in Erystallen und erystallinischen derben Massen mit Thon im Steinsalzgebirge zu Biskarybia bey Ocanna in Spanien, zu Aussee in Oesterreich und im unreinen Zustande zu Vie in Lothringen.

4. Geschlecht. Dupleatsalz.

Syn. Aphtalose; schwefelsaures Kalk.


Erystallsystem ein- und einachsfig. Die Erystalle sind der Quarzform, Fig. 39. S. 136, ähnlich, häufig fein nadelförmig oder spießig. Theilbarkeit parallel den Flächen eines rhombischen Prismas. $\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $1,73$; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos, ins Gelbe und Graue.

In Wasser löslich; Geschmack salzig, bitter, unangenehm. Besteht aus wasserfreiem, einfach-schwefelsaurem Kali (54,75 Kali; 45,25 Schwefelsäure). Decrepitirt heftig beim Erhitzen, schmilzt bei stärkerem Feuer, und bildet auf der Kohle einen Hepar. Findet sich in Schländen, Spalten so wie in Laven des Vesuv.

5. Geschlecht. Bittersalz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle, welche man bis jetzt kennt, sind Kunstproducte. Einige öfters vorkommende Combinationen haben Aehnlichkeit mit Fig. 64 und 65. S. 168,

Fig. 156.



eine weitere ist durch Fig. 156 dargestellt, ein verticales, rhombisches Prisma g, in Verbindung mit der Hälfte eines rhombischen Octaëders o. Die natürlichen Crystalle sind äußerst fein haarförmig.

Erhellbarkeit parallel der Richtung einer Abstumpfungsfäche der stumpfen Prismenanten sehr vollkommen. $D. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 1,75$; Glanz; durchsichtig bis durchscheinend; farblos und graulich; leicht löslich in

Wasser; Geschmack salzig bitter.

Besteht aus wasserhaltiger, einfach-schwefelsaurer Bitter-Erde. Das catalonische enthält 18 Bitter-Erde, 23 Schwefelsäure und 18 Wasser. Gibt im Kölbchen Wasser aus und schmilzt. Mit Soda vermischt und auf der Kohle vor dem Löthrohr im Reductionsfeuer behandelt, bildet sich etwas Schwefelnatrium, und in Folge dessen schwärzt die geschmolzene Masse reines Silber, wenn man sie befeuchtet oder mit einem Tropfen Wasser darauf setzt.

Das Bittersalz findet sich vorzüglich als Ausblähung auf bittererbehaltigen Gesteinen und Böden, zuweilen in außerordentlicher Menge, und auf große Strecken wie ein Schneefall Landstriche bedeckend, wie z. B. die Steppen Sibiriens, Gegenden in Andalusien und Catalonien. Häufiger wird es in kleinen Mengen auf Gesteinen als haarförmige, wollige, flockige u.s.w.

Ausblüthung angetroffen, so auf dem Gestein der *Via mala* in Graubünden, auf den Schieferen bey Clausthal und Goslar am Harz, auf dem schwarzen Schiefer zu Idria in Krain (Haarsalz der dortigen Bergleute), auf dem Gyps des Montmartre bey Paris, auf dem Gneis der Freyberger Gegend u.s.w. Seine Bildung in bittererdehaltigen Gesteinen geschieht in Folge einer Zersetzung eingemengten Schwefelkieses, indem die dabey entstandene Schwefelsäure sich mit der Bittererde verbindet. Kommen solche Gesteine mit Wassern in Berührung, so laugen diese das Bittersalz aus, und es entstehen die sogenannten Bitterwasser, welche dieses Salz immer in größerer oder kleinerer Menge aufgelöst enthalten. Dahin gehören die Mineralwasser von Seidlitz, Saibschütz, Epsom u.s.w.

6. Geschlecht. Mascagnin.

Mehliger Beschlag oder tropfsteinartige Rinde, von graulich und gelblicher Farbe, scharfem und bitterem Geschmack, in Wasser löslich. Gibt, mit gebranntem Kalk zusammengerieben, Ammoniak aus, und in Wasser gelöst, mit Barytsolution, einem weißen Niederschlag. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Ammoniak. Schmilzt beym Erhitzen und verflüchtigt sich. Die analoge künstliche Verbindung enthält 22,6 Ammoniak, 53,1 Schwefelsäure, 24,3 Wasser und crySTALLISIRT in Gestalten, welche zum ein- und einachsigen CrySTALLSYSTEM gehören.

Findet sich in vulcanischen Gesteinen am Vesuv und am Aetna, in Wassern vulcanischer Gegenden aufgelöst, wie bey Siena.

III. Ordnung. Brenzsalze.

Salze, welche in der Hitze Verbrennungs-Erscheinungen zeigen.

1. Geschlecht. Honigstein.

Syn. Mellit.

CrySTALLISIRT in Formen, welche dem zwey- und einachsigen CrySTALLSYSTEM angehören. Quadratoctäeder mit dem Endkanten

winkel von $118^{\circ} 13'$, und dem Seitenkantelwinkel von $93^{\circ} 6''$; damit ist oft die horizontale Endfläche verbunden, und das zweyte quadratische Prisma; auch erscheint ein stumpferes Octaeder, als gerade Abstumpfung der Endanten des gewöhnlichen, Fig. 14. S. 49.

Theilbarkeit unvollkommen nach den Flächen des Hauptoctaeders. $\rho. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 1,5 \dots 1,6$; glasartiger Fettganz; honig- und wachsgelb, bis hyacinthroth; durchsichtig bis durchscheinend; Bruch muschelig.

Besteht aus wasserhaltiger, einfach-honigsteinsaurer Thonerde, und enthält 41,4 Honigsteinsäure, 14,5 Thonerde, 44,1 Wasser. Verbrennt an der Luft erhitzt unter Hinterlassung von Thonerde; gibt im Kölbchen Wasser aus. Die erste Vermuthung, welche man in Folge der äußeren Beschaffenheit des Honigsteins von seiner chemischen Zusammensetzung schöpfte, gieng dahin, daß er ein dem Bernstein ähnliches fossiles Parzef. Klaproth entdeckte darinn die eigenthümliche Säure, und erkannte das Mineral für eine Verbindung derselben mit Thonerde.

2. Geschlecht. Humboldtit.

Syn. Dralit.

Feine, haarförmige Crystalle, oder feinkörnige, verbe, blättrige oder schalige Parthien; matt bis wenigglänzend; undurchsichtig; oder- und strohgelb; $\rho. = 1,0$; spec. Gew. $= 2,18 \dots 2,2$. Besteht aus Kleeurem Eisenorydul und enthält 53,86 Eisenorydul und 46,14 Kleeure. Wird in der Hitze schwarz, die Kleeure brennt weg, und es hinterbleibt magnetisches Eisenoryd. Löst sich in Salpetersäure. Die neutrale Auflösung gibt mit Ammoniak einen braunen, mit Kalklösungen einen weißen Niederschlag.

1. Findet sich in Rissen und auf Klüften von Braunkohle zu Braunkohle in Hessen und zu Koloserau bey Billa in Böhmen.

IV. Ordnung.

Salze, welche einen Erz-Kalch (ein schweres Metakalch) enthalten.

1. Sippchaft der Vitriole.

Verbindungen der Schwefelsäure mit schweren Metakalchen.

1. Geschlecht. Eisenvitriol.

Syn. Grüner Vitriol.

Erythallsystem zwey- und eingledrig. Eine gewöhnliche Form ist eine Combination des geraden Prismas g und der schiefen Endfläche e , Fig. 28. C. 61. Damit ist öfters noch die zweyte Seitenfläche verbunden, welche die größeren Seitenkanten des Prismas abstumpft, und eine hintere Schiefenfläche. Der Habitus der Crystalle ist gemeiniglich kurz säulen- oder tafelförmig, mit Vorherrschen der Schiefenfläche e und der Prismenflächen g . Gewöhnlicher erscheinen traubige, nierenförmige, flactitische Massen, oder rindenartige und pulverige.

ρ . = 2,0; spec. Gew. = 1,8 ... 1,9; lauchgrün ins Berg- und Spangrüne; Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Geschmack säßlich und stark zusammenziehend; in Wasser leicht auflöslich. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Eisenoxydul, und enthält 31 Schwefelsäure, 27 Eisenoxydul und 42 Wasser.

Verwittert an der Luft, wird gelb, indem er Sauerstoff anzieht und sich in schwefelsaures Eisenoxyd verwandelt. Der Eisenvitriol ist ein secundäres Erzeugniß und bildet sich bey der Zersetzung von Schwefel- und Magneties. Findet sich vorzüglich in alten Grubenbauen wo Luft- und Wasserzutritt die Zersetzung der Riese begünstigt, die stehen gebliebenen Erzen oder dem Gesteine eingemengt sind.

Schöne Crystalle kommen zu Bodenmais in Bayern, minder kleine am Rammelsberg am Harze, zu Fahlun in Schweden, auf der Grube Teufelsgrund im Schwarzwalde, zu Andernach in Rhod., zu Bilbao in Spanien u.s.w. vor.

Er bildet sich auch bey der Verwitterung kieshaltiger Schiefer, Mergel, Thone, Kohlen, und wird alsdann durch Auslaugen derselben, durch Abdampfen der vitriolischen Flüssigkeit und nachfolgende Crystallisation erhalten.

Der größte Theil des im Handel vorkommenden Eisenvitriols wird auf diese Art dargestellt. Seine Hauptanwendung zur Schwarzfärberey, zur Bereitung der Linte und des Berlinerblaus, ist bekannt. Auch wird er zur Darstellung des rauchenden Vitriolsäure benutzt, zur Schätzung des Holzes vor Fäulniß, Wurmfraß und Schwamm.

2. Geschlecht. Schwefelsaures Eisenoxyd.

Crystallsystem drey- und einachsig. Die Crystalle erscheinen als zolllange, sechsseitige Prismen mit den Flächen einer sechsseitigen Pyramide und einer horizontalen Endfläche, ähnlich Fig. 48. S. 154. Bildet gewöhnlich feinkörnige Massen von weißer Farbe, mit einem Stich ins Violette. Starkglänzend. Vollständig in Wasser löslich.

Besteht aus neutralem, schwefelsaurem Eisenoxyd mit Crystallisationswasser, gemengt mit etwas schwefelsaurer Thonerde, Kalkerde und Bittererde (Schwefelsäure 43,55, Eisenoxyd 24,11, Wasser 30,10, Thonerde 0,92, Kalkerde 0,73, Bittererde 0,32).

Findet sich in der Chilisken Provinz Coquimbo, nahe bey der Stadt Copiapo, als Lager in einem felspathigen Gestein, vermengt mit basischen Eisenoxydsalzen. Der Rand dieses an vielen Stellen zu Tage kommenden Salzlagers ist durch schwefelsäurehaltiges, rothes Eisenoxyd bezeichnet, wegen dessen Farbe die Stelle Tierra amarilla heißt.

Mit diesem Salze kommen noch zwey andere schwefelsaure Eisensalze vor von basischer Beschaffenheit, ein gelbes und ein schmutzig gelblichgrünes.

2. Geschlecht. Botryogen.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die seltenen und kleinen Crystalle sind Fig. 134. S. 258 ähnlich. Gewöhnlich in traubigen und nierenförmigen Gestalten.

$\rho = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. = 2,03; Farbe dunkelhyacinthroth bis ockergelb; Glasglanz; durchscheinend; Geschmack zu

sammenziehend. Auf löslich in Wasser mit Hinterlassung eines gelben Ockers. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von basisch-schwefelsaurem Eisenoryd und doppelt-schwefelsaurem Eisenorydul, mit einer Einmischung von schwefelsaurer Bittererde und Gyps. Enthält 6,7 ... 6,8 basisches schwefelsaures Eisenoryd, 25,9 ... 25,8 doppelt-schwefelsaures Eisenorydul, 17,1 ... 26,9 schwefelsaurer Bittererde, 2,2 ... 6,7 Gyps.

Findet sich auf der großen Kupfergrube zu Fahlun.

4. Geschlecht. Kupfervitriol.

Syn. Blauer oder cyprischer Vitriol.

Crystallsystem ein- und eingliedrig. Die bekannten Crystalle sind künstlich erzeugt, ihr Habitus ist kurz säulen- oder dick tafelförmig mit vorherrschenden Flächen eines rhombischen, mit schiefer Endfläche versehenen Prismas. Die in der Natur vorkommenden Abänderungen bilden getropfte, nierenförmige, auch zellige Gestalten, Ueberzüge und Beschläge.

H. = 2,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Farbe dunkel himmelblau ins Spangrüne und Berlinerblau; Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Geschmack höchst widerlich zusammenziehend; leicht in Wasser löslich. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Kupferoryd, und enthält 32 Kupferoryd, 33 Schwefelsäure und 35 Wasser. Verliert an der Luft etwas Wasser und beschlägt weiß; verliert in der Hitze den ganzen Wassergehalt und brennt sich weiß. Aus seiner Auflösung in Wasser scheidet Eisen metallisches Kupfer aus.

Der Kupfervitriol findet sich auf verschiedenen Kupfererzlagerstätten, namentlich auf kupferkiesführenden, und ist ein Product der Zersetzung von Schwefelkupfer-Verbindungen, das sich gern in oberen Teufen der Gruben und in alten Bauen bildet, so am Rammelsberge auf dem Harze, zu Fahlun in Schweden, auf der Grube Wahlscheid in Nassau, zu Herrengrund in Ungarn, in den Gruben des Rio tinto in Spanien u.s.w. Löst er sich in den Grubenwassern auf, so entstehen die sogenannten Cementwasser, aus welchen das Kupfer vermittelt Eisen metallisch abgeschieden werden kann.

Der Kupfervitriol wird vorzüglich zur Darstellung blauer und grüner Farben, und auch in der Heilkunst verwendet.

5. Geschlecht. Zinkvitriol.

Syn. Weißer Vitriol, Gallienstein.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle stimmen mit denen des Bittersalzes überein, s. Fig. 156. S. 298. Die natürlichen Crystalle bestehen aus stängeligen und haarsförmigen Gestalten, welche zu getropften, traubigen und nierenförmigen Aggregaten verbunden sind; öfters erscheinen sie als ein crystallinisches Pulver.

D. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 1,9 ... 2; farblos und bläulich oder röthlich; Glasglanz; durchsichtig ... durchscheinend; Geschmack höchst widerlich zusammenziehend; leicht in Wasser auflöslich.

Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Zinkoxyd, und enthält 29,07 Zinkoxyd, 27,98 Schwefelsäure, 44,0 Wasser. Verliert an der Luft etwas Wasser; beschlägt weiß und verwittert. Seine Auflösung in Wasser gibt mit Ammoniak einen weißen, flockigen Niederschlag, der sich im Uebermaß von Ammoniak wieder vollkommen auflöst.

Der Zinkvitriol ist das Product der Zersetzung der Zinkblende, und findet sich im Ganzen selten, und natürlich nur da, wo Zinkblende unter geeigneten Umständen sich oxydirt. Die bekanntesten Fundorte sind der Rammelsberg am Harz, Fahlun in Schweden und Schemnitz in Ungarn.

Als seltene Vorkommnisse können hier noch der Kobaltvitriol und der Uranvitriol erwähnt werden; ersterer hat sich in alten Grubenbauen zu Biber im Hannauischen, letzterer in einer alten Strecke einer Grube zu Joachimsthal in Böhmen gefunden.

2. Sippschaft der Haloiden.

Salzartige Verbindungen des Chlors mit Metallen.

1. Geschlecht. Eisenhaloid.

Syn. Eisenchlorür.

Reine weiße Hättchen; leicht in Wasser löslich; sublimierbar; Geschmack zusammenziehend. Besteht aus einfach-chlorigen, Olen allg. Naturg. A.

und enthält 43,5 Eisen und 56,5 Chlor. Zerfällt in feuchter Luft, und verwandelt sich unter Ausstoßen von salzsaurem Gas in Eisenoryd.

Wird von Vulkanen ausgeblasen, namentlich auch vom Vesuv.

2. Geschlecht. Eisensalmiak.

Syn. Ammonium-Eisenchlorid.

Pulverige gelbe Masse; leicht in Wasser löslich; Geschmackslos und zusammenziehend. Besteht aus Salmiak und anderthalb Chlor-Eisen. Wird an der Luft feucht. Ein vulcanisches Product, welches in den Rauchsäulen der Feuerberge aufsteigt und sich an Spalten- und Kraterwände ansetzt.

3. Geschlecht. Kupferhaloid.

Syn. Kupferchlorid.

Grünlichblaues Pulver, leicht in Wasser löslich; von widrigem, zusammenziehendem Geschmack. Besteht aus Kupfer-Chlorid. Wird in den Rauchsäulen der Vulcane aufgetrieben und färbt mitunter die abliegenden Salze, welche die Ränder der Spalten schmücken. Vesuv.

III. Classe. Brenze.

Mineralien, welche aus einer verbrennlichen Substanz bestehen und in der Hitze an der Luft verbrennen.

I. Ordnung. Erdbrenze.

Brenze, welche brennen ohne vorher zu schmelzen.

1. Eigenschaft der Schwarzkohle.

1. Geschlecht. Anthracit.

Syn. Kohlenblende; Glanzkohle; hartharte Steinkohle.

Derb und eingesprengt, bisweilen stängelig, mit Spuren einer Theilbarkeit. $\rho = 2 \dots 2,5$; spec. Gew. $1,4 \dots 1,7$; Farbe eisenschwarz bis graulichschwarz; gibt ein braunschwarzes

Glanz; Glasglanz, metallischer; undurchsichtig; Bruch muschelig.

Besteht aus Kohlenstoff und enthält Beimengungen von Kiesel-erde, Thonerde und Eisenoxyd. Schwer verbrennlich, brennt ohne zu backen oder zu schmelzen.

Findet sich gewöhnlich derb, in schaligen, körnigen oder dichten Abänderungen, selten in stängeligen Zusammensetzungen, vorzüglich im Uebergangsgebirge, theils auf Klüften und Gängen im Grauwacken- und Thonschiefergebirge, wie zu Fischwip bey Gera, zu Wehlfenstein unfern Saalfeld, zu Burgbach bey Lobenstein im Voigtlande und zu Schütz; theils auf Ergüßergängen, wie zu Leerbach am Harz, zu Kongsberg in Norwegen, theils endlich massig, flüchtig und schwammig im secundären und im Uebergangsgebirge, wie in dem Schiefer- und Sandsteingebirge des Chamouni, in den Gebirgsbildungen bey Philadelphia, bey Montiers in der Tarantaise und an einigen andern Orten.

Der Anthracit wird als Brennmaterial benutzt, erfordert aber einen sehr starken Luftzug und eine sehr hohe Hitze zur Verbrennung.

2. Geschlecht. Steinkohle.

Derb oder eingesprengt, und in mehr oder weniger mächtigen Lagern. Gefüge gewöhnlich schieferig, öfters auch richtig oder verworren faserig und dicht. $\rho. = 1,25$; spec. Gew. $= 1,1$... $1,5$; Farbe pechschwarz, graulichschwarz und schwärzlichbraun; Strich graulich oder bräunlichschwarz; Glasglanz bis Fettglanz; undurchsichtig.

Besteht aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Der Kohlenstoff waltet immer vor, und beträgt 74 bis 96 Procent, dagegen der Sauerstoff 3 bis 20, der Wasserstoff 0,5 bis 5,4 Proc., Aberdies sind immer verunreinigende Beimengungen von Erden und schweren Metalloxyden vorhanden, im Betrage von 1 bis 20 Proc. Als beständiger Begleiter der Steinkohle erscheint Schwefelkies, mehr oder weniger fein in ihre Masse eingestreut.

Vor dem Löthrohr entwickelt sie einen nicht unangenehmen stinkenden Geruch, entzündet sich leicht und brennt mit stark

leuchtender Flamme. Im Verschlrossenen geglüht, hinterläßt sie, unter Abgabe einer mehr oder weniger großen Menge brennbaren, leuchtenden Gases, 50 ... 86 Proc. einer spröden, schwer einzuschmelzenden Masse, die man *Cock's* nennt.

Bei diesem Erhitzen im verschlossenen Raume zeigt sie ein weiteres Verhalten, was bei verschiedenen Kohlen auch ein sehr verschiedenes ist. Das Steinkohlenpulver wird dabei entweder weich und brennt zu einer gleichartigen Masse zusammen (*Bactkohle*), oder es sintert zu einer festen Masse zusammen, ohne sich dabei völlig zu erweichen (*Sinterkohle*), oder endlich es bleibt pulverförmig und ohne Zusammenhang (*Sandkohle*).

Man unterscheidet folgende Abänderungen.

1. *Schieferkohle*. Von mehr oder weniger schieferiger Structur. Bei einer feiner schieferigen Zusammensetzung heißt sie auch *Blätterkohle*. Stark glänzende Abänderungen nennt man auch *Glanzkohle*.

2. *Strobkohle*. Mit unbedeutlich schieferiger, dem Körnigen sich nähernder Zusammensetzung.

3. *Cannelkohle* (*Candle Coal*). Dicht, ohne sichtbare Zusammensetzung, mit einem nach allen Seiten groß- und flachmuscheligen Bruch; schwacher Glanz. Die kohlenstoffärmste und wasserstoffreichste Steinkohle, weshalb sie auch beim Glühen im Verschlrossenen das meiste Gas ausgibt.

4. *Faserkohle* (*mineralische Holzkohle*). Von faseriger Structur, wie Kohle von weichem Holze; zerreiblich; seidenglänzend; kohlenstoffreich. Liegt zwischen den Blättern der Schiefer- und Blätterkohle.

5. *Rußkohle*. Staubartige Theile in lockerer Zusammensetzung; zerreiblich und abfärbend.

Diese Abänderungen kommen häufig mit einander verwechseln oder in lagerweiser Abwechselung vor, und treten seltener einzeln auf.

Die Steinkohle findet sich vorzüglich auf eigenthümlichen Lagern, sogenannten *Flözen*, in Abwechselung mit Sandstein und Pflanzenreste führendem Schieferthon, in einer besonderen Gesteinsbildung, welche gerade ihrer Kohlenföhrung wegen, den Namen *Steinkohlenformation* erhalten hat; ja selbst Haupt-

Steinkohlenformation genannt wird, und ihre Stellung zwischen der unteren, vorzüglich aus Schiefern und Conglomeraten zusammengesetzten Abtheilung des Uebergangsgebirges und zwischen dem Rothliegenden hat. Die Steinkohlenflöze liegen gewöhnlich mehrfältig über einander, an einigen Orten folgen deren mehr als fünfzig und bis zu Hundert auf einander, und in der Stärke wechseln sie von einigen Linien bis zu 40 Fuß. Das Steinkohlengebirge ist vorzüglich in England, Belgien und Deutschland entwickelt, weniger in Frankreich, Spanien, Böhmen, Nordamerika und Neuholand. In Deutschland treffen wir diese Bildung zunächst am Rhein, in der Grafschaft Mark; sodann bey Eschweiler, Aachen und Saarbrücken, St. Ingbert; in den Saalegegenden bey Bismin und Lohdehans im Elbgebiete bey Witschappel, bey Zwickau und Papnichen; im Oberrheingebiete vorzüglich entwickelt, und Steinkohlenreich in Obersachsen. Die technische Wichtigkeit der Steinkohle als vorzügliches Brennmaterial ist bekannt, ebenso ihre Anwendung zur Gasbeleuchtung.

2. Sippschaft der Braunkohle.

1. Geschlecht: Braunkohle.

Gen. Lignit.

Derb, mit mehr oder weniger deutlicher Holztextur, auch dicht und erdig; gelblich-, holz- und schwärzlichbraun, bis pechschwarz; $\rho = 1 \dots 2,5$; oft zertrübblich; spec. Gew. $= 1 \dots 1,4$; undurchsichtig; Bruch erdig oder muschelig, und im letzteren Fall der Glanz fettartig.

Besteht aus Kohlenstoff, der vorwaltet, Sauerstoff und Wasserstoff, in abweichenden Verhältnissen, nach Maßgabe des Zustandes, in welchem sich die Pflanzensubstanz befindet, welche die Umwandlung in Braunkohle erlitten hat.

Die Analysen haben gegeben: 84,97 ... 77,1 Kohlenstoff, 26,47 ... 19,35 Sauerstoff, 4,31 ... 2,55 Wasserstoff und 14,25 ... 1,00 erdige Beimengungen. Je weiter die Umwandlung der organischen Substanz vorgeschritten ist, desto größer zeigt sich der Kohlenstoffgehalt.

nach in einer andern Form findet, die mit der des Arragonits übereinkommt.

2. Geschlecht. Floait.

Syn. Levrit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind Combinationen der Flächen des Grundoctaëders mit den Flächen eines geraden rhombischen Prismas g (ähnlich Fig. 64. S. 168.), wozu oft noch die Flächen $\frac{h}{2}$ treten, welche die scharfen Seitenkanten von g zuschärfen (Fig. 49. S. 155.). Auch kommt bisweilen eine gerade Endfläche vor und ein horizontales Prisma, welches die Lage der stumpfen Octaëderkanten hat. Der Habitus der Crystalle ist lang säulenartig, zuweilen beynah nadelförmig. Die Oberfläche der verticalen Prismen stark vertical gestreift; die Octaëder- und horizontalen Prismenflächen parallel ihren Combinationenkanten. Theilbarkeit nach den Diagonalen des Prismas g , unvollkommen.

$H. = 5,5 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 3,9 \dots 4,2$; braun und schwarz; Strich ebenso; Metallglanz, unvollkommener; undurchsichtig. Besteht aus einfach-kieselsaurem Eisenorydul, verbunden mit etwas kieselsaurem Kalk, wobey Manganorydul gewöhnlich einen kleinen Theil von Eisenorydul ersetzt. Enthält 52,54 Eisenorydul, 1,58 Manganorydul, 13,78 Kalkerde, 29,28 Kieselerde, und schließt etwas mechanisch eingeschlossenes Wasser ein, das er bey gelinder Erhitzung ausgibt, ohne sein Ansehen zu verändern. Schmilzt auf Kohle im Reductionsfeuer zu einer schwarzen Kugel, die vom Magnet gezogen wird. Bildet gepulvert mit Salzsäure eine Gallerte.

Findet sich vorzüglich auf der Insel Elba, Jura der Alpen, theils in Crystallen, die selten einzeln eingewachsen, gewöhnlich in Hühnereiern und Drusen verbunden sind, theils verb in stängelförmiger oder körniger Zusammensetzung, in Begleitung von Augit, lagerrweise in Talkschiefer bey Rio la Marina; auch bey Skien in Norwegen auf einem Eisenerzlager, ferner zu Ischorla bey Schneeberg, zu Kupferberg in Schlesiens, in Ungarn, Sibirien und Nordamerika.

dem Erz- und Mittelgebirge, das Molassegebilde am Nordabfall der Alpen, zu Pauder, St. Martin, Rüpfnach, Elgg in der Schweiz, Bäumle unfern Bregenz, Peissenberg, Achelsbach, Spensberg, Gmünd, Gschwind u. s. w. in Südbaiern. Auf Island findet sich der Sutura brand sehr häufig. Im tertiären Gebirge Frankreichs und Englands findet sie sich in den Becken von Paris und London.

Die reine Braunkohle ist immerhin ein gutes Brennmateri-
al, doch steht sie der eigentlichen Steinkohle weit nach, und hinterläßt immer weit mehr Asche als diese, deshalb sie nicht wohl zu Schmelzungen in Schachtöfen benützt werden kann. Der Gagat wird zu Bijouteriewaaren benützt, und die kies- und thonhaltige Braunkohle zur Vitriol- und Alaunfabrication.

T o r f.

Der Torf ist eine kohlige Substanz, welche der Hauptmasse nach aus mehr oder weniger umgewandelten Pflanzenresten besteht, jederzeit viel Humus enthält und mit erdigen Theilen ver-
mengt ist. Seine dunkle braune, bey den reifsten Abänderungen ins Schwarze verlaufende Farbe, rührt von dem durch Umwandlung der Pflanzenfaser entstandenen Humus her. Er verbrennt mit Ausstößung eines widerigen Geruches, und hinterläßt 1—40 Proc. Asche. Als eine gemengte Mineralsubstanz gehört er in das Gebiet der Geognosie.

II. Ordnung. Harzbrenze.

Brenze, welche sich erweichen ehe sie brennen.

1. Eigenschaft des Schwefels.

1. Geschlecht. Schwefel.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die gewöhnlichen Crystalle sind Rhombenocäeder, Fig. 24. S. 57., öfters mit einer horizontalen Endfläche oder mit einem verticalen rhombischen Prisma verbunden; zuweilen auch mit den Flächen eines stumpferen

taëders, oder mit Flächen, welche die Seitenkanten des Octaëders ab stumpfen.

Theilbarkeit sowohl nach den Flächen des Rhombenoctaëders, als nach den Flächen des verticalen rhombischen Prismas, aber beides unvollkommen. Die Crystalle sind gewöhnlich klein, auf- oder zusammengewachsen und zu Drusen verbunden.

$D. = 1,5 \dots 2,5$; spec. Gew. $1,9 \dots 2,1$; gelb, und zwar eigenthümlich, auch citron-, wachs-, honig- und strohgelb, so wie gelblichgrau und gelblichbraun; Fettglanz, auf Crystallflächen bisweilen bemantartig; durchsichtig ... durchscheinend an den Kanten.

Besteht aus dem wohlbekannten Grundstoff Schwefel, in mehr oder weniger reinem Zustande, öfters mit thönigen, kalkigen, kohligen oder bituminösen Theilen vermengt. Schmilzt bey $+ 111^{\circ} C.$ Brennt mit blauer, wenig leuchtender Flamme, unter Ausstoßen eines zum Husten reichenden, erstickenden Geruches, welcher von der sich beim Verbrennen bildenden schwefeligen Säure herrührt. Unlöslich in Wasser, aber löslich in Kali oder Natronlauge. Sublimirt sich im Glasblöchen.

Kommt theils in Crystallen, theils in crystallinischen Partikeln, sodann kugelig, nierenförmig, getropft, rindenartig, verbündet eingesprengt vor, und mitunter in staubartigen Theilen. Die kohligen oder bituminösen Beimengungen verändern öfters Farbe, Glanz und Durchsichtigkeit, so daß braune, matte und andurchsichtige Abänderungen dadurch hervorgebracht werden.

Das Vorkommen des Schwefels ist sehr verschieden. In Oditto findet er sich auf Quarzlagern, die dem Glimmerschiefer untergeordnet sind; auf Erzgängen hat man ihn bey Rippoldsau im Schwarzwalde, im Siegenschen und zu Bries in Ungarn gefunden. Das Flözgebirge enthält ihn aber weit häufiger als die älteren Gebirgsbildungen, und es sind namentlich Gypsbildungen, in welchen man ihn in Sizilien, im Kirchenstaate, in Murcia und Arragonien, zu Vex in der Schweiz, im Amte Lauenstein in Pannover, unfern Krakau u.s.w. findet. Zu Roisdorf, unfern Bonn, kommt er im Quarzsande vor, und zu Artern in Thüringen in der Braunkohle. Im vulcanischen Gebirge endlich findet er sich in großer Menge in Eolfatoren und wirklichen Feuerbergen, wie auf Volsano, Dominica, St. Vincent, der Schwefel-

Insel der Vohor-Gruppe, auf Montserrat, Kanaga in den Aleuten, Java u.s.w. In kleiner Menge setzen ihn Schwefelwasser ab (Nachen, Mendorf, Langenbrücken), wenn sie an der Luft fließen, indem ihr Gehalt an Schwefelwasserstoff durch den Sauerstoff der Luft zersetzt und dabei der Schwefel ausgeschieden wird.

Seine Anwendung als Bändmaterial, zur Pulverbereitung, in der Metallurgie, als Arznei u.s.w. ist bekannt.

Der Schwefel bietet ein sehr interessantes Beispiel des Dimorphismus eines Grundstoffes dar, S. 133. Schmelzt man den natürlichen Schwefel ein, so krySTALLISIRT er beim Erkalten in Prismen, welche nicht dem ein- und einachsigen Crystallsysteme, sondern dem zwei- und eingliedrigen angehören. Bei der Sublimation hingegen, bei der Crystallbildung in Spalten der Bälgane, so wie in unseren Rösthäusern, entstehen immer Crystalle, welche zum ein- und einachsigen Systeme gehören, und ebenso, wenn Schwefel aus einer Auflösung in Schwefelkohlenstoff herauscrystallisiert. Der Grund dieses merkwürdigen Verhaltens scheint darin zu liegen, daß die einzelnen Theile des Schwefels, je nach der Temperatur beim Festwerden, eine verschiedene Anordnung annehmen.

Dem Salmiak der Insel Volcano ist oranienfarbiger Schwefel eingemengt, welcher einen Selen-Gehalt besitzt.

2. Eigenschaft des Harzes.

1. Geschlecht. Bernstein.

Syn. Succinit, gelbes Erdharz.

Dichte, harzige Substanz. Stumpfeckige, rundliche Stücke und Körner von rauer, unebener Oberfläche; selten eingesprengt in Braunkohle oder Sandstein; noch seltener in getropfter oder geflossener Form. Schließt öfters Pflanzenreste und sehr viele Insecten ein.

$\rho = 2 \dots 2,5$; spec. Gew. = $1 \dots 1,3$; Fettglanz; gelb, honig- bis wachsgelb, ins Braune und Rothe einerseits, schwefel- und strohgelb, ins Weiße anderseits neigend oder verlaufend; durchsichtig bis durchscheinend; vollkommen flachmuscheltiger Bruch.

Besteht aus einem eigenthümlichen Harze, worinn eine ebenfalls eigenthümliche Säure eingehüllt ist, welche den Namen der Substanz trägt. Die entfernteren Bestandtheile sind die herrschenden des Pflanzenreichs, nämlich Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Als Verunreinigung kommen darinn Thonerde, Kiesel-erde, Kalkerde vor. Schmilzt in der Hitze, verbrennt unter Ausgehen eines angenehmen Geruches, und Hinterlassung eines kohli- gen Rückstandes. Bey der trocknen Destillation entwickelt sich zuerst ein saures Wasser, dann sublimirt sich im Hals der Re- torte die Bernsteinsäure, es fließt ein farbloses Oel ab, zuletzt ein braunes, schwerflüssiges, und gegen Ende der Operation, bil- det sich ein gelber Anflug im Retortenhals.

Der Bernstein ist das fossile Harz eines untergegangenen Baumes *), und findet sich deßhalb vorzugsweise in oder mit fossi- lem Holz in der sogenannten Braunkohlenbildung, oder im Schuttl- land, im Lehm und Sand einiger Meeresküsten. Der älteste, und bis heute immer noch der wichtigste Fundort ist die preussische Küste der Ostsee, der Danziger und Königsberger Strand; es sind ferner die Küstengegenden von Curland, Lief-land, Mecklenburg, Pommern und Dänemark, an denen man ihn vorzugsweise fin- det; das lockere Gebirge wird an den Küsten durch den Wellen- schlag zerstört, der Bernstein dadurch ausgefäßt und nun entwe- der durch die Wellen ausgeworfen, oder durch die Brandung in die See geführt. Im ersteren Falle gewinnt man ihn durch Zu- sammenlesen oder Nachgraben, im letzteren durch Fischen.

Weitere Fundorte sind die Gegend von Catania und Gir- genti in Sizilien, die Küsten von Suffolk, Norfolk und Essex in England, Grönland, Sibirien, Trahenitzes im Pennegau in Frank- reich. Auch hat man ihn in den Flässhiefern der neuen Welt, bey Basel und in der Molasse des Bodenseesbeckens zu Wiesholz am Schienerberg, unsern Radolphiell, gefunden.

Der Bernstein wurde schon von den Römern zu Schmuck

*) Dieß bemerkt schon Tacitus in der Schrift: de situ et moribus ger- manorum, cap. 45., mit folgenden Worten: „Succum tamen arbo- rum esse intelligas, quia terrena quaedam atque etiam volueria animalia plerumque interloquant, quae implicata humore mox de- rescente materia cluduntur.“

verwendet, und vorzüglich von den Frauen beliebt (*Proximum locum in deliciis, seminarum tamen adhuc tantum, amecina obtinent*,- sagt Plinius Secundus in seiner Naturgeschichte, Buch 27, 11.). Noch heut zu Tage ist er sehr geschätzt und wird vielfältig zu kleinen Kunstarbeiten und zu Bijouteriewerken benutzt, und es werden große und reine Stücke sehr theuer bezahlt. Man verarbeitet ihn vorzüglich zu Danzig, Elbing und Königsberg, und steht auf der Leipziger Messe jeweils reich mit Bernsteinwaaren versehenen Buden. Man verwendet den Bernstein, fernem zu Firnissen, zur Darstellung der Bernstein säure, als Räucherpulver und zu einigen medicinischen Zwecken.

2. Geschlecht. Retinit.

Syn. Retinasphalt.

Nicht crystallisirte, harzartige Substanz, in Körnern, runden und stumpfartigen Stücken, mit rauher unebener Oberfläche, auch als pulveriger Ueberzug. $H. = 2 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 1,1 \dots 1,2$; Fettglanz; braun ins Gelbe und Rothe, die Farben schmutzig, mitunter streifig und wolkig; durchscheinend bis undurchsichtig; Bruch flachmuschelig bis uneben.

Besteht aus einem Gemenge von Harz und Bitumen, und enthält 42,5 ... 55 Harz, das Uebrige ist Bitumen, bisweilen mit einer kleinen Einmischung von Eisenoryd und Thonerde.

Schmilzt in der Hitze zu einer braunen Masse, brennt unter Ausstoßen eines aromatischen Geruches.

Findet sich in Braunkohle und fossilem Holze, am ausgezeichnetsten am Cap Sable in Maryland; an mehreren Punkten bey Halle, zu Uttigshof und Wollow in Mähren, zu Casla im Banat, zu Bovey in Devonshire.

3. Geschlecht. Asphalt.

Syn. Erdpech.

Derb, kugelig, traubig, getropft, niereenförmig, eingesprengt und als Ueberzug; pechschwarz bis gelblich und schwärzlichbraun. $H. = 2,0$; spec. Gew. $1,1 \dots 1,2$; Fettglanz; undurchsichtig; Bruch muschelig. Ist, wie organische Körper, aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, in nicht hinlänglich genau ausgemitteltem Verhältnisse zusammengesetzt. Schmilzt beim Kochen

des Wassers, ist leicht entzündlich, verbrennt mit leuchtender und stark rußender Flamme unter Ausstoßen eines eigenthümlichen Geruches, und hinterläßt wenig Asche, die Kieselerde, Thonerde, Eisenoryd und zuweilen etwas Kalkerde und Manganoryd enthält; Ammoniak und Rodmarinöl lösen den Asphalt vollständig auf; kohlensaures Kali zum großen Theil.

Er findet sich vorzüglich an den Ufern des tothen Meeres; das Meer in großer Menge auswirft; auf der Insel Trinidad bildet er zusammenhängende Läger, selbst Felsen, und auf der Oberfläche eines Sees und mehrerer Bassins schwimmende berbe Massen. Zu Derbyshire in England und zu Iberg am Harz hat man ihn auf Erzgängen im Uebergangsgebirge, zu Dannemora in Schweden auf einem Magneteisenerzlager und an vielen Orten, wie bey der Carlschütte in Hannover, am Schwarzwalde, zu Ber in der Schweiz, im Kirchenstaat, in Sizilien, Albanien im Glühgebirge, im Kalkstein oder Mergel gefunden.

Man benützt den Asphalt vorzüglich zu schwarzem Firniß und Anstrich auf Leder, Holz und Eisen, zu Siegellack, zum Firniß der Kupferstecher, auch als Brenn- und Leuchtmaterial.

4. Geschlecht. Elaterit.

Syn. Elastisches Erpöck, fossiles Gattschud.

Weiche, elastische, zuweilen schwammige, nicht crySTALLISIRTE Substanz; sehr eingesprengt und als Ueberzug; geschmeidig und elastisch; spec. Gew. = 0,9 ... 1,23; schwärzlichbraun ins Grüne und Röthlichbraune; Fettglanz; durchscheinend an den Ranten bis undurchsichtig. Besteht aus 52,2 ... 53,2 Kohlenstoff, 40,1 ... 36,7 Sauerstoff, 7,4 ... 4,8 Wasserstoff, 0,15 ... 0,1 Stickstoff, ist manchmal mit Mineralien gemengt, und nur in diesem Falle schwerer als Wasser. Schmilzt leicht, entzündet sich, stärker erhitzt, und brennt mit leuchtender, rußender Flamme und aromatischem Geruch. Dabey hinterläßt er sehr viel Asche, die bisweilen bis zu $\frac{1}{6}$ seines Gewichts beträgt.

Findet sich auf Bleigängen zu Castletown in Derbyshire, in einer Steinkohlengrube bey South-Bury in Massachusetts und auf Gängen im Kohlensandstein bey Montreuil in Frankreich, wo er zwischen Quarz und Kalkspathcrystallen vorkommt.

III. Ordnung. Fette und Oelbrenze.

Brenze, welche weich oder flüssig sind, dem Fett oder Oel vergleichbar.

1. Eigenschaften des Talgs.

1. Geschlecht. Bergtalg.

Syn. Hatchetin, Ozokerit.

Kleinförnige oder blätterige, berbe Masse, oder körnige und schuppige Theile von gelblichweißer, grüner, gelber und brauner Farbe; leichter als Wasser; weich, perlmutterglänzend; durchscheinend bis undurchsichtig. Geschmack- und geruchlos; leicht schmelzbar, so daß er in warmem Wasser zerfließt, ehe dieses den Siedepunct erreicht. Läßt sich überdestilliren, unter Hinterlassung eines kohligten Rückstandes. Unauflöslich in Wasser, aber auflöslich in Weingeist; Aether, fetten und flüchtigen Oelen. Brennt mit stark leuchtender Flamme. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff.

Findet sich bey Werthyr-Schmidt in England auf schmalen Gangtrümmern mit Quarz, Kalkspath und Eisensteinen, zu Loth-Byne in Schottland in einem Torfgrund und in ansehnlicher Menge bey Glanst in der Moldau. Wird als Leuchtmaterial benützt.

2. Geschlecht. Naphthalit.

Syn. Scheererit, natürliche Naphthaline.

Erythallinische Blättchen oder Körner, locker verbunden, oder kleine nadelförmige Crystalle; weich und zerreiblich; schwerer als Wasser; weiß ins Gelbliche und Grünliche; Perlmutterglanz, schwacher; durchscheinend; geruch- und geschmacklos. Schmilzt bey $+ 45^{\circ}$ C. vollkommen zu einer klartigen, durchsichtigen Flüssigkeit, welche zu einer erythallinischen, aus einem feinen Gewebe von Nadeln zusammengesetzten Masse erstarrt. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Entzündet sich beym Erhitzen in offener Luft, und verbrennt mit leuchtender, ruhender Flamme und einem nicht unangenehmen Geruch, ohne einen Rückstand zu

lassen. Destillirt im Verschlössenen unverändert über, und schießt bey der Condensation der Dämpfe in Crystallen an. Unlöslich in Wasser, leicht löslich in Weingeist und Aether.

Flühet sich in und auf Braunkohle zu Uznach in der Schweiz und zu Bach am Westerwalde. Es verdient bemerkt zu werden, daß man aus Steinkohlentheer durch Destillation eine mit diesem Naphthalin vollkommen übereinstimmende Substanz erhält, was es nicht unwahrscheinlich macht, daß es ein Product der Destillation oder Glühung kohlgiger Stoffe ist.

2. Eigenschaften des Oels.

1. Geschlecht. Steinöl.

Syn. Petroleum, Naphtha, Erdöl.

Dünnflüssig, farblos oder schwach gelblich; spec. Gew. = 0,75; Fettglanz durchsichtig; riecht eigenthümlich bituminös; sehr flüchtig; leicht entzündlich; brennt mit stark leuchtender, rauchender Flamme, unter Ausstoßen eines eigenthümlichen Geruches. Besteht aus 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff. Diese reine Abänderung trägt auch den Namen Naphtha. Sie verändert sich an der Luft nicht.

Davon unterscheidet sich das sogenannte Petroleum durch braungelbe Farbe und ein spec. Gew. von 0,83 ... 0,87. Es ist nicht so dünnflüssig wie Naphtha, und läßt nach der Destillation mit Wasser viel von einer braunen, weichen und zähen Masse zurück, welche erdpechartig, und also in dem reinen, flüchtigen Oele aufgelöst gewesen ist. Je mehr nun davon vorhanden ist, desto dunkler und dickflüssiger erscheint das Steinöl, und so ist die sogenannte Maltha oder der Bergtheer, welcher die Farbe und Consistenz des gewöhnlichen Theers hat, nichts anderes, als eine Auflösung einer asphaltartigen Substanz in Naphtha. Durch Destillation mit Wasser scheidet man diese vom Erdpech ab.

Findet sich vorzugsweise im Flözgebirge, in Thon, Sand, Kalk- und Mergelschichten, und scheint ein Product zersetzter organischer Körper, mitunter ein Product von dem Prozeß der Gärung zu seyn. Der ausgetrocknete Hundst ist

Die Gegend um Vulk an der nordwestlichen Ecke des caspischen Meeres, auf der Halbinsel Abcheron, woselbst mehrere Hundert Steinabblunnen im Betriebe sind. In Europa wird die größte Menge Steinsalz bey Amiano im Herzogthum Parma und am Monte Bibio, unfern Modena, gewonnen, und die reinste europäische Naphtha kommt vom Monte Claro, unweit Placenza. Auch auf der Insel Zante, in Hindostan, China, auf Trinidad und in den Karpathen sind reiche Steinablvorkommnisse. In sehr vielen Orten tritt es mit Quellwasser hervor, und schwimmt sodann auf ihrer Oberfläche. In neuer Zeit sind im Canton Genf, im Bezirk Darbagny und Chalex ergiebige Steinablsquellen aufgefunden worden. Schon lange gewinnt man es in Pechelbom und Lobosch, im Elßaß, woselbst es noch an einigen andern Puncten, als Bergtheer, in einem lockeren Sandgebirge vorkommt. Man findet es überdieß in kleiner Menge noch an vielen andern Orten. Es wird vorzüglich als Brenn- und Leuchtmaterial benützt, namentlich in Persien und im Parmesanißchen, sodann in der Medicin, ferner zur Aufbewahrung der sehr oxydablen, leichten Metalle, zur Verklebung von Firnissen. Der Bergtheer wird als Schmiere und zur Anfertigung von Oel- und hydraulischem Mörtel, sodann mit Sand und kleinen Geröllsteinen, so wie mit Mergel vermengt, zu künstlichen Platten für Dachungen und Trottoiren benützt.

IV. Ordnung. Erzbrenze.

Brenze, welche ein Metall enthalten.

Eigenschaft des Graphits

1. Geschlecht. Graphit.

Syn. Reißbley.

Crystallsystem drey- und einachsfig. Die sehr seltenen Crystalle sind dünne sechsseitige Tafeln, sehr vollkommen theilbar in der Richtung der Basis.

H. = 1 ... 2; spec. Gew. = 1,8 ... 2,4; Metallglanz; essenschwarz bis dunkelstahlgrau; undurchsichtig; in dünnen Blättern biegsam; milde; fettig anfühlen und abreiben; stark

schwarz. Besteht aus Kohlenstoff, welchem 4 und mehr Procent Eisen, so wie in wandelbarem Verhältnisse Kieselrde, Thonerde, Titanoxyd als Verunreinigungen beigemengt sind. Verbrennt sehr schmierig, und hinterläßt bis 14 Procent Asche. Wird bei längerem Glühen gelb oder braun.

Findet sich gewöhnlich verb. mit schuppiger Structur, ins Dichte übergehend, lager-, gang- oder nestweise, auch ringförmig im älteren Gebirge, und in Gesteinen, an der Stelle des Kalkmerra. Die wichtigsten Fundorte sind: Borrowdale in Cumberland, zu New-York, New-Yersey und Rhode-Island in Nordamerika, am Berg Labourd und Ursovia in den Pyrenäen, zu Chamonix in Savoyen, zu Hafnerzell und Griesbach unfern Passau, und in unreinen Abänderungen, und kleinerer Qualität findet er sich noch an mehreren andern Orten.

Man benutzt die reinsten Abänderungen, zumal den Graphit von Borrowdale, zur Anfertigung der feinsten Bleystifte, indem man diese aus ganzen Stücken schneidet. Die Abfälle werden zu geringeren Sorten verwendet. Unreine Abänderungen werden mit Thon zu feuerfesten Tiegeln verwendet (Passauer-, Ipsen- oder Graphit-Tiegel), die vorzüglich zum Metallschmelzen dienen. Geschlammter Graphit wird auch zur Frictions-Verminde- rung ge- braucht, und die gewöhnlichen Vorkommnisse vielfältig zum Schmär- zen von Eisenwaaren, Ofen, Röhren u.s.w.

IV. Classe. Erze.

Mineralien, welche ein schweres Metall, rein oder mit an- deren Stoffen verbunden, enthalten.

I. Ordnung. Kalche.

Oxydierte schwere Metalle; oxydische Erze.

1. Sippschaft der Eisentalche.

1. Geschlecht. Magneteisenstein.

Syn. Magneteisen.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind gewöhnlich regu- lre Octaëder, Fig. 5. S. 27., seltener Würfel, Fig. 1. S. 26., Rhombendodecaëder, Fig. 2. S. 45., und Combinationen dieser

Gestalten, wie sie durch die Figuren 120. und 121. S. 252, Fig. 14. S. 49., mit Ausnahme der Endfläche e, dargestellt sind, und gar oft Zwillinge von der Hauptform des Octaëders, wie Fig. 32. S. 65. Bisweilen in Aftencrystallen nach Eisenglanzformen. Theilbarkeit parallel den Octaëderflächen.

D. = 5,5 ... 4,5; spec. Gew. = 4,9 ... 5,2; eisenschwarz; Metallglanz, bisweilen unvollkommen; undurchsichtig; Strich schwarz; spröde; stark magnetisch und öfters polarisch. Besteht aus Eisenorydorydul, d. i. aus einer Verbindung der beiden Eisenoryde, und enthält 69 Eisenoryd und 37 Eisenorydul, oder in 100 Theilen 28,3 Sauerstoff und 71,7 Eisen. Verändert sich beim Glühen nicht, und gibt mit den Säuren die Eisenreaction.

Kommt theils in eingewachsenen einzelnen oder zu Drusen versammelten Crystallen, theils in Körnern, dicht und eingeprengt, von crystallinisch-förniger bis dichter Zusammensetzung vor, und bisweilen ganz locker und pulverig. Die Crystalle finden sich vorzüglich in Chlorit- und Talkgesteinen und im Serpentin, am Grünschiefer, zu Pfisch und im Illerthal in Tyrol, zu Kranbat in Steyermark, zu Wessa, Traversella und St. Marzell in Piemont, am Gotthardt, zu Verggiershäbel in Sachsen und zu Pöschitz in Böhmen. In beiden Massen findet er sich vorzüglich im Norden, in Schweden, zunächst dem Grünschiefer des Koberges in solcher Menge eingemengt, daß ein großer Theil der Bergmasse als Erz benützt werden kann; er setzt ferner das mächtige Dannemora-Eisenerzlager zusammen, das 30—40 Kläster mächtige Eisenerzlager von Gräppavara in Lönne Lappmark, das bis 800 Fuß mächtige und 3000 Fuß lange Erzlager von Kiruna-Lappmark und die 8000 Ellen lange, bis 5000 Ellen breite, und bis zur Höhe ansteigende Bergmasse des Sällvareberg in Luleå Lappmark. In kleinen Körnern findet sich das Magnetkies in vielen Gesteinen, namentlich in plutonischen und vulcanischen, im Granit, Grünschiefer, Basalt, Diorit.

Der Magnetkiesstein ist ein reichhaltiges und ganz vortreffliches Eisenerz, aus welchem die große Masse des weltberühmten schwedischen Eisens dargestellt wird. Der Name ist nach Magnesia, einer Stadt in Kleinasien, gebildet, die einst Heraclides hieß, daher der griechische Name des Minerals *lithos heracleus*.

Oken's allg. Naturg. I.

welcher später in „Magnetos Lithas“ umgewandelt, und von Aristoteles in „Magneton“ umgebildet wurde. Der jähe Abstieg des Berges Sipylus bey Magnesia, so wie die Felsen der Acropolis hinter dieser Stadt, sollen, nach Arundell's, Dr. Yates und Wors 1839 angestellten Beobachtungen Magnet Eisen enthalten und einen starken Einfluß auf die Magneteisenkabel haben.

2. Geschlecht. Chromeisenstein.

Syn. Chromerz.

Krystallsystem regulär. Die höchst selten beobachteten Krystalle sind Octaëden. Reißbarkeit nur nach etwas Octaëderfläche deutlich.

H. = 5,5; spec. Gew. = 4,8 ... 4,6; eisenschwarz bis schwärzlich; Metallglanz, unvollkommener, fettartiger; undurchsichtig; Strich braun. Besteht aus Chromoxyd-Eisenoxydul und enthält 42—50 Chromoxyd, 20—34 Eisenoxydul, und ist öfters mit etwas Eisenoxydul und Bittererde-Aluminat gemengt. Wird durch Gläsen magnetisch, durch Schmelzen mit Salpeter zerlegt, von Borax und Phosphorsalz aufgeschmolzen. Die Gläser zeigen in der Hitze die schmutzig grüne Eisenfarbe, und wenn sie erkaltet sind, die schön, feuerrothgelbe Chromfarbe.

Der Chromeisenstein kommt höchst selten krystallisiert vor, und so viel bis jetzt bekannt ist, nur zu Barchin bei Baltimore und auf Ketten Inseln in der Nähe von St. Domingo. Sein gewöhnliches Vorkommen ist verb. mit körniger oder blätteriger Glimmer, auf kleinen Lagern, in Nestern, auf schmalen Gängen oder in Körnern dem Serpentinberge eingemengt. Er wurde zuerst zu Cassie, im Departement du Var in Frankreich, in gelben Massen gefunden, dann zu Krabs in Styrien, zu Silberberg in Schippen, zu Portsep, in Schottland, auf den Shetlands-Inseln Unst und Fetlar und zu Balthore und Newberry in Nordamerika. In kleinen Röhren im Rheingeb.

Man benutzt dieses Erz zur Darstellung der eben so schönen als dauerhaften Chromfarben, des Chromgrün, Chromgelb und Chromroth, und zur Bereitung des chromsauren Kalis, das nun hauptsächlich in der Färberei angewendet wird, so wie zur Dar-

Verbindung von andern Chromverbindungen. Der Name Chrom ist nach dem griechischen Worte chroma, Farbe, gebildet, mit Beziehung auf die ausgezeichneten Farben mehrerer seiner Verbindungen.

3. Geschlecht. Titan Eisen.

Krystallsystem drey- und einachsig, hemikrystisch. Die Krystalle sind Rhomboeder von 88° mit den Flächen eines zweyten, stumpferen; klein; gewöhnlich derb und in Körnern. Theilbarkeit nicht wahrnehmbar.

D. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,48 ... 4,78; eisen-schwarz; Metallglanz; undurchsichtig. Besteht aus titansaurem Eisenorydul, welchem gewöhnlich Eisenoryd eingemengt ist, und zwar mitunter bis nahe an 60 Procent, ferner die isomorphen Substanzen Manganoxydul, Bittererde und Kalkerde, und öfters auch etwas Kiesel-erde. Die Zusammensetzung ist darnach sehr verschieden, der Eisenorydulgehalt von 14—30 Procent; der Gehalt an Titansäure von 20—42 Procent, und nach diesem ist es mehr oder weniger magnetisch.

Beym Glühen für sich verändert es sich nicht. Als Oxyd flüßet es in der äußeren Flamme Eisenreaction. Die Kugel mit Phosphorsalz wird nach der Behandlung in der Reductionsflamme unter der Abkühlung tief roth, und nach der Behandlung mit Zinn blau.

Vandörten Arendal in Norwegen in Crystallen in Granat eingebachsen; Gjerfud, Dantz, Lundebrand in derben Stücken.

4. Geschlecht. Ilmenit.

Sp. a. Arskowsk. Kischewsk.

Krystallsystem drey- und einachsig, hemikrystisch. Die Krystalle sind Rhomboeder von $88^\circ 58'$ mit einer geraden Endfläche und combinirt mit den Flächen des ersten sechseckigen Prismas; Theilbarkeit parallel der Endfläche und den Rhomboederflächen unvollständig.

D. = 5,0 ... 5,03; spec. Gew. 4,6 ... 4,8; eisen-schwarz und kupferlich-schwarz; Metallglanz; undurchsichtig; schwach magnetisch. Besteht aus titansaurem Eisenorydul und Oxyd, und

zeichnet sich durch den großen Gehalt von titanhaltigem Eisenorydul, 35—36 Procent Eisenorydul, vor dem Titan Eisen aus. Der Gehalt an Eisenoryd. variiert von 4,25 bis 11,75 Procent. Im Uebrigen finden sich dieselben Einmengungen, die beim Titan Eisen aufgeführt sind, nebst einem kleinen Gehalt an Chromoryd.

Es ist sich unschmelzbar. Verhält sich im Uebrigen vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Titan Eisen.

Findet sich im Granit des Simensees bey Miasa am Ural, begleitet von Zircon und Nephelin, und zu Gastein in Salzburg in Talk eingewachsen, von Bitterspath begleitet.

B. Geschlecht. Nigrin.

Crystallsystem zwey- und einachs. Die Crystalle sind ganz kurze quadratische Prismen, meist abgerundet. Gewöhnlich erscheinen stumpfedicke Körner. Theilbarkeit nach den Prismenflächen.

H. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 4,4 ... 4,5; schwarz; untransluc.; Metallglanz, fettartiger; nicht magnetisch. Besteht aus vierfach-titanhaltigem Eisenorydul und Manganorydul, und enthält 14 Eisenorydul, 84 Titanhaltig, 2 Manganorydul. Gibt vor dem Löthrohr, außer den Reactionen des Eisens und des Titans, auch noch starke Manganreaction.

Findet sich in Ophitien in Stadenbürgen im Saale der hiesigen Eisenwerke, und zu Bogshung am Kaiserstuhl in Nördlingen Kalkstein eingewachsen.

C. Geschlecht. Meraccon.

Es ist bis jetzt nur in abgerundeten Körnern und als Sand beobachtet worden. Theilbarkeit undeutlich. H. = 4,5 bis 5,0; spec. Gew. = 4,5 ... 4,7; eisenschwarz; Metallglanz; untransluc.; schwach magn. Best. aus halbtitanhaltigem Eisenorydul, und enthält 51 Eisenorydul, 0,25 Manganorydul, 48 Titanhaltig und eine Einmengung von 3,5 Procent Quarz. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Titan Eisen. Findet sich mit Quarz im Thale von Meraccon in Ostböhmen.

7. Geschlecht. Iserin.

Reguläres Crystallsystem. Die seltenen, beobachteten Crystalle sind Würfel und Octaëder, lose, abgerundet; gewöhnlich in rundlichen Körnern oder kleinen, rundlichen Stücken. $\rho = 6,5$; spec. Gew. $= 4,6 \dots 4,8$; eisen schwarz; metallglänzend; undurchsichtig; magnetisch. Besteht aus viertel-titan saurem Eisenorydul, und enthält 72 Eisenorydul, 28 Titansäure. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Titan Eisen. Findet sich lose in einem granitischen Sande der Herwiese im Riesengebirge, im Glasbette des Don in Aberdeenshire und an den Ufern des Loch of Erisia auf der Insel Fetlar.

Im Sande der Bäche und Flüsse vulcanischer Gegenden und an einigen Meeresküsten kommt ein schwarzer, magnetischer Eisensand vor, welchen man, seines Titangehaltes wegen, Titan-Eisensand nennt. Er enthält selten kleine Octaëder und Würfel, besteht gewöhnlich aus rundlichen oder eckigen Körnern, ist eisen schwarz, metallglänzend, undurchsichtig, stark magnetisch, hat eine Härte $= 6,6$ und ein spec. Gew. $= 4,6 \dots 4,9$. Seine Zusammensetzung aus 85,5 Eisenorydul, 14 Titansäure und 0,5 Manganorydul gibt ihn als achteiltitan saures Eisenorydul zu erkennen.

Ursprünglich kommt dieses Mineral wohl in vulcanischen Gesteinen eingewachsen vor, aus welchen es die Wässer bey der Verwitterung des Felsen auswaschen, in die Rinnsale der Bäche und Flüsse, und durch diese bis ans Meeresufer führen. Dasselbe spricht sein gewöhnliches Vorkommen in Begleitung von Körnern von Augit, Hornblende, Olivin, glasigem Feldspath u.s.w., wie sein einzigmal schon beobachtetes Auftreten in Gesteinen von genannter Beschaffenheit.

8. Geschlecht. Franklinit.

Von Spateisenerz.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Octaëder, an welchen öfters auch die Doberaëderflächen und die Flächen eines Triakisoctaëders, S. 47, vorkommen. Häufiger eingewachsene Körner. — Theilweise unvollkommen nach dem Octaëder. $\rho =$

6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 5,0 ... 5,3; eisen schwarz; Strich
 rthlichbraun; metallglänzend; undurchsichtig, stark magnetisch.
 Besteht aus einer Verbindung von Eisenoxydul und Zinkoxyd
 mit Eisenoxyd und Manganoxyd, und enthält Eisenoxydul 21,42,
 Zinkoxyd 10,81, Eisenoxyd 47,52, Manganoxyd 10,17 mit einer
 Vermengung von etwas Kiesel und Thonerde.

Schmilzt vor dem Löthrohr für sich schwierig zu einer
 schwarzen, magnetischen Schlacke, gibt mit Soda auf Kohle Zink-
 rauch, und damit auf Platinblech geschmolzen, Manganreaction.
 Findet sich bei Franklin in New-Jersey in Nordamerika.

9. Geschlecht. Wolfram.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind
 gewöhnlich eine Combination des verticalen Prismas g mit der
 ersten Seitenfläche a , dem schiefen Prisma o und den Schiefen-
 flächen d , ähnlich Fig. 130. S. 257. Durch Vorherrschen von
 g und a sind die Crystalle oft tafelförmig; gar häufig sind sie kurz-
 säulenartig. Die einzelnen Individuen sind oft parallel a oder
 o zu Zwillingen zusammengewachsen. Die Oberfläche der verti-
 calen Prismen gewöhnlich stark vertical gestreift. Theilbarkeit
 nach der Richtung einer zweyten Seitenfläche, welche die scharfe
 Kante zwischen g wegnimmt.

spec. Gew. = 5,0 ... 5,6; spec. Gew. = 7,0 ... 7,2; grünlich-
 und bräunlichschwarz; Metallglanz, demantartiger, undurchsichtig;
 Strich rthlichbraun. Besteht aus Eisen- und Manganoxydul,
 die in Wollframsäure gelöst sind, und enthält Eisenoxydul 17,
 Manganoxydul 6, Wolframsäure 77. Schwer schmelzbar in
 dünnen Splintern. Wird von Phosphorsalz leicht aufgelöst; das
 Glas zeigt im Oxydationsfeuer Eisenreaction, wird im Reduc-
 tionsfeuer dunkelroth und unter Mitwirkung von Flus gekört.

Findet sich theils verb in schaligen und strahligen Zusam-
 mensetzungen, theils crystallisirt und oftmals in großen Cry-
 stallen, aus schaligen Hüllen zusammengesetzt, ein- und aufge-
 wachsen; selten in strahlig zusammengesetzten Nistocrystallen nach
 Gestalten des Schwefels gebildet (Wheat-Brandlin in Cornwall).

Hauptfundorte sind die Zinnerzlagerrstätten im Erzgebirge →
 Zinnwald, Schlackenwalde, Waver, Ehrenfriedersdorf. — und in

Eisenwall, so wie die im Grauwackengebirge aufliegenden Gänge von Mendorf und Straßberg am Harz.

10. Geschlecht. Tantalit,

Syn. Columbit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind prismatisch, tafelartig nicht genau bestimmt und sehr selten. Gewöhnlich in crystallinischen eckigen Stücken und eingesprengt. Theilbarkeit nach den Seitenflächen eines rhombischen Prismas.

H. = 6,0; spec. Gew. = 7,2; schwarz; Metallglanz, schwacher; undurchsichtig; Strich bräunlichschwarz. Besteht aus einfach-tantalsaurem Eisenorydul mit einem kleinen Manganoxydulgehalte, und enthält 13,75 Eisenorydul, 83,44 Tantalsäure, 1,12 Manganoxydul und Spuren von Zinnoxyd. Wird langsam von Phosphorsalz aufgelöst und zeigt Eisenreaction, mit Soda auf Platinblech Manganreaction.

Findet sich zu Rimito und Tawela in Finnland im Grönitgebirge.

Von diesem Tantalit weichen die Tantalite an ~~andern~~ Fundorte sämmtlich mehr oder weniger ab, und eben so wieder unter sich. Der zu Finnbo vorkommende Tantalit, hat dieselbe Zusammensetzung, wie der Rimito-Tantalit, ist aber mit einem Stannat von (zinnsaurem) Eisen- und Manganoxydul gemengt. Er gibt ein gelbbraunes Pulver, und stimmt im Uebrigen mit obigem überein.

Der zu Bodenmais vorkommende Tantalit besteht aus zweydrittel-tantalsaurem Eisen- und Manganoxydul, und hat ein spec. Gew. von 6,0. Er enthält 17 Eisenorydul, 5 Manganoxydul, 75 Tantalsäure.

Der zu Brodbo bei Fahlun gefundene Tantalit besteht aus einfach-tantalsaurem Eisen- und Manganoxydul, gemengt mit tantalsaurem Kalk und mit Verbindungen der Wolframsäure und Zinnsäure mit denselben Basen. Sehr spec. Gew. ist = 6,29; er gibt ein gelblichbraunes Pulver.

Der zimmetbraune Tantalit von Rimito endlich, ist eine Verbindung von Eisenorydul und Manganoxydul mit Zinnoxyd.

Diese verschiedenen Tantalit-Abänderungen gehören zu den seltenen Mineralerzeugnissen, haben sich bis jetzt immer nur in granitischen Bildungen gefunden, und in einer merkwürdigen Begleitung von Granat, Beryll, Dichroit, Albit, Chrysoberyll, Glimmer, Topas. Der Fundort Paddam in Connecticut hat Veranlassung gegeben, daß das Mineral auch *Columbit* genannt wurde.

11. Geschlecht. Eisenglanz.

Crystallsystem drey- und einachsfig, hemikrystisch. Die Crystalle sind theils rhomboëdrisch, theils pyramidal, theils tafelförmig, Grundform ein Rhomboëder von $85^{\circ} 58'$. An dieser Gestalt kommt oft eine gerade Endfläche vor, wodurch, wenn sie vorherrscht, dieselbe dünn tafelförmig erscheint, überdies treten mit ihr in Combination ein stumpferes Rhomboëder und ein Oktaëder, wobei die Gestalt pyramidal wird, Fig. 157. Bisweilen

Fig. 157.



Zwillinge mit parallelen Hauptachsen der Individuen. Die Oberfläche des Grundrhomboëders und des stumpferen, oft fast horizontal gestreift, daher, wenn sie zusammen vorkommen, gewöhnlich krummflächig in einander verfließend.

Theilbarkeit nach der Grundform und der horizontalen Endfläche selten vollkommen, oft nur in Spuren.

$\rho = 5,5$; spec. Gew. = $5,0 \dots 5,8$; eisenschwarz bis Stahlgrau; oft bunt angelassen, mit Ausnahme der horizontalen Endfläche; Metallglanz; in sehr dünnen Blättchen durchscheinend mit hyacinthrothen Farbe; Strich kirschroth bis röthlichbraun; selten schwach magnetisch. Crystallisiert und in Aftercrystallen, nach Kalkspath gebildet und nach Magnetkiesstein; kugelig, spindlig, nierenförmig, getropft, verb und eingesprengt. Zusammensetzung stängelig, kernförmig oder büschelförmig aus einander laufend, so wie schalig, die Ragen parallel der horizontalen Endfläche, mitunter sehr fein, schuppig; auch körnig.

Besteht aus Eisenoxyd, welches 69,34 Eisen und 30,66 Sauerstoff enthält, und ist hier etwas mit Kieselerde, Chlormorph, Titansäure und Manganoxyd vermengt. Isomorph mit Zinnstein.

Wird, durch starkes Glühen schwarz und magnetisch, und zeigt mit den Säuren mehr oder weniger reine Eisendünste.

Man unterscheidet zwei Hauptabänderungen, Eisenglanz und Roth-eisenstein.

1. Der Eisenglanz, auch Glanzeisenanz, genannt, begreift die crystallisirten, Stücker und die deutlich zusammengefügten stängeligen, schaligen und körnigen Aggregate von eisenschwarzer und stahlgrauer Farbe und metallischem Glanze. Die sehr dünn tafelförmigen Crystalle und die schaligen Aggregate, die öfters aus papierdünnen, gehobenen, sehr zerreiblichen Lamellen bestehen, nennt man Eisenglimmer.

Der Eisenglanz kommt vorzüglich im Grund- und Nebengangsgebirge, Gneis, Glimmerschiefer, Granit, Thonschiefer auch im vulcanischen Gebirge vor, in Trachten und Lavas. Die ausgezeichneten Crystalle finden sich auf Elba, zu Gramont in Lothringen, zu Disans im Dauphiné, am Gotthardt, zu Altenberg im Erzgebirge, auf Stromboli, am Vesuv und in der Auvergne. Derbe Abänderungen finden sich mehrfältig im Schwarzwalde (Scholach, Urach, Alpirsbach, hier im Gneis), zu Penauitz in Böhmen, Tellerode am Harze, Iserslohn am Rhein, in Graubünden u. a. m. u. a. D. In Brasilien ist er in außerordentlicher Menge dem Glimmerschiefer von Minas Gerais eingemengt.

2. Der Roth-eisenstein, auch Blutstein, Hämatit genannt, umfaßt die faserigen, schuppigen, dichten und erdigen Abänderungen, deren Individuen nicht deutlich erkannt werden können, und bey denen die rothe Farbe des Strichs hervortritt. Die Härte ist etwas geringer als beim Eisenglanz, und das spec. Gew. faseriger und dichter Stücke = 4,7 ... 4,9. Die bräunlich- und blutrothe Farbe geht öfters in das Stahlgrau über, und der schwache Glanz neigt sich mitunter zum Metallglanz hin.

Der faserige Roth-eisenstein (rother Glasfopf) erscheint in ausgezeichneten, kugligen, traubigen, nierenförmigen und getropften Gestalten, und auch als Pseudomorphose, durch Uebergang nach Kalkspath, gebildet. Er findet sich vorzüglich auf Oligocen und Eocen in älteren Gneisgebirgen, in Passau, am Harz, im Bittelgebirge, Erzgebirge, Schwarzwalde, in den Alpen.

Demant- bis Fettglanz; weiß, auch gelblich, graulich, grünlich, selten blau oder grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einfach-schwefelsaurem Bleerz, und enthält im reinen Zustande 73,7 Bleerz und 26,3 Schwefelsäure. Kleine Mengen von Eisenerz, Manganerz, Kupfererz verunreinigen und färben ihn öfters. Decrepitiert im Kölschen beim Glühen, und bleibt übrigens unverändert. Schmilzt auf Kohle in der äußern Flamme zu einer klaren Perle, welche beim Gesehen milchweiß wird; in der Reductionsflamme wird er unter Brausen zu einem Bleerz Korn reducirt.

Findet sich gewöhnlich in gut ausgebildeten, einzelnen, aufgewachsenen Crystallen, bisweilen in Drusen vereinigt. Kommt ebenfalls auf Bleerzlagerrstätten vor, doch viel seltener als das Weißbleerz. Die wichtigsten Fundorte sind Zellerfeld und Anne am Harz, St. Blasien, Badenweiler und Wildschapbach im Schwarzwalde, Müsen am Westerwalde, Parisch Mine auf Anglesea, Wanlothead und Leadhills in Schottland, St. Ives und Penzance in Cornwall.

3. Geschlecht. Kupferbleerz.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind kleine, tafelförmige, rhombische Prismen mit schiefer Endfläche. Theilbarkeit parallel den Prismenflächen. $H. = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $5,3 \dots 5,5$; Demantglanz; durchscheinend; dunkel safurblau. Besteht aus einer Verbindung von einfach-schwefelsaurem Bleerz mit Kupfererzhydrat, und enthält 75,4 schwefelsaures Bleerz, 18,0 Kupfererz und 4,7 Wasser. Findet sich mit Bitriolbleerz zu Leadhills und Wanlothead in Schottland und zu Linares in Spanien.

4. Geschlecht. Zernerz.

Syn. Phyllinspath. Sulphato-tricarbonato of lead.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind tafelförmige Prismen mit schiefer Endfläche und einem zweyten verticalen, die schärferen Seitenkanten zuschärfenden Prisma. Auch kommen Zwillinge vor. Theilbarkeit nach der Schiefenfläche sehr vollkommen. $H. = 2,5$; spec. Gew. = $6,2 \dots 6,4$;

flüssiges Eisen; das ist zu Stahlfabrikation sehr geeignetes Rohmaterial. Die verschiedenen Eisenerzen werden ebenfalls als Eisenschwamm und gehen in Eisenstein in gutes Eisen. Die Umwandlung als Malerfarbe angewendet.

13. Geschlecht. Sphit.

Feu. Nadeleisenerz, Lepidokrokit.
 Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind prismatisch, nadelförmig, mitunter büschelförmig zusammengehäuft, oft schüsselförmig oder äußerst dünn, tafelförmig und blättchenförmig und dann nach dem breiten Flächen vollkommen spaltbar. Auch in Afterskrystallen nach Schwefelfeld und in strahligen Partien.

H. = 100; spec. Gew. = 4,3; schwärzlichbraun bis hyacinthroth; Strich ockergelb ins Rothe; Glanz unvollkommen diamantartig, in den Glasglanz geneigt; halbdurchsichtig bis durchscheinend, in crystallisierten und crystallinischen Stücken; undurchsichtig in Afterskrystallen. Ist ein von dem Brauneisenstein verschiedenes Hydrat des Eisenoxyds, welches nur 10 Procent Wasser enthält, und im reinen Zustande aus 89,69 Eisenoxyd und 10,31 Wasser besteht, in welchem sich also der Sauerstoffgehalt des Wassers zum dem des Eisenoxyds wie 1 zu 2 verhält.

Man unterscheidet die kleinen nadelförmigen Substanzen unter dem Namen Nadeleisenerz. Sie wurden zuerst zu Eistons auf dem Bistrot gefunden, und später zu Oberkirchen im Odenwald gebirge, wo sie mit faserigem Rotheisenstein verwachsen angestrichen wurden, und auf Quarz aufliegend in der Höhle einer Glaskugelfuge.

Die dünnen, tafelförmigen und blättchenförmigen Crystalle, welche zu kleinen Büscheln zusammengehäuft auf Brauneisenstein zu Eistons im Odenwald gefunden worden sind, wurden mit dem Namen Sphit, auch Pyrostrokit oder Rübblinglimmer belegt. Sie runden sich in sehr starker Hitze vor dem Löthrohr nur schwer zur schwarzen Kugel, und besitzen eine sehr schöne hyacinthrothe Farbe.

Die in runden, kugelförmigen und nierenförmigen Massen vorliegenden Abkömmlinge des schuppig-faserigen Zusammengesetztes

enthält 55,8 schwefelsaures Blei, 32,8 kohlensaures Blei und 11,4 kohlensaures Kupfer. Braust mit Säuren auf, hinterläßt ein weißes Pulver, gibt Kupferreaction, auf Kohle geglüht Metalkörner und mit Soda Separ. Findet sich mit den vorhergehenden zu Leadhills in Schottland.

7. Geschlecht. Buntbleyerz.

Syn. Grün- und Braunbleyerz. Pyromorphit.

Erythallsystem drey- und einachsfig. Die Erythalle sind Gestalten, welche durch die Figuren 39. S. 136, Fig. 40. S. 136, Fig. 45. S. 152, Fig. 46, S. 152, Fig. 47. S. 154, Fig. 128. S. 254 dargestellt sind, und manchmal wie ausgehöhlt. Isomorph mit Apatit. Bisweilen kommen auch Zwillinge vor. Theilbarkeit nach den Pyramiden- und Prismenflächen, un deutlich.

ρ . = 3,5 ... 4,5; spec. Gew. 5,8 ... 7,3; Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Ranten; Farbe grün und gelb herrschend, auch braun, grau, weiß, orange und roth.


Theils in Erythallen, deren Prismenflächen öfters durch eine horizontale Streifung bandig, theils in erythallinischen Gestalten, oder kugelig, traubig, nierenförmig, tropfsteinartig, so wie dorb. Die Zusammensetzung läßt sich im Allgemeinen auf folgende Weise angeben:

Ein Mischungsgewicht Chlorbley oder Chlorbley- und Fluor-Calcium, ist verbunden mit 3 Mischungsgewichten zweydrittel-phosphorsaurem oder arseniksaurem Bleypoxyd. Dabey vertreten sich Phosphorsäure und Arseniksäure als isomorphe Substanzen, sowohl in unbestimmten Verhältnissen als auch völlig, ohne daß hiedurch eine Formveränderung oder ein verschiedenes Verhältniß des ersten Gliedes der Zusammensetzung bewirkt würde. Auf eine ähnliche Weise vertritt auch Kalkerde das Bleypoxyd. Nach diesen specifischen Unterschieden in der Zusammensetzung, wodurch auch constante Unterschiede in den äußeren Verhältnissen der hierher gehörigen Mineralkörper bedingt sind, unterscheidet man folgende Gattungen:

1. Grünbleyerz. Die grüne Farbe ist herrschend. Gras-, pflazien-, oliven-, öl-, zeisig- und spargelgrün in ununterbrochener

Seitenkanten des Prismas gerade aufgesetzt sind, Fig. 159. Oft

Fig. 159.



kommen auch Zwillinge vor; die Individuen parallel der zweyten Seitenfläche zusammengesetzt, oder parallel der Fläche eines horizontalen Prismas. Theilbarkeit parallel der zweyten Seitenfläche deutlich, weniger deutlich parallel den Flächen des ersten rhombischen Prismas.

$H. = 4,0$; spec. Gew. = 4,3; bräunlichschwarz; Metallglanz, durch die dunkle Farbe erhöht; Strich röh-

lichbraun; durchscheinend in sehr dünnen Splintern mit brauner Farbe. Besteht aus Manganoryd-Hydrat, und enthält 90 Manganoryd und 10 Wasser. Gibt beym Glühen seinen Wassergehalt ab, und verhält sich im Uebrigen wie die vorhergehenden Manganerze. Der ausgezeichnetste Fundort ist Zilefeld am Harz, woselbst es in Crystallen, so wie in stängeliger und körniger Zusammensetzung, in großer Menge mit Kalispath und Schwespath im Porphyr auf Gängen vorkommt. Es findet sich ferner zu Orpington in Aberdeenshire in Schottland, zu Christiansand in Norwegen, zu Lindenæs in Westgothland in Schweden und in Neuschottland.

4. Geschlecht. Schwarzmanganerz.

Syn. Hausmannit.

Crystallsystem zwey- und einachsfig. Die Crystalle sind quadratische Octaëder. Mit dem Hauptoctaëder ist öfters noch ein stumpferes verbunden. Der Habitus stets pyramidal. Zwillinge, die Individuen parallel einer Fläche des Hauptoctaëders verbunden. Die Oberfläche des stumpferen Octaëders sehr glatt und glänzend, die der Hauptgestalt horizontal gestreift, bisweilen matt. Theilbarkeit nach einer geraden Endfläche ziemlich vollkommen, weniger deutlich nach den Octaëderflächen.

$H. = 5,0 \dots 5,5$; spec. Gew. = 4,7 ... 4,8; bräunlichschwarz; Metallglanz, unvollkommener; Strich röhlichbraun; undurchsichtig. Besteht aus Manganoryduloryd, und enthält 60

Manganoryd und $\frac{1}{31}$ Manganorydul; sein Sauerstoffgehalt beträgt 27,25 Procent. Verhält sich vor dem Löthrohr wie die Vorhergehenden.

Findet sich theils crystallisirt; theils verb in körniger Zusammensetzung, bis jetzt nur zu Idlesfeld am Harz.

5. Geschlecht. Psilomelan.

Syn. Untheilbares Manganerz, Hartmanganerz, Schwarzeisenstein.

Tränbige, nierenförmige, traubensförmige und stalactitische Gestalten, bisweilen mit krummschaligen Ablösungen und fein-faseriger Structur, ins Dichte verlaufend; auch verb, feinkörnig und dicht. $\rho = 5,0 \dots 6,0$; spec. Gew. = $4,0 \dots 4,2$; bläulich- und granlichschwarz; Strich bräunlichschwarz; wird durch Reiben mit einem harten Körper glänzend; schwacher Metallglanz, oftmals nur schimmernd oder ganz matt. Bruch stark unregelmäßig bis eben, auch faserig. Die Zusammensetzung ist noch nicht genau bekannt. Es scheint aus einer wasserhaltigen Verbindung von Manganoryd mit Thonerde oder Kalk zu bestehen und bald mehr, bald weniger mit Weichmanganerz vermischt zu seyn. Der Thonerdegehalt beträgt bis über 16 Procent; der Kalkgehalt 4,5 Proc.; der Wassergehalt zwischen 4 und 6 Procent. Gewöhnlich ist auch etwas Kiesel Erde eingemengt, öfters Eisenoryd.

Der Psilomelan ist nebst dem Weichmanganerz das verbreitetste Manganerz, und kommt an sehr vielen Orten vor, und hat oft in Begleitung von Brauneisenstein und Rotheisenstein. Unter solchen Verhältnissen findet er sich im Schwarzwalde bei Bräunlingen und Balingen, im Erzgebirge zu Roschau, Schönbensburg, Schneeberg, Johannegeorgenstadt, im Siegenischen, Hannauischen, Nassauischen, in Steyermark, Mähren, Böhmen, am Thälingerwald, in Frankreich, England. Er wechselt bisweilen in Schichten mit dem Weichmanganerz, und zeigt sich öfters mit demselben unregelmäßig verwachsen, wobey mitunter crystallinische Parthien von Weichmanganerz Verästelungen bilden in dichten, traubensförmigen und stalactitischen Massen von Psilomelan. Ausgezeichnet schöne Beispiele dieser Art kommen im Grubendistrikt

von Annaberg, in den Gruben Eichenhäder und St. Johannes bey Langenberg vor, und ebenso zu Sprenschwaldau und Rappin in Schlesien.

Der Psilomelan wird an mehreren Orten bergmännisch gewonnen, und kann, je nach der Vermengung von Oxydoryd, mit mehr oder weniger Vortheil zur Schmelzbeurtheilung benutzt werden. Er steht aber immer, hinsichtlich dieser Anwendung, dem Weichmanganerz weit nach, und kann nicht zur Entfärbung des Glases gebraucht werden, da er gewöhnlich etwas Eisenoryd enthält. Die Köpfer wenden dieses Erz zur Glasur an, und die Hüttenleute schmelzen es mit Eisenerzen durch.

Der Name Psilomelan ist gebildet nach *psilos*, nackt oder glatt, und *melas*, schwarz, mit Bezug auf die schwarze Farbe und die glatte Oberfläche der laticitischen Gestalten.

Das unter dem Namen Bad bekannte Manganerz kommt häufig mit Brauneisenstein und andern Manganerzen vor, und scheint bey der Umwandlung des Spath-eisensteins in Brauneisenstein gebildet zu werden. Es ist bis jetzt nur in faserigen, schuppigen und erdigen Theilen bekannt, welche zu kugelförmigen, traubigen, nierenförmigen, getropften und ständelförmigen, auch zu schaumartigen (Braunsteinröhren) und dicken Aggregaten vereinigt sind. $\rho. = 0,8$; abtöndelnd; spec. Gew. $= 3,7$; braun, lehr-, nellen-, schwärzlichbraun, ins Bräunlichschwarze; theils matt und durch Reiben glänzend werdend, theils unvollkommen metallglänzend; undurchsichtig bis durchscheinend in Rauten; hängt stark an der Zunge. Es besteht aus Manganoryd-Hydrat, und enthält 10,6 Wasser. Als Fundorte können die mehrsten der schon genannten Orte angegeben werden. Wo Bad mit Brauneisenstein vorkommt, wie zu Jberg am Harz, bey Pforzheim im Schwarzwald u.s.w., wechselt es oft in schaligen Lagen mit dem faserigen Eisenerz ab, und an letzteren Orte ebenso mit Gölitz.

6. Geschlecht. Kupfermanganerz.

Klein nierenförmige, traubige, tropfsteinartige Gestalten; auch deth. $\rho. = 4,2$; spec. Gew. $= 3,1 \dots 3,2$; bläulich-schwarz; Strich ebenso; Fettglanz; undurchsichtig. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von Kupferoryd und Mangan-

Erz mit Manganoxyd-Hydrat, und enthält 74,10 Manganoxyd; 4,8 Kupferoxyd, 20,10 Wasser, mit einer Beimengung von 1,05 Gyps, 0,3 Kieselrde, 0,12 Eisenoxyd nebst Spuren von Kali. Gibt beim Glühen Wasser aus, schmilzt nicht; gibt mit den Säuren Mangan- und Kupferreaction.

Findet sich zu Schlackenwalde in Böhmen.

3. Eigenschaft der Zinnkalche.

1. Geschlecht. Zinnstein.

Syn. Zinners.

Crystallsystem zwey- und einachsig. Die Crystalle sind gewöhnlich quadratische Octaeder, Fig. 12. S. 48, in Combination mit dem ersten quadratischen Prisma, Fig. 100, womit öfters

Fig. 100.




Fig. 161.





Fig. 162.



noch die Flächen des zweyten quadratischen Prismas verbunden sind; Fig. 43. S. 151. Der Habitus gewöhnlich pyramidal. Gar oft erscheinen Zwillinge; die Zusammensetzungsfläche parallel einer Abstumpfungsfäche der Octaederkanten, Fig. 161. Die Octaederflächen bilden dabey öfters viferartig einspringende Winkel, wie es die nebenstehende Figur zeigt. Die Zusammensetzung wiederholt sich bisweilen mehrmals, und mitunter sind die Individuen knieförmig verbunden, Fig. 162. Die Oberfläche des Grundoctaeders, so wie des stumpferen, welches die Lage der Kanten des ersteren hat, oft gestreift parallel ihren beiderseitigen Combinationskanten; die Prismenflächen sind oft uneben; Theilbarkeit parallel dem quadratischen Prisma und seinen beiden Diagonalen.

$\rho = 6 \dots 7,0$; spec. Gew. = $4,8 \dots 7,0$; farblos und gefärbt; gelblichweiß bis weingelb und hyacinthroth, gewöhnlich aber braun in verschiedenen Nuancen, bis schwärzlich; alle Farben trübe; Diamantglanz, in Glas und Fettglanz geneigt; halbdurchsichtig bis undurchsichtig.

Besteht aus Zinnoryd, und enthält im reinsten Zustande 78,67 Zinnmetall und 21,33 Sauerstoff. Eisen, und Manganoryd, Kiesel-erde, Thonerde, Tantaloryd verunreinigen diese Zusammensetzung mehr oder weniger, hoch steigt die Quantität solcher verunreinigender Beimengungen nicht leicht über 5 Procent.

Schmilzt nicht. Mit Soda wird er auf Kohle reducirt. Die tantalhaltigen Zinnsteine werden indeß auf diese Weise sehr schwierig reducirt, dagegen beynahe augenblicklich unter Zusatz von etwas Borax.

Die Abänderungen des Zinnsteins finden sich theils crystallisirt in auf- und eingewachsenen, einzelnen oder zu Drusen versammelten Crystallen, theils zerbr und eingesprengt, theils in runden, nierenförmigen oder stumpfförmigen Stücken. Man unterscheidet theilbaren spätigen Zinnstein und faserigen Zinnstein, den man auch kornisch Zinnerz und Holzzinn nennt. Zu der ersten Abänderung rechnet man die crystallisirten und zerbr, blätterigen Vorkommnisse, die man bisweilen auch in nadelförmigen Crystallen antrifft, und in dieser Gestalt Nadelzinnerz, Needle-Zin heißt. Sie besitzen die höchsten Grade des Glanzes, der Durchsichtigkeit und Reinheit. Das Holzzinn umfaßt die nierenförmigen und kugelförmigen Stücke mit krummschaliger Zusammensetzung und büschelförmig zartfaseriger Structur, die unreiner sind, ein geringeres spec. Gewicht ($5,3 \dots 5,4$) und eine etwas geringere Härte ($5,5 \dots 6$) besitzen und undurchsichtig sind.

Der Zinnstein findet sich vorzüglich im Granitgebirge auf Gängen und Lagern von unregelmäßiger Beschaffenheit, und auch selbst in die Masse des Gesteins eingemengt. Er ist fast immer von Quarz, Lithon-Glimmer, Apatit, Flußspath, Topas, Wolfram und Schörl begleitet. Im Erzgebirge kommt er zu Zinnwald, Schlackenwalde, Graupen, Ehrenfriedersdorf, Altenberg

und Beyer hat, in Cornwall zu St. Just, St. Agnes, Redruth, Penzance, findet er sich in beträchtlicher Menge auf Bannan und Malacca in Ostindien. Man hat ihn auch in Frankreich, Schweden, Sibirien, China, Mexico gefunden. Cornwall und Böhmen liefern die ausgezeichnetsten einfachen Crystalle; Sachsen die schönsten Präparationscrystalle. Die Gruben in Cornwall sind die reichsten; es werden dort jährlich über 40,000 Centner Zinn erzeugt. Das sibirische Zinn ist das reinste. Das Goldzinn findet sich in Cornwall und in Mexico im aufgeschwemmten Lande, in angefeuchteten Schuttmassen, aus denen es, so wie das späthige Zinnerz, durch eine Wascharbeit gewonnen wird. Man kennt viele Ablagerungen Eisenerze. Die ergiebigsten Eisenerze befinden sich in Cornwall, zu Pentewan, und heißen dort *Erzsteinwerke*, so dann auf Malacca in den Ophitgebirgen. Die in schieferigen Gesteinen, Gneis, Thonschiefer, eingeschlossenen, zerkümmerten Eisenmassen nennt man *Erzwerke*, ein Name, der sich auf die Art des bergmännischen Abbaus derselben bezieht. Es wird nämlich das ganze Gestein, da es ergiebig ist, herausgehoben, und dieß geschieht auf die Art, daß man dasselbe in Lagen oder Stockwerthe herausnimmt, während man hinreichend starke Pfeiler stehen läßt, die den Einsturz der gemachten Wölbung verhindern. Sind die Pfeiler aber zu schwach, so stürzt das Ganze ein, wodurch oftmals eine vom Tage herabgehende Vertiefung gebildet wird, auf deren Grund die Erntümer der hereingebrochenen Massen liegen, und die man eine *Pinge* heißt. Solche sieht man bei den Zinneruben von Altenberg in Sachsen, Schlackenwald in Böhmen und Cardaze in Cornwall. An ersteren Orte hat man Schächte durch die Schuttmasse niedergetrieben, und vermittelst dieser die ergiebigen Stülke herausgehoben. Der Zinnstein ist das einzige Erz, aus welchem das Zinn, das so höchst nützliche Metall, im Großen dargestellt wird.

2. Geschlecht. Rutil.

Crystallsystem zwey- und eckachsig. Die Crystalle sind dieselben, welche bey dem Zinnstein angeführt worden sind, mit dem einzigen Unterschiede, daß ihr Habitus, durch das Vorherrschen der Prismenflächen, stets säulenartig ist. Auch die vorkommenden

Zwillinge sind nach demselben Geseze, wie beym Zinnstein, gebildet, und vermöge der prismatischen Gestalt der Individuen oftmals von knieförmiger Gestalt, wie solche Fig. 162 darstellt. Sehr bemerkenswerth ist diese Symmetrie der Crystalle der Rutile und jenes des Zinnsteins. Manchmal sind viele nadel- und haarförmige Crystalle nach demselben Geseze der Spindlingsbildung verbunden und sehen alsdann sehrartige oder gitterige Gewebe zusammen, für welche *Saus sure* früher den Namen *Opagis* aufgestellt hatte. Theilbarkeit nach den Prismenflächen und seinen beiden Diagonalen.

$S. = 6,0 \dots 6,5$; Spec. Gew. $4,2 \dots 4,3$; nicht brennbar; blut- hyacinthroth bis gelbbraun; Strich hochbraun; Demantglanz, metallähnlich; durchscheinend bis undurchsichtig. Besteht aus Titanäure, und enthält im reinsten Zustande 68,7 Titanoxid und 31,3 Sauerstoff. Der Gehalt an Eisen, Mangankieselerde, Thonerde, der sich in kleinen Exemplaren findet, ist zufällig und als eine Beimengung zu betrachten. Schmilzt nicht für sich, aber sehr schwer in Phosphorsalz auf, und gibt im Oxydationsfeuer dem Glase hyacinthfarb; in der Reductionsflamme wiederhinder: lithe oder blauschwarz; und der Kugel wird bey der Abkühlung viskös. Auf Platinblech zeigen sich Abänderungen, mit Soda geschmolzen, Manganoxydhydrat.

Findet sich vorzüglich im Grundgebirge, theils crystallisirt und öfters in feinen Nadeln, theils verb und eingesprengt, auf Gängen, Lagern und selbst in Gesteine eingemengt. Schöne Crystalle kommen vor am Racher und auf der Squalpe in Steyermark, zu Schöllrippen bey Aschaffenburg, zu Pfisch und Eisenz in Tyrol, zu Rosenau in Ungarn. In losen Crystallen findet man ihn häufig zu St. Vrieur in Frankreich. In großer Menge in Shels eingewachsen, und in den daraus entstandenen Grusmassen kommt er in der Nähe von Freyberg vor. Am Vorharte trifft man ihn öfters in kleinen Crystallen auf Eisenglanz. Weitere Fundorte sind Arendal, Kiffin in Schottland, das Eschmuntzthal.

Man benutzt den Rutil in der Porzellanmalerey zur Hervorbringung einer sehr schönen gelben Farbe.

3. Geschlecht. Octaëder.

Syn. Anatas.

Crystallsystem zwey- und einachs. Grundgestalt ein spitzes quadratisches Octaëder, vergl. Fig. 13. S. 48, womit oft eine horizontale Endfläche verbunden ist, zuweilen auch ein stumpferes oder ein spitzeres Octaëder. Der Habitus der Crystalle ist, vermöge der immer vorwaltenden Flächen des spizen Grandoctaëders, durchaus pyramidal. Die Oberfläche desselben ist oft horizontal gestreift. Theilbarkeit nach seinen Flächen höchst vollkommen, nach der Endfläche unvollkommen.

$\rho = 5,5 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 3,82$; Farbe: braun und blau, weißbraun bis Gelblich und Röthlichbraune, himmels und indigblau; Diamantglanz, metallähnlicher; halbdurchsichtig bis undurchsichtig. Besteht aus Titansäure, wie der Rutil, und bietet daher ein interessantes Beispiel von Dimorphismus dar. Schmilzt für sich nicht, löst sich sehr schwer im Phosphorsalz auf, und gibt damit ein im Oxydationsfeuer farbloses Glas, das im Reductionsfeuer wolblau wird.

Findet sich selten, und in einzelnen aufgewachsenen Crystallen vorzüglich zu Disant im Dauphiné, in Begleitung von Bergkristall, Epidot, Aegirin und Albit. Man hat ihn auch in Norwegen, Cornwall, Graubünden gefunden, und in Körnern in neuerer Zeit im diamantführenden Sande Brasiliens.

4. Geschlecht. Uranpecherz.

Syn. Untheilbares Uranerz.

Zur Zeit nur sehr bekannt, in nierenförmigen Stücken und eingesprengt. Theilbarkeit nicht beobachtet; dagegen krümmungsförmige, der nierenförmigen Gestalt entsprechende Zusammensetzung. $\rho = 5,5$; spec. Gew. $= 6,3 \dots 6,5$; schwarz, graulich, pech- und rabenschwarz; Strich grünlichschwarz; metallähnlicher Fettglanz; undurchsichtig. Besteht aus Uranorydul, und enthält 96,45 Uranmetall und 3,55 Sauerstoff. Gewöhnlich ist ihm etwas Kieselersde beigemengt, auch Eisen und Blei, mitunter auch Kupfer, Kobalt, Zink, Arsenik, Selen. Schmilzt für sich nicht, färbt aber in der Zange die äußere Flamme grün; gibt

mit Borax und Phosphorsalz im Oxydationsfeuer ein gelbes, im Reductionsfeuer ein grünes Glas. Löslich in Salz- und Salpetersäure.

Findet sich auf Zinn- und Silbergängen im Grundgebirge zu Johanneßbergensstadt, Annaberg, Schneeberg, Marienberg, Joachimsthal und zu Redruth in Cornwall.

4. Gipschaft der Antimonbläthe.

1. Geschlecht. Weißantimonerz.

Syn. Antimonbläthe, Weißstießglaserz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind verticale rhombische Prismen, gewöhnlich in Combination mit der zweiten Seitenfläche *b* und dem an den Enden liegenden horizontalen Prisma *f*, Fig. 164. S. 188, und damit kommen öfters noch die Flächen eines rhombischen Octaëders vor, welche mit den Flächen *f* eine Aufsicht an den Enden bilden. Durch Vorherrschen der Flächen *b* sind die Gestalten meistens sehr dünn und tafelförmig. Viele solche tafelförmige, sehr dünne Individuen sind gewöhnlich parallel *b* verwachsen, und die dadurch gebildeten zusammengesetzten Gestalten alsdann sehr leicht und vollkommen spaltbar nach *b*. Theilbarkeit der einzelnen Individuen sehr vollkommen parallel den Flächen des rhombischen Prismas.

$D. = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. $= 5,5 \dots 5,6$; farblos, auch graulich-, gelblichweiß und aschgrau durch Verunreinigung; Perlmutterglanz auf *b*, Diamantglanz auf *f*; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus Antimonoxyd und enthält 84,32 Antimonmetall und 15,68 Sauerstoff. Leicht flüchtig, und wird auf Kohle leicht reducirt; flüchtig; kann im Röhchen leicht sublimirt und von einer Stelle zur anderen getrieben werden. Oefters durch Kiesel-erde und Eisen verunreiniget.

Findet sich selten in einzelnen, gewöhnlich in nach beschriebener Art zusammengesetzten Crystallen, die meist die Feinheit der Nadeln haben, und büschel-, stauben- und gartenförmig gruppiert sind. Mitunter auch körnig; mit stängeliger oder körniger Zusammensetzung. Sein Vorkommen ziemlich an dasjenige

andere Antimonerze gefunden, woraus es vermuthlich einer eigen-
thümlichen Vertheilung scheint entstanden zu seyn. In Bräunsdorf
in Sachsen kommen vorzüglich einfache Crystalle vor, zusammen-
gesetzte Veränderungen zu Przibram in Böhmen, Almont im
Dauphiné, Wolfach im Schwarzwalde, Malacza in Ungarn.

2. Geschlecht. Weißarsenikferz.

Syn. Arsenikbläthe.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind reguläre Octaëder,
meistens nach einer seiner Achsen verlängert. Theilbarkeit octaë-
drisch. $D. = 3,0$; spec. Gew. $= 3,6 \dots 3,7$; farblos, auch
röthlich, gelblich, grünlich, durch Verunreinigung; Glasglanz, be-
montartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Geschmack säßlich
und herb. Erscheint gewöhnlich in kugelförmigen oder faserigen
Aggregaten, auch als erdige Kruste, trüblich, nießfähig, stalag-
mitisch. Das Gefüge der Aggregate sternförmig und strahlig;
damit ist seidener Glanz verbunden. Besteht aus arsenichter
Säure, und enthält 75,82 Arsenikmetall und 24,18 Sauerstoff.
Nebendampf, auf Kohle erhitzt, unter Entwicklung eines wider-
wärtigen Knoblauchgeruchs. In Wasser löslich. In der offenen
Lufte bis zum Glühen erhitzt gewichtet und sublimirt, es sich
als ein weisses Pulver.

Diese höchst giftige Mineralsubstanz kommt auf Arsenik- und
Kobalterzgängen vor, ist ein secundäres Erzeugniß, und findet sich
zu Andreasberg, Joachimsthal, Biber, Rautel und einigen an-
dern Orten.

5. Gipschaft der Kupferfals.

1. Geschlecht. Rothkupferera.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind reguläre Octaëder,
Rautendodecaëder, Würfel und Combinationen dieser Gestalten.
Theilbarkeit octaëdrisch. Die Oberfläche der Crystalle gewöhnlich
glatt und glänzend.

$D. = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 5,7 \dots 6,0$; cochenil-
roth ins Graue und Braune ziehend; Strich bräunlichroth; De-
mantglanz, metallähnlicher; halbdurchsichtig bis durchscheinend in

Blüthen. Besteht aus Kupferoxyd, und enthält 88,72 Kupfer und 11,22 Sauerstoff. Schmilzt zur schwarzen Kugel und wird bey starkem Feuer auf Kohle zu Metall reducirt. Löst sich leicht in Borax und Phosphorsalz, färbt die Gläser grün; in Reductionsfener werden sie, zumal bey Hinzusatz, farblos und unter der Abkühlung krebbroch. Auch löslich in Salpetersäure und Ammoniak.

Man unterscheidet blättriges; haarförmiges und dickes Rothkupfererz. Das erste begreift die crystallförmigen Abänderungen, mit Ausnahme der haarförmigen Crystalle, so wie die dicken, theilbaren. Das andere, das haarförmige Rothkupfererz, besteht aus sehr zarten, haarförmigen Crystallen, welche theils nebst einander, theils verworren durcheinander liegen. Das dritte endlich, das dicke Rothkupfererz, umfaßt die Abänderungen, bey welchen die Theilbarkeit ganz unbedeutlich oder gar nicht wahrzunehmen ist.

Die schönsten Crystalle kommen in den Kupfergruben in Cornwall vor, im Temeswarer Bannath, zumal bey Woldawa, sodann zu Kaisersteimel im Westerwald, zu Chessy bey Lyon und in Sibirien, in Begleitung von dicken, blättrigen und dichten Abänderungen. Das haarförmige Rothkupfererz ist früher ausgezeichnet schön auf der nun seit Jahren aufgelaassenen Grube am Birnenberg bey Rheinpreitenbach vorgekommen. Es enthält Spuren von Selen. In weniger ausgezeichneten Abänderungen kommt das Rothkupfererz noch an manchen anderen Orten vor, am Harz, in Sachsen, in Nordamerika, Chili und Peru.

Was man Biegelerz nennt, ist ein Gemenge von pulverigem Rothkupfererz und Eisenoxider. Es ist ziegelfarbig und erdlichbreun, zerreiblich, sehr eingesprengt, als Anflug und Ueberzug. Findet sich auf vielen Kupfergruben mit anderen Kupfererzen, und zumal mit Kupferkies.

2. Geschlecht. Kupferschwärze.

Schwarze oder braune, pulverige Substanz; matt, abfärbend, undurchsichtig. Besteht aus Kupferoxyd, welchem immer in abweichenden Verhältnissen Eisenoxider und Manganoxyd beygemengt sind. Enthält im reinen Zustand 80 Kupfer und 20 Sauerstoff.

Wird mit Borax und Phosphorsalz Kupferreaction; und überträgt noch diejenige der Bismuthung.

Findet sich auf vielen Kupferlagerstätten am Harz, in Thüringen; Sachsen, Ungarn, Cornwall, Sibirien u.s.w.

3. Geschlecht. Rothzinkerz.

Crystallsystem nicht genau bestimmt. Derbe Massen, theilweis nach den Flächen eines Prisma von ungefähr 120° , und nach dessen kurzer Diagonale; auch eingesprengt. $D. = 4,0 \dots 4,5$; spec. Gew. $= 5,4 \dots 5,5$; roth, morgenth in Biegel- und Blutrothe; Strich orangefarb; Diamantglanz; an den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Zinkoxyd mit Manganoxyd, und enthält 88 Zinkoxyd und 12 Manganoxyd. Schmilzt für sich nicht; mit Soda gibt es auf Kohle Zinkrauch, auf Platinblech die grüne Manganreaction.

Findet sich in Nordamerika, in New-Yersey, bey Franklin, oft begleitet von Franklinit.

4. Sippschaft der Molybd.

1. Geschlecht. Molybdänocker.

Erdig, zerreiblich, zitrongelb, ins Orangefarbene geneigt; undurchsichtig; derb, eingesprengt und als Anflug. Besteht aus Molybdänsäure, und enthält im reinen Zustande 66,6 Molybdänmetall und 33,4 Sauerstoff. Schmilzt auf Kohle und wird von ihr eingesogen; bey gutem Feuer wird etwas Metall reducirt, welches durch Pulvern und Schlämmen der Kohle als metallisches grünes Pulver aus ihr erhalten werden kann. Löst sich in Phosphorsalz; die Kugel ist grün, wird in der Reductionsflamme undurchsichtig, schwarz oder blau, bey der Abkühlung aber durchsichtig und schön grün.

Findet sich am Bispberg in Delarue, zu Linns in Småland, auch in Schottland und Sibirien.

2. Geschlecht. Wolframocker.

Erdig, zerreiblich und weich; gelb; undurchsichtig; matt; derb und als Ueberzug. Besteht aus Wolframsäure, welche im reinen

Zustande 90 Wolframmetall und 20 Sauerstoff enthält. Wird im Reductionsofen schwarz, schmilzt aber nicht. Wird vom Phosphorsalz in der Oxydationsflamme zu einem farblosen oder gelblichen Glase aufgelöst, das im Reductionsofen schön blau wird. Bey Gegenwart von Eisen aber wird die Kugel blutroth.

Wurde 1823 bey Huntington in Nordamerika auf einem Quarz gange in Begleitung von Wolfram und Lungstein gefunden.

3. Geschlecht. Antimonoder.

Syn. Spießglanzoder.

Derb, eingesprengt und als Anflug; strohgelb ins Graue verlaufend; undurchsichtig; matt oder etwas schimmernd. $\rho = 4,5 \dots 5,0$; spec. Gew. $= 3,7 \dots 3,8$. Besteht aus wasserhaltiger, antimonichter Säure, und enthält 90,18 Antimonmetall und 19,87 Sauerstoff. Gibt in Rölchen Wasser aus; auf Kohle einen geringen Antimonbeschlag, und wird mit Soda zu metallischem Antimon reducirt.

Findet sich mit Grauspießglanzerz, aus dem er entstanden ist, in Sachsen, am Harz, im Schwarzwald, in Ungarn u.s.w.

4. Geschlecht. Uranoder.

Bitron- und orangengelbe, erdige Substanz, weich und zerreiblich; schimmernd oder matt; undurchsichtig; derb; bisweilen klein nierenförmig; auch eingesprengt, als Ausbläsung und Beschlag. Besteht aus wasserhaltigem Uranoryd, dem hin und wieder etwas Eisen, Kalk und Kupfer beigemengt ist. Gibt beym Glähen Wasser aus, und verwandelt sich in Uranorydul. Mit Borax und Phosphorsalz gibt er in der äußeren Flamme ein gelbes Glas, welches in der Reductionsflamme grün wird.

Findet sich mit Uranpecherz, aus dessen höherer Oxydation er hervorgeht, zu Johannegeorgenstadt und Joachimsthal im Erzgebirge.

5. Geschlecht. Chromoder.

Gras- und apfelgrüne, weiche und zerreibliche, erdige Substanz; schimmernd oder matt; durchscheinend bis undurchsichtig

als Ueberzug und Angestrichen. Besteht aus Chromoxyd, und enthält im reinen Zustande 76,11 Chrommetall und 23,89 Sauerstoff. Löst sich in Borax und Phosphorsalz auf, und färbt die Gläser smaragdgrün. Findet sich auf und mit Chromerzstein auf der Insel Uoß, wo es öfters in Mandeln und in Abhlungen des Chromerzsteins liegt.

6. Geschlecht. Wismuthoder.

Strohgelbe, weiche und erdige Substanz von 4,3 spec. Gew.; weich, undurchsichtig; schimmernd oder matt; verb. und als Ueberzug. Besteht aus Wismuthoxyd, enthält zufällige Beimengungen, und im reinen Zustande 89,27 Wismuthmetall und 10,13 Sauerstoff. Wird auf Kohle schwer zu Metall reducirt. Findet sich mit gediegenem Wismuth, auf und an demselben stehend, zu Annaberg, Schneeberg, Joachimsthal im Erzgebirge, auch in Schweden und Norwegen.

7. Geschlecht. Kobaltoerz.

Eva. Erzkobalt.

Erdige, schwache, graue, braune, ins Gelbe verlaufende Substanz; weich und zerreiblich; matt; undurchsichtig; kugelig, traubig, auch verb., eingestrenkt, als Ueberzug und Anflug. Besteht aus Kobaltoxyd, welchem in sehr abweichenden Quantitäten bald Manganoxyd, Eisenoxyd, Arsenik, erdige Theile beigemengt sind. Gibt beim Glühen auf Kohle Arsenikdämpfe aus, und färbt die Gläser smaragdgrün. Ist das Product der Verhüttung einiger Kobalterze, namentlich des Speiskobalts, womit er auch gewöhnlich vermischt.

Findet sich ausgezeichnet zu Saalfeld in Abhlungen und auf den Gruben St. Anton und Sophie im Schwarzwalde, auch zu Ober- und Niederndorf in Hessen und an einigen andern Orten. Wird zur Email fabrication benutzt.

8. Geschlecht. Rennige.

Scharlach- und morgenroth; weich und zerreiblich; spec. Gew. = 4,6; undurchsichtig; schwach glänzend oder matt; hängt leicht an der Zunge; erdig, verb., eingestrenkt und als Anflug.

Besteht aus Bismuthoxyd, und enthält. Der metallische Bley und 10 Sauerstoff. Wird beim Glühen auf Kohle mit Braunstein veredelt; durch Salpetersäure schnell gebräunt unter Bildung von braunem Hyperoxyd. In erhitzter Aetzkali-Lauge auflöslich. Fundorte: Briton in Westphalen, Bleyk in der Pfalz, Insel Anglesch, Schlangenbergr in Sibirien, auch soll sie auf der Bleyerzlagersstätte Grundbad bei Badenweiler vorgekommen seyn.

An den Vulkanen Popocatepetl und Iztaccuatl in Mexico hat man große Massen von Bleyoxyd in einem Bache gefunden, welche vollkommen mit dem unter dem Namen Glätte bekannten, künstlich auf Feiðherden erzeugten Bleyoxyd übereinstimmen. Das Vorkommen ist zwar noch nicht genau ausgemittelt worden, doch darf man annehmen, daß jene Feuerberge Bleyoxyd-Bergrücken einschließen.

II. Ordnung. Gefäuerte Erze.

Erzsalze mit Säuren verbunden. Salinische Erze.

1. Gipschaft. Salinische Eisenerze.

1. Geschlecht. Spätheisenstein.

Sym. Eisenspath.

Krystallsystem drey- und einachsig, hemikryst. Die Krystalle sind in der Regel Rhomboëder, mit dem Endkantenwinkel von 107° . Mit dieser Grundgestalt kommt bisweilen verbunden vor: eine horizontale Endfläche α (ähnlich Fig. 92. S. 229.), oder das erste oder zweyte sechsseitige Prisma g (ähnlich Fig. 94. S. 229.), in welcher Combination aber die Prismenflächen immer sehr klein sind. Oeffters kommt auch eine Combination des Grundrhomboëders r mit einem stumpferen Rhomboëder $\frac{1}{2}$ vor (Fig. 92. S. 229.), so wie eine Combination mit einem spitzeren Rhomboëder $2r$. Der Habitus der Krystalle ist immer entweder rhomboëdrisch, oder kistenartig. Die Flächen von r sind häufig sattelartig; die Fläche α sphärisch gekrümmt; die Prismenflächen meist rauh.

Theilbarkeit: vollkommen nach den Flächen des Grundrhomboëders. $\rho. = 3,4 \dots 4,5$; spec. Gew. $= 3,6 \dots 3,9$; gelblichgrau, ins Gelbe und Braune in Folge einer oberflächlichen Verfärbung; Glasglanz, öfters perlmutterartig; durchscheinend bis undurchsichtig bey dunkler Färbung. Besteht aus einfach-kohlensaurem Eisenoxydul, und enthält in reinem Zustande 61,4 Eisenoxydul, 38,6 Kohlensäure. Gewöhnlich enthält er aber noch andere mit Eisenoxydul isomorphe Basen mit Kohlensäure verbunden, wie namentlich kohlensaures Manganoxydul, und zwar bis zu 40 Procent, ferner etwas kohlensaure Bittererde und Kalkerde. Bey seiner an der Oberfläche beginnenden Verfärbung verwandelt sich das Oxydul des Eisens in Oxydhydrat, ebenso das Oxydul des Mangans. Dabey wird alsdann die Farbe dunkel, und das Erz findet sich öfters völlig in eine Branneisensteinmasse umgewandelt, wobey die Crystallform nicht selten gut erhalten, und der Mangangehalt als Wad ausgeschieden wird. Verknüpfert stark beym Glähen, wird schwarz unter Beybehaltung seines Glanzes, und nach dem Glähen stark von Magnet gezogen. Sein Pulver löst sich in Säuren mit Brausen auf.

Erscheint theils deutlich crystallisiert, die Crystalle selten einzeln, meist treppenförmig oder in Drusen zusammengewachsen, und mitunter viele Individuen zu einem einzigen kugeligen Aggregate verbunden; theils in körnigen, dicken Aggregaten mit ausgezeichneter Theilbarkeit, und einer bisweilen zwillingartigen Zusammensetzung nach den Flächen des stumpferen Rhomboëders $\frac{r}{2}$.

Findet sich vorzüglich im Grund- und Uebergangsgebirge, auf Gängen und Lagern, die öfters eine bedeutende Ausdehnung besitzen, und als ansehnliche Stöcke auftreten. Die schönsten Crystalle kommen von Reudorf im Anhalt-Verenburgischen, von Altenberg und Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge, und von Lössnitz bey Radebeul im Voigtlande. In Steyermark und Kärnten kommt er in großen Lagermassen vor. — Eisenerz, Sittensberg, — ebenso bey Schmaikalden; in Siegen, Nassau, am Harz, bricht er auf Gängen ein.

Der Sphäroïdicit ist ein Spathstein von kugliger, traubiger, nierenförmiger Gestalt, mit schuppig-strahliger Zusammen-

setzung und einer Andeutung von schattiger. Die Zusammensetzung gibt sich durch den auseinanderlaufend strahligen Bruch zu erkennen. Nähert sich der normalen Zusammensetzung am meisten, indem er die kleinste Menge isomorpher Basen neben dem Eisenorydul enthält. Der Steinheimer besteht aus: Eisenorydul 59,63, Kohlensäure 39,03, Manganoryd 1,89, Kalkerde 0,20, Bittererde 0,14.

Kommt in Höhlungen des Basalts und Dolerits vor, zu Steinheim bey Hanau, am Dransberg bey Göttingen, zu Bodenmais im Fichtelgebirge, zu Habelschwerdt in der Grafschaft Olitz,

Der thonige Sphärosiderit ist eine durch Thonbeimengung verunreinigte dichte Spatheisenstein-Masse, welche in kugeligen und nierenförmigen Stücken, die innen oftmals zerborsten sind, vorzüglich im Steinkohlengebirge vorkommt, und in den die Kohlen begleitenden Schiefen liegt. Auch hat man ihn in der Lias- und Jurabildung gefunden. Das Aussehen ist erdig, die Farbe gelb und braun; er bräunt mit Säuren auf, und löst sich darin mit Hinterlassung eines thonigen Rückstandes. Findet sich vorzüglich im Steinkohlengebirge Englands, Belgiens, Schlesiens und bey Carlshütte im Braunschweigischen.

Der Spatheisenstein ist in seinen verschiedenen Abänderungen ein ganz vortreffliches, leichtflüssiges Eisenerz, aus welchem geschätzte Eisen- und Stahlorten dargestellt werden, namentlich in Steyermark, im Siegener Land und bey Schmalkalden. Der thonige Sphärosiderit ist das wichtigste Eisenerz Englands. Die deutschen Berg- und Hüttenleute heißen den Spatheisenstein auch Stahlstein, Flinz.

In der Grube von Poullaouen in der Bretagne hat man eine vollkommen wie Spatheisenstein zusammengesetzte Mineralsubstanz gefunden, welche in octaëdrischen Crystallen vorkommt, die dem ein- und einachsigen Crystallsysteme angehören, und eine Theilbarkeit nach einem geraden rhombischen Prisma von $105^{\circ} 20'$ besitzen. Man hat diese Substanz Janderit genannt. Sie ist von großem Interesse, da sie uns zu erkennen gibt, daß das kohlensaure Eisenorydul, wie der kohlensaure Kalk, in zwey, zu verschiedenen Crystallsystemen gehörenden, Gestalten krystallisiert, und neben der rhomboëdrischen Form sich also auch

nach in einer andern Form findet, die mit der des Arragonits übereinkommt.

2. Geschlecht. Flvat.

Syn. Lievrit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind Combinationen der Flächen des Grundrctaëders mit den Flächen eines geraden rhombischen Prismas g (ähnlich Fig. 64. S. 168.), wozu oft noch die Flächen $\frac{6}{5}$ treten, welche die scharfen Seitenkanten von g zuschärfen (Fig. 49. S. 155.). Auch kommt bisweilen eine gerade Endfläche vor und ein horizontales Prisma, welches die Lage der stumpfen Octaëderkanten hat. Der Habitus der Crystalle ist lang säulenartig, zuweilen beynahe nadelförmig. Die Oberfläche der verticalen Prismen stark vertical gestreift; die Octaëder- und horizontalen Prismenflächen parallel ihren Combinationenkanten. Theilbarkeit nach den Diagonalen des Prismas g , unvollkommen.

$D = 5,5 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 3,9 \dots 4,2$; braun und schwarz; Strich ebenso; Metallglanz, unvollkommener; undurchsichtig. Besteht aus einfach-kieselsaurem Eisenorydul, verbunden mit etwas kieselsaurem Kalk, wober Manganorydul gewöhnlich einen kleinen Theil von Eisenorydul ersetzt. Enthält 52,54 Eisenorydul, 1,58 Manganorydul, 13,78 Kalkerde, 29,28 Kieselerde, und schließt etwas mechanisch eingeschlossenes Wasser ein, das, bei gelinder Erhitzung ausgibt, ohne sein Ansehen zu verändern. Schmilzt auf Kohle im Reductionsfeuer zu einer schwarzen Kugel, die vom Magnet gezogen wird. Bildet gepulvert mit Salzsäure eine Gallerte.

Findet sich vorzüglich auf der Insel Elba, Ilva der Alten, theils in Crystallen, die selten einzeln eingewachsen, gewöhnlich in Höhlen und Drusen verbunden sind, theils derb in stängelförmiger oder kugliger Zusammensetzung, in Begleitung von Augit, lagerrnasse in Talkschiefer bei Rio la Marino; auch bei Eken in Norwegen auf einem Eisenerzlager, ferner zu Biskorta bei Schneeberg, zu Kupferberg in Schlesien, in Ungarn, Sibirien und Nordamerika.

3. Geschlecht. Hisingerit.

Syn. Thrautil.

Nur Zeit nur beobachtet vorgekommen; nach einer Richtung theilbar; bisweilen schalig. $H = S$, ungefähr; zerbrechlich (thrautil); spec. Gew. $= 3,0 \dots 3,1$; bräunlich und bläulichschwarz; Strich bräunlichgelb; Glanz Fettartig; undurchsichtig. Besteht aus wasserhaltigem, kieselanhaltendem Eisenoxydul, und enthält 26,3 Kiesel-erde, 44,30 Eisenoxydul, 20,70 Wasser. Weiter darinn gefundene Bestandtheile sind als unwesentliche Beimengungen zu betrachten. Wird nach dem Glühen vom Magnet gezogen. Findet sich zu Ridderhyttas in Schweden und zu Bodenmais in Bayern.

Mit diesem Mineralgeschlecht stimmen weiter überein der Sideroschistsch von Conghonas de Campo in Brasilien, der Gillingit von der Gillinge-Eisengrube in Södermanland, der Chlotaphait von der Insel Rönne und von Jölan, und ganz nahe steht demselben auch der Charnodit von Charnofen in Valais, der auf den Hüften zu Verbod 43 Procent Kiesel-erde liefert.

Man muß hiezu endlich auch noch gewisse Bohnerze rechnen, welche eine concentrisch-schalige Zusammenfassung haben, aus einer chemischen Verbindung von Eisenoxydul und Kiesel-erde bestehen und gepulvert mit Salzsäure eine Gallette bilden. Solche Bohnerze kommen vorzüglich im Gebiet des Jura vor, gehören zu den obersten Bildungen desselben, und sind oft von rothen Schichten überlagert. Als Repräsentant derselben kann das Caubere Bohnerz angeführt werden, welches eine schmutzig olivengrün, ins Gelbe und Braune verlaufende Farbe, im Durchschnitt ein spec. Gew. von 3,0 hat, und ausgezeichnet concentrisch-schalige Ringe von gewöhnlich 1 bis 3 Linien Durchmesser bildet. Es besteht aus 62,44 Eisenoxydul, 21,66 Kiesel-erde, 7,14 Wasser und 8,9 Thonerde. An dünnen Ranten schälte es zur schwarzen magnetischen Schlacke. Ähnliche Bohnerze, die man durch den Namen Kiesel-eisenerz auszeichnen kann, finden sich auch im Juragebiete der Cantone Schaffhausen, Basel und Solothurn, und im Departement de la Haute Saône. Sie gehören zu

den vorzüglichsten Eisenerzen, und werden sehr vorthellhaft verhüttet.

4. Geschlecht. Cronstedtit.

Erythrit. Crystallsystem drey- und einachsig. Die Crystalle sind kleine sechs- und zwölffseitige Prismen, mit verticaler Streifung, öfters nadelförmig, selten einzeln, gewöhnlich gruppiert oder an einander gewachsen; auch in dicken Stücken von stängeliger oder faseriger Zusammensetzung, nierenförmig und eingesprengt. Theilbarkeit parallel der Endfläche vollkommen, parallel den Seitenflächen unvollkommen.

$\rho = 2,5$; spec. Gew. = 2,3; Glasglanz; durchscheinend in sehr dünnen Blättchen mit dunkelgrüner Farbe; schwarz ins Braune; Strich dunkellauggrün; in dünnen Blättchen etwas elastisch biegsam. Besteht aus wasserhaltigem, halb-kieselsaurem Eisenoryd, verbunden mit einfach-kieselsaurem Manganoxydul und Bittererde, und enthält 59,95 Eisenoryd, 22,45 Kieselerde, 2,88 Manganoxydul, 5,0 Bittererde und 10,7 Wasser. Bläht sich vor dem Löthrohr auf, ohne zu schmelzen. Bildet mit Salzsäure eine Gallerte. Findet sich zu Przibram in Bohmen und bey Wheal-Maudlin in Cornwall in Begleitung von Kalkspath, Schwefelkies und Spatheisenerz.

5. Geschlecht. Pyrosomalit.

Erythrit. Crystallsystem drey- und einachsig. Die Crystalle sind sechsseitige Prismen, bisweilen in Verbindung mit einem Hexagonaloktaeder. Theilbarkeit parallel der horizontalen Endfläche vollkommen; weniger vollkommen parallel den Prismenflächen.

$\rho = 4,0$; spec. Gew. = 3,0; Glasglanz, auf der vollkommenen Theilungsfläche Perlmutterglanz; leberbraun, ins Gelbe, Graue und Grüne ziehend; Strich etwas lichter; durchscheinend an den Ranten bis undurchsichtig. Besteht aus Eisenchlorid, verbunden mit Eisenorydhydrat und einem Mischsalz von Eisen und Manganoxydul und enthält: Chlorkies 14,00, Eisenorydul 21,61, Manganoxydul 21,14, Kieselerde 25,85, Wasser 6,82 und eine Beimengung von Kalk. Gibt im Köhlen Wasser, hernach ein Sublimat von Chlorkies. Schmilzt

zu einer magnetischen Kugel, und ertheilt, mit Phosphorsalz und Kupferoxyd. zusammengeschmolzen, der Böhrohrflamme vorübergehend eine blaue Färbung.

Findet sich auf Eisensteinlagern mit Hornblende und Kalkspath zu Philippstadt in Nordmarken und auf Gruben in Nyakopparbergs-Kirchspiel, in Westmanland in Schweden.

6. Geschlecht. Grünerde.

Zur Zeit nur verb. oder in Astercrystallen nach Augitformen. $\rho. = 1,0 \dots 2,0$; spec. Gew. $= 2,5 \dots 2,8$; seladongrün, bisweilen ins Schwärzlich- und Olivengrüne verlaufend; matt; undurchsichtig; erdig; fühlt sich etwas fettig an; hängt schwach an der Zunge. Besteht aus wasserhaltigem, kieselurem Eisenorydul, verbunden mit kieselurem Kali, und enthält 28 Eisenorydul, 53 Kieselerde, 10 Kali, 2 Bittererde und 6 Wasser. Gibt beym Erhitzen das Wasser aus, und schmilzt etwas schwer zu einem schwarzen magnetischen Glase.

Findet sich oft in kleiner Quantität in Mandelsteinen, die Wandungen der Blasenräume überkleidend, bisweilen die Höhlungen selbst ausfüllend. Die schönen Astercrystalle finden sich am Monte Bufaure bey Vigo im Fassathal; in größerer Menge kommt die Grünerde am Monte Baldo bey Roveredo vor, auf der Planeti-Alp, in einem Basalt-Luff in kleinen Gängen von einigen Follen Mächtigkeit. Sie wird hier abgebaut und unter dem Namen Veroneser Grün als Farbmaterial in den Handel gebracht. Der Grünerde ähnliche Körner kommen als Einmischung in mehreren Gesteinen des Secundär- und Tertiärgebirges vor, namentlich in der Kreide- und Grobkalkbildung.

7. Geschlecht. Krokodolith.

Syn. Blau-eisenstein.

Verb., von faseriger Zusammensetzung oder dicht; lavendel- und indigblau; $\rho. = 4,0$; spec. Gew. $= 3,2$; seidenglänzend die Fasern; matt die dichte Masse; durchscheinend in zarten Fasern, undurchsichtig in zusammengesetzten Stücken; dünne Faserbündel sind elastisch biegsam; große Tenacität. Besteht aus einem wasserhaltigen Bisilicat von Eisenorydul, verbunden mit einem

Quadrupelt von Natron und Bittererde, und enthält 50,81 ... 51,64 Kiesel-erde, 33,88 ... 34,88 Eisenoxyd, 7,03 ... 7,11 Natron, 4,0 ... 5,58 Wasser, 2,32 ... 2,64 Bittererde, nebst etwas Manganoxyd und Kalkerde. Schmilzt sehr leicht, schon in der Flamme einer Weingeistlampe, mit starkem Anschwellen zum schwarzen magnetischen Glase.

Findet sich sowohl im dichten als faserigen Zustande im Thonschiefer- und Syenitgebirge am Oranje-River am Cap; eine grobfaserige Abänderung kommt mit Titanen zwischen Feldspath eingewachsen im Syenit zu Stavern im südlichen Norwegen vor, und eine zwischen der dichten und faserigen Abänderung liegende, unvollkommen und durch einander laufend faserige Abänderung, findet sich auf Grönland. Auch gehört zu diesem Geschlecht der faserige Siberit von Golling, unfern Salzburg. Der Name Krokhydolit ist von krokys, flockige Wolle, hergeleitet, und bezieht sich auf die außerordentliche Zertheilbarkeit in die feinsten Fäden.

8. Geschlecht. Kalkoren.

Erythallinische Masse aus sehr feinen, nadelförmigen Crystallen zusammengesetzt, die rosen- und sternförmig gruppiert sind; weich; spec. Gew. = 3,38, gelb, citron-, wachs- und ockergelb, ins Bräunlichrothe; Glasglanz, bisweilen auch matt. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von phosphorsaurem Eisenoxyd, verbunden mit Sulphaten von Eisen, Thon- und Bittererde, und enthält Eisenoxyd 36,83, Phosphorsäure 9,20, Thonerde 11,29, Bittererde 7,58, Schwefelsäure 11,29, Wasser 18,98 nebst etwas Kiesel-erde und Zinkoxyd. Verknüpfert in der Hitze, schmilzt in starkem Feuer zur magnetischen Masse.

Findet sich auf der Eisengrube Herbed in der böhmischen Grafschaft Jbitrow, auf Klüften und in Höhlungen von Brauneisenstein, und hat seinen Namen von dem Griechischen kakos, schlecht, böse, und xonos, Gast, erhalten, mit Beziehung auf die schlechten Eigenschaften, welches dieses phosphorsäurehaltige Mineral dem Eisen ertheilt, welches aus Erzen dargestellt wird, die dasselbe enthalten.

9. Geschlecht. Grüneisenstein.

Crystallinische Masse, von strahliger Textur, die Fasern büschelförmig aus einander laufend; dunkel lauchgrün; Strich pf. staziengrün; Seidenzglanz, schwacher; an dünnen Ranten durchscheinend; spec. Gew. = 3,49 ... 3,56; halbhart. Besteht aus wasserhaltigem, halb-phosphorsaurem Eisenoryd, und enthält Eisenoryd 63,45, Phosphorsäure 27,71, Wasser 8,56. Schmilzt vor dem Löthrohr leicht zu einer porösen und schlackigen, schwarzen und unmagnetischen Kugel, erteilt den Gläsern die Eisenfarbe.

Findet sich in traubiger und nierenförmiger Gestalt und als Ueberzug auf Brauneisenstein auf dem Hotteter Zug im Saynischen und auf der Eisensteingrube Ralderborn bey Eisfeld im Siegenschen.

Das Erz erleidet an der Oberfläche eine Zersetzung, und wird dabey gelb, braun und unschmelzbar. Der sogenannte schlackige Brauneisenstein, oder Stilpnosiderit, kommt an den gleichen Orten vor, schmilzt ebenfalls nicht vor dem Löthrohr, wie der zersetzte Grüneisenstein, und enthält 84 Eisenoryd, 2,90 Phosphorsäure und 13,05 Wasser, eine Zusammensetzung, mit welcher die des verwitterten Grüneisensteins ziemlich übereinstimmt, wodurch es nicht unwahrscheinlich wird, daß der Stilpnosiderit ein Zersetzungsproduct des Grüneisensteins ist.

10. Geschlecht. Vivianit.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle haben Ähnlichkeit mit denen des Gyps, zumal mit Fig. 112. S. 244. Theilbarkeit parallel b sehr vollkommen. ρ . = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; indigblau bis schwärzlichgrün; Perlmutterglanz auf der ausgezeichneten Theilungsfläche, sonst Glasglanz; durchscheinend, bis nur noch an den Ranten. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-phosphorsaurem Eisenorydul, und enthält 41 Eisenorydul, 26,40 Phosphorsäure und 31 Wasser. Gibt beym Glähen viel Wasser aus, bläht sich dabey auf, wird roth und schmilzt auf der Kohle zu einem stahlgrauen, metallischglänzenden, spröden Korne. Löslich in Salz- und Salpetersäure.

Man unterscheidet zwey Abänderungen.

1. Blätteriges Eisenblau (Vivianit). Begreift die krySTALLisirten und theilbaren Varietäten, die meistens in einzelnen, angewachsenen, selten gruppirten Crystallen vorkommen, und bisweilen nadel förmig sind. Findet sich auf Kupfergruben mit Schwefelkies zu St. Agnes in Cornwall, zu Bodenmais in Bayern, im vulcanischen Gestein auf Isle de France, auf Goldgängen zu Vordöpatatz in Siebenbürgen.

2. Erdiges Eisenblau (Blau-eisenerde). Matte, staubartige Theile von smalte- und indigblauer Farbe, derb, eingesprengt, als Ueberzug und Anflug; in Thon-, Lehm- und Torfablagerungen vorkommend, und, wie es scheint, ein unter gewissen Umständen auf genannten Lagerstätten sich immer noch bildendes Mineralproduct, das man an sehr vielen Orten findet, wie zu Spandau im Thone des Festungsgrabens, zu Reiz in der Niederlausitz, bey Wolfach im Schwarzwalde, zu Eckartsberga in Thüringen, zu Hiltentrup im Lippe'schen, zu Wendalen im Hedda-Strasspiel in Hårsjedalen in Schweden. Hier hat man in einem Moor, wenig unter der Oberfläche, eine sehr bedeutende Schicht gefunden, so daß Landleute davon zum Anstreichen gebrauchten. Frisch ist die Substanz ganz weiß, in der Luft wird sie unter Anziehung von Sauerstoff blau.

Der Anglarit, welcher sich zu Anglier im Dep. der oberen Bienne findet, ist vom Vivianit nur durch einen etwas geringen Wassergehalt unterschieden.

11. Geschlecht. Würfelerz.

Crystallsystem regulär. Die gewöhnlich sehr kleinen Crystalle sind Würfel, öfters combinirt mit den Flächen eines Tetraëders, die als Abstumpfungsflächen der Hälfte der Ecken erscheinen. Theilbarkeit nach den Würfelflächen.

H. = 2,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Glasglanz, bisweilen demantartig; durchscheinend, oft nur an den Kanten. Oliven- und grasgrün, auch pistazien- und schwärzlichgrün bis überbräun; Strich lichtolivengrün bis strohgelb. Besteht aus wasserhaltigem, basischem, arseniksaurem Eisenoxydhydrat, enthält Eisenoxyd 19,20, Arseniksäure 37,82, Wasser 18,61, nebst etwas

Phosphorsäure und Kupferoxyd. Schmilzt leicht zu einer dem Magnete folgamen Kugel, riecht, auf Kohle geglüht, stark nach Arsenik, und gibt den Flüssen Eisenfarbe.

Findet sich in kleinen, gewöhnlich zu Drüsen versammelten Crystallen und derben Abänderungen mit korniger Zusammensetzung, auf Kupfergängen bey Redruth in Cornwall, St. Leonhard im Dep. de la haute Vienne und auf einem im Glimmerschiefer liegenden Rieslager am Graul bey Schwarzenberg.

12. Geschlecht. Ekorodit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind kleine rhombische Prismen in Combination mit einem rhombischen Octaeder. Die Octaederflächen walten häufig vor, und es sind die Crystalle daher bald säulenartig, bald pyramidal. Theilbarkeit unvollkommen. Die verticalen Flächen oft vertical gestreift.

$\rho = 3,4 \dots 5,0$; spec. Gew. $= 3,1 \dots 3,3$; Glasglanz; lauchgrün, seladon-, blgrün, schwärzlichgrün bis leberbraun; Strich gränlichweiß; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-arseniksaurem Eisenorydul-Oxyd, und enthält Eisenoryd 34,85, Arseniksäure 50,78, Wasser 15,55. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Würfelerz.

Findet sich theils crystallisirt, in kleinen aufgewachsenen Crystallen, theils derb und eingesprenzt oder in traubigen und nierenförmigen Gestalten, nur an wenigen Orten, wie am Graul bey Schneeberg und am Raschauer Knochen bey Schwarzenberg in Sachsen, am ausgezeichnetsten zu Antonio Pereira bey Villa Rica in Brasilien. Auch hat man ihn auf Spathelsteinlagern bey Hüttenberg in Kärnthen gefunden.

13. Geschlecht. Triplit.

Syn. Eisenpseud.

Noch nicht crystallisirt gefunden. Derb, theilbar nach drey auf einander rechtwinkelfigen Richtungen, unvollkommen. $\rho = 5,0 \dots 5,5$; spec. Gew. $= 3,4 \dots 3,7$; pechschwarz bis nellenbraun; Strich gränlichschwarz oder gelblichgrau; Fettglanz; durchscheinend in dünnen Splittern. Besteht aus halb-phosphorsaurem Eisen- und Manganoxydul, und enthält Eisenorydul

32,60, Manganoxydul 31,90, Phosphorsäure 32,78, nebst etwas phosphorsaurem Kalk. Schmilzt leicht, gibt mit den Flüssen in der Oxydationsflamme violette Gläser, löst sich in Salzsäure ohne Aufbrausen.

Findet sich verb und eingesprengt auf einem Quarzgang im Granit zu Chanteloube bey Limoges im Dep. der oberen Picone und zu Bodenmais in Bayern.

In den Steinbrüchen von Chanteloube und Häreaur kommen noch zwey andere, dem Triplit ähnliche Mineralien vor, wovon das eine den Namen Petepozit trägt und aus 34,39 Eisenoxydul, 17,57 Manganoxydul, 41,77 Phosphorsäure und 4,40 Wasser besteht, das andere Häreaulit heißt und 11,10 Eisenoxydul, 22,95 Manganoxydul, 38,00 Phosphorsäure und 19 Wasser enthält.

14. Geschlecht. Pittizit.

Syn. Eisensinter.

Verb, untheilbar, mit nierensförmiger, lactitischer Oberfläche. ρ . = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. 2,3 ... 2,5; braun, gelblich-, röthlich-, schwärzlichbraun; fettglänzend; Strich gelb; durchscheinend, mitunter nur an den Ranten. Besteht aus wasserhaltigem, basischem, arseniksaurem Eisenoxyd, und enthält 40,45 Eisenoxyd, 30,25 Arseniksäure und 28,50 Wasser. Schmilzt leicht, entwickelt beym Schmelzen auf Kohle Arsenikdämpfe. Ist öfters mit Schwefelsäure verunreinigt.

Findet sich auf mehreren Gruben im sächsischen Erzgebirge, wo er, ein Product der Zersetzung des Arsenikkieses, sich noch täglich fortbildet.

15. Geschlecht. Raseneisenstein.

Syn. Limonit.

In Ebenen und verb, löcherig, bläsig, zerfressen, erdig und dicht. Fettglanz in verschiedenem Grade, auch matt. Ocker- gelb- und schwärzlichbraun, bis bräunlichschwarz. Undurchsichtig; das spec. Gew. so wie die Härte sehr verschieden; eine dichte Varietät zeigte 2,6 spec. Gew.; vom Zerreiblichen bis zur Kalkspathhärte. Im Bruche muschelig bis erdig. Besteht aus

Eisenoxydhydrat, wovon stets ein Theil mit Phosphorsäure oder mit Humussäure, Quellsäure und Quellsäure, oftmals mit bederley Säuren verbunden ist. Der Gehalt an Phosphorsäure wechselt gewöhnlich zwischen 1—8 Procent. Demzufolge geben die Analysen sehr abweichende, quantitative Resultate. Im Raseneisenstein von Klemnow in Vorpommern fand Klaproth: Eisenoxyd 66, Phosphorsäure 8, Wasser 23, Manganoxyd 1,50; in einem Raseneisenstein vom Hagenbruche bey Braunschweig fand Wiegmann: Eisenoxyd 66, Phosphorsäure 7, organische Substanz, Humussäure 14, Wasser 13. Manchmal ist auch etwas kohlensaurer Kalk eingemengt. Das Verhalten vor dem Löthrohr ist verschieden nach der Zusammensetzung. Raseneisensteine, welche keine organische Säure enthalten, geben die Reactionen des Brauneisensteins und treten an Kesselsilber Phosphorsäure ab. Die mit Salpetersäure neutralisirte alkalische Flüssigkeit gibt mit Dicksüßerlösung einen Niederschlag, welcher zur polypedrischen Kugel schmilzt. Raseneisensteine, welche eine organische Säure enthalten, werden beym Glühen im Kölbchen schwarz, und geben, wenn Quellsäure oder Quellsäure zu ihrer Zusammensetzung gehört, überdies Ammoniak aus. Abänderungen, welche eine Vermengung von kohlensaurem Kalk enthalten, brausen mit Säuren auf.

Man unterscheidet Morasterz, Sumpferz, Wiesenerz. Ersteres umfaßt die zerreiblichen Abänderungen, letzteres die dichteren Abänderungen von der größten Härte, den höheren Graden des Glanzes und einem muscheligen Bruche. Das Sumpferz begreift die mittleren Abänderungen.

Der Raseneisenstein kommt in Mooren, Torfablagerungen, moorigen Wiesen, auf dem Boden der mit Moorwasser angefüllten Becken und Seen vor; theils in regelmäßigen Bänken oder einzelnen Schalen und Körnern, in porösen und löcherigen Stücken, theils im Zustande eines Schlammes oder einer sogenannten Gube. Er ist sehr verbreitet in der großen norddeutschen Niederung, in der Lausitz und in Niederschlesien, in den Münsterischen und Brunschwigerischen Niederungen, in Schweden und im nördlichen Rußland. In letzteren Ländern wird er vorzüglich auf dem Grunde kleiner Seen gefunden, weshalb er dort auch den Namen See-Erz hat.

schwedisch Sjömalmer, Myrmalmer, Penningemalmer heißt.

Er versteht eine große Zahl von Eisenhätten, die aus ihm ein gewöhnlich kaltbrüchiges, weil phosphorhaltiges Eisen erblasen. Die See-Erze werden förmlich geseigt. Soviel man auch alljährlich zur Speisung der Hochofen gewinnt, so bemerkt man doch keine eigentliche Abnahme derselben, und man kann wohl nicht mehr an der steten Fortbildung des Raseneisensteins zweifeln. Der Anfang seiner Bildung scheint die auf Stämpfen oft zu beobachtende Ockerhaut zu seyn, die uns durch ihr Farbenspiel anzieht, durch schöne Regenbogenfarben. Treten gewöhnliche Quellen in Vertiefungen hervor, worinn sich faulende organische Substanzen befinden, so nehmen sie die bey der Gährung erzeugte Kohlensäure auf, und sind dann im Stande Eisen aufzulösen, das sie tieferen Stellen zuführen und dort absetzen. Da ferner bey der Gährung organischer Substanzen die in ihnen vorhandene Phosphorsäure unter solchen Umständen Gelegenheit hat, sich mit Eisen zu verbinden, so ist die gleichzeitige Entstehung phosphorsauren Eisenoxyds leicht zu begreifen. Endlich sind Humussäure, so wie die Quell- und Quellsäure, Producte der Zersetzung organischer Substanzen, die, unter den angegebenen Verhältnissen mit Eisen in Berührung, sich damit verbinden können. Sind die Quellen nun wirkliche Eisenquellen, so fällt der Abfall ungleich reichlicher aus, und wird auch eine Einnengung von kohlensaurem Kalk sehr erklärlich.

2. Gipschaft. Salinische Manganerze.

1. Geschlecht. Manganspath.

Syn. Rothbraunsteinerz.

Crystallsystem brev- und einachsig, hemiedrisch. Die Crystalle sind Rhomboeder von $106^{\circ} 51'$; mit den Flächen dieses Rhomboeders sind öfters diejenigen eines kumpferen Rhomboeders combinirt, auch die Flächen des zweyten sechsseitigen Prismas und die horizontale Endfläche. Die Crystalle sind klein; die Rhomboeder oft: sattelartig oder linsenartig gekrümmt. Theilbarkeit nach den Flächen des Grundrhomboeders.

$\rho = 3,5 \dots 4,5$; spec. Gew. 3,4; röthlichweiß ins Risen- und Glasbrothe; bräunt sich an der Luft; Glasglanz, öfters perlmutterartig; durchscheinend. Besteht aus einfach-kohlensaurem Manganoxydul, und enthält in reinem Zustande 62,25 Manganoxydul und 37,75 Kohlensäure; gewöhnlich sind noch kleine Mengen von Eisenoxydul, Kalkerde und Bittererde vorhanden. Decrepitiert beim Glühen; verliert dabei die Kohlensäure, wird braunschwarz, indem sich das Manganoxydul ins Oxyduloryd verwandelt; braunt mit Stücken auf und gibt mit den Flüss. Manganreaction.

Kommt theils deutlich krystallisiert vor in kleinen, in Drusen zusammengehäuften Crystallen, theils in körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensetzungen (Abänderungen, welche man auch Dialogit- und Rhodochrosit genannt hat), theils in kugeligen und nierenförmigen Gestalten von faseriger Zusammensetzung.

Die wichtigsten Fundorte sind: Freyberg, Scheibholz bey Elbingen; am Harz; Kapnik, Nagayag und Offenbanya in Siebenbürgen.

2. Geschlecht. Manganfiesel.

Spec. Rothsteig.

Rhomboform mit Angit. Crystalle sind höchst selten. Theilbarkeit nach den Flächen des rhombischen Prismas vollkommen. $\rho = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. $= 3,5 \dots 3,7$; rosenroth, dunkel und etwas trübe; Glas- bis Perlmutterglanz; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus doppelt-kohlensaurem Manganoxydul; gewöhnlich mit einem kleinen Gehalt von Eisenoxydul, Kalk- und Bittererde. Der Manganfiesel von Långbanshytta in Schweden enthält 49,04 Manganoxydul, 48,0 Kiesel-erde, 2,12 Kalkerde, 0,22 Bittererde. Schmilzt auf Kohle; löst sich schwer in Phosphorsalz auf, unter Hinterlassung eines Kieselrückstandes, und löst das Glas in der äußeren Flamme ausblauend auf.

Kommt theils in körnigen Zusammensetzungen vor, theils in dichten. Die ersteren finden sich sehr ausgebreitet, mit Granat verwachsen, zu Långbanshytta in Schweden; auch zu Elstharinen-

berg in Sibirien und bey Radeland und Elbingerode-am Harz. Die dichten Abänderungen sind selten rein, ihre Farbe verläuft sich ins Gelbe und Braune, und gewöhnlich sind sie mit Kieselmasse und mit Eisenoryd vermengt. Die reinsten Stücke kommen von Kapnik und Kungbanshytta; die weniger reinen von den angeführten Orten am Harz, und diese sind es, denen man zum Ueberflus die Namen Hornmangan, Hydropit, Phoricit gegeben hat. Der Wismuth von Real de Minas de Getelh in Mexico scheint ein etwas kalkreicher Mangankiesel zu seyn.

Zu Klapperud in Dalecarlien kommt ein schwarzer Mangankiesel vor, welcher aus wasserhaltigem, einfachkieselsaurem Manganorydul besteht.

3. Sippschaft. Gallnische Cererze.

1. Geschlecht. Cerit.

Son. Cererit, Cerinthen.

Nur sehr bekannt, in soltdrainer und dichter Zusammensetzung. $\rho. = 5,5$; spec. Gew. = 4,9 ... 5,0; bräun und grau ins Röthliche; schwach glänzend oder nur schimmernd; durchscheinend an den Ranten. Besteht aus wasserhaltigem, einfachkieselsaurem Cerorydul. Vauquelin fand darinn 67 Cerorydul, 27 Kieselrde, 12 Wasser, nebst 2,0 Eisenoryd und 2,0 Kalkerde. Ist durch etwas Kobaltoryd röthlich gefärbt. Gibt bey starker Wärme Wasser aus; und schmilzt sehr leicht; löst in Phosphorsalz ein Kieselrde; färbt in der Oxydationsflamme das Boraxglas gelb, das durch Glühen emallweiß wird.

Findet sich zu Balthus bey Sibbanshytta in Schweden.

2. Geschlecht. Kohlen-saures Cerorydul.

Crystallinische Blättchen oder ledige Substanz; von weißer und Graue und Gelbliche, fallender Farbe; undurchsichtig; die Blättchen perlmutterglänzend; hart und zerreiblich. Besteht aus einfach-kohlen-saurem Cerorydul. Brennt sich braun-gelb; braust mit Säuren auf; löst sich im Boraxglas und färbt es in der äußeren Flamme gelb. Das Glas wird durch Glühen emallweiß.

Findet sich mit Cerit, jedoch sehr sparsam, auf der Bastnäs-Grube bey Riddarhyttan.

3. Geschlecht. Fluor-Cerium.

Crystallsystem drey- und einachsig. Die Crystalle sind kleine sechsseitige Prismen mit abgestumpften Seitenkanten. Auch kleine blätterige Massen und dorb. $\rho = 4,5 \dots 5,5$; spec. Gew. $= 4,7$; wenig glänzend; durchscheinend in dünnen Splittern; blassegelroth ins Gelbe. Besteht aus Einfach-Fluor-Cerium, und enthält 70,58 Cerium, 29,42 Fluor und eine Gemengung von Ertererde. Verhält sich gegen Borax wie Ceroryd, und gibt bey'm Glühen im Kölbchen etwas Flußsäure aus, wodurch das Glas angegriffen wird. Ist zu Finsbo und Brodbo, unsern Fahlun, im Granit gefunden worden, der daselbst von Gneis umschlossen ist.

Im Finsbo-Granit hat man noch ein zweytes basisches Fluor-Cerium gefunden, was crystallinische Massen und dorb. Stücke von gelber ins Rothe und Braune ziehender Farbe bildet, 4,5 Härte und einen fettartigen Glanz besitzt. Es besteht aus 84,28 Ceroryd, 10,85 Flußsäure und 4,95 Wasser.

Mit dem Cerit von Bastnäs kommt endlich noch ein drittes Fluor-Cerium vor, in kleinen, wachsartigglänzenden Körnern von röthlichgelber Farbe, welches ebenfalls eine basische Verbindung ist, aber weniger Ueberschuß an Basis zu haben scheint, als das Vorhergehende.

4. Geschlecht. Vitrocerit.

Crystallinische, theilbare Masse. Die Theilbarkeit fñhrt auf ein rhombisches Prisma. $\rho = 4,5$; spec. Gew. $= 3,4$; Glasglanz, schwacher, in den Perlmutterglanz verlaufend; undurchsichtig; Wolkblau ins Graue und Weiße verlaufend. Besteht aus Fluor-Cerium, verbunden mit Fluor-Calcium und Fluor-Strontium, in veränderlichen Verhältnissen. Eine Abänderung enthält Ceroryd 18,73, Flußsäure 32,55, Ertererde 19,02, Kalkerde 31,25, Thonerde 8,4. Schmilzt für sich nicht, und verhält sich im Wesentlichen wie Fluor-Cerium. Findet sich im Finsbo- und Brodbo-Granit bey Fahlun.

4. Gipschaft. Salinische Zinkerze.

1. Geschlecht. Zinkspath.

Syn. Galmez.

Crystallsystem hex. und einachsig, hemikratisch. Die Crystalle sind Rhomboëder, mit einem Grundrhomboëder von $107^{\circ} 42'$. Mit dieser Gestalt kommen combinirt vor eine horizontale Endfläche, ein sechsseitiges Prisma und ein schärferees Rhomboëder. Die Gestalten sind ähnlich den Figuren 89, 91, 93. S. 226 und 229. Die Flächen des Grundrhomboëders gewöhnlich conver. Theilbarkeit parallel denselben.

S. = 5; spec. Gew. = 4,4 ... 4,5; Glasglanz, perlmutterartiger; farblos und grau; durch Verunreinigung gelb, roth, grün, braun; durchsichtig bis undurchsichtig. Besteht aus einfach-kohlensaurem Zinkoryd, und enthält im reinen Zustande 64,63 Zinkoryd und 35,37 Kohlenäure; gewöhnlich ist aber Eisen- und Manganoryd, häufig auch Thon, beigemengt, und bisweilen etwas Cadmium. Braust mit Säuren auf; brennt sich weiß und hinterläßt Zinkoryd; die unreinen Abänderungen zeigen die Reactionen der als Beimengungen angeführten Stoffe.

Deutlich crySTALLisirte Abänderungen sind selten; und die Crystalle derselben klein und in Drusen zusammengehäuft; gewöhnlich erscheinen körnige Abänderungen, auch dichte und erdige, und zwar derb; selten in Aftercrystallen nach Kalkspath- und Flußspath-Formen. Auch kommen traubige, kugelige, nierenförmige Gestalten vor, mit faseriger Structur. Die Hauptfundorte liegen in der Bildung des jüngeren Ubergangskalksteins, oder sogenannten Bergkalks, zu Namur, Brilon, Aachen; Hersfeld, so wie in Derbyshire und Somersetshire in England; ein anderes bedeutendes Vorkommen ist im Gebiete des Muschelkalks, zu Tarnowitz und Deuthen in Schlesien, und zu Niedziana Gora und Nieke in Polen; in einem noch jüngeren Kalksteingebirge kommt er endlich zu Kalbel und Bleiberg in Kärnten vor.

Der Zinkspath ist das Haupterg zur Darstellung des namentlich vielgebrauchten Zinkmetalls und der wichtigen, unter dem Namen Messing bekannten, Kupferlegirung.

2. Geschlecht. Zinkglaserz.

Syn. Kieselzinkerz, Kieselgalmeu.

Erythallsystem ein- und einachsfig. Die kleinen, selten deutlich ausgebildeten Erythalle, die meist zu kugelförmigen, traubigen und fächerförmigen Gruppen vereinigt und in Drüsen versammelt sind, erscheinen gewöhnlich als eine Combination des verticalen rhombischen Prisma *g* mit der zweyten Seitenfläche *h* und dem horizontalen Prisma *f*, Fig. 104. C. 238. Sie sind meist tafelförmig oder kurz säulenförmig. Zu diesen Flächen treten öfters noch die Flächen des rhombischen Octaëders, der Grundform, und Flächen eines anderen horizontalen Prismas, so wie eine gerade Endfläche. Die Enden der Erythalle sind öfters ungleichförmig. Theilbarkeit parallel dem verticalen Prisma vollkommen; parallel dem horizontalen Prisma deutlich.

H. = 5,0; spec. Gew. = 3,3 ... 3,5; Glasglanz, auf der Seitenfläche *h* perlmutterartig; durchsichtig bis durchscheinend; weiß herrschend, auch gelb, braun, grün, grau und blau durch Verunreinigung; phosphoreszirt durch Reibung; polarisch-electrisch schon bey gewöhnlicher Temperatur. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-kieselsaurem Zinkoryd, und enthält 66,8 Zinkoryd, 25,7 Kieselerde und 7,5 Wasser. Gibt beym Glühen Wasser aus, schmilzt an, aber schmilzt nicht; hinterläßt im Phosphorsalz ein Kieselstelet, gibt mit Soda Zinkrauch, mit Säuren eine Gallerte.

Außer den erythallisirten Abänderungen kommen auch stängelige vor, strahlig und faserig zusammengesetzt, so wie verbe, Knige. Findet sich auf den gleichen Lagerstätten, wie der Zinkspath, und mit ihm, und überdieß auf Gängen im Grundgebirge, namentlich im Schwarzwalde zu Hofgrund, unsern Freyburg.

Bey Aachen und zu Franklin in New-Jersey hat man ein Kieselzinkerz gefunden, welches sechsseitige Prismen bildet, 3,8 bis 4,0 spec. Gew., graue, gelbliche und röthliche Farbe hat, und aus wasserfreyem, einfach-kieselsaurem Zinkoryd besteht. Man hat ihm den Namen Wilhelmit gegeben.

3. Geschlecht. Zinkbläthe.

Erdfige, zerreibliche, weiße, undurchsichtige und matte Substanz von weißer Farbe. Verb und als Anflug. Besteht aus

24

Oken's allg. Naturg. I

wasserhaltigem, drittel-kohlensaurem Zinkoryd, enthält 71,4 Zinkoryd, 13,5 Kohlensäure und 15,1 Wasser. Gibt beim Glühen Wasser aus, braust mit Säure, gibt mit Soda Zinkrauch. Findet sich sehr sparsam mit Zinkspath zu Raibell und Bleyberg in Kärnten.

4. Geschlecht. Sahnit.

Syn. Automolith.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle isomorph mit denen des Spinells. Theilbarkeit parallel den Flächen des regulären Octaëders. $\rho = 8,0$; spec. Gew. = 4,23; Glasglanz, in den Fettglanz geneigt; Farbe schmutzig grün, ins Schwarze und Blaue fallend; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Zinkoryd und Thonerde, wovon letztere die Stelle einer Säure spielt, und etwas Eisenorydul und Bittererde als isomorphe Substanzen vorkommt. Er enthält Zinkoryd 30,02, Thonerde 55,14, Bittererde 5,25, Eisenoryd 5,85 und eine Einmischung von 3,84 Kieselerde. Sein Pulver wird von Borax und Phosphorsalz nur sehr schwer und wenig gelöst; mit Soda gibt er in der Reductionsflamme eine schwarze Schlacke, und setzt etwas Zinkoryd um dieselbe ab. Kommt in Crystallen, einzelnen Körnern und zerbrochenen Stücken vor.

Wurde im Jahr 1806 zuerst in den Gruben von Fahlun gefunden, und zu Ehren des um Mineralogie und Chemie sehr verdienten schwedischen Bergamts-Assessors Sahn, mit dessen Namen belegt. Später fand man ihn noch zu Franklin in New-Yersey, und in zerbrochenen Massen auf Ostra-Silberbergs-Grube in Stora Lina-Kirchspiel in Dalarna.

5. Sippschaft. Salinische Bleyerze.

1. Geschlecht. Weißbleyerz.

Syn. Carbonbleyspath.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Grundgestalt, das Rhombenoctaëder, tritt nicht für sich auf, ebenso nicht allein das dazu gehörige, verticale, rhombische Prisma. Die Crystalle sind

durchgängig Combinationen. Die gewöhnlichsten sind: die Combination der Flächen des Octaëders *o* mit dem zweyten horizontalen Prisma *f*, wodurch eine dem Hexagondodecaëder ähnliche Gestalt gebildet wird,

Fig. 163.




Fig. 164.




Fig. 163; eine Combination der Octaëderflächen *o*, der Prismenflächen *g*, der zweyten Seitenfläche *b*, und des horizontalen Prismas *f*, Fig. 164; dieselbe Combination mit verschiedener Ausdehnung

Fig. 165.




Fig. 166.



taler Streifung der Flächen *f*, Fig. 165; Combination der Octaëderflächen *o*, der Prismenflächen *g*, der Seitenfläche *b* und eines verticalen Prismas *g'*, welches die schärferen Seitenkanten des Prismas *g* zuspitzt, Fig. 166. In dieser Combination herrscht die Seitenfläche *b* vor, und zeigt eine verticale Streifung; Combination der Prismenflächen *g*, der

Fig. 167.





Fig. 168.




zweyten Seitenfläche *b*; der Octaëderflächen *o*, der horizontalen Prismenflächen *f*, *f'*, *f''* und der horizontalen Endfläche *a*, Fig. 167. Combination der Prismenflächen *g*, der Seitenfläche *b* und des ersten und zweyten horizontalen Prismas *d* und *f*, Fig. 168. In diesen

beiden Combinationen herrschen die verticalen Prismen vor. Die meisten Crystalle kommen zu Zwillingen und Drillingen verwachsen

vor, und hier, wie beym Arragon, sind einfache Crystalle selten, und das Gesetz der Verwachsung ist ebenfalls wie beym Arragon, nämlich die Zusammensetzungsfläche ist parallel einer Prismenfläche g. Das Aussehen der Zwillinge ist natürlich verschieden, je nachdem die verbundenen Individuen pyramidal, tafel- oder säulenartig sind. Fig. 169 stellt einen Zwill-
ling des Crystalls Fig. 166 dar. Die an-
geführten Combinationen sind nicht die
Hälfte der beobachteten, dagegen, wie schon
bemerkt wurde, die gewöhnlichsten. Theil-
barkeit nach den Prismenflächen g und h.

Fig. 169.



H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 6,4
... 6,6; Demantglanz, theils fettartig,
theils, bey angelautenen Stücken, metall-
artig; weiß, durch Verunreinigung grau,
braun, schwarz, grün und blau; durchsichtig, durchscheinend bis
undurchsichtig bey starker Verunreinigung. Besteht aus einfach-
kohlensaurem Bleyperyd, und enthält im reinen Zustande 93,58
Bleyperyd und 16,42 Kohlenäure. Eine kleine Kupferbeymen-
gung färbt es grün oder blau; eine Beymischung kohligter Theile
braun oder schwarz. Dünste, mit Schwefelwasserstoff beladen,
machen es an der Oberfläche anlaufen mit bleigrauer Farbe.
Dieses Anlaufen kann man durch Bedampfen mit Hydrothion-Am-
monial leicht künstlich bewirken. Decrepitiert stark beym Erhitzen;
das weisse, wird dabey gelb; braust mit Säuren auf; gibt
auf Kohle geglüht Bleykügelchen.

Findet sich in Crystallen, stängeligen, nadel- und haarförmigen Aggregaten, und derb in Körntgen, ins Dichte verlaufenden Zusammensetzungen. Man unterscheidet Weiss- und Schwarzbleyerz, und rechnet zu ersterem alle nicht dunkelbraun oder schwarz gefärbten Abänderungen.

Dieses Bleyerz kommt beynahe auf allen Bleyerzagerstätten im Grund wie im Uebergangs- und Stöckgebirge vor, und zwar vorzüglich in den oberen, vielfach zerklüfteten und bey Atmosphä-
ren mehr oder weniger zugänglichen Theilen der Lagerstätten, somit unter Verhältnissen, welche seine neuere Erzeugung andeu-
ten. Die wichtigste Fundorte für crySTALLISIRTE Abänderungen

sind: die Gruben zu St. Blasien und Badenweiler im Schwarzwalde, zu Freyberg, Ischopau, Johannegeorgenstadt in Sachsen, Clausthal und Zellerfeld am Harz, La Croix in den Vogesen, Ries und Prizibram in Böhmen, Poussacuen in der Bretagne, Anglosa und Alston in Cumberland, St. Agnes in Cornwall, Leadhills und Wanslothead in Schottland, Kertschnsk in Sibirien. Außer diesen Fundorten gibt es noch sehr viele, an welchen verschiedene, doch weniger ausgezeichnete Abänderungen vorkommen. An einigen Puncten bricht es in größerer Menge ein, und in diesem Falle wird es sehr vortheilhaft auf Blei verschmolzen.

2. Geschlecht. Bitriolbleyerz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle haben ein Rhomboëder zur Grundform, sind selten einfache Gestalten, gewöhnlich durch mehrfältige Combinationen gebildet, und hombo-morph mit den Baryt- und Silestin-Crystallen. Die Flächen des Grundoctaëders erscheinen gewöhnlich untergeordnet, dagegen herrschen in der Regel die Flächen des dazu gehörigen, verticalen rhombischen Prismas vor, und diese sind oft mit dem ersten horizontalen Prisma *d*, und mit der zweyten Seitenfläche *b* ver-

Fig. 170.




Fig. 171.



bunden, Fig. 170. Eine Combination von pyramidalem Charakter zeigt Fig. 171, welche durch die Prismenflächen *g*, die Grundoctaëderflächen *o* und die Flächen eines spiheren Octaëders *o'* gebildet wird. Fig. 172 stellt eine Combination vor, in welcher die Prismenflächen

Fig. 172.



g, die erste und zweyte Seitenfläche *a* und *b*, die Octaëderflächen *o*, das erste und zweyte horizontale Prisma *d* und *f*, und die horizontale Endfläche *c* mit einander verbunden sind. Theilbarkeit nach dem horizontalen Prisma *d*, auch, jedoch unvollkommen, nach der Seitenfläche *b*.

$\rho. = 3,0$; spec. Gew. = 6,2 ... 6,4;

Demant- bis Fettglanz; weiß, auch gelblich, graulich, grünlich, selten blau oder grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einfach-schwefelsaurem Bleerz, und enthält im reinen Zustande 73,7 Bleerz und 26,3 Schwefelsäure. Kleine Mengen von Eisenerz, Manganerz, Kupfererz verunreinigen und färben ihn öfters. Decrepitiert im Kölbchen beim Glähen, und bleibt übrigens unverändert. Schmilzt auf Kohle in der äußern Flamme zu einer klaren Perle, welche beim Gestehen milchweiß wird; in der Reductionsflamme wird er unter Brausen zu einem Bleerz Korn reducirt.

Findet sich gewöhnlich in gut ausgebildeten, einzelnen, aufgewachsenen Crystallen, bisweilen in Drusen vereinigt. Kommt ebenfalls auf Bleerzlagern vor, doch viel seltener als das Weißbleerz. Die wichtigsten Fundorte sind Zellerfeld und Anne am Harz, St. Blasien, Badenweiler und Wildschapbach im Schwarzwalde, Rüfen am Westerwalde, Parisch Mine auf Anglesea, Wanlothead und Leadhills in Schottland, St. Ives und Penzance in Cornwall.

3. Geschlecht. Kupferbleerz.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind kleine, tafelförmige, rhombische Prismen mit schiefer Endfläche. Theilbarkeit parallel den Prismenflächen. $H. = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. $= 5,3 \dots 5,5$; Demantglanz; durchscheinend; dunkel saurblau. Besteht aus einer Verbindung von einfach-schwefelsaurem Bleerz mit Kupfererzhydrat, und enthält 75,4 schwefelsaures Bleerz, 18,0 Kupfererzhydrat und 4,7 Wasser. Findet sich mit Vitriolbleerz zu Leadhills und Wanlothead in Schottland und zu Linars in Spanien.

4. Geschlecht. Zernerz.

Syn. Phyllinspath. Sulphato-tricarbonate of lead.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind tafelförmige Prismen mit schiefer Endfläche und einem zweyten verticalen, die schärferen Seitenkanten zuschärfenden Prisma. Auch kommen Zwillinge vor. Theilbarkeit nach der Schiefenfläche sehr vollkommen. $H. = 2,5$; spec. Gew. $= 6,2 \dots 6,4$;

Fettglanz, in den Demantglanz geneigt; auf der ausgezeichneten Spaltungsfläche Perlmutterglanz; Farbe gelblichweiß, ins Graue und Gräue verlaufend. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus 1 M.-G. einfach-schwefelsaurem Blei und 3 M.-G. einfach-kohlensaurem Blei, und enthält 27,3 schwefelsaures Blei und 72,7 kohlensaures Blei. Wird beim Glühen gelb, unter der Abkühlung aber wieder weiß. Braust auf mit Säuren, und hinterläßt ein weißes Pulver. Wird auf Kohle zu metallischem Blei reducirt, und gibt mit Soda Bleiflügelchen und einen Separ.

Findet sich in Crystallen und körnigen Zusammensetzungen mit Weiß- und Buntbleierz, sehr sparsam zu Leadhills in Schottland.

5. Geschlecht. Kohlenvitriolblei.

Syn. Prismatisches schwefel-kohlensaures Blei,
Sulphato-carbonate of lead.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind kleine rhomboidische Prismen, meist sehr undeutlich. Theilbarkeit parallel den der schärferen Seitenkante des Prismas. $\rho. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. = $6,8 \dots 7,0$; Demantglanz, in Fettglanz übergehend; Farbe grünlich, und gelblichweiß, ins Graue, Apfelgrüne und Blaue ziehend. Besteht aus 1 M.-G. einfach-schwefelsaurem Blei und 1 M.-G. einfach-kohlensaurem Blei, und enthält 52,1 schwefelsaures Blei und 46,9 kohlensaures Blei. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie das Vorhergehende. Findet sich ebenfalls selten zu Leadhills in Schottland.

6. Geschlecht. Kupferbleispath.

Syn. Cupreous sulphato-carbonate of lead, Caledonit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind rhombische Prismen, mit den Flächen eines horizontalen Prismas an den Enden.

Theilbarkeit parallel dem verticalen und horizontalen Prisma. $\rho. = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $6,4$; Fettglanz; spangrün, selten berggrün. Besteht aus einer Verbindung von schwefelsaurem und kohlensaurem Blei mit kohlensaurem Kupfer, und

enthält 55,8 schwefelsaures Blei, 32,8 kohlensaures Blei und 11,4 kohlensaures Kupfer. Braust mit Säuren auf, hinterläßt ein weißes Pulver, gibt Kupferreaction, auf Kohle geglüht Metakörner und mit Soda Separ. Findet sich mit den vorhergehenden zu Leadhills in Schottland.

7. Geschlecht. Buntbleyerz.

Syn. Grün- und Braunbleyerz. Pyromorphit.

Crystallsystem drey- und einachsfig. Die Crystalle sind Gestalten, welche durch die Figuren 39. S. 136, Fig. 40. S. 136, Fig. 45. S. 152, Fig. 46, S. 152, Fig. 47. S. 154, Fig. 128. S. 254 dargestellt sind, und manchmal wie ausgehöhlt. Isomorph mit Apatit. Bisweilen kommen auch Zwillinge vor. Theilbarkeit nach den Pyramiden- und Prismenflächen, un- deutlich.

ρ . = 3,5 ... 4,5; spec. Gew. 5,8 ... 7,3; Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; Farbe grün und gelb herrschend, auch braun, grau, weiß, orange und roth.

Theils in Crystallen, deren Prismenflächen öfters durch eine horizontale Streifung bauchig, theils in crystallinischen Gestalten, oder kugelig, traubig, nierenförmig, tropfsteinartig, so wie derb. Die Zusammensetzung läßt sich im Allgemeinen auf folgende Weise angeben:

Ein Mischungsgewicht Chlorblei oder Chlorblei- und Fluorcalcium, ist verbunden mit 3 Mischungsgewichten zweydrittelphosphorsaurem oder arseniksaurem Bleiorpd. Dabey vertreten sich Phosphorsäure und Arseniksäure als isomorphe Substanzen, sowohl in unbestimmten Verhältnissen als auch völlig, ohne daß hiedurch eine Formveränderung oder ein verschiedenes Verhältniß des ersten Gliedes der Zusammensetzung bewirkt würde. Auf eine ähnliche Weise vertritt auch Kalkerde das Bleiorpd. Nach diesen specifischen Unterschieden in der Zusammensetzung, wodurch auch constante Unterschiede in den äußeren Verhältnissen der hieher gehörigen Mineralkörper bedingt sind, unterscheidet man folgende Gattungen:

1. Grünbleyerz. Die grüne Farbe ist herrschend. Gras-, pistazien-, oliven-, öl-, zeisig- und spargelgrün in ununterbrochener

Reihe. Spec. Gew. im Durchschnitt = 7,0. Besteht aus einer Verbindung von 1 M.-G. Chlorbley und 3 M.-G. zweydrittel-phosphorsaurem Bley, und enthält Bleyoxyd 82,28, Phosphorsäure 15,73, Salzsäure 1,99. Schmilzt auf Kohle in der äußeren Flamme; das Korn crySTALLISIRT bey der Abkühlung und wird dunkel. In der inneren Flamme gibt es Bleyrauch aber kein Reguli, färbt die Flamme bläulich, und das Korn crySTALLISIRT bey der Abkühlung mit großen Facetten und ist weiß. Oftmals enthält es etwas arseniksaures Bleyoxyd. Dann gibt es in der inneren Flamme metallisches Bley, und riecht nach Arsenik.

Kommt auf Bleylagerstätten, namentlich auf Gängen und gewöhnlich in den oberen Teufen vor, zu Zischopau, Freyberg, Przibram und Bleystadt in Böhmen, Hofgrund und Wildschapbach im Schwarzwald, Clausthal und Jellerfeld am Harz, in England und Schottland.

2. Traubenbley. Die gelbe Farbe ist herrschend; stroh-, wachs-, honig-, orangengel ins Morgenrothe; auch gelblich- und grünlichweiß. Spec. Gew. im Durchschnitt 7,2. Seltener in Crystallen, dagegen in der Regel in traubigen, kugeligen Gestalten, auch derb. Besteht aus einer Verbindung von 1 M.-G. Chlorbley und 3 M.-G. zweydrittel-arseniksaurem Bleyoxyd, und enthält 75,59 Bleyoxyd, 21,20 Arseniksäure, 1,99 Salzsäure und, wie bereits angegeben worden ist, häufig auch eine kleine Menge der isomorphen Phosphorsäure. Enthält das Traubenbley keine Phosphorsäure, so wird es beym Schmelzen auf Kohle, unter Auslösung des Arsenikgeruchs, vollkommen reducirt; bey einem kleinen Gehalte an Phosphorsäure bleibt eine kleine, nicht reducirte Perle zurück, welche eine crySTALLISIRTE Oberfläche zeigt.

Dieser gehört vielleicht auch der Hedypphan von Långbanshytta, der Schnüre im Mangankiesel bildet, 4,5 Härte, 5,4 spec. Gew., eine graulichweiße Farbe besitzt und aus 1 M.-G. Chlorbley und 3 M.-G. zweydrittel-arseniksaurem Bleyoxyd und Kalkerde besteht.

Kommt unter denselben Verhältnissen, und zum Theil an denselben Fundorten, vor, wie das Grünbleyergz. Ausgezeichnete Crystalle kommen von Johanneorgenstadt, und weitere schöne Abänderungen von den Gruben Neue Hoffnung-Gottes bey St. Bla-

sien und Haussbaden bey Badenweiler, St. Agnes in Cornwall, St. Priy unter Baubray im Depart. der Saone und Loire, und zu Kertschinsk in Sibirien.

3. Braunbleyerz. Braune Farbe; nesten- und haarbraun, leberbraun, ins Gelbe. Spec. Gew. = 5,8 ... 7,0. Besteht aus einer Verbindung von 1 M.-G. Chlorbley und Fluor-Calcium, mit 3 M.-G. zweydrittel-phosphorsaurem Bleyoxyd und Kalkerde, oder aus einer Verbindung von 1 M.-G. Chlorbley mit 3 M.-G. zweydrittel-phosphorsaurem Bleyoxyd. Es enthält im ersteren Falle 10,84 Chlorbley, 3,40 Fluorbley, 73,25 zweydrittel-phosphorsaures Bleyoxyd und 12,5 zweydrittel-phosphorsauren Kalk; im letzteren Falle 10,0 Chlorbley, 89,9 zweydrittel-phosphorsaures Bleyoxyd. Schmilzt vor dem Löthrohr, indem es die Flamme blau färbt, ohne Arsenikgeruch und ohne Reduction. Die fluorhaltige Abänderung entwickelt beym Erwärmen mit Schwefelsäure in einem Platintiegel Dämpfe von Flußsäure, welche Glas angreifen.

Findet sich theils in Crystallen, theils in kugeligen, traubigen Gestalten, die im Innern bisweilen sternförmig aus einander laufende, faserige Structur und concentrische Farbenstreifung besitzen (Polysphärit), theils verb. Die wichtigsten Fundorte sind: Ries und Bleystadt in Böhmen, und Poullaouen in der Bretagne; für den Polysphärit die Gruben Sonnenwirbel und Gelobt Land sammt Niklas bey Freyberg, so wie Johannegeorgenstadt und Ries.

Das Buntbleyerz wird auf Bley aufgeschmolzen, wo es, wie z. B. im Schwarzwalde, in größerer Menge vorkommt. Die Hüttenleute heißen es hier gefärbtes Erz.

3. Geschlecht. Gelbbleyerz.

Syn. Bleywolfsbat.

Crystallsystem zwey- und ehnachsig. Die Crystalle haben theils die Gestalt der Grundform, die eines spitzen quadratischen Octaëders, Fig. 173, theils sind es Combinationen dieser Form, mit dem ersten quadratischen Prisma g und einer horizontalen Endfläche c, Figur 174, oder des quadratischen Prismas g mit einem stumpferen Octaëder $\frac{o}{3}$ und der horizontalen End-

fläche e , Fig. 175; des Grundoctaëders o mit dem stumpferen

Fig. 173.




Fig. 174.




Fig. 175.




Octaëder $\frac{o}{g}$ und der horizontalen Endfläche e , Figur 176; des stumpferen Octaëders $\frac{o}{g}$ mit

dem schärferen Octaëder o' , Fig. 177. Außerdem kommen noch einige zusammengesetztere Combinationen vor. Der Habitus der Crystalle ist theils pyramidal, theils kurz säulen-

Fig. 176.



Fig. 177.



artig und tafelartig. Die Oberfläche von o und o' ist glatt, von g oft gekrümmt und bisweilen horizontal gestreift. Manche Crystalle wie ausgehöhlt und zerfressen. Theilbarkeit nach o , auch nach e .

$\delta = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. = $6,6 \dots 6,9$; Fettglanz; Farbe wachsgelb, herrschend, ins Oranien gelbe, Gelblich graue und Graulichweiße verlaufend; auch zeisig- und olivengrün; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus einfach-molybdänsaurem Bleypoxyd, und enthält 59 Bleypoxyd und 40,5 Molybdänsäure. Decrepitiert heftig beim Glühen im Kölbchen; schmilzt auf Kohle, und zieht sich in dieselbe hinein, während Bleypregull auf der Oberfläche bleiben. Färbt in kleinen Mengen Phosphorsalz grün. Wird von Salzsäure, mit Ausscheidung von Chlorbley, zu einer grünlischen Flüssigkeit aufgelöst, welche, etwas verdünnt, beim Umrühren mit einem eisernen Stabe sogleich eine blaue Farbe annimmt.

Findet sich in kleinen Crystallen, oft treppenförmig und zellig gruppiert oder in Drusen versammelt, auch verk., mit körniger Zusammensetzung. Die wichtigsten Fundorte sind Bleiberg und

Windischkappel in Kärnthen und Annaberg in Oesterreich; auch hat man es zu Badenweiler am Schwarzwald, zu Repbanya in Ungarn, in Mexico und Massachusetts gefunden.

9. Geschlecht. Rothbleyerz.

Syn. Bleichromat.

Erythrasystem zwey- und eingliederig. Die Crystalle sind gewöhnlich Combinationen des geraden rhombischen Prismas *g* mit dem vorderen schiefen Prisma *o* des Grundoctaëders,

Fig. 178.




Fig. 179.



Fig. 178, wozu oft noch die hintere schiefe Endfläche *d* tritt, wodurch die durch Fig. 179 dargestellte Gestalt gebildet wird. Ist die schiefe Endfläche, sehr stark entwickelt, allein mit den Prismenflächen *g* combinirt, so hat die Gestalt oft das Ansehen eines sehr spizen Rhomboëders, wie Fig. 90. S. 229. Es kommen überdieß noch verticale Pris-

men vor, welche die Seitenkanten des Prismas *g* zuschärfen. Die verticalen Prismen oft gestreift. Durch Vorherrschen der verticalen Prismen ist der Habitus der Crystalle oft säulenförmig. Theilbarkeit nach den Prismenflächen *g* deutlich.

$\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $6,0 \dots 6,1$; Diamantglanz; Farbe hyacinthroth in verschiedenen Nüancen, ins Morgenrothe verlaufend; Strich orangengelb; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus einfach-chromsaurem Bleypoxyd, und enthält 68,38 Bleypoxyd und 31,62 Chromsäure. Decreplirt beym Erhitzen, färbt in geringer Menge Borax und Phosphorsalz smaragdgrün.

Findet sich theils crySTALLISIRT, selten in einzelnen aufgewachsenen Crystallen, gewöhnlich stängelig zusammengehäuft, durch einander gewachsen, breit gedrückt und zu plattensförmigen Stücken in einander geflossen; auch dorb mit stängeliger und körniger Zusammensetzung. Der Hauptfundort ist Beresow in Sibirien.

Von da kam es zuerst nach Deutschland, und wurde sofort rother sibirischer Bleyspath genannt. Es gab die nächste Veranlassung zur Entdeckung des Chrommetalls. Bauquelin entdeckte nämlich darin bey seiner Analyse die eigenthümliche Säure, und stellte daraus das Chrommetall dar. Später fand man dieses schöne Bleierz auch zu Conconhas do Campo in Brasilien. Es zeichnet sich durch großes Lichtbrechungs-, Farbenzerstreuungs- und Lichtpolarisierungs-Vermögen aus.

10. Geschlecht. Bauquelinik.

Syn. Kupferchrombley.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die sehr kleinen Crystalle sind Zwillinge, durch schiefe rhombische Prismen gebildet. Theilbarkeit nicht bestimmt. $\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $5,5 \dots 6,8$; Demantglanz, in den Fettglanz geneigt; schwärzlich- und olivengrün, ins Zeisiggrüne, Gelbe und Braune verlaufend; Strich zeisiggrün; schwach durchscheinend bis undurchsichtig; besteht aus einer Verbindung von 2 M.-G. basischem, chromsaurem Bleypoxyd und 1 M.-G. basisch-chromsaurem Kupferoxyd, und enthält 60,87 Bleypoxyd, 10,90 Kupferoxyd und 29,33 Chromsäure. Schmilzt unter starkem Schäumen zu einer dunkelgrauen, metallischglänzenden Kugel. Färbt Borax und Phosphorsalz in kleinen Quantitäten grün; nach gutem Reductionsfeuer wird das Glas unter der Abkühlung roth. Mit Soda zusammengeschmolzen auf Kohle gibt er metallisches Blei.

Findet sich mit Rothbleierz zu Veresow in Sibirien und in Brasilien.

11. Geschlecht. Scheelbleierz.

Syn. Bleyscheelat, Xanthinspath.

Crystallsystem zwey- und einachsig. Die Crystalle sind gewöhnlich spige, quadratische Octaëder, knospenförmig zusammen gehäuft, wie in einander verschlossen, bauchig gekrümmt, kegelförmig oder spinselförmig. Isomorph mit Schwerstein, scheelsaurem Kalk. Theilbarkeit parallel den Octaëderflächen. $\rho = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. = $8,0 \dots 8,1$; Fettglanz; wachsgelb, ins Grüne, Graue und Braune verlaufend; durchscheinend, bisweilen nur an

den Kanten. Besteht aus einfach-wolframsaurem (scheelsaurem) Bleoryd, und enthält 49,25 Bleoryd und 51,75 Wolframsäure. Schmilzt auf Kohle, gibt Bleirauch und läßt eine dunkle, crystallinische Kugel zurück. Löst sich in Borax auf; in sehr starker Hitze raucht Blei fort, und die Kugel wird nach der Abkühlung klar und dunkelroth. Mit Phosphorsalz gibt es in der Reductionsflamme ein blaues Glas.

Findet sich mit Quarz, Glimmer und Wolfram zu Zinnwald im Erzgebirge.

12. Geschlecht. Vanadinbleyerz.

Syn. Erythronbleyerz.

Crystallsystem drey- und einachsig. Die Crystalle sind kleine, reguläre, sechsseitige Prismen. Theilbarkeit undeutlich. $\rho = 3,5$; spec. Gew. $= 6,8 \dots 7,2$; Fettglanz; strohgelb, wachsgelb, röthlich- bis kastanienbraun; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von basischem Chlorblei und basischem, vanadinsaurem Blei, und enthält auf 25,33 Procent von ersterem, 74 Procent von letzterem, und überdieß 0,67 Eisenoxydhydrat, das zwischen den Abkömmlingen liegt, und Spuren von arseniksaurem Blei. Färbt das Boraxglas smaragdgrün, ist in Salzsäure, unter Ausscheidung Chlorblei, zu einer schön grünen Flüssigkeit auflöslich. Läßt man Salpetersäure darauf einwirken, so überziehen sich die Stücke schön roth mit Vandinsäure.

Findet sich theils in sehr kleinen Crystallen, theils in kugelförmigen, traubigen Gestalten zu Zimapan in Mexico und zu Beresow in Sibirien.

Zu Wanlockhead in Schottland hat man ebenfalls einige Abänderungen von vanadinsaurem Bleoryd gefunden, sie stimmen jedoch mit dem beschriebenen nicht überein, und scheinen zum Theil aus doppelt-vanadinsaurem Bleoryd zu bestehen.

13. Geschlecht. Hornbleyerz.

Crystallsystem zwey- und einachsig. Man hat Crystalle beobachtet, die eine Combination des ersten und zweyten quadratischen Prisma, des Quadratoctaeders und einer geraden Endfläche sind. Theilbarkeit parallel dem ersten quadratischen Prisma.

$\rho = 3,0$; spec. Gew. = 6,0 ... 6,1; Glanz demantartig; Farbe weiß, grau, gelb, grün, blau; durchsichtig ... halbdurchsichtig. Besteht aus 1 M.-G. Chlorbley und 1 M.-G. kohlensaurem Bley, und enthält 85,5 Bleyoxyd, 9,5 Salzsäure, 6,0 Kohlensäure. Schmilzt sehr leicht zu einer klaren Kugel; braust mit Säuren auf, wird, auf Kohle geschmolzen, leicht reducirt; zusammengeschmolzen mit einem Fluß von Phosphorsalz und Kupferoxyd färbt es die Löthrohrflamme schön blau.

Wurde früher einmal zu Matlock in Derbyshire, später auch zu Southampton in Massachusetts und am Vesuv gefunden.

14. Geschlecht. Chlorbley.

Syn. Bleychloroxyd, Bleierz von Mendip.

Crystallsystem ein- und einachsig. Kleine rhömbische Prismen und crystallinische, nach der Prismenfläche theilbare, Massen. $\rho = 2,5$... 3,0; spec. Gew. = 7,0 ... 7,1; Demantglanz, auf den Theilungsflächen perlmutterartig; Farbe blaß gelblich, röthlichweiß und strohgelb; durchscheinend. Besteht aus 1 M.-G. Chlorbley und 2 M.-G. Bleyoxyd, und enthält 55,92 Bleyoxyd, 34,63 Chlorbley und eine Einmischung von 7,55 kohlensaurem Bleyoxyd, 1,46 Kieselersde, 0,54 Wasser. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Hornbleierz. Findet sich in den Mendip-Hügeln in Somersetshire und unter den Producten des Vesuv (Cotunnit).

15. Geschlecht. Bleygummi.

Crystallsystem unbekannt. Klein kugelige, traubige Massen von dünnstängiger und auseinanderlaufend strahliger Zusammensetzung. $\rho = 4,0$... 4,5; spec. Gew. = 48; Glasglanz; gelblichweiß, lichtgrün, durch Verunreinigung gelblich und röthlichbraun; durchscheinend; verhärtetem Gummi ähnlich. Besteht aus wasserhaltigem, doppelt-thonsaurem Bleyoxyd, und enthält 40,14 Bleyoxyd, 27,0 Thonerde, 18,8 Wasser, nebst Beimengungen von Kieselersde, Eisen- und Manganoxyd, und mitunter von phosphorsaurem Bleyoxyd. Zerspringt beim Glähen mit Heftigkeit und gibt Wasser aus. Wird mit Kobaltsolution schön

blau; und mit Soda vermischt auf Kohle erhitzt erscheinen Bleykugeln.

Findet sich in der Bleygrube von Quelgoat bey Poullaouen in der Bretagne, und auf der Bleygrube de la Nussiere, unfern Beaujeu im Rhone-Departement.

A n h a n g.

Die Bleyerde ist ein Gemenge von Thon und verschiedenen salinischen Bleyerzen. Gewöhnlich ist der grauen, durch Eisen auch häufig gelb, braun oder roth gefärbten Thonmasse, Weißbleyerz und Buntbleyerz eingemengt, seltener Vitriolbleyerz. Die Substanz ist erdig, matt, riecht thonig beym Anhauchen. Kommt mit verschiedenen Bleymineralien vor, füllt Klüfte und Höhlungen aus, oder überzieht und umhüllt andere Erze.

Findet sich vorzüglich zu Jellersfeld am Harz, zu Tarnowitz in Schlessen, zu Badenweiler am Schwarzwald, zu Krasau in Polen, zu Nertschinsk in Sibirien. Wird mit anderen Bleyerzen verhüttet.

6. Sippchaft. Salinische Silbererze.

1. Geschlecht. Hornsilber.

Syn. Hörnerz.

Crystallsystem regulär. Die meist sehr kleinen Crystalle sind Octaëder, Würfel, Rautendodecaëder und Combinationen des Würfels mit dem Octaëder, und des Würfels mit dem Dodecaëder. Die Würfelflächen sind öfters trichterförmig ausgehöhlt. Theilbarkeit nicht wahrgenommen.

$\rho = 1,0 \dots 1,5$; spec. Gew. = $5,5 \dots 5,6$; perlgrau, ins Blaue und Grüne verlaufend; bräunt sich am Lichte; Fettglanz, demantartiger; durchscheinend; geschmeidig. Besteht aus Einfach-Chlor Silber, und enthält 73,5 Silber, 24,7 Chlor. Schmilzt leicht; wird im Reductionsfeuer reducirt auf metallisches Silber; färbt, mit Phosphorsalz und Kupferoxyd zusammengeschmolzen, die Löthroßflamme blau.

Kommt theils in einzelnen aufgewachsenen oder zu brüßigen Häuten verbundenen, auch reihe- und treppenförmig gruppirten

Erytallen vor, theils als rindenartiger Ueberzug, so wie verb und eingesprengt, von korniger und stängeliger Zusammensetzung. Findet sich an Silbergängen, vorzüglich in oberer Teufe, und hauptsächlich zu Fresnillo, Zacatecas und Tatorce in Mexico, und zu Huantajayo in Peru. Auch wurde es zu Freyberg, Johanns-georgenstadt, Joachimsthal, Schneeberg im Erzgebirge gefunden, ferner zu Kongsberg in Norwegen, zu Huel-Mexico in Cornwall und zu Kollivan in Sibirien. Sehr reiches Silbererz.

2. Geschlecht. Jodsilber.

Dünne, weiche und geschmeidige Blättchen, von grünelber Farbe und blätterigem Gefüge; durchscheinend; fettglänzend. Besteht aus Jodsilber, und enthält 86,5 Silber und 13,5 Jod. Schmilzt leicht, färbt die Flamme purpurroth, und hinterläßt metallisches Silber. Findet sich sparsam in Begleitung von Gediegen-Silber bey Mazapil unsern Zacatecas in Mexico, wie es scheint im Serpentinegebirge. Darauf deutet die Aufschrift: „Argont viergo de Serpentine,“ unter welcher es zuerst Bauquellin angekommen war.

3. Geschlecht. Hornquecksilber.

Syn. Quecksilberhornerz.

Erytallsystem zwey- und einachsfig. Die Erytalle sind eine Combination eines Quadratoctaëders mit dem zweyten quadratischen Prisma, und ähnlich Fig. 44. S. 151. Sie sind sehr klein und zu Drusenhaufen verbunden. Theilbarkeit, Spuren in der Richtung des ersten quadratischen Prismas.

H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 8,5; Diamantglanz; weiß, graulichweiß, gelblich und aschgrau; durchscheinend, oft nur an den Kanten. Besteht aus einfach Chlor-Quecksilber, und enthält 83 Quecksilber und 15 Chlor. Sublimirt sich in der Hitze, gibt, mit Phosphorsalz und Kupferoxyd zusammengeschmolzen, der Böhmerflamme eine blaue Farbe, überzieht, mit Wasser vermengt auf blaues Kupfer aufgetragen, dieses mit einer Quecksilberhaut.

Findet sich sehr selten mit Quecksilbererzen zu Idria in Kärn, Moschellandsberg bey Zweybrücken und Almaden in Spanien; auch hat man es zu Horzowitz in Böhmen gefunden.

Nach Del-Rio soll in America auch Jodquersilber von dunkelzinnrother Farbe vorkommen.

Es wird auch angegeben, daß man aus dem Cadmium, welches auf der Königshütte in Schlessen aus Galmei gezogen wird, mittelst Wasser zwey sublimierbare Salze ausziehen könne, nämlich Jod-Zink und Brom-Zink. Demnach scheinen diese Verbindungen in einzelnen Parthien in geringer Menge im dortigen Galmei vorzukommen.

7. Gipschaft. Salinische Kupfererze.

1. Geschlecht. Malachit.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind rhombische Prismen mit einer schiefen Endfläche und mit der ersten Seitenfläche; meist nadelförmig. Ofters zu Zwillingen verbunden in der Richtung der ersten Seitenfläche, welche die größeren Seitenkanten des Prismas abstumpft.

• Theilbarkeit nach der Schiefenfläche, und parallel der schärferen Seitenkante des Prismas.

H. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,6 ... 4,0; Diamantglanz, in den Glasglanz geneigt; grüßgrün, auch smaragd- und spangrün, einerseits ins Weiße, andererseits ins Schwärzliche verlaufend; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, halb-kohlensaurem Kupferoxyd, und enthält 72,2 Kupferoxyd, 18,5 Kohlensäure, 9,3 Wasser. Gibt beym Mischen Wasser aus und wird schwarz; branzt mit Säuren auf; gibt mit Soda auf Kohle geschmolzen ein Kupferkorn.

Man unterscheidet folgende Abänderungen:

1. Fasriger Malachit. Begreift die deutlich crystallinischen und die strahligen und faserigen Stücke. Zarre, nadelförmige Individuen sind gewöhnlich büschelförmig zusammengewachsen oder bilden aufgewachsene Crystallgruppen, und sind öfters zu dicken Massen verbunden. Auch erscheint diese Abänderung bisweilen in Aftercrystallen nach Rothkupfererz oder Kupferlasur.

2. Dichter Malachit. Umfaßt die knolligen, kugelförmigen, Malactitischen und dicken Vorkommnisse mit trümmerschalliger Zu-

sammensetzung, bey welchen oft Farbennüancen in concentrischen Lagen wechseln.

3. Erdiger Malachit. Begreift die zerreiblichen, matten Stücke von erdigem Ansehen, die öfters aus staubartigen Theilen zusammengesetzt sind, auch stalactitisch, d. h. als Anflug und Ueberzug vorkommen (Kupfergrün).

Der Malachit kommt mit verschiedenen Kupfererzen auf Gängen und Lagern vor, und am ausgezeichnetsten in Sibirien am Ural. Dort wurden und werden noch immer die schönsten und größten Stücke gefunden, deren Gewicht öfters einige Centner beträgt, selbst bis über 1000 Pfund steigt; ja im Jahr 1835 hat man aus der Nobejsnoi-Kupfergrube zu Nischney-Tagil im nördlichen Ural eine Malachitmasse von 14000 russischen Pfunden an den Tag gefördert. Schöne Abänderungen finden sich auch im Vannat, zu Chessy bey Lyon, zu Wildschapbach im Schwarzwalde, in Cornwall, am Harz und in Thüringen. In den Sumescheskischen-Gruben in Permien hat man ihn auch als Versteinerungsmasse von Pflanzenkörpern gefunden.

Die dichten Abänderungen werden ihrer schönen Farben und des Glanzes wegen, vielfältig verarbeitet zu Schmucksteinen, Dosen, Griffen u. s. w. Größere Stücke werden zu Matten verarbeitet, durch deren Zusammensetzung schöne Tische gebildet werden. Aus ganz großen Stücken formt man Säulen und Basen, die zu dem Schönsten gehören, was in dieser Art zu sehen ist. (Barskoe Selo bey St. Petersburg, Pallast des Prinzen von Oranien zu Brüssel.) Gewöhnliche Vorkommnisse werden mit anderen Kupfererzen verhüttet.

2. Geschlecht. Kieselmalachit.

Spez. Kieselkupfer.

Bis jetzt nur in traubigen, kugeligen, nierenförmigen Stücken bekannt, d. h. und eingesprengt. Theilbarkeit fehlt. $H. = 2,0 \dots 3,0$; spec. Gew. $= 2,0 \dots 2,1$; Fettglanz, schwacher, auch matt; spangrün ins Himmelblau; halbburchsichtig bis durchscheinend an den Ranten. Bruch muschelig. Besteht aus 1 M.-G. doppelt-kieselsaurem Kupferoxyd und 6 M.-G. Wasser, und enthält 45,17 Kupferoxyd, 37,35 Kieselerde und 17,0 Wasser. Siehe

beym Glähen Wasser aus und wird schwarz. Löst sich im Phosphorsalz und hinterläßt ein Kieselstelet. Schmilzt mit wenig Soda zu einem dunkeln Glase, das innwendig roth ist und ein Kupferkorn einschließt; mit einer größeren Menge Soda schmilzt er in die Kohle ein, indem er auf der Oberfläche ein Kupferkorn hinterläßt. Findet sich unter ähnlichen Verhältnissen, wie der Malachit, und am ausgezeichnetsten, ebenfalls in Sibirien. Auch kommen schöne Abänderungen zu Poloma in Ungarn vor, gewöhnlichere am Harz, in Böhmen, Sachsen, Thüringen, im Schwarzwalde, in Nordamerica, Mexico und Chili.

3. Geschlecht. Kupfersmaragd.

Syn. Diopas.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Die Crystalle sind, von einem Grundrhomboëder von $126^{\circ} 19'$ abzuleitende, spitzere Rhomboëder von $95^{\circ} 48'$, in Combination mit einem sechsseitigen Prisma. Theilbarkeit parallel den Flächen des Grundrhomboëders. $H. = 5,0$; spec. Gew. = $3,2 \dots 3,3$; Glasglanz; smaragd-, span- und schwärzlichgrün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus 1 M.-G. doppelt-kieselsaurem Kupferoxyd und 3 M.-G. Wasser, und enthält 45,10 Kupferoxyd, 36,85 Kieselerde, 11,51 Wasser, nebst einer Vermengung von 3,38 Kalkerde, 2,36 Thonerde und 0,21 Bittererde. Bildet mit Säuren eine Gallerte; gibt mit Soda zusammengeschmolzen ein grünes Glas, welches ein geschmeidiges Kupferkorn einschließt. Wird beym Glähen für sich schwarz und gibt Wasser aus.


Ist bis jetzt nur in Crystallen vorgekommen, und findet sich in der Steppe der mittleren Kirgisenhorde.

4. Geschlecht. Kupferlasur.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind verticale, rhombische Prismen mit schiefer Endfläche und Combinationen dieser Gestalt mit der ersten Seitenfläche, mit Octaëderflächen, mit schiefen Prismen an den Enden, mehreren schiefen Endflächen und noch einigen andern Gestalten, so daß sie zu den sehr verwickelten gehören. Eine oft vorkommende, einfachere

Combination ist durch Fig. 180 dargestellt. Die Schiefenfläche

Fig. 180.



e zuweilen parallel der größeren Diagonale gestreift; manche Flächen rauh, oder uneben. Theilbarkeit nach g und e undeutlich; vollkommener nach den Flächen eines schiefen Prismas. Der Habitus der Crystalle ist gewöhnlich kurz säulen- oder dick tafelartig.

$\rho. = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 3,7 \dots 3,9$; Glasglanz, in den

Demantglanz geneigt; lasurblau, herrschend, auch smalte- und schwärzlichblau; durchscheinend; öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, zweydrittel-kohlensaurem Kupferoryd, und enthält 69,08 Kupferoryd, 25,46 Kohlensäure und 5,46 Wasser. Gibt beim Glähen Wasser aus, wird schwarz und verhält sich ganz wie Malachit.

Man unterscheidet:

1. Blätterige Kupferlasur. Begreift die crystallinischen und zusammengesetzten, festen, crystallinischen und derben Abänderungen. Die Crystalle sind gewöhnlich zu Gruppen verbunden, die häufig kugelig, traubig, nierenförmig, knollig erscheinen, und bisweilen kommen auch Knollen und Kugeln vor, die im Innern hohl und drusig sind.

2. Kupfersammetz, nennt man die feinen, haarförmigen Crystalle, welche feine, sammetartig glänzende Ueberzüge bilden.

3. Erdige Kupferlasur. Begreift die zerreiblichen, staubartigen Abänderungen von etwas lichterer Farbe, und kommt derb, eingesprengt als Ueberzug und Anflug, bisweilen auch kleinstäubig vor.

Die ausgezeichnetsten Crystalle kommen von Chessy bey Lyon, andere schöne Abänderungen von Szaska und Schmölnitz in Ungarn, Drawicza und Moldawa im Bannat (Kupfersammetz), und von den Kupferlagerstätten Sibiriens, Schlesiens, Thüringens, des Tyrols und Schwarzwaldes:

5. Geschlecht. Atacamit.

Syn. Salzkupfererz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die sehr seltenen Crystalle sind ähnlich Fig. 104. S. 238. Die verticalen Prismen vertical gestreift. Theilbarkeit parallel der stumpferen Seitenkante des Prismas g.

$\rho = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. $= 3,6 \dots 4,0$; Glasglanz, schwacher, in den Fettglanz geneigt; gras-, smaragd-, lauch- bis schwärzlichgrün; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von 1 M.-G. Chlorkupfer mit 3 M.-G. Kupferoxyd, und besteht aus 71,7 Kupferoxyd, 12,1 Salzsäure und 16,2 Wasser. Färbt beym Glühen vor dem Löthrohr die Flamme stark blau mit grünen Kanten; schmilzt auf Kohle und gibt ein Kupferkorn.

Bildet gewöhnlich stängelige Aggregate mit divergierend strahliger Zusammensetzung, auch nierenförmige Gestalten und derbe Massen. Findet sich in Peru und Chili auf Gängen, welche Kupfer-, Eisen-, Gold- und Silbererze führen. Am Vesuv kommt es als Sublimat an den Oeffnungen von Fumarolen und in Spalten des Kraters vor. Bey Schwarzenberg in Sachsen ist es 1806 auf einem Kupfer- und Eisenerze führenden Gange vorgekommen. Das sandförmige Salzkupfererz, welches aus Peru zu uns kommt, wird von den Bewohnern der Wüste Atacama aus derben, crystallinischen Massen dieses Erzes durch Zerreiben bereitet. Es wird von den Indianern unter dem Namen Arenilla verkauft, und in Peru und Chili als Streusand gebraucht.

6. Geschlecht. Brochantit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sich gerade rhombische Prismen, in Combination mit der stark entwickelten ersten Seitenfläche, und an den Enden zugespitzt durch die Flächen des ersten und zweyten horizontalen Prismas. Theilbarkeits Spuren nach der ersten Seitenfläche.

$\rho = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 3,79 \dots 3,87$; glasglänzend; smaragdgrün; durchscheinend. Besteht aus drütel-

schwefelsaurem Kupferoryd mit 3 M.-G. Wasser, und enthält 62,62 Kupferoryd, 17,13 Schwefelsäure und 11,88 Wasser, nebst einer Einmischung von Zinnoryd und etwas Bleoryd. Unlöslich in Wasser. Gibt, in einer offenen Glasröhre geglüht, Wasser aus und den Geruch der schwefeligen Säure. Schmilzt für sich, und mit Soda zu einem Kupferkorn.

Findet sich zu Rehbanya in Siebenbürgen, angewachsen auf Rothkupfererz und selenhaltigem Bleeglanz, gemengt mit Malachit, dem er sehr ähnlich sieht; auch zu Ekatarinenburg in Sibirien.

7. Geschlecht. Phosphormalachit.

Syn. Pseudomalachit, Phosphatkupfererz, klinorhombisches, phosphorsaures Kupferoryd.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die seltenen und selten deutlichen Crystalle sind rhombische Prismen mit schiefer Endfläche, combinirt mit einem an den Enden liegenden, schiefen Prisma. Sie sind sehr selten deutlich, und gewöhnlich gruppiert zu kugelligen, traubigen, nierenförmigen Gestalten mit drusiger Oberfläche und faseriger oder strahliger Zusammensetzung.

$H. = 4,5 \dots 5,0$; spec. Gew. = 4,2; Fettglanz, bisweilen glas- oder demantartig; smaragd-, span- und schwärzlichgrün; durchscheinend; öfters nur an den Kanten. Besteht aus drittelsphosphorsaurem Kupferoryd mit 3 M.-G. Wasser, und enthält 62,84 Kupferoryd, 21,68 Phosphorsäure und 15,4 Wasser. Schmilzt für sich zu einer stahlgrauen Kugel, welche ein Metalkorn einschließt. Verliert bey'm Glühen den ganzen Wassergehalt; löst sich in Salpetersäure ohne Aufbrausen; die Auflösung gibt mit essigsaurem Blei einen Niederschlag von phosphorsaurem Bleoryd.

Ist auf der Kupfergrube am Birneberg bey Rheinbreitenbach, mit Quarz, Chalcedon, Rothkupfererz und Malachit vorgekommen.

8. Geschlecht. Olivenmalachit.

Syn. Libethenit, rhombisches, phosphorsaures Kupferoryd.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle sind eine Combination des geraden rhombischen Prismas mit dem rhombi-

sehen Octaëder und einem an den Enden liegenden zweyten horizontalen Prisma. Die Octaëderflächen glatt, die Prismenflächen gestreift. Theilbarkeit nach den Diagonalen des rhombischen, verticalen Prismas, undeutlich.

$\text{H.} = 4,0$; spec. Gew. $= 3,6 \dots 3,8$; Fettglanz; dunkelolivengrün bis schwärzlichgrün; durchscheinend, zuweilen nur an den Kanten. Besteht aus halb-phosphorsaurem Kupferoxyd mit 1 M.-G. Wasser, und enthält 63,9 Kupferoxyd, 28,7 Phosphorsäure und 7,4 Wasser. Verhält sich vor dem Löthrohr wie das vorhergehende Geschlecht, verliert beym Glühen aber nur halb so viel Wasser.

Findet sich in drusig zusammengehäuften Crystallen zu Libethen bey Neusohl in Ungarn und auf den Gunnis-Lake-Gruben in Cornwall.

9. Geschlecht. Olivenerz.

Syn. Olivenit.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle sind eine Combination des geraden, rhombischen Prismas, mit der ersten Seitenfläche und dem an den Enden liegenden zweyten horizontalen Prisma, ähnlich Fig. 29. C. 62, mit Weglassung der Fläche b. Theilbarkeit nach dem verticalen und horizontalen Prisma undeutlich.

$\text{H.} = 3,0$; spec. Gew. $= 4,2 \dots 4,4$; Glasglanz; seidenartig bey faserigen Zusammensetzungen; olivengrün in verschiedenen Abstufungen, ins Rauch-, Pistazi- und Schwärzlichgrüne einerseits, ins Heislgrüne und Schwefelgelbe andererseits verlaufend; auch leber- und holzbraun, durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, halbarsemitäurem Kupferoxyd, worinn etwas Arseniksäure durch Phosphorsäure ersetzt ist, und enthält 56,43 Kupferoxyd, 36,71 Arseniksäure, 3,36 Phosphorsäure und 3,50 Wasser. Schmilzt für sich in der Platinzange und crystallisirt beym Abkühlen als eine strahlige Masse von schwärzlicher Farbe, deren Oberfläche netzförmig mit prismatischen Crystallen bedeckt ist. Stößt, auf Kohle geschmolzen, Arsenikgeruch aus.

Kommt theils in kleinen und sehr kleinen Crystallen vor, die oft nadel- und haarförmig, einzeln aufgewachsen sind oder zu

Drusen verbunden, theils in halbfugeligen, traubigen und nierenförmigen Gestalten mit drüßiger Oberfläche, welche aus faserigen Individuen zusammengesetzt sind.


Findet sich auf den Kupfergruben zu Redruth in Cornwall.

10. Geschlecht. Linsenerz.

Syn. Pelekyd, prismatischer Liroconmalachit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind gerade rhombische Prismen, durch die Flächen des ersten, horizontalen Prismas an den Enden zugespitzt, wobei beide Gestalten ziemlich gleich ausgebildet sind, Fig. 181. Theilbarkeit nach dem horizontalen und verticalen Prisma unendlich.

Fig. 181.



$\rho. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 2,9 \dots 3,0$; Glasglanz; himmelblau bis spangrün; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einer Verbindung von wasserhaltigem, halb-arseniksaurem Kupferoxyd mit Thonerdehydrat, und enthält

35,19 Kupferoxyd, 20,79 Arseniksäure, 22,24 Wasser, 8,03 Thonerde, nebst 3,41 dieser isomorphem Eisenoxyd, 3,61 der Arseniksäure isomorpher Phosphorsäure und eine Beimengung von Kiesel-erde. Schmilzt auf Kohle unter Ausstößung von Arsenikgeruch ruhig, und hinterläßt spröde Metallkörner; löst sich vollkommen in Ammoniak auf.

Ist selten, und findet sich meist nur crystallisirt in kleinen, an einander gewachsenen Crystallen, und zu Drusen verbunden; hin und wieder auch derb von körniger Zusammensetzung. Findet sich zu Redruth in Cornwall und zu Herrengrund in Ungarn.


11. Geschlecht. Euchroit.

Syn. Prismatischer Smaragd-Malachit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind eine Combination eines verticalen rhombischen Prismas g mit der geraden Endfläche c , der zweyten Seitenfläche b , dem zweyten horizontalen Prisma f und mit zwey anderen verticalen Prismen, welche die Kanten zwischen dem ersten verticalen Prisma und der

zweiten Seitenfläche zuspitzen, Fig. 182. Die verticalen Flächen

Fig. 182.



sind vertical gestreift. Theilbarkeit vertical und horizontal prismatisch, undeutlich.

$\rho. = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 3,3 \dots 3,4$; Glasglanz; smaragdgrün; halb- durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus wasserhaltigem, halb-arseniksaurem Kupferoxyd, und enthält 47,85 Kupferoxyd, 33,02 Arseniksäure und 18,8 Wasser.

Schmilzt, und hinterläßt auf Kohle ein sprödes Kupferkorn, unter Ausstosung von Arsenikgeruch. Verliert durch Glühen alles Wasser.

Findet sich zu Libethen in Ungarn in quarzigem Glimmerschiefel.

12. Geschlecht. Strahlerz.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die Crystalle sind verticale rhombische Prismen mit einer auf die scharfen Seitenkanten aufgesetzten, stark entwickelten Schiefenfläche. Theilbarkeit nach dieser vollkommen. $\rho. = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. $= 4,1 \dots 4,3$; Glasglanz, perlmutterartig auf der Theilungsfläche; dunkel spangrün ins Himmelblau geneigt; durchscheinend an den Kanten. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von arseniksaurem Eisen- und Kupferoxyd, und enthält 27,5 Eisenoxyd, 22,50 Kupferoxyd, 33,50 Arseniksäure, 12,0 Wasser nebst einer Beymischung von Kieselerde. Schmilzt unter Entwicklung arsenikalischer Dämpfe, und gibt neben Kupferreaction auch starke Eisenreaction.

Findet sich in Crystallen und in nierenförmigen Gestalten von stängeliger und strahliger Zusammensetzung, zu Rebruth in Cornwall.

13. Geschlecht. Erinit.

Syn. Dykomez Habronem-Malachit.

Derbe Massen und concentrische Ueberzüge bildend. Theilbarkeit in Spuren vorhanden. $\rho. = 4,0 \dots 5,0$; spec. Gew. $= 4,0$; smaragdgrün ins Grasgrüne; an den Kanten durch-

scheiend. Matt, Besteht aus 2 M.-G. Wasser enthaltendem, drittel-arseniksaurem Kupferoxyd, und enthält 59,44 Kupferoxyd, 33,78 Arseniksäure, 5,0 Wasser nebst 1,77 Thonerde. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Euchroit. Wurde in der Grafschaft Limerik in Irland gefunden.

14. Geschlecht. Kupferglimmer.

Syn. Kupfer-Phyllit, rhomboëdrischer Euchlor-Glimmer.

Crystallsystem dreh- und einachsig, hemiedrisch. Die Crystalle sind spitze Rhomboëder mit vorherrschender gerader Endfläche, und deshalb dünn tafelartig. Theilbarkeit parallel der Endfläche ausgezeichnet.

H. = 2,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; smaragd- bis spangrün; Demantglanz, auf der Theilungsfläche Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchscheinend. Scheint aus wasserhaltigem, viertel-arseniksaurem Kupferoxyd zu bestehen, und enthält 58 Kupferoxyd, 21 Arseniksäure und 21 Wasser. Verknüpfert beym Glähen heftig, schmilzt auf Kohle unter Entwicklung von Arsenikrauch, löst sich vollkommen auf in Ammoniak; verhält sich im Uebrigen wie die Vorhergehenden.

Gewöhnlich crystallisirt, in einzelnen aufgewachsenen oder zu Büscheln und Garben verbundenen, auch in Drüsen versammelten kleinen Crystallen. Selten derb, von kleinblättriger Zusammensetzung. Findet sich zu Redruth in Cornwall.

15. Geschlecht. Kupferschaum.

Syn. Prismatischer Euchlor-Malachit.

Derbe, strahlglättrige Massen, vollkommen theilbar in einer Richtung. In dünnen Blättchen biegsam. H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 3,0 ... 3,2; apfel- und spangrün; Perlmutterglanz auf der Theilungsfläche; durchscheinend. Besteht aus einer 9 M.-G. Wasser enthaltenden Verbindung von drittel-arseniksaurem Kupferoxyd, und enthält 48,88 Kupferoxyd, 25,01 Arseniksäure, 17,46 Wasser und eine Gemengung von 13,65 kohlensaurem Kalk. Löst sich in Säuren unter Aufbrausen, in Ammoniak unter Hinterlassung eines weißen Rückstandes von Kohlen-

saurer Kalkerde. Decrepitiert heftig beim Erhitzen. Verhält sich im Uebrigen wie die Vorhergehenden.

Findet sich zu Rogel, Falkenstein und Schwarz in Tyrol, Saalfeld in Thüringen, Libethen in Ungarn, Matlock in Derbyshire, im Temeswarer Bannat und zu Campiglio, unsern Piombino, im Kirchenstaate.

16. Geschlecht. Condurrit.

Dichte, erdige, glanzlose Masse von bräunlichschwarzer Farbe und flachmuscheligen Bruch. Weich, milde, wird durch den Strich glänzend; spec. Gew. = 5,2. Besteht aus wasserhaltigem, arsenichtsaurem Kupferoxyd, und enthält 60,50 Kupferoxyd, 25,94 arsenichte Säure, 8,39 Wasser, nebst einer Einnengung von 3,0 Schwefel und 1,5 Arsenikmetall. Gibt im Köblchen Wasser und ein weißes Sublimat von arsenichter Säure. Schmilzt mit Soda zu einem spröden Kupferkorn.

Findet sich zu Condurrow in Cornwall auf einem Granitgang.

8. Sippschaft. Salinische Uran-, Kobalt- und Nickelerze.

1. Geschlecht. Uranglimmer.

Syn. Uran-Phyllit, Pyramidaler Euxchor-Malachit.

Erystallsystem zwey- und einachsfig. Die Erystalle sind Quadratoctaeder und Combinationen desselben mit dem ersten und zweyten quadratischen Prisma und einer vorherrschenden geraden Endfläche. Der Habitus ist daherwegen in der Regel tafelförmig, seltener kurz säulenartig, noch seltener pyramidal. Theilbarkeit ausgezeichnet parallel der Endfläche.

ρ . = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,3; Glasglanz, diamantartiger; auf der Theilungsfläche perlmutterartiger; Farbe gelb und grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus dreypiertel-phosphorsaurem Uranoxyd-Kalkerde oder Kupferoxyd mit 12 M.-G. Wasser. Nach dieser Verschiedenheit in der Zusammensetzung unterscheidet man zwey Gattungen.

1. **Uranit. Kalk-Uranglimmer.** Besteht aus dreiviertel-phosphorsaurem Uranoryd-Kalkerde. Ist citron- und schwefelgelb. Enthält 59,37 Uranoryd, 5,66 Kalkerde, 14,63 Phosphorsäure und 14,9 Wasser. Löst sich in Borax und Phosphorsalz zu einem gelben Glase auf, das nach der Reduction unter der Abkühlung schön grün wird.

Findet sich in einzelnen und zu Drusen versammelten Crystallen auf Eisensteingängen zu Antun im Dep. der Saône und Loire, zu St. Vrieux bey Limoges, zu Bodenmais in Bayern, zu Eisensbach, unsern Donaueschingen auf dem Schwarzwalde.

2. **Chalkolit. Kupfer-Uranglimmer.** Besteht aus dreiviertel-phosphorsaurem Uranoryd-Kupferoryd. Grün; zeisig-, apfel-, gras- und smaragdgrün. Enthält 60,35 Uranoryd, 8,44 Kupferoryd, 15,56 Phosphorsäure und 15,05 Wasser. Das mit Borax und Phosphorsalz erhaltene Glas wird nach der Reduction bey der Abkühlung roth, am leichtesten, wenn dabey etwas Zinn angewendet wird.

Findet sich in ausgezeichneten Abänderungen, schön gruppirten Crystallen und verben, blätterigen Massen, zu St. Austle und in der Gegend von Redruth in Cornwall. Weniger ausgezeichnet zu Eibenstock, Schneeberg und Johanngeorgenstadt in Sachsen, auf den Gruben Sophie und Anton bey Wittichen im Schwarzwalde und bey Baltimore in Nordamerica.

2. Geschlecht. Kobaltblätthe.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Eine gewöhnliche Combination ist der Fig. 30. S. 62 ähnlich. Oberfläche des verticalen Prismas vertical gestreift. Theilbarkeit nach b, Fig. 30, sehr vollkommen. $H. = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. $= 2,9 \dots 3,0$; Diamantglanz; glasartiger, auf der Theilungsfläche Perlmutterglanz; roth, kermesin-, cochenill- und pfirsichblüthroth bis röthlichweiß; durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Dünne Crystalle sind in gewissen Richtungen biegsam. Besteht aus wasserhaltigem, zweydrittel-arseniksaurem Kobaltoryd, und enthält 39 Kobaltoryd, 37 Arseniksäure und 22 Wasser. Gibt im kochenden Wasser aus, riecht, auf Kohle geschmolzen, nach Arsenik; färbt die Glasse schön blau.

Bildet theils Crystalle, welche meist haar- oder nadelförmig und in büschel- und sternförmige Gruppen geordnet sind, theils kugelige, trübige, niereenförmige Gestalten mit drüsiger Oberfläche und dünnslängeliger oder faseriger Zusammensetzung, öfters auch erdigen Ueberzug oder Beschlag. Ist das Product der Oxydation von Arsenik-Kobalt.

Ihre Vorkommen ist an dasjenige anderer Kobalterze gebunden, daher sie sich nur auf Kobaltlagerstätten findet, wie zu Saalfeld und Glücksbrunn in Thüringen, zu Riegersdorf in Oessen, zu Schneeberg und Annaberg in Sachsen, zu Wittichen im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, Allevard im Dauphiné.

Eine der Kobaltbläthe ganz ähnliche, und unter gleichen Verhältnissen vorkommende Substanz, besteht aus einer Verbindung von Kobaltoxyd und arsenichter Säure. Sie unterscheidet sich von der Kobaltbläthe dadurch, daß sie, im Kölbchen geglüht, ein weißes Sublimat gibt.

3. Geschlecht. Nickelbläthe,

Syn. Nickelgrün, Nickeloeder.

Haarförmige Crystalle, auch verb, eingesprenzt, als Ueberzug und Beschlag. Reich und zerreiblich; apfel-, zeisiggrün und grünlichweiß. Besteht aus wasserhaltigem, halb-arseniksaurem Nickeloxyd, und enthält 36,20 Nickeloxyd, 36,80 Arseniksäure und 25,50 Wasser. Gibt, im Kölbchen geglüht, Wasser aus, auf Kohle Arsenikdämpfe. Löst sich im Borax zu einem dunkelgelben Glase auf, das durch Zusatz von etwas Salpeter blau wird.

Ist das Product der Oxydation von Arsenik-Nickel, und findet sich als secundäres Erzeugniß, wo dieses Mineral vorkommt, wie zu Riegersdorf in Oessen, Wittichen im Schwarzwalde, Allevard im Dauphiné u.s.w.

III. Ordnung. Schwefelerze.

Verbindungen von schweren Metallen mit Schwefel und analogen Stoffen.

1. Eigenschaft der Riese.

1. Geschlecht. Schwefelkies.

Syn. Eisenties, Pyrit, Markasit.

Crystallsystem regulär, hemikubisch. Die auftretenden Halbfächer haben parallele Flächen. Die wichtigsten einfachen Gestalten sind der Würfel, das Octaëder, das Pyritoëder, Fig. 12. S. 47, das Tetratetraëder, Fig. 10. S. 45, und das Hemioctaëder, Fig. 183. Von diesem

Fig. 183.




Fig. 184.





Fig. 185.



gleich sind, indem die acht Octaëderflächen wohl als gleichseitige

kommt der Würfel und das Pyritoëder am häufigsten vor. Von den zahlreichen Combinationen erscheint besonders häufig die Combination des Würfels mit dem Pyritoëder, dessen Flächen schiefe Abstumpfungen der Würfelkanten bilden, so daß immer zwei gegenüberliegende Abstumpfungsflächen über dieselbe Würfelfläche geneigt sind, Fig. 184. Desfers kommen der Würfel, das Octaëder und das Pyritoëder zusammen vor; diese Gestalt hat Aehnlichkeit mit Fig. 86. S. 225, zugeacht, daß sämtliche Ecken durch die o Flächen abgestumpft sind. Eine Combination des Octaëders mit dem Pyritoëder ist ähnlich Fig. 7. S. 41, wenn das Octaëder vorherrscht. Die Pyritoëderflächen bilden am Octaëder Zuschärfungen der Ecken. Stehen die Flächen beider Gestalten im Gleichgewicht, so bilden sie das Tetratetraëder Fig. 185, welches der gleichnamigen Gestalt der Geometrie ähnlich sieht, dessen Flächen aber nicht

Bildet theils Crystalle, welche meist haar- oder nadelförmig und in büschel- und sternförmige Gruppen geordnet sind, theils kugelige, trübige, nierenförmige Gestalten mit drüsiger Oberfläche und dünnfädiger oder faseriger Zusammensetzung, öfters auch erdigen Ueberzug oder Beschlag. Ist das Product der Oxydation von Arsenik-Kobalt.

Ihr Vorkommen ist an dasjenige anderer Kobalterze gebunden, daher sie sich nur auf Kobaltlagerstätten findet, wie zu Saalfeld und Glücksbrunn in Thüringen, zu Riegersdorf in Hessen, zu Schneeberg und Annaberg in Sachsen, zu Wittichen im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, Allemont im Dauphiné.

Eine der Kobaltbläthe ganz ähnliche, und unter gleichen Verhältnissen vorkommende Substanz, besteht aus einer Verbindung von Kobaltoryd und arsenichter Säure. Sie unterscheidet sich von der Kobaltbläthe dadurch, daß sie, im Kölbchen geglüht, ein weißes Sublimat gibt.

3. Geschlecht. Nickelbläthe,

Syn. Nickelgrün, Nickelsäuer.

Haarförmige Crystalle, auch verb, eingesprengt, als Ueberzug und Beschlag. Weich und zerreiblich; apfel-, zeisigrün und grünlichweiß. Besteht aus wasserhaltigem, halb-arseniksaurem Nickeloryd, und enthält 36,20 Nickeloryd, 36,90 Arseniksäure und 25,50 Wasser. Gibt, im Kölbchen geglüht, Wasser aus, auf Kohle Arsenikdämpfe. Löst sich im Borax zu einem dunkelgelben Glase auf, das durch Zusatz von etwas Salpeter blau wird.

Ist das Product der Oxydation von Arsenik-Nickel, und findet sich als secundäres Erzeugniß, wo dieses Mineral vorkommt, wie zu Riegersdorf in Hessen, Wittichen im Schwarzwalde, Allemont im Dauphiné u.s.w.

III. Ordnung. Schwefelerze.

Verbindungen von schweren Metallen mit Schwefel und analogen Stoffen.

1. Sippschaft der Riese.

1. Geschlecht. Schwefellies.

Syn. Eisenlies, Pyrit, Markasit.

Krystallsystem regulär, hemiëdrisch. Die auftretenden Halbfächer haben parallele Flächen. Die wichtigsten einfachen Gestalten sind der Würfel, das Octaëder, das Pyritoëder, Fig. 12. S. 47, das Jcositetraëder, Fig. 10. S. 45, und das Hemioc-

Fig. 183.




Fig. 184.





Fig. 185.



taëder, Fig. 183. Von diesem kommt der Würfel und das Pyritoëder am häufigsten vor. Von den zahlreichen Combinationen erscheint besonders häufig die Combination des Würfels mit dem Pyritoëder, dessen Flächen schiefe Abstumpfungen der Würfelfanten bilden, so daß immer zwey gegenüberliegende Abstumpfungsflächen über dieselbe Würfelfläche geneigt sind, Fig. 184. Oefers kommen der Würfel, das Octaëder und das Pyritoëder zusammen vor; diese Gestalt hat Aehnlichkeit mit Fig. 86. S. 225, zugebacht, daß sämtliche Ecken durch die o Flächen abgestumpft sind. Eine Combination des Octaëders mit dem Pyritoëder ist ähnlich Fig. 7. S. 41, wenn das Octaëder vorherrscht. Die Pyritoëderflächen bilden am Octaëder Zuschärfungen der Ecken. Stehen die Flächen beider Gestalten im Gleichgewicht, so bilden sie das Jcosäzder Fig. 185, welches der gleichnamigen Gestalt der Geometrie ähnlich steht, dessen Flächen aber nicht

gleich sind, indem die acht Octaëderflächen wohl als gleichseitige

Dreiecke erscheinen, die zwölf Pyritoberflächen aber gleichschieneliche Dreiecke sind. Eine etwas zusammengekehrte Combination, des Pyritöders d, mit dem Octaöder o, dessen Flächen die geraden Abstumpfungen der Hexaëdercken bilden, und mit dem Hemioctakishezaöder s, Fig. 183, dessen Flächen an dem Pyritöder dreysflächige Zuspitzungen derselben Ecken bilden, zeigt Fig. 186.

Fig. 186.





Fig. 187.



Außer diesen gewöhnlicheren Combinationen kommen noch mehrere andere, zum Theil verwickelte, vor. Auch erscheinen zuweilen Zwillingescrystalle. Die verbundenen Individuen haben eine gemeinschaftliche Hauptachse, das eine ist gegen das andere um 90° verdreht, und sie durchkreuzen sich somit. Fig. 187 stellt einen Zwillingescrystall dar, aus Pyritöder-Individuen gebildet, das sogenannte eiserne Kreuz. Zur leichteren Unterscheidung beider Individuen ist das eine schraffirt. Außerdem hat man noch Combinationen zu Zwillingen vereinigt gefunden; namentlich auch die Combination Fig. 186.

Die Würfel-Flächen sind oft gestreift, parallel den Pyritöderkanten, die Pyritöderflächen parallel denselben Kanten,

die Flächen des Hemioctakishezaöders parallel ihren längsten Kanten oder ihren Combinationenkanten mit dem Octaöder.

Theilbarkeit nach den Würfel- oder Octaöderflächen, in verschiedener Vollkommenheit; beide zuweilen höchst unvollkommen und kaum wahrzunehmen.

$\rho = 6,0 \dots 6,5$; spec. = $4,9 \dots 5,1$; Metallglanz; speisgelb; goldgelb, messinggelb, röthlichgelb, braun und bunt durch Anlaufen. Besteht aus doppelt Schwefel-Eisen, und enthält 46,08 Eisen und 53,92 Schwefel. Riecht beim Zerbrechen schwefelig. Gibt beim Glühen im Kölbchen ein Schwefel-Sublimat. Auf Kohle entwickelt er den Geruch der schwefeligen Säure, und läßt sich zu rothem Eisenoxyd rösten. Bisweilen enthält der Schwefelkies Selen, Arsenik, Kupfer, Gold, Silber

Einige Abänderungen verwandeln sich, unter Beybehaltung der Form, in das 10 Procent Wasser enthaltende Eisenorphydrat, wobey, wenn sie goldhaltig sind, dieses Metall öfters in kleinen Blättchen darinn zu erkennen ist. Andere Abänderungen zeigen dagegen eine große Beständigkeit.

Der Schwefelkies findet sich häufig crySTALLISIRT, die Crystalle einzeln eingewachsen oder zu kugelligen und treppenförmigen Gruppen, so wie zu Drusen, verbunden. Ausgezeichnete Crystalle der Combination Fig. 184 kommen auf der Grube Herrensegen im Schwarzwald und auf Elba vor, die Hemioctäeder zu Presnitz in Böhmen und im Grosso-Thal in Piemont, und an letzterem Orte namentlich auch die Combinationen dieser Gestalt mit dem Pyritoder und Octäeder Fig. 186, so wie noch mehrere andere zusammengefestere. Die Zwillinge, Fig. 187, finden sich zu Minden und Blotho in Westphalen, und diejenigen der Combination Fig. 188 auf Elba. Crystalle, welche durch ungleichwerthige Ausdehnung der Flächen und mangelhafte Beschaffenheit der Oberfläche; Krümmung der Flächen und Abrundung der Kanten sich auszeichnen, kommen zu Almersode in Hesse vor.

Sehr häufig kommt der Schwefelkies auch in Ideniten, ins Dichte verlaufenden Zusammensetzungen vor, in Pseudomorphosen durch Ueberzug gebildet nach Quarz und Kalkspath, als Versteinerungsmasse von Schnecken und Muscheln, so wie zellig, knollig, nieren, kornig, körnig und eingesprengt. Er ist die verbreitetste metallische Substanz, und beynähe in allen Gebirgsbildungen, auf den verschiedensten Erzlagersstätten, anzutreffen, und seine Fundorte sind deshalb so allgemein und zahlreich als jene selbst. Wir unterlassen es daher deren mehrere anzuführen.

Der Schwefelkies kann mit Nutzen zur Darstellung von Schwefel benutzt werden, da er beym Glühen einen Theil davon abgibt. Man gewinnt aus ihm, durch das sogenannte Schwefelreiben, durchschnittlich 14—16 Procent Schwefel. Der Rückstand ist Einfach-Schwefelkies, oxydirt sich an der Luft mit Leichtigkeit, und wird zur Darstellung von Eisenvitriol verwendet. Ehedem wurde der Schwefelkies, vor der allgemeineren Anwendung des Feuersteins, als Flintenstein benutzt.

2. Geschlecht. Bindarkies.

Syn. Rhombischer Eiskies, Strahlkies, Wasserties,

Erythrales Eisenkies, ein- und einachsig. Die Grundgestalt, ein Rhombenoktaeder, kommt bisweilen selbstständig vor; in der Regel sind aber die Erythrales Combinationen. Die Figuren 188 und

Fig. 188.





Fig. 189.



189 stellen eine Combination dar, worin die Octaederflächen o, die Flächen des verticalen rhombischen Prismas g, die Flächen des ersten und zweiten horizontalen Prismas

d und f und die horizontale Endfläche o mit einander verbunden sind. Das verschiedene Verhalten, in welchem die verbundenen Gestalten vorherrschen, gibt den beiden ganz gleich zusammengesetzten Formen einen sehr verschiedenen Habitus. Fig. 190 stellt

Fig. 190.





Fig. 191.



eine Combination des verticalen Prismas g, der horizontalen Endfläche o und eines zweiten horizontalen Prismas r dar, welche die gewöhnliche Form der Individuen des Rammkieses ist. Fig. 191 stellt die Form der Individuen des Speerkieses vor, eine Combination des verticalen Prismas g, der Endfläche o und des zweiten horizontalen Prismas f und r. Die horizontale Endfläche und die horizontale Prismenfläche r stark

gestreift nach der kürzeren Diagonale; die Octaederflächen o öfters aniden oder drusig, die Prismenflächen g und f dagegen glatt.

Große Neigung zur Zwillingabildung. Die gewöhnlichste Zusammensetzung ist diejenige der Individuen Fig. 191, welche die eigentlichen Speerkies-Zwillinge bilden. Die Zusammensetzung

fläche parallel g , die Umbruchungsachse senkrecht darauf. Es sind häufig drei, vier und fünf Individuen mit einander verbunden, und die dadurch erzeugten Gestalten haben das Ansehen der Fig. 192.

Fig. 192.





Fig. 190.



Die Streifung ist durch die oscillatorische Combination der Flächen f , r und o hervorgebracht. Häufig kommen auch sehr regelmäßige, kammförmige Aggregate vor, Fig. 193, indem viele tafelförmige Individuen, wie Fig. 190, in der Art mit einander verbunden sind, daß ihre größeren Diagonalen nur wenig divergieren, während die Flächen e beiderseits in eine Ebene fallen. Die Flächen des Prismas g sind meist conver gebildet.

Thailbarkeit parallel g ziemlich deutlich; nach f nur spurenweis.

$\rho = 6,0 \dots 6,5$; spec. Gw. = $4,6 \dots 4,9$; Metallglanz; weisgelb,

ins Graue oder Grünliche; undurchsichtig. Besteht aus Doppelschwefeleisen, und ist somit zusammengesetzt, wie der Schwefelkies. Gerölligen und dichten Abänderungen ist eine kleine Menge Einfach-Schwefeleisen eingemengt. Dieses ist die Ursache ihrer Verwitterung, die in einer Bildung von schwefelsaurem Eisenoxyd besteht, wobei die Masse sich mit weißen Salzkristallen überkleidet und auseinander fällt, ein Vorgang, den man das *Dissoziieren* nennt, und wozu jene Varietäten eine so auffallende Neigung haben, daß man sie in den Sammlungen kaum erhalten kann.

Verhält sich vor dem Löthrohr wie Schwefelkies. Findet sich vorzüglich im Flözegebirge, weniger im Grundgebirge.

Man unterscheidet folgende Varietäten:

1. *Strahlkies*. Mehrfache Crystalle, ähnlich Fig. 188 und 189, gewöhnlich zu mancherley Gruppen verbunden, und zu faserigen, knolligen, traubigen, sternförmigen und stalaktitischen Gestalten vereinigt, die eine drüsige Oberfläche besitzen und strah-

lige oder faserige Zusammensetzung zeigen, die zum Theil mit trunnigwalliger Ablosung verknüpft ist. Münsterthal im Schwarzwalde, Freyberg und Memmendorf im Erzgebirge, Joachimsthal, Eibisch und Eblitz in Böhmen, Condé in Frankreich, Derbyshire in England.

2. **Speerkies.** Begreift die Speerspitzen ähnlichen Zwillinge, Fig. 192, aus Individuen wie Fig. 191 gebildet, welche auf der Grube Unterhaus-Sachsen bey Freyberg und zu Eibisch, Eblitz und Alsfattel in Böhmen vorkommen.

3. **Kammkies.** Erscheint am gewöhnlichsten in den hakenkammförmigen Aggregaten, welche Fig. 193 darstellt, und zeichnet sich durch eine auffallende, grünlich-speisgelbe Farbe aus. Kommt zu Andreasberg am Harze und in Derbyshire vor.

4. **Reberkies.** Umfaßt die feinförnigen und dichten Abänderungen von einer ins Graue ziehenden Farbe und sehr schwachem Glanze. Theils in kugelligen, knolligen, nierenförmigen und stalactischen Gestalten, theils verb und eingesprengt, und gar häufig als Versteinerungsmasse von Pflanzen und Mollusken, namentlich von kleineren Ammoniten. Auch in Pseudomorphosen. Ist dem Bitriolesieren im hohen Grade unterworfen. Allgemein verbreitet.

Findet sich selten auf Gängen, häufig dagegen in der Keuper- und Liasformation, und in den thonigen Ablagerungen jurassischer Formationen, so wie des tertiären Gebirges und des Diluviums; häufig auch im Steinkohlengebirge, sowohl in den Kohlenschiefern als in der Kohle selbst. Einzelne Fundorte aufzuführen ist bey solcher allgemeinen Verbreitung unnöthig.

Man benutzt den Binderkies vorzüglich zur Bitriol- und Klau-Verarbeitung. Er ist an vielen Orten thonigen Ablagerungen von Schwarz- und Braunkohle in großer Menge beigemengt. Solche Kohle zerfällt an der Luft, während Eisenvitriol und schwefelsaure Thonerde auswittern, die man, vermittelst Wasser, auszieht. Oftmals läßt sich die Kohle zuvor noch als Brennmaterial benutzen, worauf erst der Rückstand, unter Befeuchtung, an der Luft der Bitriolesierung überlassen wird. Diese geht im dem Falle, nach vörangegangenem Brennen der Kohle, erst recht gut von Statten, wenn der Kiesgehalt etwas gering, oder seine

Beschaffenheit sehr dicht, und der des gemeinen Schwefelkieses ähnlicher ist. Derartige kieshaltige Kohle verarbeiten die Vitriol- und Alaunwerke zu Buxweiler im Elsaß, zu Gaildorf und Deben-
dorf in Schwaben, zu Friesdorf und Nüßchen bey Bonn u.s.w. In England sind, zumal in Yorkshire, bey Whitby, erdige Lias-
schichten so sehr mit diesem Kies imprägnirt, daß sie mit großem
Nutzen auf Alaun verarbeitet werden, der auch von Whitby aus
über London in großen Massen nach Schweden und Rußland ver-
sendet wird.

Während der Binärkies vitriolesciert, wird Wärme erzeugt,
und die Temperatur steigt oft, zumal bey größeren Massen, bis
zur Entzündung. Feuchtigkeit befördert diese Umwandlung außer-
ordentlich, und deshalb kann man gerade durch Wasser, durch
Befeuchtung kieseliger Thon- oder Kohlenmassen, diese zum wahren
Erglätzen bringen. An der Küste von Yorkshire löste sich vor
mehreren Jahren eine große, kieselige Liasmasse ab, fiel auf den
Strand, wurde hier von den Wellen benetzt, vom Meerwasser
durchdrungen, und gerieth, in Folge der dadurch außerordentlich
rasch eintretenden und vor sich gehenden Vitriolescirung, in voll-
ständiges Erglätzen, und brannte einige Jahre fort, bis alle brenn-
baren Theile des Felsens verzehrt waren. Manchmal gelangt die-
ser vitriolescirende Kies selbst in Steinkohlengruben, wo er der
Kohle eingemengt ist, und Haufen von Kohlenklein längere Zeit
dem Einfluß der Luft und der Feuchtigkeit preisgegeben sind, zu
Zersetzung, und bewirkt dadurch sogar Entzündung von Kohlen-
massen, ja verderblichen Grubenbrand, wobey ganze Kohlenflöße
ins Glätzen gerathen und mit äußerster Heftigkeit Jahre lang
fortbrennen.

3. Geschlecht. Magnetikies.

Syn. Rhomboidrischer und hexagonaler Eisenkies.

Crystallsystem drey- und einachsig. Die sehr selten deutlichen
Crystalle sind tafelartige, sechsseitige Prismen mit horizontaler
Endfläche, tafelartige Hexagontodocaeäder mit dieser verbunden,
oder eine Combination des Prismas mit dem Dodecaeder. Beide
Gestalten bisweilen horizontal gestreift.

Theilbarkeit parallel der Endfläche ziemlich vollkommen; nach dem Prisma unvollkommen.

ρ . = 3,5 ... 4,5; spec. Gew. = 4,5 ... 4,7; Metallglanz; bronzegelb, oft braun angelaufen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig; magnetisch, gewöhnlich. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Schwefeleisen mit Doppelt-Schwefeleisen, in welcher gewöhnlich 6 M.-G. des ersteren mit 1 M.-G. des letzteren verbunden sind, in welchem Falle das Mineral 39,85 Eisen und 40,15 Schwefel enthält. Es sind diese beiden Sulfurete aber auch noch in anderen Verhältnissen mit einander zu Magnetkies verbunden, da man bereits solche kennt, welche 44 Procente Schwefel enthalten. Nicht beym Glühen nach schwefeliger Säure, löst sich in Salzsäure zum größten Theil auf, unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff.

Findet sich gewöhnlich verb und eingesprengt in blätterigen, körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensetzungen, auf Lagern und Gängen im Grünschiefergebirge und eingemengt in Gesteine. So zu Bodenmais in Bayern, Breitenbrunn und Seyr in Sachsen, Querbach in Schlesien, Val-Sugana in Südtirol, Obdach in Steyermark, Fahlun und Nyä-Kopparsberg in Schweden. Auf Gängen kommt er zu Andreasberg und Rongsberg vor, und im Grünschiefer bey Treseburg am Harz; dem Serpentin eingemengt zu Lodsmoos und bey St. Blästen im Schwarzwalde; in granitischen Gesteinen an der Valadetta und bey Bagndres-Luchon, in Glimmerschiefer am Pic de Midi de Bigorre, in dioritischen Gesteinen zu Baréges in den Pyrenäen, in doleritischen am Kaiserstuhl im Breisgau. Sehr interessant ist dessen Vorkommen in den Meteorsteinen von Stannern und Juvenas.

Der Magnetkies wird nach vorangegangener Röstung auf Eisenvitriol benutzt.

4. Geschlecht. Arsenikkies.

Syn. Prismatischer Arsenikkies.


Erythrasystem ein- und einachsfig. Die Erythras sind gewöhnlich eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g mit dem zweyten horizontalen Prisma f umstehender Fig. 194. Sind beide Gestalten im Gleichgewicht, so sind die Erythras tafelförmig,

Fig. 194.



deren Individuen parallel; einem ersten horizontalen Prisma verbunden sind, welches als Abstumpfungsfäche des stumpferen Ecks an Fig. 194 erscheint. Die Individuen durchkreuzen sich, indem

Fig. 195.



bey vorherrschenden Prismenflächen g säulenartig. Die Seitenflächen dieses Prismas sind öfters concav; das horizontale Prisma ist nach der kürzeren Diagonale stark gestreift.

Häufig kommen auch Zwillinge vor, deren Individuen parallel; einem ersten horizontalen Prisma verbunden sind, welches als Abstumpfungsfäche des stumpferen Ecks an Fig. 194 erscheint. Die Individuen durchkreuzen sich, indem ihre längeren Achsen zusammenfallen, und die kürzeren mit einander einen Winkel machen, Fig. 195.

Theilbarkeit parallel g ziemlich deutlich.

$\rho = 5,5 \dots 6,0$; spec. Gew. $= 6,0 \dots 6,2$; Metallglanz; silberweiß, bis lichtstahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus 1 M.-G. Dopp-

pelt-Schwefeleisen und 1 M.-G. Doppelt-Arsenikleisen, und enthält 36,04 Eisen, 21,09 Schwefel und 42,88 Arsenik. Gibt beym Glühen auf Kohle starken Arsenikgeruch nebst Schwefelgeruch; beym Glühen im Kölbchen gibt er erst ein gelbes Sublimat von Schwefel-Arsenik, und später ein graues metallisches von Arsenik.

Findet sich theils crystallisirt, theils verb, in verworren stängeliger oder körniger, ins Dichte übergehender Zusammensetzung, theils eingesprengt, auf Gängen und Lagern zu Freyberg, Altenberg, Joachimsthal, Ehrenfriedersdorf, Münzig, Geyer, Zinnwald, Schlackenwalde, zu Andreasberg und am Rammelsberg am Harz, zu Zalatna in Siebenbürgen, im Canton Valais in der Schweiz, auf den Zinnerzagerstätten in Cornwall, im Serpentin eingesprengt zu Todtmoos im Schwarzwalde u. a. a. D.

Der Arsenikkies wird zur Darstellung von Auripigment und weißem Arsenik benützt. Der silberhaltige Arsenikkies von Bräunsdorf bey Freyberg, welchen Werner Weißerz genannt hatte, wird auf Silber verarbeitet.

5. Geschlecht. Arsenikalkies.

Syn. Xrotomer Arsenikkies.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle gerade rhombische Prismen, durch die Flächen des ersten horizontalen Prismas an den Enden zugespitzt, ähnlich Fig. 181. Theilbarkeit parallel einer geraden Endfläche, vollkommen. Die Prismen parallel ihren Combinationskanten gestreift.

H. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,2 ... 7,3; Metallglanz; silberweiß, ins Strahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenik-Eisen, und enthält bisweilen eine Beimengung von Schwefel-Eisen, so wie von Arsenik-Nickel und Arsenik-Kobalt. Der Reichensteiner Arsenikkies enthält 32,35 Eisen, 65,88 Arsenik und 1,77 Schwefel. Er gibt beim Glühen im Kölbchen ein sehr geringes Sublimat von Schwefel-Arsenik, und verhält sich im Uebrigen wie Arsenikkies.

Findet sich verb. und crystallisirt auf Spathseisensteinlagern in der Böbling bey Hüttenberg in Kärnthen und zu Schladming in Steyermark, lager- und nesterweise im Serpentin zu Reichenstein in Schlesien.

Wird, vorzüglich zu Reichenstein, zur Darstellung von metallischem und weißem Arsenik benutzt.

6. Geschlecht. Haarkies.

Art, haarförmige Crystalle, dem brey- und einachsigen Crystallsystem angehörig, sechsseitige Prismen von messinggelber Farbe, metallischem Glanze und ungefähr 3,0 Härte und 5,2 spec. Gew.

Besteht aus Einfach-Schwefel-Nickel, und enthält 64,8 Nickel und 35,2 Schwefel. Gibt, in einer offenen Röhre geglüht, den Geruch nach schwefeliger Säure aus. Löst sich in Königswasser; die Lösung wird durch einen Ueberschuß von Ammoniak saphirblau. Findet sich zu Joachimsthal in Böhmen, zu Schußbach am Westerwalde und auf Abendröthe bey Andreasberg.

7. Geschlecht. Kupfernickel.

Syn. Prismatischer Nickelties.

Crystallsystem brey- und einachsfig. Die Crystalle sind kurze, sechsseitige Prismen durch die Flächen eines Dodecaëders zugespitzt. Theilbarkeit nicht ausgemittelt.

ρ . = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,5 ... 7,7; Metallglanz; kupferroth, licht; braun und schwarz durch Anlaufen. Besteht aus Einfach-Arsenik-Nickel, und enthält 44,21 Nickel, 54,72 Arsenik nebst kleinen Quantitäten Eisen, Blei, Schwefel und Kobalt. Liecht beym Glühen stark nach Arsenik, verhält sich nach starker Röstung wie Nickeloryd, und zeigt gewöhnlich eine schwache Kobaltreaction.

Findet sich höchst selten in, gewöhnlich undeutlichen, Crystallen, in der Regel derb und eingesprengt, auch in kugeligen, traubigen, nierenförmigen und stalactitischen Gestalten, welche mitunter eine Andeutung faseriger Structur erkennen lassen. Kommt vorzüglich auf Kobalt- und Silbergingen vor, zu Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Freyberg in Sachsen, Andreasberg am Harze, Joachimsthal in Böhmen, Riegersdorf in Hessen, Saalfeld in Thüringen, Biber im Hanauischen, Wittichen im Schwarzwalde, Schladming in Steyermarl, Wallis in der Schweiz, Dronowa im Bannat, Allevard in Frankreich, auch in Cornwall und Schottland. Wird zur Darstellung von Nickel-Metall benutzt, das in neuerer Zeit sehr vortheilhaft zur Argentanfabrication und zu einigen anderen Legierungen verwendet wird.

8. Geschlecht. Arseniknickel.

Syn. Weißmetallkies.

Crystallform nicht bestimmt; derb; Theilbarkeit undeutlich; ρ . etwa 5,0; spec. Gew. 7,1 ... 7,2; Metallglanz; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenik-Nickel, und enthält 28,14 Nickel, 71,30 Arsenik. In kleinen Quantitäten ist Schwefelkupfer und Schwefelwismuth, oder Arsenik-Eisen und Kobalt eingemengt. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Kupfernickel, und zeigt überdieß die Reactionen der Einkommungen.

Findet sich zu Schneeberg in Sachsen und auf der Eisensteingrube Hasselhau bey Zanne am Harze.

9. Geschlecht. Antimonnickel.

Crystallsystem nicht genau bestimmt. Erscheint in kleinen, dünnen Tafeln, welche scheinbar regulär sechsseitig sind, einzeln

und an einander gereiht auftreten; auch in crystallinischen, denbritischen Parthien und eingesprengt. $H. = 5,0$; spec. Gew. ? Metallglanz; lichtkupferroth ins Blaue, außen wie innen; Strich röthlichbraun. Besteht aus Einfach-Antimon-Nickel, und enthält 29,92 Nickel, 68,73 Antimon und eine Einmischung von 0,96 Eisen und 6,43 Schwefelbley. Ist also dem Kupferrnickel analog zusammengesetzt, dessen Arsenik hier durch Antimon ersetzt ist. Gibt, auf Kohle geglüht, starken Antimonrauch; löst sich in Königswasser; die Lösung wird durch einen Ueberschuß von Ammoniak blau.

Findet sich zu Andreasberg auf dem sogenannten Andreaßer Ort, begleitet von Kalkspath, Bleiglanz und Speiskobalt.

10. Geschlecht. Speiskobalt.

Syn. Octaëdrischer Kobaltkies.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Würfel, Octaëder und Verbindungen dieser Gestalten unter einander, so wie mit dem Rautendodecaëder und dem Tetratetraëder. Die Würfel sind bisweilen in der Richtung einer, durch die entgegengesetzten Ecken laufenden, Achse in die Länge gezogen, prismatisch verlängert, wodurch das Ansehen der Crystalle rhomboëdrisch wird. Solche Individuen sind zuweilen zu Zwillingen verbunden, deren Zusammensetzungsfläche parallel ist einer Hexakisoctaëderfläche in Fig. 125. S. 252. Die Oberfläche der Würfel oft convex oder unregelmäßig gekrümmt; die Crystalle bisweilen wie zersprungen. Theilbarkeit parallel den Würfelflächen, sehr unvollkommen.

$H. = 5,5$; spec. Gew. 6,3 ... 6,6; Metallglanz; zinnweiß bis stahlgrau; dem Anlaufen unterworfen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenik-Kobalt, dem kleine Quantitäten von Arsenik-Nickel und Eisen, so wie Schwefel-Eisen und Kupfer eingemengt sind. Der weiße Speiskobalt von Riegeisdorf enthält 74,21 Arsenik, 20,31 Kobalt, 3,42 Eisen, 0,15 Kupfer und 0,88 Schwefel; der graue Speiskobalt von Schneeberg enthält 70,37 Arsenik, 13,95 Kobalt, 11,71 Eisen, 1,79 Nickel, 1,39 Kupfer, 0,01 Bismuth, 0,66 Schwefel. Gibt beym Glühen starken Arsenikrauch; färbt die Fläße smaltteblau.

Findet sich theils crystallisirt, die Crystalle in Drusen ver-

sammelt, theils in ausgezeichneten gestrickten, staubenförmigen und baumförmigen Gestalten, theils endlich verb und eingesprengt, und von körniger ins Dichte verlaufender Zusammensetzung. Kommt auf Gängen vor mit Silber- und Kupfererzen, Kupfernickel, vorzüglich zu Schneeberg und Joachimsthal im Erzgebirge (an ersterem Orte, namentlich auch auf der Grube Daniel, eine ständige Abänderung und in Zwillingserystallen), zu Riegersdorf in Hessen, Wiber im Hanauischen, Wittichen im Schwarzwalde (hier insbesondere eine dichte graue Abänderung). Zu Schlading in Steyermark und zu Drawiza in Ungarn bricht er auf Lagern ein. Weitere Fundorte sind Freyberg, Annaberg, Marienberg, Saalfeld, Städtelbrunn, Andreasberg, das Sayn'sche, Siegen'sche, Cornwall, Schweden und einige andere Gegenden.

Wird zur Smaltebereitung verwendet, und ist dieserwegen und bey seinem im Ganzen sparsamen Vorkommen ein sehr geschätztes Erz.

11. Geschlecht. Kobaltkies.

Syn. Isometrischer Kobaltkies.

Erystallsystem regulär. Die Erystalle sind Octaëder, bisweilen in Combination mit Würfelflächen. Theilbarkeit in Spuren wahrnehmbar nach beiderley Flächen.

* ρ . = 5,5; spec. Gew. 4,9 ... 5,0; Metallglanz; zinnweiß ins Stahlgrau geneigt; mitunter gelblich und röthlich angelauten; Strich grau; undurchsichtig. Besteht aus Unterhalb-Schwefelkobalt, gemengt mit etwas Schwefel-Kupfer und Schwefel-Eisen, und enthält Kobalt 53,35, Schwefel 42,25, Eisen 2,20, Kupfer 0,97. Gibt bey'm Bläsen den Geruch der schwefeligen Säure aus und kein Arsenik. Färbt die Glasse smaltelau. Schmilzt im Reductionsfeuer zu einer magnetischen Kugel.

Findet sich theils erystallförmig, theils verb mit körniger Zusammensetzung auf einigen Gruben bey Wäsen im Siegen'schen, und ist auch zu Eoos in Helsingland und auf der Vastnäsgrube bey Ritdarshyttan in Schweden vorgekommen.

Ist das reichste Kobalterz, kommt aber nur in geringer Menge vor.

12. Geschlecht. Glanzkobalt.

Syn. Dodecaëdrischer Kobaltkies.

Crystallsystem regulär, hemiëdrisch. Die Crystalle sind Würfel, Octaëder, Combinationen beider, Pyritoëder der Fig. 12, S. 47, Combination dieser Gestalt mit dem Octaëder Fig. 7, S. 41, und Fig. 185, S. 399, mit dem Würfel Fig. 184, S. 399, und mit diesem und dem Octaëder. Die Würfel Flächen gestreift parallel den Pyritoëderkanten. Theilbarkeit nach den Würfel Flächen vollkommen.

ρ . = 5,5; spec. Gew. = 6,0 ... 6,01. Metallglanz; silberweiß ins Röthliche, öfters röthlichgrau angelauten; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Doppelt-Schwefel-Kobalt mit Doppelt-Arsenik-Kobalt, und enthält 33,10 Kobalt, 43,46 Arsenik, 20,08 Schwefel und 3,23 Eisen. Gibt beim Rösten in einer offenen Röhre arsenichte Säure und schwefelige Säure aus; färbt die Gläser smaltetblau.

Findet sich gewöhnlich crystallisirt, auch verb und eingesprenkt, von körniger Zusammensetzung, auf Lagern und Gängen im Grundgebirge zu Tunaberg und Häkanbo in Schweden, zu Stutterud in Rodums Kirchspiel in Norwegen. Ein Haupterz zur Smaltbereitung.

13. Geschlecht. Nickelglanz.

Syn. Weißes Nickelerz.

Crystallsystem regulär, hemiëdrisch. Die Crystalle sind Combinationen des Pyritoëders mit dem Octaëder. Theilbarkeit nach den Würfel Flächen.

ρ . = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 6,1 ... 6,3; Metallglanz; lichtbleygrau, dem Zinnweißen sich nähernd; stark anlaufend, und dadurch äußerlich oftmals schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Doppelt-Schwefel-Nickel mit Doppelt-Arsenik-Nickel, und enthält 29,94 Nickel, 45,37 Arsenik, 19,34 Schwefel, nebst 4,11 Eisen und 0,92 kupferhaltigem Kobalt. Decrepitiert beim Erhitzen, gibt beim Glühen viel Schwefel-Arsenik aus. Die geglühte Probe sieht wie Kupfernickel aus, und gibt mit den Flüssigkeiten dieselben Reactionen.

Findet sich auf den Loos-Robaltgruben in Schweden, auf der Grube Albertine bey Harzgerode am Harz.

14. Geschlecht. Spießglanznickelies.

Syn. Nickelspießglanzerz.

Erythallsystem regulär. Die Erythalle sind Würfel. Theilbarkeit nach den Flächen desselben, vollkommen.

D. = 5,0; spec. Gew. = 6,2 ... 6,5; Metallglanz; bleigrau, ins Stahlgrau, durch Anlaufen dunkler; Strich graulich-schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Doppelt-Schwefelnickel mit Doppelt-Spießglanznickel, woben öfters mit dem Spießglanz das diesem isomorphe Arsenik in die Zusammensetzung eingeht, und enthält Nickel 27,36, Schwefel 15,98, Spießglanz 55,76; in einer andren Abänderung wurde gefunden: Nickel 25,25, Schwefel 15,24, Spießglanz 47,75, Arsenik 11,75. Gibt beym Rösten in der offenen Röhre starken Antimonrauch, im Fall eines Arsenikgehaltes auch Arsenikrauch, und den Geruch der schwefeligen Säure. Die geröstete Probe gibt mit Königswasser eine Auflösung, welche durch einen Ueberschuß von Ammoniak blau wird.

Findet sich gewöhnlich verb auf Gängen im Uebergangsgewirge auf der Grube Jungfrau bey Gosensbach, Aufgeklärt Glack bey Eiseru, Landkrone bey Wilkendorf im Siegenschen, auf der Grube Friedrich Wilhelm zu Greusburg im Saynischen und auf einigen Spatheisensteingruben bey Kobenstein im Fürstenthum Neuf.

15. Geschlecht. Kupferies.

Erythallsystem zwey- und einachsig, hemikrystisch. Die Grundgestalt, ein quadratisches Octaëder, tritt selbstständig auf, öfters säulenartig verlängert oder tafellartig verkürzt, and nicht selten ist die eine Hälfte der Flächen gegen die andere vorherrschend entwickelt, o und o', wodurch die Gestalt einen tetraëdrischen Habitus erhält, wie umstehende Fig. 196. Mit dem Grundoctaëder ist öfters ein zweiteres, sphärisches 2o verbunden, Fig. 197, ferner eine gerade Endfläche c, Fig. 198, auch ein stumpferes Octaëder o'', Fig. 199. Auch kommen noch Flächen

Fig. 196.




Fig. 197.




Fig. 198.





Fig. 199.



von anderen Octaëdern vor, die spitzer oder stumpfer sind als *o* so wie die Flächen des ersten und zweiten quadratischen Prismas. Die Octaëderflächen gestreift parallel den Combinationskanten mit *2o*; die Prismenflächen horizontal. Große Neigung zur Zwillingbildung, so daß einfache Gestalten selten sind. Die Zusammensetzungsfläche parallel einer Fläche von *o*, oder parallel einer Fläche eines stumpferen Octaëders; auch kommen

Durchkreuzungs-Zwillinge vor, durch tetraëdrische Individuen gebildet.

Theilbarkeit parallel dem spitzeren Octaëder *2o* ziemlich vollkommen; nach *c* unvollkommen.

$\rho = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. = $4,1 \dots 4,3$; Metallglanz; messinggelb, häufig bunt angelaufen; Stein grünlichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Schwefel-Kupfer mit Einfach-Schwefel-Eisen, und enthält 34,40 Kupfer, 30,47 Eisen, Schwefel 35,37. Gibt beim Rösten schwefelige Säure aus, färbt die Gläser grün, welche nach der Behandlung im Reductionsfeuer unter Hinzufuß bei der Abkühlung roth werden. Schmilzt zu einem dem Magnete folgenden Korn.

Findet sich theils crystallisirt in kleinen, häufig verzerrten Crystallen, die bald einzeln aufgewachsen, bald zu Gruppen und Druisen verbunden sind, theils in nierenförmigen, traubigen und stalactitischen Gestalten, am häufigsten aber dach und eingesprengt. Sehr verbreitet. Kommt auf Gängen und Lagern in den verschiedensten Gebirgsbildungen vor, begleitet von anderen Kupfererzen oder den verschiedensten Mineralien; so in Sachsen in

Freiberg, zumal auf den Gruben Kyrprinz, Bescheret-Glück, Junge hohe Birke, am Harz zu Lauterberg und Goslar, in Thüringen zu Ramsdorf und Mannsfeld, im Schwarzwalde zu Schapbach und Rippoltsau, im Siegenschen zu Eisfeld, in Nassau zu Dillenburg, in Südtirol am Monte Mulatto bey Predazzo, in England auf Anglesea, in Cornwall und Derbyshire, in Irland zu Wicklow, in Schweden zu Fahlun, in Norwegen zu Åræa und Arendal, in Ungarn, Sibirien und vielen anderen Ländern.

Ist eines der wichtigsten Kupfererze, und wird zur Darstellung des metallischen Kupfers benutzt.

16. Geschlecht. Zinnfies.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Würfel. Theilbarkeit parallel den Flächen derselben und ihren Diagonalen.

$\rho = 4,0$; spec. Gew. = 4,3; Metallglanz; stahlgrau, ins Messinggelbe geneigt; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Halb-Schwefel-Kupfer und Einfach-Schwefel-Zinn, und enthält Kupfer 30,0, Zinn 26,5, Schwefel 30,5, nebst einer Einmischung von 12,0 Eisen. Riecht beym Glühen an der Luft nach schwefeliger Säure, wird auf der Oberfläche weiß von Zinnoxyd, und gibt mit den Säuren die Kupfer- und Eisenreaction.

Findet sich gewöhnlich verb., höchst selten in Crystallen zu St. Agnes in Cornwall.

17. Geschlecht. Buntkupfererz.

Syn. Octaëdrischer Kupferfies.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Würfel und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaëder; auch Zwillinge, die Zusammensetzungsfläche eine Octaëderfläche, Umdrehungsachse senkrecht darauf, und Durchkreuzungen wie Fig. 33. S. 65. Oberfläche rauh, zum Theil gekrümmt. Theilbarkeit nach den Octaëderflächen, sehr unvollkommen.

$\rho = 3,9$; spec. Gew. = 4,9 ... 5,1; Metallglanz; Farbe ein Mittel zwischen bronzegelb und kupferroth; läuft sehr schnell an, bunt, roth, blau, braun; Strich schwarz; undurchsichtig.

Besteht aus einer Verbindung von Halb-Schwefel-Kupfer mit Einfach-Schwefel-Eisen, und enthält Kupfer 61,07, Eisen 14,00, Schwefel 23,75. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Kupferkies. Färbt, mit Salzsäure befeuchtet, beim nachherigen Glähen die Löthrohrflamme schön blau.

Findet sich gewöhnlich verb, höchst selten crystallisirt, eingesprengt und in Platten von körniger, ins Dichte verlaufender Zusammensetzung, auf Gängen und Lagern zu Redruth in Cornwall, zu Dronow im Bannat, zu Fahlun in Schweden, zu Hittertalen und Arendal in Norwegen, zu Saalfeld und Ramsdorf in Thüringen, zu Leogang in Salzburg, Annaberg und Freyberg in Sachsen, in Sibirien, zu Pereguba im russischen Lappland und in Nordamerica.

Wie mit andern Kupfererzen verhältet.

2. Eigenschaften der Glanze.


1. Geschlecht. Kupferglanz.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle sind kurze, verticale, rhombische Prismen g, häufig combinirt mit der zweyten Seitenfläche b, der horizontalen Endfläche c, den Grund-octaëdersflächen o, den Flächen des zweyten horizontalen Prismas f und den Flächen eines stumpferen Octaëders $\frac{o}{2}$, Figur 200.

Fig. 200.



Fig. 201.



Auch kommt das Prisma g bloß mit der Seitenfläche b und der Endfläche c combinirt vor, wobei die Crystalle kurz säulenartig oder tafelförmig sind, und einem regulären sechsseitigen Prisma sehr ähnlich sehen, Fig. 201.

Die Flächen f und b stark horizontal gestreift. Auch Zwillinge; die Zusammensetzungsfläche parallel einer Fläche g. Die Zusam-

mensetzung bisweilen an beiden Seiten eines Individuums ausgeführt, bringt Zwillinge und Drillinge hervor, wie am Aragon und Weißbleierz. Eine andere Zusammensetzung findet nach dem kumpferen Octaeder $\frac{2}{3}$ statt, und bildet Durchkreuzungs-Zwillinge. Theilbarkeit nach g höchst vollkommen.

ρ . = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,4 ... 5,7; Metallglanz; schwärzlichbleygrau, bisweilen bunt angelaufen; Strich schwarz; undurchsichtig, milde in hohem Grade; besteht aus Halb-Schwefelkupfer, und enthält 79,50 Kupfer, 19,0 Schwefel nebst etwas Eisen. Riecht beim Glähen nach schwefeliger Säure; schmilzt leicht, kocht auf und stößt glühende Tropfen aus; gibt mit Soda ein Kupferkorn.

Findet sich selten deutlich crystallisirt, meist derb, eingesprengt, in Platten, knollig und wulstig, auch als Versteinerungsmittel von Pflanzen (Frankenberger Kornähren).

Kommt auf Gängen und Lagern vor, und eingesprengt in bituminöse Mergelschiefer. Ausgezeichnete Fundorte sind: mehrere Gruben in der Nähe von Rebruth in Cornwall für crystallisirte Abänderungen; für derbe das Limeswarer Bannat, Cornwall und die Gegend von Katharinenburg in Sibirien; für knollige u.s.w. das Mergelschiefergebirge im Mannsfeldischen. Die Frankenberger Kornähren finden sich zu Frankenberg in Hessen. Als weitete Fundorte können angeführt werden: Kupferberg und Rubelstadt in Schlesien, Freyberg und Gießhübel in Sachsen, Kapnik in Ungarn, Rongberg und Nardal in Norwegen, das Siegensche u. m. a. G. Wird mit anderen Kupfererzen zur Darstellung des Kupfers benutzt.

2. Geschlecht. Kupferindig.

Derb oder klein nierenförmig, kugelig, in Platten und eingesprengt. Berreiblich; spec. Gew. 3,8; fettartig glänzend oder schimmernd; indigblau, ins Schwarze; undurchsichtig. Besteht aus Einfach-Schwefel-Kupfer, und enthält 64,8 Kupfer, 32,8 Schwefel, nebst einer Beimengung von etwas Eisen und Blei. Brennt für sich erhitzt mit blauer Flamme, und stößt den Geruch von schwefeliger Säure aus. Schmilzt unter Ausstoßen glühender Tropfen. Gibt mit Soda ein Kupferkorn.

Stens allg. Naturg. I.

Findet sich mit Kupfererzen zu Badenweiler am Schwarzwalde, Pongau in Salzburg, Kielce in Polen, und wurde zuerst 1813 im Sangerhauser Revier beobachtet. Am Besten bildet sich in Spalten und Mündungen der Fumerolen dieselbe Substanz vermöge der Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf sublimiertes Kupferhaloid.

3. Geschlecht. Selenkupfer.

Derb, weich, geschmeidig, metallisch glänzend, silberweiß, auf dem Striche glänzend, undurchsichtig. Besteht aus Halb-Selenkupfer, und enthält 64,0 Kupfer, 40,0 Selen. Schmilzt für sich zu einer grauen Kugel, und riecht dabei stark und widerlich nach verfaultem Rettige. Gibt, nach der Auflösung mit Soda, ein Kupferkorn.

Findet sich auf der Kupfergrube Strickerum in Småland in Schweden.

4. Geschlecht. Selenit.

Erythralinisch. Fibrige Massen; weich, nimmt Fingerringe vom Fingerring an; bleigrau, metallisch glänzend, milde, undurchsichtig. Besteht aus Halb-Selenkupfer und Einfach-Selen-Silber. Schmilzt unter Auslösung eines starken Selengeruchs, gibt mit den Flüssigkeiten Kupferreaction, und hinterläßt beim Abtreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich ebenfalls auf der Strickerum-Grube in Småland.

5. Geschlecht. Silberglanz.

Syn. Hexaëdrischer Silberglanz, Glaserz.

Erythralinisch. Die Crystalle sind Würfel, Octaëder, Icositetraëder, Rautendodecaëder und Combinationen dieser Gestalten. Sie sind häufig bis zur Verunstaltung in die Länge gezogen, zumal bei reihenweiser Gruppierung. Oberfläche oft uneben und wie eingedrückt. Theilbarkeit, Spuren nach Würfel- und Dodecaëderflächen.

$\rho = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 6,8 \dots 7,1$; Metallglanz; schwärzlich bleigrau, durch Anlaufen braun oder schwarz, bisweilen bunt; Strich glänzend; geschmeidig, undurchsichtig.

Besteht aus Einfach-Schwefel-Silber, und enthält 87 Silber und 13 Schwefel. Nicht beim Schmelzen nach schwefeliger Säure, und hinterläßt bei anhaltendem Schmelzen zuletzt ein Silberkorn.

Findet sich häufig crySTALLISIRT, in aufgewachsenen, zu Drusen versammelten, reihenweise und treppenförmig gruppierten Crystallen. Mey undeutlicher und unvollkommener Ausbildung derselben erscheinen crySTALLINISCHE, haar-, draht-, baumsförmige, zahnige, gestrichte Gestalten. Auch kommt er in unregelmäßigen, astigen Gestalten vor, in Platten, derb, eingesprengt, als pulverige Masse (Silberschwärze) Ueberzüge bildend.

Man findet ihn vorzugsweise auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge. Seine reichsten Fundstätten sind die Silbergruben in Mexico, Peru und Chili, Guadaluca in Spanien, Schemnitz und Kremnitz in Ungarn, Freyberg, Johannegeorgenstadt, Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Joachimsthal im Erzgebirge, Rongsberg in Norwegen. Auch kommt er in Cornwall vor, zu Schwarz in Tyrol, zu Wolfsach und Wittichen im Schwarzwalde u. a. e. a. D.

Der Silberglanz ist nach dem Gediegen-Silber das reichste Silbererz und auch das vortrefflichste.

6. Geschlecht. Silberkupferglanz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle zeigen die Combination der Fig. 200. G. 416, und sind dieser ähnlich. Die verticalen Prismenflächen mehr in die Länge gezogen. Isomorph mit Kupferglanz. Zeigt auch Zwillinge wie dieser.

Weich und vollkommen milde; spec. Gew. = 6,25; Metallglanz; schwärzlich bleigrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Halb-Schwefelkupfer mit Einfach-Schwefel-Silber, und enthält 52,27 Silber, 30,48 Kupfer, 15,73 Schwefel. Nicht beim Glühen nach schwefeliger Säure, gibt mit den Flüssigkeiten Kupferreaction, und hinterläßt beim Abreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich derb am Schlangenberge in Sibirien, und crySTALLISIRT und derb zu Andelsdorf in Schlesien.

7. Geschlecht. Sterubergit.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle haben das Ansehen rhombischer Tafeln, und sind Combinationen der Fläche eines rhombischen Octaëders, mit einer vorherrschenden, horizontalen Endfläche und mit verticalen Prismenflächen, immer tafelartig. Auch Zwillingscrystalle, die Zusammensetzungsfläche parallel einem verticalen Prisma. Theilbarkeit sehr vollkommen nach der geraden Endfläche.

$\rho = 1,0 \dots 1,5$; spec. Gew. = 4,2; Metallglanz; dunkel tombachbraun; Strich schwarz; sehr mild; dünne Blättchen vollkommen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Schwefel-Silber mit Schwefel-Eisen, und enthält Silber 33,2, Eisen 36,0, Schwefel 30,0. Riecht beym Glühen nach schwefeliger Säure, schmilzt zu einer magnetischen Kugel, ertheilt den Gläsern Eisenfarbe und hinterläßt beym Abtreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich theils in Crystallen, die gewöhnlich mit einer Prismenfläche aufgewachsen, und zu Rosen und Kugeln mit drüsiger Oberfläche gruppiert sind, theils in dicken Massen von blättriger Zusammensetzung, zu Joachimsthal in Böhmen, in Begleitung anderer Silbererze.

8. Geschlecht. Schiffsäsz.

Syn. Biegsames Schwefelsilber.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind Combinationen des verticalen rhombischen Prismas mit der ersten und zweyten Seitenfläche, mit den zweyten horizontalen Prismen und solchen verticalen Prismen, welche die Kanten des ersten rhombischen zuschärfen. Der Habitus ist schiffartig, worauf sich auch der Name bezieht. Theilbarkeit nach der zweyten Seitenfläche vollkommen. Weich und mild; wird vom Messer leicht geschnitten; spec. Gew. = 5,9 ... 6,2; Metallglanz; grau, zwischten stahlgrau und schwärzlich bleigrau; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Schwefel-Silber und -Bley mit Underthalb-Schwefel-Spießglanz. Ist noch nicht genau analysirt. Gibt beym Glühen Schwefelgeruch, auf

Kohle Antimon- und Bleysauch, und hinterläßt beim Abtreiben ein Silberkorn.


Ist sehr selten auf einigen Gruben, Habacht, Alter grüner Zweig u.s.w. zu Freyberg vorgekommen.

9. Geschlecht. Sprödglasserz.

Syn. Prismatischer Melanglanz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Grundform ein Rhombenoctaëder, kommt nicht selbstständig, immer nur in Combinationen vor. Die gewöhnlichsten Combinationen sind: eine Verbindung des zum Grundoctaëder gehörigen verticalen rhombischen Prismas mit der horizontalen Endfläche und der zweyten Seitenfläche, ähnlich Fig. 201. S. 416, tafelfartig, und lange Zeit für eine reguläre, sechsseitige Tafel gehalten; eine Verbindung des Octaëders o, mit dem zweyten horizontalen Prisma f und der End-

Fig. 202.



fläche c, Fig. 202; eine Combination des Grundoctaëders o mit dem zweyten verticalen Prisma f, dem verticalen Prisma g, der zweyten Seitenfläche b, einem stumpferen Octaëder $\frac{o}{2}$, und der geraden Endfläche c, ähnlich Fig. 200. S. 416. Bisweilen tritt dazu noch die erste Seitenfläche und ein spitzeres Octaëder $2o$.

Häufig kommen auch Zwillinge vor; die Zusammensetzungsfläche parallel g. Wiederholt sich die Zusammensetzung mehrmals mit parallelen Zusammensetzungsflächen, so entstehen Zwillinge, welche denen des Arragons, Figur 107. S. 239, ähnlich sind; wiederholt sie sich mit geneigten Zusammensetzungsflächen, so werden Crystallaggregate gebildet, welche die Beschaffenheit der Zwillinge des Speerklases, Fig. 192, S. 403, haben.

Der Habitus der Crystalle ist durchaus tafelfartig oder kurz säulenförmig. Theilbarkeit parallel f und b sehr unvollkommen. Die Oberfläche von g und b vertical gestreift.

H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,2 ... 6,3; Metallglanz; eisenwarz bis schwärzlich bleigrau; selten bunt angelauten, undurchsichtig; milde. Besteht aus einer Verbindung von

6 M.-G. Einfach-Schwefel-Silber mit 1 M.-G. Aunderthalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält Silber 68,54, Spießglanz 14,68, Schwefel 16,42 nebst 0,64 Kupfer. Gibt beym Glähen Schwefelgeruch, Antimonrauch, und hinterläßt beym Abtreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich gewöhnlich crystallisirt, in aufgewachsenen, zellig, rosenförmig und treppenförmig gruppirten Crystallen, auch verb und eingesprengt, mit körniger Zusammensetzung. Ist früher ausgezeichnet im Freyberger Revier vorgekommen, namentlich auf den Gruben Morgenstern, Himmelsfürst u. e. a., sodann zu Schneeberg, Johannegeorgenstadt, Joachimsthal, Annaberg. Weitere Fundorte sind Andreasberg am Harz, Pzibram in Böhmen, Wolfach im Schwarzwalde, Schemnitz und Kremnitz in Ungarn, auch hat man es in Mexico und Peru gefunden. Wird als reiches Silbererz zur Darstellung metallischen Silbers benutzt.

10. Geschlecht. Polybasit.

Syn. Krotomer Engenglanz, Mildglangierz.

Crystallsystem trepp- und einachsfig. Die Crystalle sind reguläre, sechsseitige Prismen, gewöhnlich niedrig und tafelartig an den Enden durch eine horizontale Fläche begrenzt. Auch kommen zwischen den Prismenflächen und der Endfläche Rhomboëder vor. Die Endflächen sind parallel den abwechselnden Endkanten des Prismas gestreift. Theilbarkeit ist nicht zu bemerken.

H. = 2,5; spec. Gew. = 6,2; Metallglanz; eisenschwarz; milde; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von 9 M.-G. Schwefel-Silber und Schwefelkupfer mit 1 M.-G. Aunderthalb-Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik, und enthält Silber 64,29, Kupfer 9,93, Spießglanz 5,09, Arsenik 3,74, Schwefel 17,04. Verhält sich vor dem Blüthrohr. wie Spröbglaserz, mit dem Unterschied, daß es beym Glähen im Kölbchen ein gelbes Sublimat von Schwefel-Arsenik, und beym Glähen auf Kohle Arsenikgeruch gibt.

Findet sich theils crystallisirt, theils verb und eingesprengt zu Guanaruato und Guarisamey in Mexico, und auf einigen Gruben bey Freyberg, in Begleitung von Spröbglaserz.

11. Geschlecht. Fahlerz.

Syn. Tetraëdrischer Kupferglanz.

Crystallsystem regulär, Hemiëdrisch. Die Crystalle haben sämmtlich einen tetraëdrischen Habitus, und sind reine Tetraëder, Hemicoctetraëder und Combinationen dieser Gestalten mit mehreren anderen Gestalten des Systems. Fig. 203 stellt eine Combination zweier Tetraëder dar, wobei das weniger entwickelte $\frac{o}{2}$ als Abstumpfung der Ecken des vorherrschenden $\frac{o}{2}$ erscheint; Fig. 204 ist eine Combination des Rautendodecaëders d, mit dem Tetraëder $\frac{o}{2}$; Figur 205 zeigt das Hemicoctet-

Fig. 203.




Fig. 204.




Fig. 205.




Fig. 206.





Fig. 207.



raëder p (Pyramidentetraëder); Fig. 206 stellt eine Combination des Tetraëders $\frac{o}{2}$ mit dem Hemicoctetrahedron p vor; Fig. 207 zeigt eine Combination des Tetraëders $\frac{o}{2}$, des Hemicoctetraheders p und des Rautendodecaëders d, mit vorherrschenden Tetraëderflächen; umstehende Fig. 208 zeigt

eine Combination des Hemicoctetraheders p mit dem Hemitria-

Fig. 208.





Fig. 209.



Trisectaëder 20 (Trapezoidbodecaëder) und dem Rautendodecaëder d, wobei die Flächen der ersten Gestalt vorherrschen. Auch kommen öfters Zwillinge vor; die Zusammenfassungsfläche parallel einer Octaëderfläche, die Individuen durchkreuzen sich oft, wie in Fig. 209. Die Flächen $\frac{o}{2}$ und p parallel den Tetraëderkanten gestreift; $\frac{o}{2}$ immer rauh, öfters auch d.

Etheilbarkeit octaëdrisch, sehr unvollkommen.

H. = 3,0 ... 4,0; spec. Gew. 4,7 ... 5,2; Metallglanz; stahlgrau bis eisen schwarz; Strich graulich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefel-Metallen, in welcher einerseits Schwefel-Kupfer und Schwefel-Silber, nebst etwas Schwefel-Eisen und Schwefel-Zink als positive oder basische Körper auftreten, andererseits Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik als die negativen, gleichsam sauren Körper erscheinen, wobei sowohl Schwefel-Kupfer und Schwefel-Silber, als Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik sich wechselseitig ersetzen. Nach dieser Verschiedenheit in der chemischen Zusammensetzung unterscheidet man zwei Gattungen.

1. Kupfer-Fahlerz. Der basische Körper der Verbindung ist vorwaltendes Schwefel-Kupfer; die negativen Körper Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik kommen bald zusammen, bald einzeln in der Verbindung vor. Bey vorwaltendem Arsenik ist die Farbe im Allgemeinen lichter, bey vorwaltendem Spießglanz im Allgemeinen dunkler, und so findet man, namentlich in der Abänderung, welche man auch Schwarzerz, Schwarzgültigerz genannt hat, immer einen beträchtlichen Gehalt an Spießglanz, und öfters gar kein Arsenik. Der Silbergehalt ist unbedeutend, und immer um so geringer, je größer der Kupfergehalt ist. Mit dieser Zusammensetzung ist das geringere spec. Gewicht verbunden.

Das Fahlerz von Gersdorf bey Freyberg enthält: Kupfer

28,63, Silber 2,37, Eisen 4,89, Zink 2,76, Spießglanz 16,52, Arsenik 7,21, Schwefel 26,33. Das Fahlerz von Jilla bey Clausthal enthält: Kupfer 34,48, Silber 4,97, Eisen 2,27, Zink 5,55, Spießglanz 28,24, Schwefel 24,73.

Vor dem Löthrohr gibt es Schwefelgeruch, Antimon- oder Arsenikrauch oder beides, starke Kupferreaction, und bey'm Abtreiben auf Knochenasche ein kleines Silberkorn.

Findet sich crystallisirt, dorb und eingesprengt auf Lagern und Gängen, welche Kupfererze führen. Ausgezeichnete, crystallisirte Abänderungen kommen vor: zu Clausthal am Harze (Figur 205), zu Dillenburg im Nassauischen (Fig. 204, 208), zu Kapnik und Felsöbánya in Siebenbürgen (Fig. 204, 207), zu Freyberg im Erzgebirge, zu Neuborf im Anhaltischen, zu Falkenstein bey Schwarz in Tyrol, zu Schemnitz und Kremnitz in Ungarn.

2. Silber-Fahlerz. Der basische Körper der Verbindung ist vorwaltendes Schwefel-Silber, oder aber dieses beträgt mehr als die Hälfte vom Gehalt des Schwefel-Kupfers. Hieher gehören die früher unter dem Namen Graugültigerz aufgeführten Abänderungen, welchen das größere spec. Gewicht zukommt, und deren negatives Schwefel-Metall Schwefel-Spießglanz ist. Die Farbe ist stahlgrau. Das Silber-Fahlerz von Habacht-Fundgrube, einem Besitze von Bescheret-Glück bey Freyberg, enthält: Silber 31,29, Kupfer 14,81, Eisen 5,98, Zink 0,99, Spießglanz 24,63, Schwefel 21,17. Das Silber-Fahlerz von der Grube Wenzel bey Wolfach im Schwarzwalde enthält: Silber 17,71, Kupfer 25,23, Eisen 3,72, Zink 3,10, Spießglanz 28,63, Schwefel 23,52. Gibt vor dem Löthrohr Schwefelgeruch, Antimonrauch, Kupferreaction, und hinterläßt bey'm Abtreiben auf Knochenasche eine große Silberkugel.

Weit weniger verbreitet als das Kupfer-Fahlerz. Findet sich vorzüglich auf Habacht-Fundgrube bey Freyberg, und auf dem Wenzel-Gang bey Wolfach im Schwarzwalde.

Die Fahlerze sind sowohl wegen ihres Kupfergehaltes, als auch, und vorzüglich wegen ihres oft sehr beträchtlichen Silbergehaltes, sehr geschätzt, und werden auf Kupfer und Silber verhüttet.

Der Tennantit scheint ein Kupfer-Zahlerz zu seyn, dessen negatives Schwefel-Metall in Schwefel-Arsenit besteht. Findet sich auf Gängen bey Redruth in Cornwall.

12. Geschlecht. Bleyglanz.

Syn. Hexaëdrischer Bleyglanz.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind vorherrschend Würfel, auch Octaëder, Combinationen dieser beiden Gestalten, Combinationen des Würfels mit dem Dodecaëder, mit dem Tricostetraëder (Fig. 8. S. 42.). Die Oberfläche des Würfels parallel den Combinationsebenen mit dem Octaëder gestreift. Auch Zwillinge; die Zusammensetzungsfläche eine Octaëderfläche, öfters mit Durchwachsung, wie es Fig. 126, S. 252, zeigt. Theilbarkeit nach den Würfelflächen sehr vollkommen.

ρ . = 2,5; spec. Gew. = 7,5 ... 7,6; Metallglanz; bleygran; bisweilen bunt angelaufen, zumal die Octaëderflächen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus Einfach-Schwefel-Bley, und enthält 86,64 Bley und 13,36 Schwefel. Beynahe immer ist etwas Schwefel-Silber beygemengt, öfters Antimon, Eisen, Kupfer, auch Spuren von Selen, Arsenik, Gold. Decrepitirt gewöhnlich stark beim Erhitzen. Setzt beim ersten Anblasen auf Kohle einen weißen Streifen von antimoniger Säure ab, wenn er Antimon enthält. In stärkerer Hitze brennt der Schwefel ab, und es bleibt ein Bleykorn, das, auf Knochenasche abgetrieben, beynahe immer Spuren, und häufig deutlich wahrnehmbare Rädchen von Silber hinterläßt. Ein Kupfergehalt färbt bey diesem Versuche die Knochenasche grünlich; ein Gehalt an Eisen bräunlich oder schwarz. Selenhaltiger Bleyglanz löst beim Rösten auf Kohle Kettiggeruch aus, arsenikhaltiger Knoblauchgeruch.

Der Bleyglanz findet sich häufig crystallisirt, zum Theil in großen Crystallen, die oft ein geschlossenes, zerfressenes Ansehen haben, zerschnitten und nicht selten trichterförmig ausgehöhlt, und gewöhnlich in Drusen versammelt sind; auch in Pseudomorphoëen nach Buntbleierz (Blaubbleierz), ferner röhrenförmig, traubig, gestrikt, verb und eingesprengt von grobkörniger, ins Dichte verlaufender Zusammensetzung. Nach der Größe des Kornes unter-

scheidet der Berg- und Hüttenmann grob-, Klein- und feinspeissigen Bleyglanz.

Man findet den Bleyglanz auf Lagern und Gängen vom Grundgebirge an in allen Gebirgsbildungen herauf bis zum Eias, und einschließlicb desselben. Er ist eines der verbreitetsten Erze. Schöne crySTALLisirte Abänderungen kommen vor zu Reudorf im Anhaltischen, zu Andreasberg am Harze, zu Freyberg, Johanngeorgenstadt und Annaberg im Erzgebirge, zu Przibram und Mies in Böhmen, zu Dillenburg im Nassauischen, auf dem Wenzelgang bey Wolfach im Schwarzwalde, u.s.w. Große Lagerstätten kommen zu Bleyberg und Windischkappel in Kärnthén und in Granada in Spanien vor; mächtige, bleyglanzführende Gänge am Harze, im Nassauischen, im Schwarzwalde, in Siebenbürgen, England, Schottland und in vielen andern Ländern.

Der Bleysschweif scheint ein dichter, mit Schwefel-Antimon gemengter, vielleicht auch damit chemisch verbundener, Bleyglanz zu seyn. Er zeichnet sich durch lichtbleygraue Farbe aus, und ein spec. Gewicht von 7,2. Gemenge desselben mit Bleyglanz haben öfters ein streifiges Ansehen, und gelten für streifigen Bleyglanz, *Galena striata* der älteren Mineralogen. Die Schweden nennen dieses Vorkommen *Strip malm*.

Der mullmige Bleyglanz besteht aus feinschuppigen, lockeren Theilen des Minerals.

Der Bleyglanz ist dasjenige Erz, woraus man die große Masse von metallischem Bley und Bleyglätte darstellt, welche in allen Zweigen der Technik und der Kunst, im gewöhnlichen Leben und in der Medicin benutzt wird. Nebst dem liefert das Erz eine beträchtliche Menge Silber, und wird im rohen Zustande, in dem es *Alquifoux* heißt, zur Glasur der Töpferwaare verwendet, daher der Name Glasurerz, Hafnererz.

13. Geschlecht. Selenbley-

Derbe Massen, von feinkörniger, ins Dichte verlaufender Zusammensetzung. ρ . etwas über 2,5; spec. Gew. = 8,2 ... 8,8; Metallglanz; bleygrau; undurchsichtig. Besteht aus Einfach-Selen-Bley, und enthält 72 Bley, 28 Selen, nebst einer kleinen Quantität Kobalt, was die Veranlassung gegeben hat, das Erz,

ehe dessen Selengehalt dargethan war, Kobaltbleyerg zu nennen. Gibt beym Glähen in einer Glasröhre ein rothes Sublimat, auf Kohle erhißt den Geruch nach faulen Rettigen und Bleyrauch. Der Kobaltgehalt färbt die Gläser von Borax und Phosphorsalz smalttblau.

Findet sich auf der Grube Lorenz zu Clausthal und auf Eisensteingruben bey Verbach, Lillerohe und Jorze am Harze.

14. Geschlecht. Selenkupferbley.

Derbe Massen von feinkörniger Zusammensetzung; weich; spec. Gew. = 7,0; Metallglanz; lichtbleygrau; durch Anlaufen messinggelb und blau; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Selen-Bley und Einfach-Selen-Kupfer, und enthält Bley 59,67, Kupfer 7,36, Selen 29,96. Gibt vor dem Löthrohr die unverkennbaren Reactionen des Selen, Bleys und Kupfers.

Findet sich zu Lillerohe am Harze.

Von diesem Erze unterscheidet sich das Selenbleykupfer durch eine etwas dunklere Farbe, ein spec. Gew. von 5,6, durch einen hohen Grad von Schmelzbarkeit und eine verschiedene Zusammensetzung, indem es 47,33 Bley, 15,45 Kupfer, 34,26 Selen, 1,29 Silber, nebst etwas Eisen-, Bley- und Kupferoxyd, also neben dem Einfach-Selen-Bley noch Halb-Selen-Kupfer enthält. Es findet sich mit dem vorhergehenden.

15. Geschlecht. Selen Silberbley.

Syn. Selen Silber.

Crystallsystem regulär, wie es die Theilbarkeit zeigt, welche parallel den Flächen eines Würfels sehr vollkommen ist. ρ . = 2,5; spec. Gew. 8,0; Metallglanz; eisenschwarz; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Selen-Bley und Einfach-Selen-Silber, und enthält 89,61 Selen-Silber und 6,79 Selenbley, nebst etwas Selen-Eisen. Riecht beym Glähen nach faulen Rettigen, wird mit Soda auf Kohle reducirt zum Silberkorn.

Findet sich in kleinen Blättchen, die bisweilen von Kupfer-

Fies überzogen sind, zu Elkerode am Harz in Begleitung von Selen-Bley.

16. Geschlecht. Selenquecksilberbley.

Derbe Massen von körniger Zusammensetzung, nach drey rechtwinklig sich schneidenden Richtungen theilbar, und somit zum regulären Crystallsystem gehörig; weich; spec. Gew. = 7,3; Metallglanz; bleigrau, ins Blaue und Schwarze; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Selen-Bley mit Einfach-Selen-Quecksilber, und enthält Bley 55,84, Quecksilber 16,94, Selen 24,97. Gibt beym Glühen im Kölbchen ein metallisches Sublimat von Selen-Quecksilber; mit kohlensaurem Natron im Kölbchen geglüht metallisches Quecksilber. Im Uebrigen verhält es sich wie Selenbley.

Findet sich mit den vorhergehenden zu Elkerode am Harze.

17. Geschlecht. Molybdänglanz.

Spez. Wasserbley.

Crystallsystem drey- und einachsfig. Die seltenen Crystalle sind Combinationen des ersten sechsseitigen Prismas mit der geraden Endfläche, oder des Hexagondodecaeders mit derselben, und immer tafelförmig. Prismen- und Dodecaederflächen sind horizontal gestreift. Theilbarkeit nach der horizontalen Endfläche höchst vollkommen.

H. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 4,5 ... 4,6; Metallglanz; lichtbleigrau; milde in hohem Grade, abfärbend; in dünnen Blättchen biegsam; fettig anzufühlen; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Schwefel-Molybdän, und enthält 60 Molybdän und 40 Schwefel.

Reicht beym Glühen nach schwefeliger Säure; färbt, in der Platinzange erhitzt, die Edthrohrflamme grün; verpufft mit Salpeter, und hinterläßt dabey gelbe Flocken, welche die Reaction der Molybdänsäure zeigen.

Findet sich gewöhnlich derb und eingeprengt, mit körnig-schaliger Zusammensetzung, theils eingewachsen in Granit und Gneis, wie zu Baltimoro, Northampton und Hadham in Connecticut, theils mit Quarz verwachsen auf den Zinnerzlagerrstätten

zu Ehrenfriedersdorf, Schlackenwalde und Zinnwald, theils auf Eisenerz- und Kupfererzlagerstätten, wie in Norwegen zu Aren-
dal, Laurvig und Hitterdal, in Schweden am Bispsberg, zu Skins-
kutteberg und an vielen anderen Orten; endlich hat man ihn
auch in Schlessen zu Olaz, in Mähren zu Obergas, im Chamou-
nythal und in England gefunden.

18. Geschlecht. Wismuthglanz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind nadel-
förmige, rhombische Prismen mit vertical gestreiften Flächen. Theil-
barkeit parallel der Endfläche des rhombischen Prismas und sei-
nen Diagonalen, ziemlich vollkommen.

H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,1 ... 6,5; Metall-
glanz; lichtbleygrau; undurchsichtig. Besteht aus Aenderthalb-
Schwefel-Wismuth, und enthält Wismuth 80,98, Schwefel 18,72.
Gibt im Kölbchen ein Schwefelsublimat, schmilzt auf Kohle unter
Umherwerfen von glühenden Tropfen, und hinterläßt metallisches
Wismuth.

Findet sich gewöhnlich in spießigen und nadelförmigen Cry-
stallen, oder in zartfädigen Partzien eingewachsen, auch verb
und eingesprengt zu Schneeberg, Altenberg, Johanngeorgenstadt
und Joachimsthal im Erzgebirge, zu Nydarsbyttan in Schweden,
bey Rebruth in Cornwall, zu Keshbanya in Oberungarn und zu
Veresow in Sibirien.

19. Geschlecht. Kupferwismutherz.

Nadel förmige Crystalle von unbestimmter Gestalt; gewöhn-
lich verb und eingesprengt; weich; spec. Gew. = 5,0? Metall-
glanz; lichtbleygrau, durch Anlaufen gelblich, röthlich, auch
bräunlich; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer
Verbindung von Schwefel-Wismuth mit Schwefel-Kupfer, und
enthält Wismuth 47,24, Kupfer 34,06, Schwefel 12,59. Richt
beym Glühen nach Schwefel; es steigen Kugeln von Wis-
muth aus, und die Kohle beschlägt gelb; die gerösthete Probe zeigt
Kupferreaction.

Hat sich in früheren Jahren auf den Gruben Neuglück und
Daniel bey Wittichen im Schwarzwalde gefunden.

20. Geschlecht. Silberwismuth erz.

Syn. Wismuthbley erz; Wismuthsilber.

Haar- und nadel förmige Crystalle von unbestimmter Gestalt. Weich und milde; spec. Gewicht unbestimmt; Metallglanz; lichter bleygrau, wird durch Anlaufen dunkler; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefel-Wismuth, Bley und Eisen mit Schwefel-Silber, und enthält Wismuth 27,0, Bley 33,0, Eisen 4,3, Silber 15, Schwefel 16,3, nebst etwas Kupfer. Schmilzt leicht; es steigt bey gelinder Erhitzung Wismuth aus; gibt Bleyrauch, riecht nach Schwefel, hinterläßt bey dem Abstreifen auf Knochenasche ein Silberkorn.

Hat sich innig verwachsen mit Quarz, und in diesen eine gesprengt, auf der Grube Friedrich-Christian im Wildschapbach im Schwarzwaldta gefunden.

21. Geschlecht. Nadel erz.

Die Gestalten scheinen rhombische Prismen zu seyn mit stark gestreifter Oberfläche. Theilbarkeit nach einer der Diagonalen unendlich. $\rho. = 2,5$; spec. Gew. $= 6,1 \dots 6,7$. Metallglanz; schwärzlich bleygrau, wird durch Anlaufen röthlich und braun; Strich schwärzlichgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefel-Wismuth, Schwefel-Bley und Schwefel-Kupfer, worinn Schwefel-Wismuth einerseits mit Kupfersulphuret, andererseits mit dem Bleysulphuret verbunden ist, und enthält Wismuth 36,45, Bley 36,05, Kupfer 10,59, Schwefel 16,61. Schmilzt vor dem Löthrohr; die Kohle beschlägt gelb von Wismuth- und Bleypoxyd, es hinterbleibt ein Wismuthkorn, welches Kupferreaction gibt.

Findet sich in Quarz eingewachsen in prismatischen, nadel- und stangenförmigen Gestalten, auch verb in kleinen Partzien im Quarz zu Beresow am Ural, begleitet von Gediengen-Gold.

22. Geschlecht. Tellurwismuth.

Syn. Tetradymit, rhomboedrischer Wismuthglanz.

Crystallsystem drey- und einachsfig, hemikrystisch. Die Crystalle sind Combinationen zweyer spitzer Rhomboeder mit der ho-

horizontalen Endfläche, welche stark vorherrscht, weßhalb der Habitus der Gestalten tafelförmig ist. Sie sind gewöhnlich zwillingsartig verwachsen, die Zusammenschungsfläche parallel einer Endkante, und sich an allen Endkanten wiederholend, wodurch Vierlinge gebildet werden, und worauf sich der Name Tetradymit bezieht, von dem griechischen Worte tetradimos, vierfach, abgeleitet. Die Rhomboederflächen horizontal gestreift. Theilbarkeit parallel der horizontalen Endfläche sehr vollkommen.

$\rho. = 2,0$; biegsam in dünnen Blättchen; spec. Gew. $= 7,4 \dots 7,5$; Metallglanz, Farbe zwischen zinnweiß und stahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Tellurwismuth mit Schwefelwismuth, und enthält: Wismuth 59,84, Tellur 35,24, Schwefel 4,92.

Gibt vor dem Löthrohr auf Kohle einen gelben und weißen Beschlag, welcher die Reductionsflamme blau färbt, riecht nach schwefeliger Säure. Fund sich unsern Schemnitz in Ungarn, bey dem Dorfe Schoubkán auf einer Lettenkluft im Grünslein und auf der Razianzeni-Grube unweit Pojana in Siebenbürgen. Auch soll der prismatische Wismuthglanz von Mezbanpa in Ungarn dazu gehören, und das auf der Bastnäsgrube zu Riddarhyttan in Schweden und zu Tellmarcken in Norwegen gefundene Tellurwismuth.

23. Geschlecht. Tellurwismuthsilber.

Syn. Silberwismuthspiegel; wismuthiger Spiegelglanz; Melophänsilber.

Derbe Masse in einer Richtung parallel einer horizontalen Endfläche sehr vollkommen theilbar, und wahrscheinlich zur hemikrystischen Abtheilung des drey- und einachsigen Crystallsystems gehörig; $\rho. = 2,5$; spec. Gew. $= 8,0$; Metallglanz; lichtstahlgrau; in dünnen Blättchen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefelwismuth mit Tellurwismuth und Tellur Silber, und enthält Wismuth 61,15, Tellur 29,74, Silber 2,07, Schwefel 2,33. Gibt vor dem Löthrohr Schwefelgeruch, schmilzt leicht, und beschlägt die Kohle gelb und weiß, färbt die Löthrohrflamme blau.

Findet sich zu Deutsch-Wilsen (Börsen) bey Gran in Ungarn

24. Geschlecht. Blättertellur.

Syn. Pyramidaler Tellurglanz; Blättererz.

Erythallsystem zwey- und einachsig. Die Crystalle sind Combinationen zweyer Quadratoctaëder, und der horizontalen Endfläche, ähnlich Fig. 176. S. 379. Die Octaëderflächen zart gestreift; die Endfläche wie zerfressen. Theilbarkeit ausgezeichnet parallel derselben.

ρ . = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 6,8 ... 7,1; Metallglanz; schwärzlich bleigrau; in dünnen Blättchen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefel-Bley und Schwefel-Spießglanz einerseits, und von Schwefel-Bley und Tellur-Gold andererseits, und enthält Bley 63,1, Tellur 13,0, Gold 6,7, Spießglanz 4,5, Schwefel 11,7, nebst etwas Kupfer. Raucht, beym Glühen auf Kohle, und beschlägt dieselbe gelb; bey fortgesetztem starkem Blasen hinterbleibt ein Goldkorn. Nicht, in der Glasröhre geglüht, nach schwefeliger Säure. Gibt ein weißes Sublimat, das durch Erhitzen grau wird, und aus tellur-saurem Bleyoxyd besteht.

Findet sich zu Nagyag in Siebenbürgen.

25. Geschlecht. Tellurbley.

Derb; theilbar nach den Würfelflächen. ρ . = 3,0; spec. Gew. = 8,16; Metallglanz; zinnweiß, ins Gelbliche; milde; undurchsichtig. Besteht aus Tellur-Bley, mit einem kleinen Gehalte von Tellursilber, und enthält Bley 60,35, Tellur 38,37, Silber 1,28. Färbt, vor dem Löthrohr auf Kohle geglüht, die Flamme blau, und verfliegt gänzlich, bis auf ein kleines Silberkorn.

Findet sich auf der Grube Sawodinsk am Ural.

26. Geschlecht. Tellursilber.

Derbe Massen von grobkörniger Zusammensetzung. Theilbarkeit nicht wahrgenommen. ρ . nahezu 3,0; spec. Gew. = 8,4 ... 8,5; Metallglanz; Mittelfarbe zwischen bleigrau und stahlgrau; geschmelzig; undurchsichtig. Besteht aus Tellur-Silber, und enthält 62,82 Silber, 36,98 Tellur, nebst etwas Kupferhalt.

tigem Eisen. Hinterläßt, mit Soda geschmolzen, ein reines Silberkorn. Schmilzt für sich zur schwarzen Kugel, auf der sich beim Erkalten weiße Pünktchen oder feine Dandriten von Silber bilden; gibt in der offenen Röhre ein weißes Sublimat, das sich zum Theil fortblasen läßt, zum Theil in feine Tröpfchen zusammenzieht.

Findet sich mit dem vorherrschenden Erz auf der Grube Sawodinski am Ural, welche 40 Werst von der reichen Silbergrube Siranowski, am Flusse Buchharma, liegt.

27. Geschlecht. Weißtellurerz.

Syn. Gelberz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind verticale rhombische Prismen, verbunden mit der zweiten Seitenfläche und den Flächen des zweiten horizontalen Prismas, als Zuschärfung an den Enden, ähnlich Fig. 104. S. 238. Theilbarkeit nur in Spuren vorhanden, Weich; spec. Gew. = 10,67; Metallglanz; Silberweiß; gelb, grau und schwarz durch Anlaufen; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Tellur, Blei, Gold und Silber, und enthält Tellur 44,75, Blei 19,50, Silber 8,50, nebst 0,5 Schwefel. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Blättertellur, riecht aber nicht nach Schwefel. Findet sich zu Nagpaz in Siebenbürgen.

28. Geschlecht. Schriftez.

Syn. Schriftglanz; prismatischer Antimonglanz.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die feinen, kurz nadelförmigen Crystalle sind rhombische Prismen, und gewöhnlich in einer Ebene reihenförmig gruppiert zu Gestalten, welche Schrifzügen ähneln, oder zu Drüsenhäutchen und crystallinischen Ueberzügen verbunden. $\rho = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. = 5,7 ... 5,8; Metallglanz; stahlgrau; milde; undurchsichtig. Zusammensetzung noch nicht genau bekannt. Enthält annähernd 51 ... 52 Tellur, 11,33 Silber, 24 Gold, 1,5 Blei und 11,7 Spießglanz, Arsenik, Kupfer, Eisen, Schwefel. Gibt, auf Kohle, gegläht, einen weißen Beschlag, welcher die Reductionsflamme grünlichblau färbt und verschwindet. Wird vom Königswasser unter Auscheidung von

Chlor Silber aufgelöst; die Lösung gibt, mit Eisenvitriol versetzt, einen bräunlichen Niederschlag von Gold.

Findet sich zu Offenbanya in Siebenbürgen, vorzüglich auf der Grube Franziscus.

20. Geschlecht. Grauspießglanzerz.

Syn. Antimonglanz, prismatoidischer Antimonglanz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind meist lang-säulenartig, spießig oder nadelförmig, und gewöhnlich Combinationen des rhombischen Octaëders o mit dem rhombischen Prisma g, und der ersten Seitenfläche a, Fig. 210, oder eine

Fig. 210.




Fig. 211.



Combination der genannten Prismenflächen mit einem stumpferen Octaëder $\frac{o}{2}$, Fig. 211. Die verticalen, vorherrschenden Flächen sind stark vertical gestreift, und deshalb die Prismen nicht selten schiffartig. Die Flächen o bisweilen horizontal gestreift.

Theilbarkeit parallel der kürzeren Diagonale des Prismas g höchst vollkommen; nach einer geraden Endfläche, nach den Flächen g und a unvollkommen. Die Hauptspaltungsfläche bisweilen horizontal gestreift.

D. = 2,0; spec. Gew. = 4,5 ... 4,7; Metallglanz; bleigrau, rein, ins Stahlgrau geneigt, bisweilen bunt angelaufen; undurchsichtig. Besteht aus Antithal-Schwefel-Spießglanz, und enthält 72,5 Spießglanz und 27,2 Schwefel.

Schmilzt vor dem Löthrohre für sich mit Leichtigkeit, und wird von der Kohle eingefogen; gibt, in der offenen Glasröhre erhitzt, Schwefelgeruch und einen weißen Beschlag von Antimonorpd. Löst sich in Salzsäure auf, unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff. Die Auflösung gibt, mit Wasser versetzt, einen reichlichen weißen Niederschlag.

Man unterscheidet folgende Varietäten:

1. Strahliges Grauspießglanzerz. Umfaßt die deutlich crystallisirten und stängelig zusammengesetzten Varietäten. Die gewöhnlich spießigen Crystalle sind häufig büschelförmig oder zu verworren strahligen Aggregaten zusammengewachsen, die sich theils verb, theils eingeprengt, auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge finden, und von Quarz, Kalkspath, Brauns-
spath, Schwerspath begleitet sind. Wolfach, Sulzburg, Mänstertal im Schwarzwald, Leogang in Salzburg, Schladming in Steyermark, Neudorf im Anhaltischen, Przibram in Böhmen, Bräunsdorf bey Freyberg, Kremnitz, Schemnitz, Pöfing, Felsőbánya in Ungarn, Allemont im Dauphiné, Malbosc im Depart. de l'Ardeche, Cornwall.

2. Haarförmiges Grauspießglanzerz. Feine, haarförmige, büschelförmig gruppierte oder filzartig durch einander gewebte Crystalle von schwärzlich bleigrauer Farbe, oft bunt angelassen. Ist öfters ein Begleiter des vorigen.

3. Dichtes Grauspießglanzerz. Verb. Von klein- und feinförniger, ins Dichte verlaufender Zusammensetzung und lichtbleigrauer Farbe. Kommt ebenfalls mit der ersten Varietät vor. Die vorzüglichsten Fundorte sind: Goldkronach, unsern Bai-reuth, Bräunsdorf in Sachsen, Malbosc im Ardeche-Dep., Ragurka und Kremnitz in Ungarn.

Das Grauspießglanzerz wird bergmännisch gewonnen, und sowohl durch einfaches Aufschmelzen oder Auslaigern aus den mit Gangarten vermengten Erzen zu sogenanntem rohem Spießganz (Antimonium crudum) gemacht, als zur Darstellung von metallischem Spießganz benutzt. Ersteres wird vorzüglich in der Heilkunde angewendet, letzteres zur Bereitung vieler Metalllegierungen gebraucht, von denen wir zunächst nur das Letternmetall nennen wollen, das zum Schiffsfuß verwendet wird.

30. Geschlecht. Zinkenit.

Syn. Bleyantimonerz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind rhombische Prismen, durch ein horizontales Prisma an den Enden zugespitzt, ähnlich Fig. 181, S. 393, wahrscheinlich brüchig.

artig verbunden, indem sie wie irreguläre, sechseckige, an den Enden mit sechs Flächen zugespitzte Prismen erscheinen, wie beim Arragon gruppiert. Die Endflächen gewöhnlich rauh und unterbrochen; die Seitenflächen stark vertical gestreift. Theilbarkeit nicht ausgemittelt.

ρ . = -3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 5,3; Metallglanz; stahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von 1 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley mit 1 M.-G. Unterhalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält Bley 31,84, Spießglanz 44,39, Schwefel 22,58. Gibt beim Glühen auf Kohle Schwefelgeruch, Bleyrauch und einen weißen Beschlag von antimonischer Säure.

Findet sich zu Wolfsberg, unsern Stollberg am Harze.

31. Geschlecht. Federerz.

Feine, haarförmige Crystalle filzartig verwebt; schwärzlich bleygrau; dem haarförmigen Grauspießglanzerz sehr ähnlich. Besteht aus einer Verbindung von 2 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley mit 1 M.-G. Unterhalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält Bley 46,87, Spießglanz 31,84, Schwefel 19,72, nebst 1,30 Eisen und etwas Zink. Gibt auf Kohle beim Glühen Bleyrauch, den weißen Antimonbeschlag, und, mit Soda geschmolzen, viele Bleyförner.

Findet sich ebenfalls zu Wolfsberg am Harze, und wahrscheinlich gehört noch Manches, was bisher als haarförmiges Grauspießglanzerz betrachtet worden ist, hieher.

32. Geschlecht. Jamesonit.

Syn. Protomer Antimonglanz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Die Crystalle sind verticale rhombische Prismen mit horizontaler Endfläche, und dieser parallel höchst vollkommen theilbar. Eine weitere, weniger vollkommene Theilbarkeit geht parallel den Prismenflächen und der kürzeren Diagonale. ρ . = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 5,5 ... 5,8; Metallglanz; stahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von 3 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley mit 2 M.-G. Unterhalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält Bley 40,75, Spießglanz 34,40, Schwefel 22,15, nebst etwas Kupfer und Eisen.

Verhält sich vor dem Löthrohr wie die vorhergehenden, zeigt aber noch überdies Eisen- und Kupferreaction.


Findet sich seltener in Crystallen, gewöhnlich in dünnstängelig zusammengesetzten Massen in Cornwall und in Ungarn.

33. Geschlecht. Plagionit.

Syn. Rosenit.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die Crystalle sind eine Combination des zwey- und eingliederigen Octaëders o, eines spitzeren ähnlichen Octaëders 2o, der ersten Seitenfläche a und einer schiefen Endfläche c, Fig. 212.

Fig. 212.



Alle Flächen, c ausgenommen, wenig glänzend und stark gestreift. Theilbarkeit nach den Flächen 2o.

$\rho. = 2,5$; spec. Gew. $= 5,4$; Metallglanz; schwärzlich bleigrau, ins Eisenschwarze; undurchsichtig. Besteht aus 4 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley und 3 M.-G. An-

berthalt-Schwefel-Spießglanz, und enthält Bley 40,52, Spießglanz 37,94, Schwefel 21,53. Gibt vor dem Löthrohr Schwefel-, Bley- und Spießglanzreaction.


Findet sich gleichfalls zu Wolfsberg am Harze, und hat den Namen wegen der schiefen Stellung der Achsen seiner Gestalt erhalten, nach „plagion“, = schief.

34. Geschlecht. Bournonit.

Syn. Spießglanzbleyerz; biprismatischer Kupferglanz.

Crystallsystem ein- und einachsig. Eine einfache, gewöhnlich vorkommende Combination der Flächen eines rhombischen Pri-

Fig. 213.



mas g, der ersten und zweyten Seitenfläche a und b, des zweyten horizontalen Prismas f und der horizontalen Endfläche c ist durch Fig. 213 dargestellt. Häufig kommen Zwillinge vor; die Zusammensetzungen

flache parallel g; oft ist die Zusammensetzung an parallelen Flächen wiederholt. Theilbarkeit parallel b unvollkommen, und noch unvollkommener nach a und c.

$\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. $= 5,7 \dots 5,8$; Metallglanz; schwärzlich bleigrau bis eisen schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer zweigliederigen Verbindung von 3 M.-G. Halb-Schwefel-Kupfer mit 1 M.-G. Aunderthhalb-Schwefel-Spießglanz einerseits, und 3 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley mit 1 M.-G. Aunderthhalb-Schwefel-Spießglanz andererseits, und enthält Kupfer 12,65, Bley 40,84, Spießglanz 26,28 und Schwefel 20,31. Gibt vor dem Blüthrohr Schwefel-, Bley-, Spießglanz- und Kupferreaction.

Findet sich verb und in Crystallen zu Wolfsberg, Neuborf und Andreasberg am Harze, Ranslo in Cornwall und Kapnik in Siebenbürgen (Nädelers).

35. Geschlecht. Berthierit.

Syn. Eisenantimonerz; Häubingerit.

Derbe Masse von blätteriger Zusammensetzung, dem Ansehen nach aus verwachsenen, rhombischen Prismen bestehend. Setzen feine, nadelförmige Crystalle. Theilbarkeit parallel der kürzeren Diagonale eines rhombischen Prismas. $\rho = 3,0$; spec. Gew. $= 4,0 \dots 4,2$; Metallglanz; dunkelstahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von 3 M.-G. Einfach-Schwefel-Eisen und 2 M.-G. Aunderthhalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält 16,0 Eisen, 52,0 Spießglanz und 30,3 Schwefel. Gibt vor dem Blüthrohr Schwefelgeruch, Eisen- und Spießglanzreaction.

Findet sich zu Chazelles in der Anvergne und auf der Grube Neue Hoffnung Gottes zu Bedunsdorf bey Freyberg.

Außer dem Berthierit gibt es noch zwey andere Verbindungen von Schwefel-Eisen und Schwefel-Spießglanz. Die eine kommt in der Grube Matouret, unweit Chazelles, vor, und besteht aus 3 M.-G. Schwefel-Eisen oder 15,7 Procent, und 4 M.-G. Schwefel-Spießglanz oder 84,3 Procent. Die andere findet sich zu Anglar, im Dep. de la Creuse, macht sich durch eine dünn- und parallel-faserige Zusammensetzung, so wie

auch eine graugrüne, ins bronzartige ziehende Farbe bemerklich, und besteht aus einer Verbindung von gleichen Mischungsgewichten Einfach-Schwefel-Eisen und Unterhalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält 19,4 Schwefel-Eisen und 80,6 Schwefel-Spießglanz.

38. Geschlecht. Antimonkupferglanz.

Syn. Prismatoidischer Kupferglanz.

Crystallsystem ein- und einachsfig. Die Crystalle sind F. 144, S. 272, ähnlich. Theilbarkeit parallel der Endfläche c ziemlich deutlich, doch unterbrochen. $\rho = 3,0$; spec. Gew. = 5,73; Metallglanz; schwärzlich bleigrau; undurchsichtig. Besteht aus einer zweygleiderigen Verbindung von 2 M.-G. Halb-Schwefel-Kupfer und 1 M.-G. Unterhalb-Schwefel-Arsenik einerseits, und von 2 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley und 1 M.-G. Unterhalb-Schwefel-Spießglanz andererseits, und enthält Kupfer 17,35, Bley 29,90, Arsenik 6,03, Spießglanz 16,64, Schwefel 28,60, nebst 1,40 Eisen. Gibt beym Glühen im Köbchen ein Sublimat von Schwefel-Arsenik; auf Kohle geglüht gibt er Bleirauch, Antimonbeschlag, Arsenik- und Schwefelgeruch, und hinterläßt eine Schlacke, welche starke Kupferreaction zeigt.

Findet sich verb und in undeutlichen Crystallen mit Spath-eisenstein zu St. Gertrud, unweit Wolfsberg, im Lavandthale in Kärnthén.

3. Gipschaft der Blenden.

1. Geschlecht. Spießglanzblende.

Syn. Rothspießglanzertz, Antimonblende; prismatische Purpurbende.

Crystallsystem zwey- und eingliederig. Die Crystalle sind haar- oder nadelförmig, und in der Richtung der kurzen Diagonale eines rhombischen Prismas in die Länge gezogen, wie die Crystalle des Glaubersalzes, Fig. 154, S. 296. Einzelne Crystalle wurden als eine Combination eines rhombischen Prismas mit der ersten Seitenfläche und einer schiefen Endfläche erkannt. Theilbarkeit parallel der ersten Seitenfläche höchst vollkommen; nach der zweyten Seitenfläche unvollkommen.

$\rho. = 1,9 \dots 1,5$; spec. Gew. $= 4,5 \dots 4,0$; Dementglanz; Kirschroth; durchscheinend; milde; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Verbindung von Antimonoryd mit Anderthalb-Schwefel-Antimon, und enthält 30,14 Antimonoryd und 69,86 Schwefel-Antimon. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Grauspießglanzerz.

Man unterscheidet gemeines Rothspießglanzerz, welches die strahligen und spießigen Abänderungen mit büschelförmiger Zusammensetzung, so wie die haarförmigen Crystalle begreift, und Zundererz, welches in zunderähnlichen Lappen und Häutchen erscheint, die aus haarförmigen Individuen zusammengesetzt sind.

Findet sich auf Gängen mit anderen Spießglanzerzen zu Bräunsdorf bey Freyberg, zu Allemont im Dauphiné, zu Malaczka in Ungarn, zu Horhausen im Saynischen; das Zundererz kommt vorzüglich zu Klausthal und Andreasberg am Harz vor.

2. Geschlecht. Manganblende.

Syn. Hexaëdrische Glanzblende.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Combinationen des Würfels und des Octaëders, mit rauher Oberfläche. Theilbarkeit nach den Würfelflächen vollkommen. $\rho. = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 4,0$; Metallglanz, unvollkommener; eisenschwarz; Strich dunkelgrün; undurchsichtig. Besteht aus Einfach-Schwefel-Mangan, und enthält 63,23 Mangan und 36,77 Schwefel. Gibt beim Glühen in einer offenen Röhre Schwefelgeruch, auf Kohle abgeröstet mit den Flüssigkeiten violblaue Gläser, mit verdünnter Salzsäure Schwefelwasserstoff.

Findet sich verb. mit körniger Zusammensetzung und in unedentlichen Crystallen zu Nagayag in Siebenbürgen mit Blättererz, auch in Cornwall und Mexico.

3. Geschlecht. Helvin.

Syn. Tetraëdrischer Granat.

Crystallsystem regulär, hemiëdrisch. Die Crystalle sind Combinationen zweyer Tetraëder, ähnlich Fig. 203, S. 423. Theilbarkeit nach Octaëderflächen, unvollkommen.

$\rho. = 6,0 \dots 6,5$; spec. Gew. $= 3,1 \dots 3,3$; Fettglanz,

glasartiger; wachs- und honiggelb, ins Braune und Grüne verlaufend; durchscheinend an den Kanten; Strich ungefärbt. Besteht aus einer merkwürdigen Verbindung von Schwefel-Mangan-Manganoryd mit einem Silicat von Mangan, und einem Silicat von Eisenoryd und Kalkerde; enthält Schwefel-Mangan 14,0, Manganorydul 22,3, Eisenorydul 8,0, Kalkerde 8,0, Kieselerde 25,3, nebst 1,4 Thonerde. Entwickelt mit warmer Salzsäure Schwefelwasserstoff mit Hinterlassung einer Gallerte; färbt Boraxglas violett; löst sich im Phosphorsalz mit Hinterlassung eines Kieselsteletts.

Findet sich theils in auf- oder eingewachsenen kleinen Crystallen, theils verb und eingesprengt auf Granatlagern im Gneise zu Bergmannsgrün und Rittersgrün bey Schwarzenberg, so wie in Brauneisenstein am Kalten-Roder bey Breitenbrunn in Sachsen.

4. Geschlecht. Zinkblende.

Syn. Dodecaëdrische Granatblende.

Crystallsystem regulär, hemiëdrisch. Die Crystalle sind Tetraëder, Combinationen derselben, ähnlich Fig. 203, S. 423.

Fig. 214.





Fig. 215.



Tetraëder in Combination mit dem Feßtetraëder, ähnlich Fig. 204, S. 423, wobei die Flächen des letzteren öfters ziemlich groß sind, wie bey Fig. 214; Dode-

Fig. 216.



caëder d in Combination mit dem Tetraëder $\frac{o}{2}$ und dem Würfel a, Fig. 215; Dodecaëder d in Combination mit dem Hemiöctäëdrißhexaëder t, Fig. 216. Große Neigung zur Zwillingbildung, so daß einfache Crystalle selten sind. Die Zusammensetzungsfläche eine Octaëderfläche, die Umdrehungsachse senkrecht darauf; die Zu-

sammensetzung findet mit theilweiser Durchkreuzung oder mit Juxtaposition statt. Octaëder-Zwillinge dieser Art sind dargestellt durch die Figuren 32 und 33, S. 65; ein Rhombendodecaëder-

Fig. 217.



Zwilling ist dargestellt durch Fig. 217. Theilbarkeit nach den Flächen des Rhombendodecaëders höchst vollkommen. Es gelingt bisweilen Theilungsgekalten, wie Fig. 217, zu erhalten.

$\rho. = 3,5 \dots 4,0$; spec. Gew. $= 2,9$

$\dots 4,1$; Demantglang; gelb und grün, und durch Beymischung von Eisen roth,

braun und schwarz; öfters bunt angelaufen; durchsichtig in allen Graden, bis undurchsichtig, bey ganz dunkler Färbung. Besteht aus Einfach-Schwefel-Zink, mit einer größeren oder kleineren Beymischung von Einfach-Schwefel-Eisen, und hin und wieder von etwas Schwefel-Cadmium. Enthält 61,5 \dots 63 Zink, 33,0 \dots 35 Schwefel und 2,0 \dots 4 Eisen. Riecht beym Glähen vor dem Löthrohr schwefelig, und gibt, auf Kohle stark gegläht, Zinkrauch, der in der Hitze gelb ist, und unter der Abkühlung weiß wird. Schwer schmelzbar.

Findet sich theils crystallisirt, in aufgewachsenen, häufig in Drusen versammelten Crystallen, die auch oft zu kugelligen Gruppen durch einander gewachsen, und deshalb schwer zu erkennen sind; theils verb und eingesprengt, mit blätteriger und körniger, auch mit strahliger und faseriger Zusammensetzung (Strahlenblende), die mitunter verbunden ist mit traubigen, nierenförmigen, stalactitischen Gestalten, und einer krummschaligen Ablösung (Schalenblende). Manchmal verlaufen sich körnige Abänderungen ins Dichte, wobey alsdann der Glanz sich vermindert und fettartig wird.

Die verschiedene Färbung hat Veranlassung gegeben, die Blende auch in gelbe, braune und schwarze zu unterscheiden. Zu der ersteren rechnet man die gelben, einerseits ins Grüne, andererseits ins Rothe verlaufenden Abänderungen. Sie besitzen den höchsten Grad des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Zur braunen Blende zählt man die braunen, ins Rothe und Schwarze ziehenden Abänderungen, welche nur noch an den Kan-

ten durchscheinen; die schwarze Blende endlich umfaßt die dunkel-schwarzbraun und sammtschwarz gefärbten Stücke, die gewöhnlich undurchsichtig sind.

Die Zinkblende kommt häufig vor, und zwar auf Eagern und Gängen, mit Blei-Kupfer-Silber- und Eisenerzen. Die gelbe Blende findet man in sehr schönen Abänderungen zu Schemnitz in Ungarn und zu Kapnick in Siebenbürgen, auch zu Schwarzenberg, Scharfenberg und Rittersgrün in Sachsen, zu Summe-rud bey Drammen in Norwegen, zu Ratiboritz in Böhmen; die braune findet sich zu Ems in Nassau, zu Freyberg und an mehreren andern Orten in Sachsen, zu Wies in Böhmen, zu Schemnitz, Offenbanya, Ragyag in Ungarn, zu Sala in Schweden, zu Goslar und Lautenthal am Harze, in Derbyshire u.s.w. Die faserige Schalenblende kommt zu Raibell in Kärnten und zu Brilon in Westphalen vor, und ist früher auch in den Gruben Silberedel bey Hohenegelsdorf und Hofgrund im südlichen Schwarzwald vorgekommen. Die braune, strahlige, cadmiumhaltige Blende findet sich zu Przibram in Böhmen. Die schwarze Blende kommt häufig auf den Gängen um Freyberg vor, zu Zellerfeld am Harze, auf der Grube Teufelsgrund im Münstertal im Schwarzwald, zu Schemnitz, Kremnitz, Felsöbanya und an vielen andern Orten.

Als cadmiumhaltig hat man noch die Zinkblende von Ehdronies im Cherente-Dep. erkannt, die schwarze Blende von Breitenbrunn, die Blende von Brilon, die schwarze Blende der alten Nordgrube bey Freyberg u. e. a.

Die Zinkblende kann zur Darstellung des Zinkvitriols und des metallischen Zinks benutzt werden. Sie bedarf im letzteren Falle einer langen und sorgfältigen Röstung unter Zusatz von Kohlenstaub, und gibt 24—25 Procent Zinkmetall.

5. Geschlecht. Silberblende.

Syn. Rhomboëdrische Rubinblende. Rothgältigerz.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiëdrisch. Grundgestalt ein Rhomboëder, dessen Endkantenwinkel $108^{\circ} 20'$ oder $107^{\circ} 36'$ ist, je nach der Zusammensetzung. Es bestehen nämlich die Individuen dieses Geschlechtes entweder aus einer Verbindung von

3 M.-G. Einfach-Schwefel-Silber mit 1 M.-G. Andernthalb-Schwefel-Spießglanz; oder aus einer Verbindung von 3 M.-G. Einfach-Schwefel-Silber mit 1 M.-G. Andernthalb-Schwefel-Arsenit. Nach den mathematischen und chemischen Eigenschaften zerfällt daher das Geschlecht in zwey Gattungen.

1. Antimon. Silberblende. Rhomboëder von $105^{\circ} 20'$. Theilbarkeit ziemlich vollkommen nach den Flächen desselben. Die Crystalle sind Combinationen des zweyten sechsseitigen Prismas a mit einem stumpferen Rhomboëder $\frac{r}{2}$, ähnlich F. 218;

Fig. 218.





Fig. 219.



des zweyten sechsseitigen Prismas a mit dem Grundrhomboëder r und der Hälfte der Flächen des ersten sechsseitigen Prismas g ; Fig. 219; des zweyten sechsseitigen Prismas

mit der horizontalen Endfläche, ähnlich Fig. 99, E. 220; des zweyten sechsseitigen Prismas a mit dem Stufenöber z , dem Grundrhomboëder r , mit dem stumpferen Rhomboëder $\frac{r}{2}$, F. 220;

Fig. 220.





Fig. 221.



des zweyten sechsseitigen Prismas a und dreyer übereinander und an den Enden liegender Stufenöber z , z' und z'' , F. 221.

Außer diesen gewöhnlichen Combinationen kommen noch mehrere andere, und auch

Zwillinge vor. Die Zusammensetzungsfläche parallel einer Endante von $\frac{r}{2}$, oder pa-


rallel einer Fläche z . Die Flächen a , $\frac{r}{2}$ und z gestreift.

$\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $5,78 \dots 5,85$; Metallglanz; kermesinroth bis schwärzlich bleigrau; Strich kermesin- bis kirschroth; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von 3 M.-G. Einfach-Schwefel-Silber und 1 M.-G. Aunderthalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält Silber 58,95, Spießglanz 22,84, Schwefel 16,61. Gibt beym Glühen auf Kohle Schwefelgeruch, starken Antimonrauch, und hinterläßt ein Silberkorn.

Findet sich theils crystallisirt, in aufgewachsenen und zu Drusen versammelten, öfters auch büschelförmig oder treppenförmig gruppirten Crystallen, theils verb., eingesprengt und als Aug. Kommt in schönen Crystallen vor zu Andreasberg am Harze und zu Freyberg, auch zu Wolfach im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, zu Schennitz und Kremnitz in Ungarn, zu Rongsberg in Norwegen u. a. e. a. D.

2. Arsenik-Silberblende. Rhomboëder von $107^\circ 36'$. Theilbarkeit nach dessen Flächen, nicht immer deutlich. Die hier vorkommenden Crystalle zeigen denselben Habitus und denselben Charakter, wie diejenigen der vorhergehenden Gattung. Die Skalenoëder z und z' herrschen vor, das Skalenoëder z' kommt auch selbstständig vor. Die Gestalten sind deshalb mehr pyramidal und spieglig, wie Fig. 222 zeigt, welche eine Combination des Skalenoëders z' mit dem stumpferen Rhomboëder $\frac{r}{2}$ ist, und dem Rhomboëder r' .

Fig. 222.



$\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. = $5,5 \dots 5,6$; Diamantglanz; cochenill- und kermesinroth; Strich morgenroth; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus einer Verbindung von 3 M.-G. Einfach-Schwefel-Silber mit 1 M.-G. Aunderthalb-Schwefel-Arsenik, und enthält Silber 64,69, Arsenik 15,09, Schwefel 19,51, nebst 0,69 Spießglanz.

Gibt beym Glühen im Köbchen ein gelbes Sublimat von Schwefel-Arsenik, auf Kohle Schwefelgeruch, Arsenikgeruch, und hinterläßt ein Silberkorn.

Findet sich crystallisirt, trüblich, verb., eingesprengt und als

Anflug. Kommt unter ähnlichen Verhältnissen vor, wie die vorhergehende Gattung, in Begleitung von Gediegen-Silber, Kobalterzen und Arsenit, zu Joachimsthal in Böhmen, zu Annaberg, Schneeberg, Marienberg, Johannegeorgenstadt, auch auf den Gruben Kurprinz und Himmelsfürst zu Freyberg, zu Andreasberg am Harz, zu Wittichen im Schwarzwalde, zu Chelanches im Dauphiné, zu Guadalecanal in Spanien.

Bei der Zusammensetzung dieses Geschlechtes vertreten sich Arsenit und Antimon gegenseitig als isomorphe Substanzen. Beide Gattungen kommen öfters mit einander gemengt vor; die Antimon Silberblende enthält oft einen Kern von Arsenit-Silberblende, und dieses wird öfters von jener überzogen, und es gibt sogar Crystalle, die aus stängeligen Theilen beider Gattungen zusammengesetzt sind. Die Silberblende ist ein sehr reiches, geschätztes, aber im Ganzen nur in geringer Menge vorkommendes Silbererz.

6. Geschlecht. *Myargyrit*.

Syn. Hemiprismatische Rubinblende.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind gewöhnlich etwas verwickelte Combinationen. Das eine Flächenpaar des ein- und eingliedrigen Octaëders *c* kommt mit der Endfläche *c* vorherrschend entwickelt vor, wie es die Fig. 223 zeigt,

Fig. 223.



Fig. 224.



deren Habitus kurz säulenartig ist, und durch Vergrößerung der Fläche *c* öfters viel tafelartig wird. Damit sind noch Flächen anderer Octaëder verbunden, welche als Halbpysramiden auftreten, wie *o*, *f*, *s*, und Prismenflächen *b* und *o'*.

Fig. 224 zeigt eine ähnliche Combination mit pyramidalem Habitus. Theilbarkeit parallel *b* unvollkommen, auch nach anderen Richtungen.

$D. = 2,5$; spec. Gew. $= 5,2 \dots 5,4$; Metallglanz, im Demantglanz; zerfällt eisen schwarz, bis lichtstahlgrau; Strich dunkelfirschroth; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung

von 1 M.-G. Einfach-Schwefel-Bley mit 1 M.-G. Unterhalb Schwefel-Spießglanz, und enthält Silber 36,40, Spießglanz 39,14, Schwefel 21,95, nebst 1,06 Kupfer und 0,62 Eisen. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Antimon-Silberblende.


Findet sich auf der Grube Neue-Hoffnung-Gottes zu Bräunsdorf. Es hat den Namen von argyros, Silber, und meion, weniger, erhalten, weil es weniger Silber enthält als das Rothgültigerz.

7. Geschlecht. Zinnober.

Syn. Mercurblende, penitome Rubinblende.

Krystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Das Grundrhomboëder von $71^{\circ} 48'$ kommt nicht für sich allein vor, dagegen häufig in Combination mit einer horizontalen Endfläche, wobey beiderley Flächen öfters im Gleichgewichte stehen, wodurch die Krystalle Aehnlichkeit mit einem Octaëder erhalten. S. Fig. 91; S. 229. Gewöhnlich findet sich das Grundrhomboëder r, verbunden mit der Endfläche c, in weiterer Combination mit zwey stumpferen Rhomboëdern $\frac{1}{2}r$ und $\frac{1}{4}r$, Fig. 225, oder in Verbindung mit einem stumpferen Rhomboëder $\frac{1}{2}r$ und den Flächen


Fig. 225.



des ersten sechseitigen Prismas g. Die meisten Rhomboëderflächen sind horizontal gestreift. Öfters Zwillingsscrystalle; die Hauptachsen beider Individuen parallel, das eine gegen das andere durch 60° um diese Achse verdreht; theils mit Juxtaposition, wobey die horizontale Fläche als Zusammensetzungsfläche erscheint, theils mit Durchkreuzung. Theilbarkeit parallel g vollkommen.

H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 8,0 ... 8,1; Demantglanz; cochenillroth, ins Bleigraue und Scharlachrothe; Strich scharlachroth; mäßig halbdurchsichtig, bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus Einfach-Schwefel-Quecksilber, und enthält 85 Quecksilber, 15 Schwefel. Verflüchtigt sich beym Gläsen gänzlich; sublimirt sich im Kölbchen, gibt, mit Eisenseile zusammenge-
rieben, beym Gläsen metallisches Quecksilber.

Fig. 270.



Findet sich theils in kleinen Crystallen, die selten deutlich, meist durch einander gewachsen und in Drusen versammelt sind, theils verb mit körniger oder faseriger, ins Dichte verlaufender Zusammensetzung, ferner eingesprengt, als lockeres Anflug und in zarten Dendriten. Ist bisweilen

durch erdige Theile verunreiniget.

Die Hauptfundorte in Europa sind Almaden in Spanien und Idria in Krain. An letzterem Orte kommt er oft mit einer erdigen und kohligen Masse vermengt vor, die eine große Menge eines eigenthümlichen, dem Bergtalg ähnlichen Körpers enthält, den man Idrialin genannt hat. Dieses Gemenge nennen die Krainer Bergleute Kohlenzinnober, auch Quecksilberlebererz. Weitere europäische Fundorte sind Moschellandsberg unsern Zweybrücken, Hartenstein in Sachsen, Windischkappel und Neumarkt in Kärnthen, Rosenau, Szlana, Schemnitz, Kremnitz in Ungarn, Dumbrava in Siebenbürgen. In großer Menge findet er sich in Peru, Mexico, Neugranada, China.

Der Zinnober ist ein Hauptquecksilbererz, und wird zur Darstellung des metallischen Quecksilbers benutzt.

B. Geschlecht. Kaufschgebb.

Syn. Gelbe Arsenikblende. Antimonit, Oparment.

Crystallsystem ein- und eiaachsig. Die sehr seltenen und gewöhnlich undeutlichen Crystalle sind Combinationen des rhombischen Octaëders σ mit den Flächen des verticalen rhombischen Prismas g und den Flächen $\frac{f}{2}$, welche die scharfen Seitenkanten des Prismas g zuschärfen, s. Fig. 49, S. 155; Combinationen des Prismas g , mit der ersten Seitenfläche b und dem ersten horizontalen Prisma d , ähnlich Fig. 170, S. 373; öfters erscheint auch das horizontale Prisma d an der Gestalt Fig. 49 als Abstumpfungsfäche der Kanten zwischen σ . Die Seitenfläche b rauh, die übrigen Flächen parallel den Combinationskanten mit b gestreift und gewöhnlich uneben. Theilbarkeit nach b höchst vollkommen.

$H. = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. $= 3,4 \dots 3,5$; Fettglanz, auf b metallähnlicher Perlmutterglanz; citrongelb bis pomeranz

Ofens allg. Naturg. I.

zengelb; Strich ebenso; milde; in dünnen Blättchen biegsam; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Ranten. Besteht aus Aunderthalb-Schwefel-Arsenik, und enthält 62 Arsenik und 38 Schwefel. Brennt, für sich auf Kohle erhitzt, mit weißgelber Flamme, und riecht dabey nach Schwefel und Arsenik; schmilzt im Kölbchen, und gibt einen gelben, durchsichtigen Sublimat.

Findet sich theils theils crystallisirt in kleinen durch einander gewachsenen Crystallen, die bisweilen zu Drusen versammelt sind, theils traubig, nierenförmig, stalactitisch mit schaliger und strahliger Zusammensetzung, so wie verb. und eingesprengt, mit körnig-blättriger Structur, und als Anflug und Ueberzug.

Findet sich selten auf Gängen, wie zu Andreasberg am Harze, öfters als Ueberzug auf Kalispas zu Kapnik und Felsöbanpa in Siebenbürgen. Zu Tajowa bey Neusohl in Ungarn findet es sich im Thonmergel, und, wie es scheint, unter ähnlichen Verhältnissen auch in der Walachey und in Katsollen. Zu Hall in Tyrol hat man es im körnigen Gyps gefunden, und an mehreren Orten als ein Sublimat in vulcanischen Gebirgsbildungen,

9. Geschlecht. Realgar.

Syn. Rothe Arsenikblende. Rauschroth.

Crystallsystem zwey- und eingliedrig. Die Crystalle sind säulenartig. Fig. 227 stellt eine Combination der Gestalten vor,

Fig. 227.




Fig. 228.



welche die Crystalle dieses Geschlechtes gewöhnlich zeigen, nämlich eine Verbindung des verticalen Prismas g mit einem zweyten rhombischen Prisma g' , der ersten und zweyten Seitenfläche a und b , der vorderen schiefen Endfläche c , der hinteren schiefen Endfläche c' mit dem vorderen schiefen Prisma o und dem hinteren schiefen Prisma o' . War oft erscheinen auch nur die Flächen g , g' , c und o mit einander verbunden, Fig. 228. Theil-

tenfläche a und b , der vorderen schiefen Endfläche c , der hinteren schiefen Endfläche c' mit dem vorderen schiefen Prisma o und dem hinteren schiefen Prisma o' . War oft erscheinen auch nur die Flächen g , g' , c und o mit einander verbunden, Fig. 228. Theil-

barkeit nach c und b ziemlich vollkommen, weniger deutlich nach a und g. Die verticalen Prismen gewöhnlich auch vertical gestreift, und c parallel der geneigten Diagonale; o und o' öfters rauh.

$\rho = 1,5 \dots 2,0$; spec. Gew. = $3,4 \dots 3,6$; Fettglanz; morgenroth; Strich pomeranzengelb; milde; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus Einfach-Schwefel-Arsenik, und enthält 69,57 Arsenik und 30,43 Schwefel. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Rauschgelb.

Findet sich theils crystallisiert in kleinen, oft zu Drusen versammelten Crystallen, theils derb, mit körniger Zusammensetzung, theils eingesprengt, als Anflug und Ueberzug.

Kommt auf Gängen vor zu Andreasberg, Rappil, Felsphänya, Nagayag, Wittichen, Schneeberg, Joachimsthal. Zu Lajowa hat man es mit dem Rauschgelb im Thonmergel gefunden. Am Gotthardt kommt es im Dolomit vor, und in vulcanischen Gesteinen am Vesuv, Aetna, auf Quadeloupe und in Japan.

IV. Ordnung. Gediegene Erze.

Metalle, im mehr oder weniger reinen Zustande, so wie Verbindungen derselben unter einander.

1. Geschlecht. Gediegen-Eisen.

Crystallsystem regulär; Theilbarkeit nach den Flächen des Würfels. Nach Beobachtungen von Crystallisations-Verhältnissen des Schmiedeeisens und der Figuren, welche beym Aetzen einer polirten Fläche von Meteorereisen mit Salpetersäure hervortreten, gehört das Gediegen-Eisen entschieden dem bezeichneten Crystallsysteme an.

$\rho = 5,0 \dots 6,0$; spec. Gew. = $6,9 \dots 7,8$; Metallglanz; stahlgrau, ins Silberweiße; wird durch Anlaufen schwarz; Oberfläche gewöhnlich rauh; wirkt stark auf den Magnet; sehr zähe. Besteht aus metallischem Eisen, und enthält immer etwas Nickel, und zwar von 1,5 bis 3 Procent, auch kleine Beymengungen von Magnesium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Zinn und Phosphor.

Die bekannten Gießgen-Eisen-Massen, für welche diese Beschreibung gilt, gehören zu den aus der Luft auf die Erde herabgefallenen Massen, welche man meteorische nennt, und dieses Gießgen-Eisen ist daher Meteorereisen. Es bildet gewöhnlich poröse, zellige und astige Massen, selten dichte. Die Höhlungen sind gewöhnlich mit einem Schmelz ausgekleidet, und schließen mitunter Olivin ein. Es kommt auch häufig eingesprengt in steinigten Massen vor, die von Zeit zu Zeit auf die Erde herabfallen.

Die erste Meteorereisenmasse, welche genauer bekannt und von Klaproth untersucht wurde, ist diejenige, welche, laut eidlicher Bestätigung von Augenzeugen, im Jahr 1751, am 26. May, Abends gegen 6 Uhr, zu Praschna, unweit Agram in Croatien, unter starkem Krachen, als Bruchstück einer feurigen Kugel, 71 Pfund schwer, niedergefallen ist. Sie wurde in das Kaiserliche Naturalien-Cabinet zu Wien gebracht. Im Jahre 1794 entdeckte Pallas am Jenisey in Sibirien, zwischen Krasnojarsk und Abakansk, im hohen Schiefergebirge, ganz oben auf dem Rücken, am Tage liegend, eine Eisenmasse von 1680 Pfund, voll Blasenräume, in denen öfters Olivin liegt. Diese große Masse ward von den Tataren als ein vom Himmel gefallenes Heilthum verehrt. Weitere interessante Meteorereisenmassen sind: die in dem südamerikanischen Bezirke San Jago del Estero gefundene, welche Rubin de Celis an Ort und Stelle untersucht, und aber 30,000 Pfund schwer geschätzt hat; die Eisenmasse von mehreren Tausend Pfunden, welche in der Provinz Durango in Mexico, in der Mitte einer ausgedehnten Ebene gefunden wurde, und von welcher A. v. Humboldt Stücke mitgebracht hat; ferner die Massen von Louisiana in Nordamerika, Santa Rosa in Südamerika, von Elbogen in Böhmen (der verwünschte Burggraf, im Volksmunde), von Wittburg bey Trier, welche aus Unkunde in einem Frischfeuer war eingeschmolzen worden. In allen diesen Eisenmassen wurde der Nickelgehalt nachgewiesen.

Meteorsteine.

Größere und kleinere steinige Massen, welche von Zeit zu Zeit auf die Erde herabfallen, gewöhnlich von einem krachenden,

oftmals donnerdähnlichen Getöse begleitet, nennt man Meteorsteine. Sie sind gewöhnlich von rundlicher Gestalt, an der Oberfläche verglast, braun, schwarz und schlackig, im Innern erdig und grau, und enthalten Meteorereisen eingemengt, das rostet, wenn der Stein mit lufthaltigem Wasser befeuchtet wird. Sie haben 3,4 ... 3,7 spec. Gewicht, wirken auf den Magnet und bestehen öfters aus einem körnigen Gemenge, worinn man neben Nickel-Eisen, Augit, Labrador, Magnetkies, Olivin, Chrom-Eisen, Magnet-Eisen unterscheiden kann. Häufig sind sie indessen so dicht, daß man ihre Zusammensetzung nur durch eine ganz sorgsame, mechanische und chemische Analyse ermitteln kann. Im Ganzen sind sie einander so ähnlich, daß die gegebene Beschreibung beynahe auf alle paßt. Nur der Meteorstein von Alaïs unterscheidet sich von allen andern, indem er verhärtetem Thone ähnlich, grauschwarz ist und in Wasser mit Thongeruch zerfällt. Gewöhnlich zerspringen die Steine während ihres Falls, und die Stücke werden gemeiniglich weit umhergeschleudert. Bildet aber das Meteorereisen den überwiegenden Bestandtheil derselben, so zerspringen sie nicht, und solche eisenreiche Massen sind es daher, welche die größten der gefundenen Meteorsteine zusammensetzen.

Die einfachen Stoffe, welche man in diesen, nach Art tellurischer Gesteine gebildeten Massen seither angetroffen hat, belaufen sich auf achtzehn, und machen somit gerade ein Drittheil von den auf der Erde entdeckten aus. Sie sind:

Sauerstoff, als Bestandtheil der in Meteorsteinen gefundenen Metallkalche und Erden.

Wasserstoff, in einer im Stein von Alaïs gefundenen organischen Verbindung.

Schwefel, Bestandtheil des Schwefeleisens, das den Steinen fein eingemengt ist.

Phosphor, in den metallischen Glitterchen, welche bei Auflösung des Meteorereisens in Salzsäure von diesem abfallen.

Kohle, im Meteorereisen und im Stein von Alaïs.

Kiesel, in den Kieselverbindungen, welche häufig in diesen Massen vorkommen.

Kalium, }
Natrium, } in mehreren Steinen.

Calcium, }
 Magnesium, } sind als Kalk oder Oxide gewöhnliche
 Aluminium, } Bestandtheile der Meteorsteine.

Chrom, als Chrom-Eisen.

Zinn, als Zinnoryd in geringer Menge in der Steinmasse vertheilt, theils metallisch, an Eisen gebunden.

Kupfer, in sehr geringer Menge, mit Zinn vereinigt.

Nickel, im meteorischen Olivin und im Meteorisen.

Mangan und

Kobalt gewöhnlich mit

Eisen verbunden, welches nicht nur metallisch, sondern auch als Magneteisen den Steinen ganz gewöhnlich eingeengt ist.

Das sind nun lauter wohl bekannte Stoffe unserer Erde. Die Steine aber, von denen die Rede ist, fallen aus der Luft herab, oder, wie man auch sagt, vom Himmel nieder, und sind zu allen Zeiten gefallen. Woher kommen nun diese Steine, wo ist ihre Heimath?

Nach dem Berichte von Plutarch vermuthete Anaxagoras von einem zu seiner Zeit bey Megos Potamos in Thracien gefallenen Steine, daß er von einem andern Weltkörper ausgeworfen seye. Diese, vielleicht die Wahrheit einschließende, Ansicht, so wie alles Andere, was von der ältesten Zeit bis herauf gegen das Ende des 18. Jahrhunderts von aus der Luft niedergefallenen Steinen berichtet wurde, fand keine Beachtung. Die Naturforscher zogen die Zuverlässigkeit solcher Nachrichten in Zweifel, Niemand hielt Meteorsteinfälle für möglich, und was die Alten davon überliefert hatten, das wurde als lächerliche Fabel und Aberglaube verworfen. Da sprach unser Landsmann Ghladni 1794 in seiner anziehenden Schrift: „Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderen ihr ähnlichen Eisenmassen, nebst einigen damit in Verbindung stehenden Naturerscheinungen“ mit großer Bestimmtheit aus, daß dergleichen Massen wirklich aus der Luft herabfallen, und daß sie außerhalb der Erde entsprungen, kosmischen Ursprungs seyn müssen. Im gleichen Jahre ereignete sich zu Siena in Italien ein Meteorsteinfall. Olbers beschrieb ihn 1795, und äußerte dabei die

Idee, daß dergleichen Steine vom Monde ausgeworfen seyn könnten, hielt es aber doch für wahrscheinlicher, daß sie aus dem Befas herstammten. In demselben Jahre ereignete sich zu Wetzlarstage in Vorkyrie am 13. December ein Meteorsteinfall, welcher gehörig beglaubiget wurde. Howard untersuchte die Steine, fand darinn metallisches Eisen eingesprengt, entdeckte Nickelgehalt, und theilte seine Untersuchung im Jahr 1802 der Königl. Gesellschaft in London mit. Durch diese Arbeit veranlaßt, sprach nun im gleichen Jahre Laplace die Idee aus, daß die Steine von dem Monde kommen, zutugend, die den Fall begleitende Feuererscheinung habe ihren Grund in der Zusammenbrückung der Luft in Folge der unendlichen Geschwindigkeit, mit welcher die Meteorsteine in die Atmosphäre eindringen, welche jedoch durch den Widerstand der Luft so verringert werde, daß der Fall zuletzt nur mit der gewöhnlichen Fallgeschwindigkeit geschehe. Ein neues auffallendes Ereigniß war aber noch nöthig, um auch sehr noch der Ansicht Chladnits Anerkennung und Eingang zu verschaffen. Der Zufall wollte es, daß sich einige Monate nach dem Ausspruche von Laplace, am 26. April 1803 zu Rügge im Dep. de l'Orne, einer der größten und merkwürdigsten Steinregen ereignete, wobei auf eine gewisse Fläche gegen ein Paar Tausend Steinstücke fielen. Die Zahl der Augenzeugen war groß, und die französische Academie der Wissenschaften, schon aufmerksamer geworden auf solche Ereignisse, übertrug ihrem Mitgliede Biot eine Untersuchung der Verhältnisse an Ort und Stelle. Sein Bericht hob nun alle Zweifel, daß die Steine von oben herabgefallen wären, unter Erscheinungen, die denjenigen, welche man von früheren Steinfällen anführte, so sehr ähnlich waren, daß dadurch auch alle älteren Berichte von Meteorsteinfällen glaubwürdig wurden.

Von jetzt an erregen alle ähnlichen Massen die größte Aufmerksamkeit, und man steng nun an darüber nachzudenken, wo diese Massen gebildet worden, von wo sie kommen möchten, was überzeigte sich dabei immer mehr und mehr von der Richtigkeit der Chladnischen Ansicht und von der Wahrscheinlichkeit, daß sie vom Monde ausgeworfen werden.

Es ist bekannt, daß die uns zugewandte Seite des Mondes

und Unerwarteten und sehr Ringgebirgen, die den Kratern der Vulkanen unserer Erde sehr ähnlich sind, ganz besetzt ist. Diese Ringgebirge, die im Verhältniß zur Größe des Mondes, viermal höher sind, als die Berge auf der Erde, mächtig hohe Wälle, die meistens große Kraterbeden umschließen, zeigen eine Masse, die nahezu die Größe hat, welche hinreichen würde, den Krater anders zufüllen. Sie scheinen daher nichts anderes als diejenige Masse zu seyn, welche vor der Entstehung des Kraters den ganzen Raum ausgefüllt hat, woraus folgt, daß die unsern Kratern so ähnliche Vertiefungen, durch Eruptionen entstanden sind. Welche ungeheure Kraft gehört aber dazu, Massen von solcher Größe bis zu einer Höhe von 25,000 par. Fuß aufzuhäufen?

Nach den Beobachtungen der Astronomen sind einige dieser Feuerberge des Mondes jetzt noch thätig. Wenn nur die Kraft, welche auf dem Monde Eruptionen bewirkt, jedenfalls so groß angenommen werden muß, als die Auswurfkraft der irdischen Vulkane, so müssen sich die ausgeworfenen Körper bedeutend weiter von dem Monde entfernen als von der Erde, und zwar nach folgenden Gründen: erstens beträgt die Masse des Mondes nur $\frac{1}{80}$, oder 1,42 Procent von der Masse der Erde, und deshalb macht auch die Schwere, oder die Kraft, mit welcher der Mond alle Körper auf seiner Oberfläche anzieht, nur den fünfsten Theil von der Schwere der Erde aus; zweitens hat der Mond keine Atmosphäre, oder nur eine äußerst feine, der Wurf geschieht folglich in einem jedenfalls sehr verdünnten Raume, und die ausgeworfenen Körper erleiden also nicht den mechanischen Widerstand, den die Atmosphäre der Erde den auf ihr geworfenen Körpern entgegensetzt, die daher bald wieder zur Ruhe kommen; drittens ist der Auswurf immer gegen die Erde gerichtet; da der Mond der Erde beständig dieselbe Seite zukehrt, und während nun ein geworfener Körper vom Monde aufsteigt, nimmt die Anziehung der Erde zu demselben beständig zu, indessen die Anziehung des Mondes stetig abnimmt; viertens endlich liegt die Gleichgewichtsgränze zwischen der Erde und dem Monde, der Punkt, wo die Anziehungssphären beider an einander gränzen, bedeutend näher am Monde als an der Erde, und eine Auswurfkraft, durch welche ein Körper in der Secunde 7771 Fuß fortgeschleu-

dort wird, würde, nach Biot, diese Gränze erreichen. Mit einem geringen Kraftüberschuß wird der Körper dieselbe übersteigen, dadurch in den Anziehungskreis der Erde gelangen, und in Folge dessen auf die Erde niederfallen müssen. Jene Geschwindigkeit ist etwa fünf- bis sechsmal größer als die einer 24pfündigen Kanonenkugel beim Austritt aus der Geschützröhre, und wird schon von der Wurfkraft unserer Vulcane übertroffen. Da nun ein Körper, mit einer gewissen Kraft vom Monde aus in die Höhe geworfen, daher sechsmal so hoch steigt als wenn er von der Erde aus geworfen würde, so stellt sich, mit Erwägung der angeführten Thatsachen, klar heraus, daß Auswurfsschlinge von Mondvulcanen allerdings auf die Erde herabfallen können.

Angenommen, daß die aus der Luft niederfallenden Meteorsteine wirklich vom Monde kommen, so werden sie wahrscheinlich meistens vom höchsten Punkte der Scheibe abstammen, da sie von hier aus am leichtesten über die Gleichgewichtslinie hinausgeworfen werden können. Sie dürften somit von einer beschränkten Bergmasse herkommen, und dies erklärte sodann ihre große Gleichheit in physikalischen und chemischen Verhältnissen, da ein und derselbe Berg leichte Massen von ziemlich gleichen Beschaffenheit ausgeben kann.

Von Meteorsteinmassen, welche in deutschen Ländern niedergefallen sind, verdienen besonders angeführt zu werden: die Masse von Ensisheim im Elsaß, welche 1492 niedergefallen ist, von der ein großes Stück in der Kirche des genannten Orts aufgehängt ist; der Stein von Stannern, der 1808, und der Stein von Erxleben, der 1812 niedergefallen ist. Weitere gut bekannte Meteorsteine sind die von Lissa, Smolensk, Juvenas, Dynares, Chantonnais, Sontalar, Blansko. Der Stein von Blansko ist der erste, welcher in Folge einer planmäßigen und consequenten Nachsuchung gefunden worden ist. Am 25. November 1832, Abends 6 1/2 Uhr, erschien in der Nähe von Blansko in Mähren ein stark leuchtendes Feuermeteor, das mit donnerähnlichem Getöse verschwand. Der Berg- und Hüttendirector Reichenbach befand sich zu dieser Zeit gerade auf dem Felde, war ein Zeuge des Meteors, erkannte dasselbe als eine Erscheinung, welche gewöhnlich den Fall von Meteorsteinen begleitet,

laßt mit Steintrümmern vermengt. Crystallisirte Abänderungen kommen aus Cornwall, Sibirien, von der Grube Käusersteimel am Westerwalde und von der Insel Raalsöe in der Färder Gruppe, die übrigen findet man zu Rheinbreitenbach, Siegen, Eisfeld, Ramsdorf und auf vielen Kupferwerken in Ungarn, Schweden und Norwegen. Im Schutlande kommt es besonders häufig in Nordamerika vor, an den Ufern des Flusses Ontonagon, zwischen den Seen Huron und Superior. Unter ähnlichen Verhältnissen, doch minder häufig, findet es sich im nordwestlichen Theile der Hudsonsbay, in Canada, auf den Bäreninseln, in Kamtschatka, China, Japan und Chili.

Es wird zur Darstellung des reinen metallischen Kupfers benutzt.

3. Geschlecht. Gediegen-Bley.

Draht-, haarförmig, drendritsch und in Körnern; dehnbar und geschmeidig. $\rho. = 1,0 \dots 2,0$; spec. Gew. = 11; Metallglanz; bleygrau; undurchsichtig; abfärbend. Besteht aus metallischem Bley. Schmilzt leicht; beschlägt die Kohle gelb; wird beim Schmelzen auf Knochenasche von dieser allmählich eingesogen. Löst sich in Salpetersäure; wird durch Schwefelsäure aus der Auflösung gefällt.

Findet sich bey Alton in England auf einem Gange im Bergkalk; in draht- und haarförmigen Gestalten kommt es in alten Gruben von Carthagena in Murcia in Spanien vor; mit Bleyglanz verwachsen hat man es im Bette des Anglatze-Flusses in Nordamerika gefunden, in Körnern im sibirischen Gold- und Platinsand in den Newjänkschen und Welskowskischen Ablagerungen. Ba allererst hat auf dessen Vorkommen der norwegische Zoologe Kärstke mit jener Umsicht und Besonnenheit aufmerksam gemacht, welche den früheren Unglauben über seine Existenz beflachte. Er fand es auf der Insel Madera in ziemlicher Quantität in Blasenräumen eines lavaartigen Gesteins.

4. Geschlecht. Gediegen-Wismuth.

Syn. Detachdrisches Wismuth.

Crystallsystem regulär, hemiedrisch. Die Crystalle sind Tetraeder, Verbindungen zweyer Tetraeder, wie Fig. 203, S. 423,

über eines Tetraëders mit dem Rautendodecaëder wie Fig. 204, S. 423. Sehr oft sind die Gestalten verzerrt; ihre Oberfläche oft uneben. Theilbarkeit nach den Flächen eines Octaëders, vollkommen.

$\rho. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 9,6 \dots 9,8$; Metallglanz; röthlich-silberweiß; durch Anlaufen grau, roth oder blau. Besteht aus metallischem Wismuth, und enthält häufig etwas Arsenik. Sehr leichtflüchtig; leicht löslich in Salpetersäure; die Lösung wird durch Wasser zerseht, in dem sich ein weißer Niederschlag absetzt.

Findet sich selten deutlich crystallisirt, meist in crystallinischen Parthien, baumsförmig, gestrikt, in Blechen, verb und eingesprenkt. Es kommt im Ganzen selten vor, auf Gängen, im Grund- und Uebergangsgebirge, wie zu Johannegeorgenstadt, Annaberg, Altenberg, Schneeberg, Joachimsthal, Diber im Bananischen, Rodun in Norwegen, Wittichen im Schwarzwalde und an einigen anderen Orten.

Es wird seiner Leichtflüchtigkeit wegen zum Schnellloth benutzt, und ist in Sachsen ein Gegenstand bergmännischer Gewinnung.

5. Geschlecht. Gebiegen-Tellur.

Syn. Rhomboëdrisches Tellur.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Die Crystalle sollen Rhomboëder von $115^\circ 12'$, und mit einer geraden Endfläche combinirt seyn. Theilbarkeit nach den Rhomboëderflächen. $\rho. = 2,0 \dots 2,5$; spec. Gew. $= 6,1 \dots 6,4$; Metallglanz; zinweiß; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Tellur, und enthält nebstdem etwas Gold und Eisen. Färbt die Löthrohrflamme blau; leichtflüchtig, flüchtig. Löst sich in Salpetersäure. Außerst selten. Hat sich früher eingesprenkt und in kleinen, verben, körnigen Parthien auf Gängen zu Fagebay bey Zalathna in Siebenbürgen gefunden.

6. Geschlecht. Gebiegen-Spießglanz.

Syn. Rhomboëdrisches Antimon.

Crystallsystem drey- und einachsig, hemiedrisch. Die bisher beobachteten Crystalle sind künstlich erzeugt. Durch Theilung

wird ein Rhomboëder von $116^{\circ} 59'$ erhalten; Aberdies vollkommen theilbar parallel einer horizontalen Endfläche.

$\rho. = 3,0 \dots 3,5$; spec. Gew. $= 6,6 \dots 6,7$; Metallglanz; zinnweiß; undurchsichtig; spröde. Besteht aus metallischem Spießglanz, und enthält Beimengungen von Arsenik, Silber und Eisen. Leichtflüchtig; verbrennt mit Funkensprühen, wenn eine stark erhitzte Kugel durch Herabfallen sich in viele kleine zertheilt, und beschlägt den Körper, über welchen die kleinen Kügelchen hingeleiten, weiß. Löst sich in Salzsäure auf; die Auflösung wird durch Wasser zersetzt, unter Absatz eines weißen Niederschlags.

Findet sich theils verb mit körniger Zusammensetzung, theils in traubigen und nierenförmigen Gestalten, zu Allumont im Dauphiné, zu Przibram in Böhmen, zu Sala in Schweden und zu Andreasberg am Harze.

7. Geschlecht. Gebiegen-Arsenik.

Syn. Rhomboëdrisches Arsenik.

Erkaltssystem drey- und einachsig. Die Crystalle sind Rhomboëder von $114^{\circ} 26'$, in Combination mit einem spitzern Rhomboëder von $85^{\circ} 26'$. Theilbarkeit nach beiden Rhomboëdern und nach einer horizontalen Endfläche, unvollkommen.

$\rho. = 3,5$; spec. Gew. $= 5,7 \dots 6,0$; Metallglanz; stahlgrau oder weißlichbleygrau; durch Anlaufen sehr bald graulich-schwarz; spröde; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Arsenik, und ist gewöhnlich vermengt mit etwas Spießglanz, Bley, Silber, bisweilen auch mit Spuren von Gold. Verflüchtigt sich vor dem Löthrohr ohne zu schmelzen, und entwickelt einen starken Knoblauchgeruch.

Kommt sehr selten in deutlich erkennbaren Crystallen vor, gewöhnlich in kugelligen, nierenförmigen, traubigen und stalactischen Gestalten mit schaliger Zusammensetzung (Scherbenkobalt, Näpfchenkobalt), selten mit stängeliger oder faseriger Textur, öfters auch in Matten, verb und eingesprenkt.

Findet sich vorzüglich auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge, zu Freyberg, Schneeberg, Mansfeld, Marienberg, Joachimsthal im Erzgebirge, zu Andreasberg am Harze, zu

Wittichen und im Münsterthal im Schwarzwalde, zu Markirch im Elsaß, zu Allemont im Dauphiné, zu Rongberg in Norwegen, Kapnik in Siebenbürgen und Dramiza im Banat.

Man benutzt es zur Darstellung von reinem, metallischem Arsenik (Fliegenstein) und von weißem Arsenik.

8. Geschlecht. Gediegen-Quecksilber.

Syn. Flüssiges Mercur.

Flüssig, in Gestalt von Tropfen. Spec. Gew. = 13,5 ... 13,6; Metallglanz, starker; zinnweiß; undurchsichtig. Erstarrt bey einer Kälte von 40° C., und schießt dabey in regelmäßigen octaëdrischen Crystallen an. Siedet bey 360° C.; verdampft in allen Temperaturen. Besteht aus metallischem Quecksilber. Verflüchtigt sich vor dem Löthrohr ohne Rückstand. Löst sich leicht in Salpetersäure auf; die Lösung wird durch Salzsäure und Kochsalz weiß gefällt; metallisches Kupfer scheidet daraus das Quecksilber metallisch ab.

Kommt theils eingesprengt und in Tropfen, theils in Höhlungen und Drusenräumen des Zinnober, oder in schieferigen Gesteinen vor, und findet sich zu Wolfstein, Mährsfeld und Moschel bey Zweibrücken, zu Idria in Krain, zu Horzowitz in Böhmen, zu Delach in Kärnten, zu Almaden in Spanien, auch in Peru und China. Wird zur Darstellung von reinem Quecksilber benutzt.

9. Geschlecht. Amalgam.

Syn. Dodecaëdrisches Mercur.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Rautendodecaëder und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaëder, dem Icositetraëder und dem Hexakisoctaëder, Kanten und Ecken abgerundet, wie geflossen. Theilbarkeit, Spuren parallel dem Dodecaëder. δ . = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 13,7 ... 14,1; Metallglanz; silberweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von 2 M.-G. Quecksilber mit 1 M.-G. Silber, und enthält 64 Quecksilber und 36 Silber. Hinterläßt bey'm Glühen metallisches Silber.

Findet sich theils in Crystallen, theils in solchen ähnlichen,

kugelförmigen Gestalten, theils in Trümmern, dünnen Platten, verb und als Anflug, am Landsberg bey Moskau im Freybrückischen, zu Ezlana in Ungarn, zu Almaden in Spanien, und soll ehebem auch zu Allemont im Dauphiné und zu Sala in Schweden vorgekommen seyn.

10. Geschlecht. Gebiegen-Silber.

Sp. Hexaedrisches Silber.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Würfel, Octaëder, Combinationen dieser beiden Gestalten, Tricosterräder und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaëder, und eines Leucitoëds mit dieser Gestalt. Gar oft sind die Crystalle verzerrt, theils durch einseitige Verkrümmung oder Verlängerung, theils durch unvollständiges Ausreten der Flächen. Selten kommen Zwillinge vor; die Zusammenschungsfläche parallel einer Octaëderfläche. Die Oberfläche der Crystalle ist oft uneben, rauh oder gestreift. Theilbarkeit noch nicht wahrgenommen.

$\rho = 2,5 \dots 3,0$; spec. Gew. $= 10,3 \dots 10,5$; Metallglanz; Silberweiß, durch Anlaufen oft gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; dehnbar und geschmelzlig. Besteht aus metallischem Silber, und enthält oft Beymengungen von Arsenik, Spießglanz, Kupfer und Spuren von Gold. Löst sich leicht in Salpetersäure auf; die Auflösung wird durch Salzsäure oder Kochsalzlösung weiß gefällt. Dieser Niederschlag (Hornsilber) schwärzt sich am Lichte.

Die Abänderungen dieses Geschlechtes kommen häufig, aber selten deutlich crystallisiert vor, und die Crystalle sind gewöhnlich klein, verzerrt und verschiedentlich gruppiert, in mannsaltigen, zahnigen, draht-, haar- und baumförmigen, in moosartigen und gefrickten Gestalten; auch erscheint es in Platten, Blechen, Blättchen, verb, in stumpfackigen Stücken, in Körnern und als Anflug.

Das Gebiegen-Silber findet sich vorzüglich auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge, namentlich zu Freyberg (auf den Gruben Himmelsfürst und Pöfprung Gottes, auf deren ersterer schon centnerschwere Massen eingebrochen sind), Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Johantgeorgensstadt (Hier angeblich einmal eine

Masse von 100 Centnern), zu Joachimsthal, Przibram, An-
 drasberg, Wittichen im Schwarzwalde (wo auf der Grube Anton
 in neuester Zeit derbe Massen bis zu 8 Pfunden vorkommen),
 Rongsberg in Norwegen (früher öfters Massen von 100 Mark;
 im Juny 1834 wurde eine derbe Silbermasse von 7½ Centner
 gefunden), Schlangenberg in Sibirien, zu Guanarnato, Zacatecas,
 Fresnillo und Tatorce in Mexico, zu Cerro de Pasco in Peru,
 bey Coquimbo in Chili. In kleinerer Quantität findet es sich
 noch an mehreren anderen Orten. Der Silberreichthum von Peru
 ist außerordentlich. Im Jahr 1760 hat ein einzelnes Gruben-
 gebäude 90,000 Mark Silber geliefert. Ueberhaupt sind die
 americanischen Gebirge silberreich. Nach H. v. Humboldt
 haben die spanischen Colonien seit ihrer Entdeckung bis zum Jahr
 1803, also in einem Zeitraum von 311 Jahren, 512,700,000
 Mark Silber geliefert. Als H. v. Humboldt diese Colonien
 verließ, war die jährliche Ausbente noch 3,460,000 Mark, wo-
 von Mexico allein 2,340,000 Mark erzeugte.

Das Silber, sagt er, welches seit drey Jahrhunderten in
 dem neuen Continente dem Schooß der Erde entzogen worden
 ist, würde, von aller Beymischung gereinigt und zusammenge-
 schmolzen, eine Kugel von 68 par. Fuß Durchmesser bilden.

Die Silberausbente von Europa und dem asiatischen Ruß-
 land beträgt über 324,000 Mark; davon erzeugt das russische
 Reich gegen

die Oesterreichischen Staaten über	77,000 Mark.
Sachsen über	90,000 "
der Harz	60,000 "
die Preussischen Länder	36,000 "
Norwegen	20,000 "
England	14,000 "
Frankreich	12,000 "
Schweden	6,600 "
Raffau	6,000 "
Savoyen	3,500 "
Baden	2,500 "
Sachsen-Koburg	2,000 "
Anhalt-Bernburg	2,000 "

Belgien	700 Mark.
America erzeugt jährlich über	3,600,000 "
und zwar Mexico	2,196,000 "
Peru	573,000 "
Buenos-Ayres	542,000 "
Chili	184,000 "
die Vereinigten Staaten	120,000 "
Schumbien	1,250 "

Demzufolge werden alljährlich 3,924,000 Mark Silber dem Schoof der Erde entzogen, und sofort wieder verminzt und zu den verschiedenartigsten Silberarbeiten verwendet in einem ungefähren Betrage von 95 Millionen Anthen!

11. Geschlecht. Spießglanzsilber.

Krystallsystem ein- und einachsig. Die Krystalle sind verticale rhombische Prismen, verbunden mit den zweiten Seitenflächen b , und an den Enden mit einem Rhombenoctaëder und dem zweiten horizontalen Prisma f , wodurch sie den Anschein einer Combination eines sechsseitigen Prismas mit einem sechsseitigen Pyramide erhalten. Die zweite Seitenfläche und das zweite horizontale Prisma erscheinen hiezuweilen vorherrschend, und die Gestalt ist sodann Fig. 164, S. 371, ähnlich. Oefters tritt auch eine horizontale Endfläche hinzu, welche mitunter auch allein an den Enden liegt, Oefters Zwillinge; die Zusammensetzungsfäche eine verticale Prismenfläche. Die Zusammensetzung wiederholt sich öfters mit parallelen und mit geneigten Zusammensetzungsfächen, so daß Aggregate entstehen, wie beim Arsenigkit und Weißbleierz, mit deren Krystallisationen die Gestalten dieses Geschlechtes überhaupt große Aehnlichkeit haben. Die verticalen Prismen gestreift. Theilbarkeit nach der horizontalen Endfläche und nach f deutlich; unvollkommen parallel dem verticalen Prisma.

ρ . \approx 9,5; spec. Gew. = 9,4 ... 9,8; Metallglanz; Silberweiß, durch Anlaufen gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; etwas spröde. Besteht aus einer Verbindung von 2 M. G. Silber und 1 M. G. Spießglanz, und enthält 76 Silber und 24 Spießglanz. Schmilzt leicht, gibt Antimonrauch und hinterläßt bey längerem Schmelzen endlich ein Silberkorn.

Findet sich theils crystallisirt, theils knollig, nierenförmig, in dünnen Platten, verb und eingesprengt, mit feinerer und strahlig-blättriger Zusammensetzung. Kommt auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge vor zu Andrasberg am Harz, und ist in früheren Jahren ausgezeichnet auf der Grube Wenzel zu Wolfach im Schwarzwalde vorgekommen. Als weitere Fundorte werden Allemont in Frankreich und Guadalcanal in Spanien angeführt.

12. Geschlecht. Gebiegen-Gold.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Würfel, Octaeder, Rautendodecaeder, Pyramidenwürfel, Combinationen der ersteren drey Gestalten, Combinationen eines Leucitoids mit dem Octaeder, und bisweilen kommen sehr zusammengesetzte Combinationen vor, in denen man Octaeder, den Würfel, das Rautendodecaeder, ein Leucitoid und Hexaëdoctaeder unterscheidet. Auch Zwillinge parallel einer Octaederfläche verbunden, und durch Pyramidenwürfel gebildet. Diese Zwillingescrystalle bilden sechseckige Pyramiden, wie bey dem Gebiegen-Kupfer, da bey diesem Pyramidenwürfel die zweyerley Kanten unter einander gleich sind. Theilbarkeit nicht beobachtet.

H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 12,6 ... 19,09; Metallglanz; goldgelb, ins Messinggelbe und ins Orangebe; undurchsichtig; dehnbar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Golde, welches aber niemals ganz rein ist, sondern immer etwas Silber, und zwar in sehr verschiedenen Mengen, und eine kleine Quantität von Kupfer und Eisen enthält. Das reinste, bisher bekannte Gebiegen-Gold ist dasjenige aus dem Goldsande von Schadrinsk bey Katharinenburg am Ural, es enthält 98,96 Gold; 0,16 Silber, 0,35 Kupfer und 0,05 Eisen. Der Silbergehalt steigt bis auf 38,38 Procent. Das spec. Gewicht steht mit dem Silbergehalte in umgekehrtem Verhältnisse; je größer derselbe ist, desto kleiner das specifische Gewicht.

Bey dem Silbergehalt von	0,16	Proc.	ist das spec. Gew. =	19,09
„ „ „ „	5,23	„ „ „ „	„ „ „ „	16,44
„ „ „ „	9,35	„ „ „ „	„ „ „ „	17,98
„ „ „ „	2,02	„ „ „ „	„ „ „ „	17,58

Bey dem Silbergehalt von	10,65	Proc.	ist das spec. Gew. =	17,48
" " " "	12,07	" " " "	" " " "	17,46
" " " "	13,19	" " " "	" " " "	16,36
" " " "	16,15	" " " "	" " " "	17,06
" " " "	39,38	" " " "	" " " "	14,55

Doch finden hier auch Anomalien statt, in dem das Gold von 16,15 Silbergehalt ein größeres spec. Gew. zeigt, als dasjenige mit einem Silbergehalt von 13,19 Procent. Mit dem größeren Silbergehalte wird die Farbe messinggelb und graulich. Löst sich nur in Königswasser auf, unter Hinterlassung von Chlor Silber.

Die verschiedenen Abänderungen des Gediegen-Goldes finden sich theils deutlich crystallisirt, die Crystalle sehr klein, aufgewachsen oder in Drusen versammelt und lose, theils in den mannichfaltigsten, crystallinischen Formen und Gruppierungen, als zahnig, draht-, haar-, moos-, baumsförmig, gestrikt, astig, in Blechen, Platten, dorb, eingesprengt, als Anlag, in stumpfseitigen Stücken, Körnern, als Sand und feiner Staub.

Das Gold ist außerordentlich verbreitet, findet sich an sehr vielen Orten, aber in sehr ungleichmäßiger Vertheilung, und nur an wenigen Orten in größerer Menge. Seine gewöhnlichen Begleiter sind Quarz, Schwefelkies und Brauneisenstein, Gänge seine allgemeinste, ursprüngliche Lagerstätte, und Feldspath- und Hornblendegesteine, so wie Conglomerat- und Schiefergebilde des Uebergangsgebirges, diejenigen Gebirgsbildungen, in welchen es vorzugsweise vorkommt. Im Gränstein- und Spennitgebirge liegen die goldführenden Gänge von Ungarn und Siebenbürgen (Kremnitz, Schemnitz, Raggab, Zalatna, Offenbanya), so wie diejenigen von Antioquia und Choco in Südamerika, der Insel Aruba bey Suracao, wie auch die goldführenden Eisenerzgänge in Nordcarolina; im Grauwacken- und Thonschiefergebirge liegen die goldführenden Gänge von Peru, Mexico, Neuspanien und zu Beresow am Ural, wie auch am Schlangenbergr in Sibirien, woher das sogenannte Electrum kommt, welches einen Silbergehalt von 36 Procent hat. In feldspathigen, porphyrischen Gesteinen findet es sich zu Bördspat in Siebenbürgen; in quarzigem Talschiefer und im Eisenglimmerschiefer kommt es in

Brasilien vor, zu Villa Rica, Matto Grosso und Tejuco; auf Lagern zu Pöfling und Magurka in Ungarn, Kauris und Schellgaden in Salzburg und am Galanda in Graubünden. In geringer Menge hat man es auf seiner ursprünglichen Lagerstätte gefunden zu Kongsberg in Norwegen, zu Redelfors in Schweden, zu Eula in Böhmen, zu Zillerohe am Harze, im Billerthal in Tyrol, im Schwarzagrund bey Rudolfsbadt, am Hundsruck, bey la Garbette in Frankreich.

In sehr beträchtlicher Menge kommt es im Schuttlande als Waschgold vor, öfters von Magnet Eisen, Chromeisen, Zirkon und anderen Edelsteinen begleitet, bisweilen auch von Demant und Platin. Unter solchen Verhältnissen findet es sich namentlich in Brasilien, ferner in Mexico, Peru, Chili, in Nordcarolina, auf der Insel Aruba, und in neuerer Zeit hat man, seit 1819, im asiatischen Rußland, an beiden Seiten des Ural und im Norden desselben, goldführendes Schuttland von nie geahnter Ausdehnung und Reichhaltigkeit aufgefunden. Das Gold findet sich hier gewöhnlich in kleinen Körnern und Schüppchen im Quarzsand, der stark mit Geschieben von Granitstein, Serpentin und Chloritischiefer untermengt ist. Zuweilen kommen Stücke von bedeutender Größe vor, besonders in der Wäsche Tzarewo Alexandrowsk bey Niasa im südlichen Ural, wo Stücke von 13 und 16 Pfund, und ein Stück von 24 $\frac{1}{2}$ russischen Pfunden vorgekommen ist. Auch im Innern von Africa, in Manica, Monomotapa, um Schabun, auf der Terasse von Fajoglo, im Lande Bouré und in der Landschaft Bambuck liegen goldreiche Schutt-
ablagerungen.

In der Capitania Porpaz in Südamerica kommt eine Art Gediegen-Gold vor, welche den Namen Ouro poudre, faules Gold, hat, leicht schmelzbar ist, und aus 85,93 Gold, 9,85 Palladium und 4,17 Silber besteht.

In kleinerer Menge kommt Gediegen-Gold in kleinen Bächchen bey Ahlapinn in Siebenbürgen vor, im Bette der Aridge (Aurigira) in Frankreich, im Rheinbette zwischen Waldshut und Mannheim, wohin das von der Aar beygeführt wird, auch in der Donau, der Isar und einigen Flüssen in Macedonien, Thracien und mehreren andern, findet sich Gold, und in der neuesten

Zeit hat man in der Moselgegend, im Grobbach bey Enkirch, ein Stück Gold von 4 Loth gefunden, und in kleinern Stüchken, im Werthe einiger Ducaten, kommt es öfters im Goldbach bey Mandel, unfern Berncastel, vor.

Die ehemaligen spanischen Colonien haben in einem Zeitraum von 311 Jahren 3,625,000 Mark Gold geliefert, und während dieser Zeit ist die Goldproduction von Brasilien wenigstens zweymal so groß gewesen, so daß man sie mit Wahrscheinlichkeit auf 6,200,000 Mark anschlagen kann. Von 1752 bis 1761 betrug die reichste Ausbeute jährlich über 48,000 Mark.

Die gegenwärtige jährliche Ausbeute ist beyläufig folgende:

Brasilien liefert	2,500 Mark.
Mexico	18,594 „
Columbien	18,338 „
Chili	11,468 „
die Vereinigten Staaten . . .	11,154 „
Peru	3,600 „
Buenos-Ayres	2,000 „
Rußland	22,000 „
Sibirien	12,000 „
Indischer Archipelagus . . .	5,000 „
Südafrika	2,000 „
Südafrika	16,000 „
Oesterreich	4,500 „
Baden	50 „
Piemont	25 „
Harz	10 „
Schweden	8 „

Im Ganzen werden also jährlich ungefähr 151,800 Mark Gold gewonnen, wovon indessen Europa nur ungefähr den dreyßigsten Theil producirt.

13. Geschlecht. Gediegen-Platin.

Crystallsystem regulär. Crystalle, kleine Würfel, sind höchst selten. Gewöhnlich in platten oder eckigen, oft rundlichen Körnern, seltener in stumpfeckigen Stücken. Theilbarkeit nicht genau nachgewiesen.

Sp. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 17,1 ... 17,9. Metallglanz; Kahlgrau; undurchsichtig; geschmeidig und dehnbar. Besteht aus metallischem Platin, mit Spuren von Gold, oder hat eine Beimengung von Iridium, Rhodium, Palladium, Osmium, Kupfer, Eisen und Mangan. Ein brasilianisches Gediegen-Platin fand Wollaston beynahe vollkommen rein. Magnetische Platinförner von Nischon-Lagilel am Ural fand Berzelius zusammengesetzt aus: Platin 73,38, Eisen 12,98, Iridium 2,35, Rhodium 1,15, Palladium 0,30, Kupfer 5,20, und unlöslichen Theilen 2,30; nicht magnetische Körner von demselben Orte enthalten: Platin 73,94, Eisen 11,04, Iridium 4,97, Rhodium 0,86, Palladium 0,28, Kupfer 0,70, unlösliche Theile 1,06. Das Gediegen-Platin von dieser Stelle besteht somit hauptsächlich aus einer Verbindung von Platin mit Eisen. Im Platin von Barbacons in Antioquia in Südamerika fand Berzelius: Platin 94,30, Eisen 5,31, Rhodium 3,48, Iridium 1,46, Palladium 1,06, Kupfer 0,74, Osmium 1,03, Kalk 0,12, Quarz 0,60; und im Platin von Soroblagodat am Ural: Platin 86,50, Eisen 8,32, Rhodium 1,18, Palladium 1,10, Kupfer 0,45, unlösliche Theile 1,49. Im Platin von Choco in Südamerika fand Evansberg: Platin 86,16, Eisen 8,03, Rhodium 2,16, Iridium 1,69, Palladium 0,35, Osmium 0,97, Osmium-Iridium 1,91, Kupfer 0,40, Mangan 0,10. Die Beimengungen sind also nicht nur ungewöhnlich zahlreich, sondern sie bestehen zum Theil auch aus seltenen, wenig verbreiteten Stoffen. Unschmelzbar vor dem Löthrohr; löst sich in Königswasser; die Auflösung wird durch Kalium- und Ammoniakverbindungen gelb gefärbt.

Findet sich, zugleich mit Gediegen-Gold, auf Brauneisenstein führenden Gängen, die im Epenitzgebirge aufstehen, zu Santa Rosa in Antioquia, eingesprengt im Grünslein-Epenitzgebirge des Urals zu Laja, zwischen Nischon-Turinsk und Nischon-Lagilel. Weit häufiger aber kommt es im Schuttlande vor, welches bei der Verwitterung der Grünslein-Epenitbildung entsteht, welcher das Platin angehört. Als begleitende Mineralien erscheinen Magneteisenstein, Titanisen, Chromisen, Gediegen-Gold, verschiedene Edelsteine, Bruchstücke von Serpentin u. d. a. Unter solchen Verhältnissen findet es sich zu Choco und Barbacons in

Südamerika, von Diamant begleitet zu Minas-Geraes in Brasilien, auch hat man es auf St. Domingo, im Thale von Jaly, gefunden.

In neuerer Zeit erst wurde es am Ural aufgefunden, und zwar auf der West- und Ostseite des Gebirges, theils mit Gediengen-Gold, theils für sich allein, und namentlich mit Titaneisen bey Nischon-Tagilsk, am westlichen Abfall des Gebirges, im Gebiete des Grünsteins, der hier die Messerscheide des Gebirges bildet. Die jährliche Platinausbeute am Ural beträgt zwischen 6—7000 Mark. Die Petersburger Sammlung bewahrt ein dort gefundenes Stück von 10 $\frac{1}{2}$ Pfund russisch, und die größten in America gefundenen Stücke sind diejenigen, welche in der Labradorer Sammlung (11641 Gran schwer), und in der Berliner Sammlung (1098 Gran schwer, von H. v. Humboldt mitgebracht) aufbewahrt werden. In neuester Zeit ist das Platin auch im Lande der Birmanen, mit Gediengen-Gold im Schuttlande von Bergströmen, gefunden worden.

Man stellt aus dem Gediengen-Platin das reine metallische Platin dar, welches, vermöge seiner Dehnbarkeit, Strengflüssigkeit und des Widerstandes, den es, mit Ausnahme des Königswassers, allen Säuren entgegensetzt, so wie seiner Eigenschaft, selbst in sehr hoher Temperatur sich nicht zu verflüchtigen, nicht zu oxydiren, zu den nützlichsten Metallen gehört, welche entdeckt wurden. Man wendet es vorzüglich zu Schmelz- und Siedgefäßen in chemischen, physikalischen, pharmaceutischen und den verschiedensten technischen Laboratorien an, und darf behaupten, daß Wissenschaft und Technik durch dasselbe in den Stand gesetzt wurden, erfolgreiche Entdeckungen, höchst wichtige Fortschritte zu machen.

14. Geschlecht. Gediengen-Palladium.

Kleine Körner und Schuppen. Härter als Platin; spec. Gew. = 11,3 ... 11,8; Metallglanz; licht stahlgrau, ins Silberweiße; geschmeidig und dehnbar; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Palladium, und hat eine kleine Beimengung von Platin und Iridium. Unschmelzbar vor dem Löthrohr; löst sich Salpetersäure auf.

Findet sich mit Gebiegen-Platin in Brasilien, in losen Körnern; zu Tillerode am Harze kommt es höchst sparsam in sehr kleinen Schuppen mit Gebiegen-Gold vor, das von Selenbley umgeben ist. Es wurde darinn auch etwas Platin gefunden, was in wissenschaftlicher Beziehung interessant ist, da nun Deutschland mit Gewissheit in die Reihe der plattinführenden Länder gestellt werden kann.

15. Geschlecht. Gebiegen-Zruidium.

Crystallsystem regulär. Die Crystalle sind Octaëder mit Würfelflächen. Theilbarkeit nach den Würfelflächen, undeutlich. $\rho. = 6,5$; spec. Gew. $= 21,5 \dots 22,6$; Metallglanz; silberweiß, durch Anlaufen gelblich; wenig dehnbar; undurchsichtig. Besteht aus 76,85 Zruidium, 19,64 Platin, 0,89 Palladium und 1,78 Kupfer. Schmilzt selbst nicht im Sauerstoffgebläse; wird von Königswasser nicht aufgelöst.

Findet sich selten in kleinen Körnern und Crystallen unter dem Platin von Nischon-Tagilsk und Newiansk am Ural.

16. Geschlecht. Osmium-Zrid.

Crystallsystem drey- und einachsfig. Die Crystalle sind Combinationen eines Hexagonododecaëders mit einer horizontalen Endfläche, und dem ersten sechsseitigen Prisma, ähnlich Fig. 46, S. 152. Die Endfläche herrscht oft vor, und die Crystalle erscheinen dadurch tafelförmig. Theilbarkeit parallel der Endfläche ziemlich vollkommen.

$\rho. = 7,0$; spec. Gew. $= 19,3 \dots 19,4$; Metallglanz; zinnoberweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von 1 M.-G. Osmium mit 1 M.-G. Zruidium, und enthält Osmium 49,34, Zruidium 46,77, Rhodium 3,15 und Eisen 0,74.

Verändert sich beym Glühen nicht; wird vom Königswasser nicht aufgelöst; im Kölbchen, mit Salpeter geschmolzen, riecht es etwas nach Osmium, und bildet nach dem Erkalten eine grüne Masse.

Findet sich selten in Crystallen, gewöhnlich in Körnern in dem Goldsande von Newiansk am Ural, 95 Werste nördlich von Katharinenburg, auch bey Bilimbajewsk, Ryschim und an

mehreren anderen Orten am Ural und zu Minas Gerais in Brasilien.

Außer dieser Verbindung hat man noch zwey andere gefunden, welche bleygraue Farbe, die Crystallform der beschriebenen, die gleiche Zerkleubarkeit und Härte, aber ein höhers spec. Gew. haben, nämlich von 21,1. Schmelzen beym Gläßen nicht, verlieren aber den Glanz, werden schwärzlich und verbreiten dabey einen durchdringenden Geruch nach Osmium, der die Augen heftig angreift. Sie bestehen aus einer Verbindung von 1 M.-G. Iridium mit 3 und mit 4 M.-G. Osmium. Sie enthalten überdieß etwas Rhodium, aber kein Platin. Hundert Riffon-Tagelal am Ural.

Geognosie.

Begriff.

Geognosie betrachtet das Verhältniß der einzelnen Mineralien zu einander, lehrt die Beschaffenheit der Gesteine, die Form, Structur und Lagerung der Gebirgsmassen kennen, welche die feste Erdrinde zusammensetzen, macht uns mit den organischen Resten bekannt, welche darin eingeschlossen liegen und mit den Verhältnissen der Bildung der Erdrinde und den Veränderungen, welche sie schon erlitten hat, und fortwährend noch erleidet.

Nach dem Namen, der abgeleitet ist dem Griechischen *gæ*, Erde und *gnos*, Kenntniß, wäre sie, strenge genommen und in allgemeiner Bedeutung, Kenntniß der Erde. Das Wort ist jedoch in dem bezeichneten, eingeschränkteren Sinne zu nehmen. Außerhalb Deutschland wird dafür ganz allgemein die Benennung Geologie gebraucht, die von *Wonner*, dem Begründer der positiven, wissenschaftlichen Geognosie, mit letzterem Namen vertauscht worden ist, weil, was man früher Geologie nannte, bis auf seine Zeit fast nur aus größtentheils ganz mißglückten Theorien über die Erdbildung bestand, die, theils wegen des damals sehr unvollkommenen Zustandes der Hilfswissenschaften, theils weil dabei gar Vieles aus der Region der Phantasie herbezogen wurde, wenig geeignet waren, den wissenschaftlichen Forscher anzusprechen und die Fortschritte der Wissenschaft eher hemmten als beförderten.

Seitdem haben aber Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik, Zoologie und vergleichende Anatomie ganz ungetrübliche, ja zum Theil riesenhafte Fortschritte gemacht, und sie setzen uns nunmehr

in Stand, wichtige Urkunden der Natur aufzufinden, zu lesen und darin Beweisstellen für die Geschichte der Erde zu entdecken, die für unsere Vorfahren ein verschlossenes Buch geblieben war. Auf solche Weise ist die Geologie in das Gebiet der Thatfachen zurückgekehrt, und hat sie sich in der öffentlichen Meinung in guten Ruf gesetzt, so daß sie jetzt ohne Scheu unter ihrem wahren Namen auftreten kann. Sie ist nun ganz dasselbe, was man in Deutschland mit Geognosie bezeichnet.

E i n t h e i l u n g.

Mineralien, welche große Massen der Erdrinde zusammensetzen, heißt man Gesteine, auch Gebirgsarten. Diese Bezeichnung wird allgemein gebraucht, die Mineralien mögen bey diesem Vorkommen einfache oder gemengte seyn, so bald sich deren allgemeine Verbreitung nachweisen läßt und sie mit gleichbleibender Beschaffenheit in großen Massen auftreten. Die größeren Gebilde, welche durch die Gesteine zusammengesetzt werden, heißt man Gebirgsmassen.

Nach diesen natürlichen Unterschieden der Gegenstände, welche die Geognosie zu betrachten hat, theilt man sie auf eine dem Studium förderliche Weise in zwei Abtheilungen:

1. In die Lehre von den Gesteinen, Gesteinslehre oder Petrographie, dem Griechischen *petra*, Fels und *grapho*, ich schreibe oder beschreibe, hergeleitet.

2. In die Lehre von den Gebirgsmassen, welche durch die Gesteine zusammengesetzt werden, Gebirgsmassenlehre, Orographie, nach dem griechischen Worte *Oros*, Berg, Gebirg, gebildet.

Erste Abtheilung.

P e t r o g r a p h i e.

Die Kenntniß der Gesteine wird bey der Betrachtung der verschiedenen Gebirgsbildungen vorausgesetzt, und deßhalb muß die Gesteinslehre der Gebirgsmassenlehre vorangehen.

Zusammensetzung der Gesteine.

Die Gesteine sind entweder einfache, gleichartige, d. h. von solcher Beschaffenheit, daß man bey ihnen weder mit dem

Bewaffneten Auge, noch durch Anwendung mechanischer oder chemischer Trennungsmittel eine Zusammensetzung aus verschiedenen Mineralkörpern nachweisen kann, oder sie sind gemengte, zusammengesetzte, ungleichartige, solche, bey welchen durch die angeführten Mittel eine Zusammensetzung aus verschiedenen Mineralien nachgewiesen werden kann.

Es sind nur einige wenige Mineralien, welche als ganz allgemein verbreitete, theils als einfache Gesteine auftreten, theils allgemein in die Zusammensetzung der gemengten eingehen. Sie gehören vorzüglich in die Classe der Erden und sind: Quarz, Feldspath, Glimmer, Kalk und Thon. — Alle übrigen in der Reihe der Gesteine hervortretenden Mineralien stehen diesen an allgemeiner Verbreitung und Masse weit nach. Gyps, Hornblende, Augit, Serpentin, Pechstein und Obsidian schließen sich denselben zunächst an.

Der einfachen Gesteine sind wenige, auch sind sie niemals so rein, wie das einzelne einfache Mineral, das in kleinen Individuen auftritt, während die Gesteine in großen Massen erscheinen, die in mannigfaltiger Berührung mit anderen Massen stehen.

Bey weitem die mehrsten Gesteine sind aus zwey oder mehreren einfachen Mineralien zusammengesetzt. Sie heißen in diesem Falle Gemengtheile des Gesteins. Selten ist ihre Quantität bey einem zusammengesetzten Gesteine gleich groß. Gewöhnlich übertrifft ein Gemengtheil den anderen, oder mehrere andere an Menge. Man nennt diesen alsdann den vorwaltenden Gemengtheil und von diesem sind sehr oft die Charaktere eines Gesteins abhängig. Doch übt öfters auch ein in geringerer Menge vorhandener Gemengtheil einen entschiedenen Einfluß auf die Eigenschaften eines Gesteins aus. Jederzeit heißt derjenige Gemengtheil, der die Haupteigenschaften eines Gesteins bedingt, der charakterisirende. Die Verbindung der Gemengtheile ist bald mehr, bald weniger innig. Sehr innig gemengte Gesteine haben nicht selten das Ansehen einfacher, ungemengter und ihre Zusammensetzung kann öfters nur auf chemischem Wege ausgemittelt werden.

Structure der Gesteine.

Sind die Theile eines Gesteins so zusammengefügt, daß kei-

ner als den anderen umschließend erscheint und bestehen diese Theile aus eiligen, scharfkantigen, crySTALLINISCHEN Körnern, die nach allen Seiten hin mit einander in gleicher Berührung stehen, so nennt man die Structur eine körnige. Bestehen die einzelnen Theile aber aus Blättchen, die sich vorzugsweise nach den vorherrschenden Dimensionen berühren, und daher lagenweise mit einander verbunden sind, so nennt man diese Structur die schieferige. Nicht nennt man solche Gesteine, deren Theile keine besondere Gestalt besitzen und die so innig mit einander verbunden sind, daß die Art der Verbindung nicht angegeben werden kann und das Ganze wie zusammengeschmolzen aussieht.

Besteht ein Gestein aus einer Grundmasse, in welcher, wie in einen Teig, crySTALLINISCHE Theile oder wirkliche Crystalle von Mineralien eingeschlossen liegen, so heißt man diese Structur die Porphyr-Structur und nennt man ein solches Gestein einen Porphyr. Die Porphyr-Structur tritt um so deutlicher hervor, je inniger gemengt die Grundmasse oder der Teig gemengt ist, worin die Crystalle liegen. Entfernt sich die Grundmasse vom dichten, treten, im Fall sie gemengt ist, die einzelnen Gemengtheile deutlicher hervor, so erscheint die Porphyr-Structur unvollkommener, indem sich die im Teige liegenden Crystalle nicht mehr so deutlich von den Bestandtheilen desselben unterscheiden, und man nennt diese unvollkommene Porphyr-Structur alsdann porphyrartige, zumal dann, wenn statt vollkommenen Crystallen crySTALLINISCHE Theile in der Grundmasse liegen.

Bestehen sich in der Grundmasse eines Gesteins Höhlungen, die theilweise oder ganz mit von der Grundmasse verschiedenen Mineralien ausgefüllt sind, so nennt man diese Structur die Mandelstein-Structur und die Gesteine, welche sie zeigen, Mandelsteine. Der Name ist dadurch veranlaßt worden, daß die in den Höhlungen eingeschlossenen Räume öfters die Gestalt einer Mandel haben. Die Ausfüllungen bestehen gar oft nur aus einem einzigen Minerale und namentlich bricht Kalk sehr häufig als Ausfüllungsmasse auf. Nicht selten werden die Hohlräume aber auch von mehreren Mineralien erfüllt, die gewöhnlich in Lagen über einander liegen, die der Oberfläche der Räume parallel sind. Gemeiniglich sind die Wandungen zunächst mit einer

dünnen Lage von Geränerde bekleidet, dann folgen die Ausfüllungsmineralien, unter welchen, außer Kalk, Quarz und Brolithe am häufigsten auftreten.

Liegen in einer Grundmasse größere und kleinere, mehr oder weniger eckige oder abgerundete Stücke von Mineralien oder Gesteinen, wie einen Teig eingebacken, so nennt man diese Art von Structur die Conglutinat-Structur. Die Gesteine von dieser Beschaffenheit sind aus Trümmern anderer gebildet, später wieder zusammengebackene Massen, Conglutinate und heißen auch Trümmergesteine.

Sind die Theile eines Gesteins ganz locker mit einander verbunden, liegen lose neben einander und solche Gesteine erscheinen als lose Gemenge.

Verlaufen der Gesteine in einander.

Während ein einfaches Mineralgeschlecht niemals in ein anderes verläuft, sehen wir zahlreiche Beispiele, daß Gesteine in einander übergehen oder verlaufen. Die bestimmten Mischungsverhältnisse der einfachen Mineralien sind bei den Gesteinen nicht anzutreffen, deren Theile nur mechanisch mit einander vereiniget sind.

Das Verhältniß zwischen den Gemengtheilen eines zusammengesetzten Gesteins ist veränderlich. Der eine oder der andere Gemengtheil nimmt öfter überhand, vermehrt sich mitunter auf Kosten eines anderen, oder er vermindert sich, oder endlich es tritt ein neuer hinzu. Die Eigenschaften des Gesteins ändern sich dabei, nähern sich bald mehr bald weniger den Eigenschaften eines anderen, und so werden Uebergänge gebildet. Auch durch bloße Veränderungen der Structur entstehen Uebergänge. So geht der körnige Granit dadurch in Gneis über, daß sich die Glimmerblättchen in parallele Lagen ordnen.

Beymengenungen.

Oft kommen in Gesteinen einzelne Mineralien vor, welche nicht wesentlich zur Zusammensetzung gehören und die deshalb als Beymengenungen betrachtet werden. Die gemengten Gesteine enthalten sie häufiger als die einfachen, und in der Regel sind sie nur in geringer Menge vorhanden, und nicht selten ist

Ihr Auftreten an Verticilitäten, oder an bestimmte Berührungsverhältnisse mit andern Gesteinen gebunden.

Veränderungen, welche die Gesteine durch Verwitterung erleiden.

In der Luft werden die mehrsten Gesteine nach und nach verändert. Sie erleiden eigenthümliche Veränderungen, und der dabei stattfindende Vorgang wird im Allgemeinen Verwitterung genannt. Die Einwirkung ist theils mechanisch, theils chemisch.

Auf mechanische Weise bewirkt das atmosphärische Wasser ganz allgemein das Zerfallen der Gesteine an der Luft. Es dringt in ihre Masse, oder sintert auf Sprüngen und Klüften ein, erstarrt bey eintretendem Frost und treibt dabey die Masse aus einander. Tritt nun Thauwetter ein, so schmilzt das Eis aus, die Theile trennen sich von einander, Stücke lösen sich los und fallen ab. So wird bey fortgesetzter Einwirkung des Wassers auf gleiche Weise der Zusammenhang der Masse immer mehr und mehr aufgehoben, das geschlossene Ganze immer mehr und mehr zerstückelt und am Ende in ein lockeres Hauswerk umgewandelt, in eine Schuttmasse umgebildet. — Gesteine, welche Wasser einsaugen, und solche, die ein schiefriges Gefüge besitzen, welches das Eindringen des Wassers auf Spalten begünstigt, sind dieser mechanischen Zerstörung besonders ausgesetzt. Diese Zerstörung der Gesteine ist aber geradezu die Grundlage eines neuen Lebens, indem dadurch der fruchttragende Boden gebildet wird, worin es den Pflanzen möglich wird, Wurzel zu fassen.

Auf chemische Weise wird die Verwitterung der Gesteine namentlich durch den Sauerstoff- und Wassergehalt der Atmosphäre herbeigeführt. In der Regel werden beide von dem einen oder andern der Stoffe eines Gesteins aufgenommen, es entstehen Oxyde, höhere Oxydationsstufen, Hydrate, Salze, das Volumen der Masse wird dabey größer, und in gleichem Maasse das Gefüge lockerer. Ein Gehalt an Eisen und Manganoxydul, an Magneteisenstein, Schwefelkies und Binnit trägt besonders zur Verwitterung der Gesteine bey. Sie werden an der Oberfläche durch das entstehende Eisenoxydhydrat rothfarbig, braun, die oberste

Boge wird locker, erdig, löst sich ab und setzt die nächst tieferen derselben Einwirkung aus. Dies sieht man allenthalben beyrn Serpentin, Grünstein, Dolerit u.f.w.

Oft verwandelt sich der Kies in braunes Drydhydrat, am gewöhnlichsten aber in wasserhaltiges, schwefelsaures Eisenoxydul-Salz, welches ausblüht, oder durch eine in dem Gestein vorhandene, erdige oder alkalische Substanz, wie durch Thonerde, Kalkerde, Bittererde, Kali, zersezt wird, woben sich schwefelsaure Thonerde, Gyps, Bittersalz, Alaun bilden, welche ausblähen, während das Gestein mürbe wird und zerfällt. Auch solche Gesteine, welche eine größere Menge eines kalk- oder natronhaltigen Minerals enthalten, wie Granit, Weißstein, Klingstein, sind der Verwitterung stark unterworfen. Die atmosphärischen Wasser ziehen eine lösliche Verbindung von Alkali und Kieselerde aus, und es bleibt eine thonige Masse zurück, welche häufig noch eine kleine Menge Alkali enthält. Temperaturverhältnisse wirken noch mehrfach modificierend auf solche Zersezungen ein. Manchmal erfolgt Verwitterung auch einzig in Folge einer Wasseranziehung, wie beyrn Anhydrit. Endlich wirken auch häufig Dämpfe verändernd auf Gesteine ein.

Veränderungen, welche Gesteine durch Feuer- einwirkung erleiden.

Diese Veränderungen sind mehr selten, und werden überhaupt weit seltener wahrgenommen, als die vorhin betrachtete Verwitterung.

Durchglühungen verwandeln, je nach dem Grade der Hitze, die Gesteine immer mehr oder weniger, entfärben oder färben anders, machen dichte Gesteine kienig, bewirken ein Zusammenflutern der Theile, wodurch die Gesteinsmassen häufig härter und spröder werden; wird die Hitze bis zum Schmelzen gesteigert, so findet ein völliger Fluß der Massen, oder eine Verschlackung statt, und berühren sich dabey verschiedenartige Gesteine, z. B. kieselige und kalkige, so fließen sie an den Berührungsfächen in einander, durchdringen sich mehr oder weniger chemisch, und es entstehen an solchen Stellen und unter solcher wahrhaft chemischer Aaseinanderwirkung verschiedener Stoffe, mannichfaltige Mineralien, die

nicht selten in schönen Crystallen in den in einander geflossenen Massen liegen. Erdbrände und vulcanisches Feuer bewirken mancherley Brennung, Durchglühung und Schmelzung von Gesteinsmassen, wobey Schlacken, Laven, Bimsstein u.s.w. gebildet werden.

Classification der Gesteine.

Die Gesteine zerfallen in zwey große Abtheilungen, wovon die erste diejenigen Gesteine in sich faßt, welche unter chemischem Einfluß und unter chemischer Aufeinanderwirkung der Stoffe gebildet worden sind, und unter Mitwirkung der Crystallisationskraft eine mehr oder weniger crystallinische Beschaffenheit angenommen haben. Man nennt diese Gesteine deshalb crystallinische. Die zweyte Abtheilung umfaßt solche Gesteine, die aus Bruchstücken und Trümmern einfacher Mineralien, oder sowohl angemengter als zusammengesetzter Gesteine, oder aus Resten organischer Substanzen bestehen, deren Form eine Folge erlittener mechanischer Einwirkung ist, und die man daher nichtcrystallinische, auch Trümmergesteine heist.

Die crystallinischen Gesteine lassen sich nach dem characterisirenden Gemengtheil in Sippschaften ordnen, die Trümmergesteine nach den Structurverhältnissen.

Beschreibung der einzelnen Gesteine.

1. Abtheilung. Crystallinische Gesteine.

1. Sippschaft. Quarzgesteine.

Die Gesteine dieser Sippschaft haben zur Grundmasse und als characterisirenden Gemengtheil Quarz, der sowohl ziemlich rein, als mit Thon, Eisenoxydhydrat, Feldstein, Schörl und kohligen Theilen gemengt vorkommt. Sie zeichnen sich durch große Härte und Sprödigkeit vor allen anderen Gesteinen aus, und sind für sich unschmelzbar.

1. Gestein. Quarzfeld.

Quarzmasse, von lichter, weißer und grauer Farbe, gewöhnlich fädig, auch schieferig, dicht und porphyrartig. Defter ist etwas Thon beygemengt, nicht selten Glimmer, der eine

schieferige Structur herbeiführt und einen Uebergang im Glimmerschiefer vermittelt. Dazu tritt bisweilen auch Feldspath, wodurch das Gestein granitartig wird, und mitunter ist dichter Feldstein eingemengt, wodurch es sich dem Hornfels nähert. Es troht der Witterung lange, wird nach und nach mechanisch zerstört und zerfällt in eine rauhe, steinige Schuttmasse, auf der nur kümmerlich Flechten und Moose sich ansehn.

2. Gestein. Hornstein.

Der Hornstein, wie er in der Dryptognose S. 143 beschrieben worden ist, erscheint in größeren Parthien, vorzüglich als die Grundmasse eines Porphyrs (Hornstein-Porphyr). Der ausgezeichnete Hornsteinporphyr von Eisdaalen in Schweden, hat eine braune, ins Rothe verlaufende, Farbe, und schließt kleinere und größere Feldspathprismen von graulich- und gelblichweißer, so wie von fleischrother Farbe ein, bisweilen auch Glimmerblättchen und Quarzcrystalle. Durch Auswittern der Feldspathcrystalle wird das Gestein löcherig. Seine dichte, harte Grundmasse widersteht aber den Einflüssen der Witterung sehr lange, und liefert endlich bey seiner mechanischen Zerstörung einen im Allgemeinen sehr anfruchtbaren Boden. Der schöne Eisdaaler Hornsteinporphyr wird verarbeitet.

3. Gestein. Kiefelschiefer.

Erscheint im Großen als eine schieferige, mit Thon, Kalk und Kohle gemengte, durch letztere grau und schwarz, durch Eisenoxyd oder Eisenoxydul roth, braun oder grün gefärbte Quarzmasse, die häufig von feinen weißen Quarzadern durchzogen und sehr hart ist. Der Bruch ist theils splitterig, theils flachmuschelig. Bymengungen vermindern die Härte. Durch eine stärkere Thonbymengung nähert er sich mehr oder weniger dem Thonschiefer. Eingeschlossene Feldspathcrystalle geben ihm bisweilen Porphyr-Character. Der schönste Kiefelschiefer-Porphyr ist derjenige von Eisdaalen, den man daselbst verarbeitet. In der dunkelbraunen Kiefelschiefermasse liegen hellgefärbte Feldspathcrystalle. Der Verwitterung widersteht der Kiefelschiefer sehr lange. Nach und nach wird er an der Oberfläche graugelb, und durch mechanische Zerstörung verwandelt er sich endlich in ein der Vegetation sehr ungünstiges Erdreich.

4. Gestein. Jaspis.

In größeren Gebirgsmassen kommt nur der Bandjaspis vor, der parallellaufende rothe, braune, graue, grüne und gelbe Farbbänder zeigt. Die Färbungen sind durch Eisenorydul, Eisenoryb und Eisenorybhydrat hervorgebracht. Mitunter ist er thonig, und bisweilen wird er, durch Einschluß von Feldspathcrystallen, porphyrartig. Der Witterung widersteht er sehr lange, und deshalb zeigt er sich auch dem Wachsthum sehr ungünstig.

5. Gestein. Wehschiefer.

Besteht aus einer dichten Quarzmasse, die mit etwas Thon gemengt, und gewöhnlich durch Eisenorydul, zuweilen auch durch Chlorit grünlich gefärbt ist. Er besitzt schieferige Structur, geht bey einem größeren Thongehalt in Thonschiefer über. Widersteht den Einflüssen der Witterung lange, und zerfällt nach und nach in eckige Stücke, die sich endlich in eine sehr wenig fruchtbare Erde verwandeln. Er wird als Schleifmaterial angewendet, und hat davon seinen Namen.

6. Gestein. Hornfels.

Ein inniges dichtes Gemenge von Quarz und dichtem Feldstein, worinn der Quarz vorwaltet. Die herrschende, in verschiedenen Abänderungen auftretende Farbe wird hin und wieder durch beygemengten Turmalin dunkel, und durch Hornblende-einmengung grün. Glimmer bewirkt öfters eine schieferige Structur. Seltener liegen einzelne Feldspathcrystalle oder Körner von Magneteisen und Granat in der Masse. Mit zunehmender Quarzmenge geht er in Quarzfels über, mit Ueberhandnehmen des Feldsteins in Weißstein. Eine Vermehrung der Hornblende vermittelt einem Uebergang in Grünstein, und wenn einzelne Glimmerblätter und Feldspathkörner darinn auftreten, so nähert sich das Gestein dem Granit. Es widersteht der Verwitterung sehr hartnäckig. Gewöhnlich wird es an der Oberfläche graugelb, bey eingemengten Magneteisenkörnern wird es außen ockergelb. Das aus ihm entstehende Erdbreich ist wenig fruchtbar.

2. Gipschaft. Feldspathgesteine.

Die Feldspathgesteine enthalten Feldspath oder Feldstein als Grundmasse oder als charakterisirenden Gemengtheil.

Auch zählt man dazu diejenigen Gesteine, welche höchst wahrscheinlich durch Feuereinwirkung aus feldspathigen Massen gebildet worden sind. Diese Gesteine haben eine geringere Härte als die Quarzgesteine, und zeichnen sich durch Schmelzbarkeit aus. Als weitere Gemengtheile enthalten sie Quarz, Glimmer, Hornblende und Zeolith.

1. Gestein. Weißstein.

Besteht aus einem innigen Gemenge von dichtem Feldstein und Quarz, worinn ersterer stets vorwaltet. Derselbe bildet er eine kieselige Feldspathmasse, aus welcher Kalisäure viele Kieselerde auszieht. Das Gestein ist im Allgemeinen dicht und von lighter Farbe, grau, weiß, worauf sich der Name bezieht, bisweilen aber auch dunkler gefärbt, braun, grün und mitunter gestreift. Derselbe ist Glimmer beigemengt, das Gestein dadurch schleierig, dem Gneis ähnlich; treten dazu noch Quarzkörner, so nähert es sich dem Granit. Es verläuft auch in Hornfels, und durch Beimengung von Hornblende in Grünschiefer. Die Witterung wirkt sehr stark auf den Weißstein ein; er zerbröckelt, zerfällt in Grus, und verwandelt sich nach und nach in eine weiße Thonmasse. Das Erdreich, welches aus der Verwitterung desselben entsteht, ist der Vegetation sehr günstig.

2. Gestein. Granit.

Besteht aus einem körnigen Gemenge von Feldspath, Quarz und Glimmer, von vollkommen crystallinischem Ansehen. Der Feldspath ist vorherrschend, Glimmer in geringster Menge vorhanden. Mit dem Feldspath, und statt desselben ist öfters Albit in dem Gemenge, bisweilen auch eine thonige, oder specksteinartige Substanz. Der Glimmer wird mitunter durch Chlorit oder Talkblättchen ersetzt. Der Feldspath ist gewöhnlich von weißer, grauer, seltener von rother Farbe; der Glimmer von grauer, tombakbrauner, schwarzer oder dunkelgrüner Farbe, selten von silberweißer, am seltensten von violetter oder rosenrother. Der Quarz ist meistens grau. Die Größe der Gemengtheile ist außerordentlich verschieden. Der klein- und feinkörnige ist indessen der häufigste, der grobkörnige schon viel seltener und grobkörniger, in welchem die Gemengtheile bis zu fußgroßen Stücken liegen, ist sehr selten. In Sibirien liegen in einem

großförmigen Granite so große Glimmertafeln, daß man daraus Scheiben spaltet, die zu manchen Zwecken, zu Fenstern, Laternen, statt des Glases gebraucht werden. Auch bey Vernsbach und Forbach im Schwarzwalde, bey Penig und Siebenlehen in Sachsen kommen sehr großförmige Granite vor, worinn Quarz und Feldspath in großen Parthien auftreten.

Eine gewöhnlich glimmerarme Granitabänderung, in welcher der Quarz in kleinen prismatischen Theilen zwischen den Blättern des Feldspathes liegt, nennt man Schriftgranit (Pegmatit), weil die flügeligen Quarztheile Figuren darstellen, welche Schriftzügen ähnlich sind. Liegen einzelne Feldspathcrystalle im Granitgemenge, so erhält das Gestein Porphyr-Character, und wird porphyrartiger Granit genannt. Die Feldspathcrystalle sind Zwillinge, die öfters die Größe einiger Felle erreichen, und bald gleichförmig in der Masse, wie in einem Teig, vertheilt, bald gruppenweise besammet liegen. Unter feinkörnigen, feldspathreichen Granitabänderung, worinn der Glimmer höchst sparsam in kleinen Blättchen vorkommt, aber öfters Theile von dichtem Feldstein liegen, haben französische Mineralogen, ihrer Schmelzbarkeit wegen, den Namen Eurit gegeben, und wenn sie Feldspathcrystalle einschließt, was öfters der Fall ist, dieselbe Eurit-Porphyr heißen. Auch zählt man das vom erzgebirgischen Bergmann Greifen genannte Gestein zum Granit, welches einen Bestandtheil der Zinnwalder Zinnerzlagerstätte ausmacht, aus grauen Quarzförnern und kleinen Blättchen von lithon-Glimmer besteht, theils sehr wenig, theils gar keinen Feldspath, dagegen öfters Körner und Crystalle von Zinnstein enthält.

Als fremde Beymengungen erscheinen am häufigsten Schöbel, Granat, Pinit, Hornblende, Magnetkies, Schwefelkies, seltener Apatit, Pistazit, Beryll und noch etliche andere Mineralien.

Nicht selten fließt man den Granit in andere Gesteine verlaufen. Durch Ueberhandnahme des Glimmers und parallel geordnete Lagen desselben geht er in Gneis, durch Abnahme des Quarzes und Vermehrung der Hornblende in Syenit und Gränstein über, und durch Verschwinden des Glimmers und Vermengung von dichtem Feldstein verläuft er in Weißstein.

Der Verwitterung widerstehen die Klein- und feinkörnigen,

quarzreicheren Abänderungen im Allgemeinen sehr lange; die grobkörnigen, und namentlich die großkörnigen, verwittern dagegen bald, und von diesen insbesondere die mit fremden Mineralien vermengten, so wie diejenigen, welche kalk- und kalkerdehaltigen Felspath führen.

Die Verwitterung beginnt damit, daß der Felspath mäß und weich wird. Das Gestein verliert dadurch seine Festigkeit, zerbröckelt, zerfällt in Grus und verwandelt sich nach und nach in einen thonigen Boden, worinn der Quarz in kleinen Körnern und der Glimmer sparsam in sehr kleinen Blättchen liegt. Unter Einfluß des atmosphärischen, kohlensäurehaltigen Wassers verwandelt sich der Felspath auch häufig in eine weisse, thonige Masse, welche man Kaolin nennt.

Der Boden, welcher aus Granit entsteht, ist immer thonig, um so mehr, je feldspathreicher das Gestein ist, und im Allgemeinen sehr fruchtbar. Sein Gehalt an Thonerde, Kalkerde, Bittererde, Kali und Natron, wirkt äußerst vorthellhaft auf die Vegetation, und in einem milden Klima sieht man darauf die schönste Begetation, wie z. B. am westlichen Fuß des Schwarzwaldes, wo bey Offenburg, Achern, Oberkirch, Mühl, Affenthal u.s.w. neben vorzüglichem Getreide, sehr gutes Obst, Rüsse, Cassanien, Hanf, Weizen, Reis u.s.w., und vortrefflicher Wein, auf granitischem Boden wachsen. Im höhern Gebirge stehen darauf ausgezeichnete Weizenanbestände.

Die klein- und feinkörnigen Granitabänderungen sind ein sehr festes Baumaterial, und ganz geeignet zu größeren architektonischen Constructionen, ganz besonders zu Säulen, Obelisken, Piedestals, Einfassungen, Schalen; auch liefern sie vortreffliche Mühlsteine. Die Batterloobrücke zu London ist aus rothem schottischem und aus grauem cornischem Granit erbaut; aus finnländischem Granit besteht das Piedestal, welches zu St. Petersburg die Bildsäule Peters des Großen trägt, daraus bestehen die prachtvollen Säulen der Pfalz-Kirche daselbst, und die majestätische Alexandersäule; aus einem von den Rauenschen Bergen hergeholten Granitgeschiebe ist die 22 Fuß lange Schale des Berliner Museums gearbeitet; aus porphyrtartigem Granit des Schwarzwaldes Larennes Denkmal zu Sasbach bey Achern errichtet,

ein Obelisk von 14 Fuß Länge; aus orientalischem Granit sind die beiden schönen Granitsäulen gehauen, welche Venedigs Piazzetta zieren; und wovon die eine den aus Erz gegossenen, anklon geflügelten Löwen trägt; aus röthlichem Granit ist der schlanke, 169 Fuß hohe, ägyptische Obelisk Luxor gearbeitet, der in Paris auf dem Condorshen-Platze aufgestellt ist:

3. Gestein. Syenit.

Besteht aus einem körnigen Gemenge von Feldspath oder Labrador und Hornblende, wotinn der Feldspath vorherrscht, und Quarz entweder gar nicht, oder nur in sehr geringer Menge erscheint. Die Farbe des Feldspaths oder Labradors ist häufig roth, seltener grau oder gränlich; die Hornblende ist gewöhnlich lauchgrün oder schwarz. Mitunter nimmt sie überhand und bildet den Hauptgemengtheil. Das Korn ist größtentheils ein mittleres, selten fein. Eingewachsene Feldspathcrystalle geben dem Gestein öfters ein porphyrtartiges Ansehen. Nicht selten ist Glimmer beigemengt, und dann nähert sich das Gestein dem Granit, und wird wohl auch Hornblende-Granit genannt. Gemeinlich ist Schwefelkies beigemengt, bisweilen auch Magnetkies in Adnieren und einzelnen Crystallen, manchmal auch Sirkon und Titanit.

Durch Ueberhandnehmen von Hornblende und Auftreten von dichtem Feldstein geht der Syenit in Gränstein und Hornblende-gestein über; durch Einmischung von Glimmer und Quarz in Granit und Gneis.

Der Verwitterung unterliegen Feldspath und Hornblende, und deshalb wird das Gestein an der Luft stark angegriffen; es beschlägt rostfarbig, indem sich der eingemengte Kies und der Magnetkiesstein, in Eisenorydhydrat umwandeln. Es zerfällt sofort, zerbröckelt, zerfällt in Grus und verwandelt sich in eine thonige, braune oder gelbe Erde, die ziemlich feucht, im Allgemeinen aber fruchtbar ist.

Im Alterthum wurden die besten Syenitabänderungen zu verschiedenen Zwecken verarbeitet. Ein großer Theil der zahlreichen schönen Monumente Oberägyptens, die große Säule zu Alexandrien u. v. a. sind aus rothem Syenit gearbeitet. Die dunkel-gefärbten Abänderungen, mit schwarzer Hornblende und grauem

Feldspath, oder bisweilen dichten Feldstein, hat man mehrfältig bey ägyptischen Monumenten mit Basalt verwechselt. Aus einer solchen Abänderung bestehen die beiden ägyptischen Figuren, welche Belzoni seiner Vaterstadt Padua geschenkt, und diese am Eingang des großen Saales aufgestellt hat, worinn sich das Monument von Titus Livius befindet. Porphyrartige Abänderungen mit schwarzer Hornblende hat man auch für Porphyre genommen; so ist die schöne Säule in der Kreuz-Capelle der Marcuskirche in Venedig, als „Porrdo nero o bianco“ bezeichnet, ein deutlich erkennbarer Syenit; daraus besteht auch die Riesensäule im Odenthal. Moreaus Denkmal bey Räcknitz, unsern Dresden, ist aus dem rothen Syenit des Plauenschen Grundes construiert, der auch als Pflasterstein jener Stadt benutzt wird.

4. Gestein. Gneis.

Crystallinisches, schieferiges Gemenge von Feldspath, Quarz und Glimmer. Feldspath und Quarz sind mit einander zu einem körnigen Gemenge verbunden, parallele Glimmerlagen sondern dasselbe in Platten, geben dem Gestein das streifige Ansehen und das schieferige Gefüge. Der Feldspath waltet gewöhnlich vor, ist grau oder weiß, selten roth. Der Quarz fehlt zuweilen ganz; mitunter erscheint dichter Feldstein in der Masse, und das Gestein nähert sich alsdann, je nach der Quantität des Quarzes und der mehr oder weniger innigen Verschmelzung der Bestandtheile; bald mehr dem Weiskstein, bald mehr dem Hornfels. Je glimmerreicher das Gestein und je feinkörniger Quarz und Feldspath sind, um so vollkommener ist seine schieferige Structur; bey größerem Korn jener Gemengtheile und Abnahme des Glimmers spaltet es in dicke Platten, und wenn der Glimmer sparsam und nicht immer in parallelen Lagen in dem Gesteine liegt, so erlangt es ein granitartiges Ansehen, und stellt eine dem Granit wirklich nahe stehende Abänderung dar, welche man granitischen Gneis heißt. Sehr selten erscheint er durch einzelne auserystallisirte Feldspathcrystalle porphyrartig. An der Stelle des Glimmers treten hin und wieder Chlorit, Hornblende, auch Talk, sehr selten Graphit auf. Eisenoryd färbt das Gestein bisweilen roth. Von beygemengten Mineralien bemerkt man vorzüglich Schwefelkies, Granat, Pinit, Schörl.

Man bemerkt Uebergänge in Granit, Syenit, Weißstein, Hornfels, Grünstein, Glimmer-, Chlorit- und Talkschiefer.

Der feldspath- und glimmerreiche Gneis verwittert sehr stark, der quarzige dagegen widersteht den Einflüssen der Atmosphäre sehr lange. Der erstere ist der allgemein verbreitete, und deshalb sieht man Gneisfelsen in der Regel verwittert und mit lockerem Grus überdeckt, und diesen an vielen Stellen in tiefen Lagen. Die daraus entstehende Erde ist lehmig, hat gewöhnlich eine gelbe Farbe und zeigt sich sehr fruchtbar.

5. Gestein. Feldstein.

Dichte Feldsteinmasse; selten rein, gewöhnlich mit Quarzkörnern vermengt und Feldspathcrystalle einschließend, und so fast immer als Grundmasse eines besonderen Porphyrs auftretend, den man Feldsteinporphyr nennt. Die Feldspathcrystalle haben in der Regel eine lichtere Farbe als die Grundmasse, und heben sich dadurch deutlich hervor. Sie sind meist klein und Zwillinge. Die Quarzkörner sind grau, ziemlich gleichförmig vertheilt. Statt ausgebildeter Feldspathcrystalle liegen hin und wieder crystallinische Theile dieses Minerals in der Masse, öfters auch thonige. Graue und rothe Färbungen sind vorherrschend. Ist die rothe Farbe der Grundmasse tief und rein, die Farbe der Feldspathcrystalle weiß, so hat das Gestein ein sehr schönes Ansehen. Solcher Art ist der antike rothe Porphyr. Von fremden Bymengungen erscheinen vorzüglich Glimmer, Hornblende und Schwefelkies. Sehr dichte Abänderungen des Feldsteinporphyrs haben Aehnlichkeit mit dem Hornsteinporphyr, und werden bisweilen mit diesem verwechselt. Sie unterscheiden sich indessen von demselben sehr leicht durch ihre Schmelzbarkeit. Nehmen Quarzkörner, Glimmerblätter und Feldspathcrystalle überhand, so nähert sich das Gestein dem Granit, durch Ueberhandnahme von Hornblende, dem Syenit.

Der Verwitterung widersteht der Feldsteinporphyr sehr lange. Davon machen nur die feldspathreichen Abänderungen eine Ausnahme, die bald zerfallen und sich in einen thonigen, der Vegetation nicht ungünstigen Boden verwandeln. Die dichten Abänderungen werden sehr langsam mechanisch zerfüßt, und in ein Hauswerk setiger Stücke umgewandelt, das höchst langsam zu Erde

gefällt, während das atmosphärische Wasser dasselbe auslaugt und ihm Kali, Natrium, Kalk- und Bittererde entzieht, welche dem Wachsthum sehr förderlich sind, weshalb sich dann die Felsen und Schutthaufen dieses Gesteins häufig nackt zeigen, und der endlich daraus sich bildende Boden der Vegetation nicht günstig ist. Der schöne, rothe, ägyptische Feldsteinporphyr, der wahre *porfido antico*, läßt sich sehr gut schleifen und polieren. Im Vatican zu Rom stehen daraus gefertigt ein Sarcophag und zwei große schöne Vasen, in der Marcussäule in Venedig mehrere ausgezeichnete schöne Säulen, und in der Academie daselbst ist in einer Urne aus antikem Porphyr Canova's Rechte eingeschlossen.

6. Gestein. Klingstein.

(Phonolith.)

Ein Gemenge von dichtem Feldstein und Zeolith, in abweichenden Verhältnissen und so innig gemengt, daß nur die chemische Analyse Aufschluß über dessen Zusammensetzung geben kann. Die vorherrschende Farbe des Gesteins ist grau, ins Braune, Grüne und Schwarze verlaufend; es ist an den Kanten durchscheinend, im Bruche splitterig und gibt beim Anschlagen einen Klang. Darauf bezieht sich der Name. Im gepulverten Zustande mit Salzsäure behandelt, gibt es eine Gallerte, indem der Zeolith zersetzt wird; der Gehalt an Feldstein bleibt unverändert zurück, während man den Zeolith durch Säure ganz ausziehen kann. Häufig ist glasiger Feldspath eingemengt in kleinen Crystallen oder crystallinischen Blättchen, wodurch das Gestein die Beschaffenheit eines Porphyr's erhält. Eine solche, zugleich etwas schieferige Abänderung hat man früher Porphyr-schiefer geheißen.

Der Zeolith ist gar oft in Schnüren und Adern, oder in feinen Crystallen dazwischen ausgesondert, auch erscheinen Apophyllit, Analcim, Chabasit, Augit, Hornblende, Glimmer, Magnetisen beigemengt. Durch Ueberhandnehmen des Augits nähert er sich dem Basalte, durch Anwachsen des glasigen Feldspath's dem Trachyte.

Der Witterung widerstehen nur die zeolitharmen Abänderungen; je größer die Menge des eingemengten Zeoliths ist und die Beimischung der übrigen zeolithischen Mineralien, um so

schneller verwittert er, da die bald erfolgende Zerstörung dieser sein Zerfallen herbeiführt, wobey er sich in eine sehr fruchtbare, dem Weinbau sehr günstige Erde verwandelt.

Die dichtesten Abänderungen können zu Bau- und Pflastersteinen benutzt werden. Die Mauern der demolirten Felsenvestung Hohentwiel im Högau waren größtentheils aus einem sehr dichten Klingstein gebaut.

7. Gestein. Trachyt.

Besteht aus einer feldspathartigen Grundmasse von rauhem, mattem Ansehen, worin Crystalle von glasigem Feldspath (Rhyakolith) liegen. Das Gestein hat gewöhnlich eine graulichweiße Farbe, bisweilen ist es aber auch dunkler gefärbt, aschgrau, röthlich, bräunlich, schwärzlich, auch grünlich. Man unterscheidet folgende Hauptabänderungen:

1. Körniger Trachyt. Die Grundmasse besteht aus einer Verbindung einzelner Körner der feldspathartigen Masse, und zuweilen aus lauter Körnern von Rhyakolith. Sehr spröde, fählt sich scharf an und besitzt von allen Trachytarten den meisten Glanz.

2. Porphyrtiger Trachyt (Trapp-Porphyr). In einer feinkörnigen oder dichten Trachyt-Grundmasse liegen einzelne Crystalle von Feldspath oder Rhyakolith.

3. Blasiger Trachyt. Enthält viele kleine, rundliche oder eckige, öfters in die Länge gezogene Blasonräume, deren Wandungen theils wie verglast, theils von kleinen Crystallen verschiedener Mineralien überkleidet sind.

4. Schlackiger Trachyt. Die Grundmasse befindet sich in einem halbverglasten, schlackenartigen Zustande, hat einen großmuscheligen Bruch und viele Blasen.

5. Dichter Trachyt. Dichte Trachytmasse von splittertigem Bruch. Riecht beym Anhauchen schwach thonig.

6. Erdiger Trachyt. Erdige, weiche, oftmals zerreibliche Trachytmasse, die beym Anhauchen stark thonig riecht (Domit).

Zahlreiche fremde Beymengungen, von welchen namentlich Glimmer, Hornblende, Augit, Magnet Eisen häufig auftreten, Quarz, Harmotom, Granat, Haupn, Sphen, Kalkspath, Schwefelkies, Eisenglanz seltener vorkommen, modificieren, je nach ihrer

Quantität, die Beschaffenheiten des Gesteins auf mannfaltige Weise. Einnengung von dichtem Feldstein nähert dasselbe dem Klingstein. Auch sieht man Uebergänge in Perlstein, Pechstein und Obsidian. Der Trachyt wird an der Luft bald mürbe und erdig. Er verwandelt sich in eine graue Erde, welche der Vegetation sehr günstig ist, da sie, aus einer feldspathigen Masse hervorgehend, reich an Thonerde und Kali ist. Die porphyrtartige Abänderung wird durch Auswittern der Crystalle löcherig, wie man dieß am Eölnner Dom sieht, der aus dem porphyrtartigen Trachyt des Drachensfels im Siebengebirge erbaut ist.

8. Gestein. Andesit.

Besteht aus einer crystallinisch-körnigen Masse von Albit, mit Einnengung von Hornblende, worinn auch viele Körner von gemelnem Feldspath und Crystalle von Rhyaololith liegen. Im Außern ganz dem Trachyt ähnlich, so wie in seinen übrigen Verhältnissen. Der Name bezieht sich auf das häufige Vorkommen des Gesteins in den Anden, namentlich an den Vulkanen von Chili.

In naher Beziehung zu mehreren der beschriebenen Feldspathgesteine, namentlich zu den beiden letzteren, stehen die nachfolgenden Gesteine, welche, nach allen bisherigen Beobachtungen, unter Feuereinwirkung gebildet worden sind, und diese durch ihre Eigenschaften beurfunden.

9. Gestein. Pechstein.

Dichte Pechsteinmasse, durch eingeschlossene Feldspathcrystalle oft porphyrtartig. Selten sind Körner von Quarz, Augit, Hornblende, Blättchen von Glimmer beigemengt. Man bemerkt Uebergänge einerseits in dichten Feldstein und schlackigen Trachyt, andererseits in Perlstein und Obsidian.

Verwittert äußerst langsam. Er verbleicht an der Oberfläche, zerspringt, es lösen sich schalige Stücke ab, die nach und nach in ein Haufwerk scharfkantiger Stücke zerfallen, die sich sehr langsam weiter zertheilen und in eine thonige Erde verwandeln, welche der Vegetation nicht sehr günstig ist.

10. Gestein. Perlstein.

Besteht aus Perlsteinmasse, welche durch kugelige Zusammensetzung ausgezeichnet ist, und sich in schalige Stücke zerlegen läßt. Ofters porös, blasig, schwammig. Selten sind Glimmer, Quarz, Granat beygemengt, mitunter Feldspathcrystalle eingeschlossen, wodurch er porphyrartig wird. Man kennt Uebergänge des Perlsteins in Trachyt, Pechstein, Obsidian und Bimsstein. Die unzähligen feinen Risse, von welchen er, vermöge seiner Structur, durchsetzt ist, führen ein schnelles Zerfallen seiner Masse herbey, und er verwandelt sich an der Luft bald in eine Grusmasse, welche in eine thonige fette Erde übergeht, die wenig fruchtbar ist.

11. Gestein. Obsidian.

Dichte Obsidianmasse, durch eingeschlossene Feldspathcrystalle öfters porphyrartig; bisweilen blasig, schwammig. Die Blasenräume gewöhnlich nach einer Richtung in die Länge gezogen. Beygemengt findet man zuweilen Augit, Glimmer, Quarz, Chrysolith, auch Bruchstücke von Trachyt und Perlstein. Er zeigt Uebergänge in Trachyt, Pechstein und Bimsstein.

Er widersteht den Witterungseinflüssen lange. Allmählich lösen sich von seiner Oberfläche kleine, dünne Blättchen ab, welche oftmals die Beschaffenheit des sogenannten blinden Glases zeigen, silberweiß und metallartig glänzend werden. Bisweilen erhält das Gestein, namentlich wenn es blasig ist, bey der Verwitterung einen röthlichen Beschlag von Eisenoxyd. Nach und nach zerfällt es in eine Erde, welche der Vegetation nicht ungünstig ist.

12. Gestein. Bimsstein.

Bimssteinmasse, durch eingemengte Crystalle von glashem Feldspath oft porphyrartig. Bisweilen häufen sich diese Crystalle so sehr an, daß sie die vorherrschende Masse bilden. Bisweilen sind Augit, Hornblende, Glimmer, Magneteisen beygemengt. Verwittert äußerst langsam, und verwandelt sich endlich in eine sehr lockere, das Wachsthum wenig befördernde Erde.

3. Sippchaft. Glimmergesteine.

Sie sind durch Glimmer, oder die verwandten Mineralien Chlorit und Talk characterisirt, und zeichnen sich durch ein schieferiges Gefüge aus.

1. Gestein. Glimmerschiefer.

Besteht aus einem Gemenge von Glimmer und Quarz, bey welchem die Glimmerblättchen in paralleler Lage an einander liegen und die Quarzkörner einschließen. Besitzt eine mehr oder weniger vollkommene, schieferige Structur. Die Farbe des Glimmers bedingt die Farbe des Gesteins. Es wird um so dickschieferiger, in je größerer Menge Quarz darinn enthalten ist, und geht durch Ueberhandnehmen desselben in einen schieferigen Quarzfels über. Nebst dem Glimmer ist bisweilen auch Chlorit oder Talk vorhanden, welche bey stärkerer Beymischung dem Gestein eine grüne oder graulichweiße Farbe geben.

Von fremdartigen Beymischungen, die im Allgemeinen bey diesem Gesteine häufiger auftreten, als bey irgend einem andern, erscheint am allergewöhnlichsten Granat, in Körnern und Crystallen von sehr verschiedener Größe, und mitunter in solcher Menge, daß er wie eingesäet in dem Gestein liegt, und öfters den Quarz verdrängt. Es sind namentlich die dünnschieferigen, glimmerreichen, oft auch Chlorit oder Talk führenden Abänderungen granatreich. Bisweilen liegen auch Feldspathkörner in der Masse, und hin und wieder einzelne Crystalle davon. Ueberdies kommen im Glimmerschiefer oft Hornblende, Schörl, Epidot, Staurolith vor und noch viele andere Mineralien. Man sieht das Gestein in Gneis, Chlorit und Talkschiefer verlaufen.

Vermöge seiner schieferigen Structur zerfällt es in der Witterung bald in scheibensförmige Stücke, dünne Schiefer und nach und nach in Blättchen. Die chemische Zersetzung geht indessen sehr langsam vor sich. Der sich endlich aus der zerfallenen Masse bildende Boden ist der Vegetation in der Regel nicht sehr günstig.

Man benützt die feineren, dünnschieferigen Abänderungen zur Bedachung, die quarzigen, dickschieferigen zu Platten, Treppentufen, Einfassungen und bisweilen auch zur Construction des

Schmelzraums der Eisenschmelzöfen, und nach dem technischen Worte „Gestell,“ das zur Bezeichnung jenes Ofentheiles gebraucht wird, hat man dem Glimmerschiefer auch den Namen Gestellstein gegeben.

2. Gestein. Chloritschiefer.

Besteht aus einer mehr oder weniger reinen Chloritmasse von schieferigem Gefüge, lauch- und berggrüner Farbe. Oefters sind Quarzkörner eingemengt, bisweilen auch Thon, öfters Talk, wobey die Farbe lichter wird und perlmutterartiger Glanz auftritt. Liegen neben Talk auch noch Blättchen von Glimmer in der Masse, so erhält das Gestein ein gesprenkeltes Ansehen. Bey vorwaltendem Chlorit ist es in der Regel dünn- und wellenförmig-schieferig; mengt sich Quarz in größerer Menge ein, so wird es dickschieferiger, fester und seine Farbe zieht ins Graue. Von fremden Beymengungen erscheint am gewöhnlichsten Magnetkies, das bald in Körnern, bald in wohlausgebildeten Crystallen im Chloritschiefer eingeschlossen ist. Oefters auch liegt Granat darinn, manchmal in unzähligen vielen kleinen Crystallen, und mitunter kommt Feldspath, Gyanit, Hornblende, Magnesit, Schwefelkies, Kupferkies darinn vor. Man bemerkt Uebergänge in Glimmer-, Talk- und Thonschiefer.

Au der Luft bleicht er ab, und zerfällt nach und nach in eine blätterige Schuttmasse, die sich sehr langsam in eine eisenreiche, lehmige Erde umwandelt, welche der Vegetation nicht sehr günstig ist.

3. Gestein. Talkschiefer.

Schieferige Talkmasse von graulich- und grünlichweißer Farbe, oftmals mit Quarzkörnern gemengt, bisweilen auch mit Feldspath. Durch Ueberhandnehmen des Quarzes wird das Gestein fester und dickschieferig. Oefters ist Glimmer und Chlorit beygemengt, und bisweilen liegen darinn auch Strahlstein, Magnetkies, Magnetkies, Magnesit, Gyanit, Granat und einige andere Mineralien. Gar oft tritt indessen das Gestein ziemlich rein auf.

Ein inniges Gemenge von Talkmasse mit Glimmer und Chlorit, dichter und dickschieferiger als der reine Talkschiefer, und gewöhnlich Körner von Magnetkies einschließend, wird Topfstein genannt, von seiner Anwendung zu Töpfen und verschiedenen

anderen Gesteinen. Dieser Topfstein ist bei *Lapis comensis* oder *oklaris* des Plinius, der in der Gegend von Ephraim immer noch verarbeitet wird, und in der Schweiz unter dem Namen Lawegstein oder Giltstein bekannt ist. Man macht auch Ofenplatten daraus, die von großer Dauer sind, s. S. 178. Die Inselaner von New-Caledonien sollen eine weiche, zerreibliche Abänderung von Talkschiefer pfandweise verschlucken.

Eine besondere Abänderung eines quarzigen Talkschiefers hat den eigentümlichen Namen biegsamer Sandstein, und den indischen Namen *Italsumit* erhalten. Er besteht aus einem innigen Gemenge von kleinen, silberweißen oder bläulichweißen Talkblättchen und sehr kleinen Quarzkrnern, hat eine gräulich-weiße Farbe und ein schieferiges Gefüge. Dünne Platten desselben sind etwas biegsam.

Der Talkschiefer verläuft in Glimmer-, Chlorit- und Thonschiefer. Der Verwitterung widersteht er nicht lange; er zerfällt bald und verwandelt sich in einen thonigen, fetten Boden, der nicht fruchtbar ist.

4. Sippschaft Hornblendegesteine.

Gesteine, welche durch Hornblende oder Augit charakterisiert sind. Sie zeichnen sich durch Gefügtheit und dunkle Farbe aus.

1. Gestein. Hornblendegestein.

Gemenge von gemeiner Hornblende und Quarz, worin erstere gewöhnlich vorwaltet. Das Gefüge ist mehr oder weniger schieferig; deutlich schieferige Abänderungen nennt man Hornblendeschiefer. Bisweilen nimmt der Quarz überhand, das Gestein wird dadurch grau, dick- und unvollkommen schieferig. Manchmal liegen in einem solchen quarzreichen Gemenge einzelne blätterige oder strahlige Hornblendepanthen, wodurch eine dunkle Sprenkelung der Masse hervorgebracht wird. Eine sehr gewöhnliche Beimengung ist Schwefelkies, der die Hornblende allent- halben so häufig begleitet; seltener erscheint Granat. Manchmal liegt Glimmer in dem Gemenge, bisweilen auch Feldspath, Magnetkies und Magnetkies. Man bemerkt Uebergänge in Gneis und Granit.

Verbindungen von Kieselerde und Thonerde besteht; deren Menge von Kalk, Mägelerde, Eisen und Kali begreunet sind. Manche Thonschiefer bestehen aus einer Masse, die sich durch Behandlung mit Säuren in einen darsin löslichen und in einen unlöslichen Theil trennen läßt. Kohlige Theile treten, nebst Eisen, als färbende Substanz auf.

Dieser Thonschiefermasse sind häufig andere Mineralkörper beigemengt, und demnach unterscheidet man folgende Abänderungen:

1. Reiner Thonschiefer. Thonschiefermasse ohne fremdartige Beimengungen. Dünnschieferig, grau, von sehr gleichmäßigem Ansehen.

2. Glimmeriger Thonschiefer. Mit Glimmerblättchen gemengte Thonschiefermasse. Die Glimmerblättchen liegen in größerer oder geringerer Menge zwischen den Schieferlagen des Gesteins.

3. Quarziger Thonschiefer. Quarzige, kieselige, mitunter glimmerführende Thonschiefermasse, in welcher sich häufig Quarz in Adern, Schnüren, einzelnen Lagen oder in Körnern ausgefondert zeigt.

Diese beiden Abänderungen zeigen verschiedene Farben. Die vorherrschende graue geht oft in eine grüne, blaue, bläuliche über, und bisweilen ist die Färbung völlig roth durch eingemengtes Eisenoryd, welches dann und wann in solcher Menge vorhanden ist, daß man den Schiefer wie einen armen Eisenstein benutzen kann. Auch zeigen beide Abänderungen bisweilen eine sehr bestimmte prismatische Structur, vermöge welcher sie beim Zerbrechen in griffelähnliche Stücke zerfallen (Griffelschiefer).

4. Porphyrartiger Thonschiefer. Selten schließen die vorhergehenden Abänderungen einzelne Feldspathcrystalle ein, und in diesem Falle erscheinen sie porphyrartig.

5. Kohliger Thonschiefer. Der ganzen Masse nach von kohligcn Theilen durchdrungener Thonschiefer, von graulich- und sammet-schwarzer Farbe, meistens etwas glimmerführend. Besteht auf den Schieferflächen einen Schimmer; bröckelt sich weiß. Oefters ist er sehr dünn und vollkommen geradeschieferig, leicht spaltbar, und dann heißt man ihn Dachschiefer, weil ihn diese

scheint. Von fremdartigen Beimengungen: asphalten, vorzüglich Glimmer, Schwefelkies; Magnetisenstein und Aitaneisen. Nicht selten enthalten einige Abänderungen Serpentin. Man bemerkt Ausbuchtungen zum Spessartenfels, Granäth und Serpentin.

Von der Witterung wird zuerst der Labradorit angegriffen. Er wird matt, pulverig, vom Wasser aufgewaschen, wodurch Rautenfaltungen an der Oberfläche entstehen, zwischen welchen der Diallag hervorsticht, wodurch die Außenfläche der Magmaassen ein rauhes Aussehen erhält. Durch den Gehalt an Magnetisen wird das Gestein stellenweise rothgelb. Nur sehr langsam dringt die Verwitterung tiefer ein, wobei das Gestein endlich sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden verwandelt.

Der Labradorit wird als Basaltstein benutzt. Die ersten archaischen Aemern verwendeten Labradormassen, wovon unter Ferdinand von Medici 1604 zum Ben der Laurentinischen Grotte zu Florenz aus Brasilien bezogen, und daher der italienische Name Verde di Corsica dazw.

4. Gestein. Diabas.

Besteht aus einem Gemenge von Diallag und Granat. Der Diallag ist grün, und öfters erscheint an seiner Stelle die jüngere Verwachsung von Diallag und Epidotstein, die unter dem Namen Smaragdite bekannt ist. Der Granat ist roth. Beide Mineraltheile treten in ziemlich gleicher Menge auf, doch waltet öfters der Diallag vor. Die Structur ist körnig. Als fremdartiger Beimengungen beobachtet man Glimmer, Quarz, Schwefelkies, Hornblende. Der Name des Gesteins deutet auf seine ausgefachten Mineraltheile hin. Es wird hin und wieder verworfen.

5. Gestein. Augitfels.

Gr. Augitfels.

Körnige Augitmasse von grüner, brauner, grauer und gelber Farbe, fettartigem Glanze, rauhem und scharfem Anfühlen und 2,2 bis 2,3 specifischem Gewichte. Die Farben wechseln aufs Manichfaltigste, und neben einander liegende Körner sind oft ganz verschieden gefärbt, ja selbst einzelne Theile eines Kornes. Die Größe desselben ist sehr variabel. Hin und wieder erscheint ein großes Korn, und die Masse geht ins Blätterige über und

zeigt sich deutlich; häufig aber ist das Korn klein und fein, und bisweilen so sehr, daß das Gestein einer dichten Masse ähnelt, womit immer eine grüne Färbung vermischt ist.

Als fremdbartige Beimengung erscheint am häufigsten Topfstein, der öfters durch die ganze Gesteinsmasse verbreitet ist, ferner Speckstein und Schmel. Seltener liegt Hornblende, Kaltspath oder Asbest in der Masse.

Widersteht im übermüdigten Zustande der Witterung leicht, wird an der Oberfläche zuerst matt, bräunlich und gelblich. Der mit Topfslein unterhängte Augitfels zerfällt sehr bald zu einem erdschaffigen Grus.

7. Gestein. Dolerit.

Besteht aus einem körnigen Gemenge von Labrador, Augit und Magnetkieseln. Der Labrador hat eine grünlich oder gränliche Farbe, der Augit ist schwarz, und das Magnetkieseln in sehr feinen Körnern eingemengt. Das Gestein ist schwarz, grün oder grün. Selten ist das Gemenge so grobkörnig, daß man die Labrador- und Augittheile deutlich unterscheiden kann; gewöhnlich ist das Korn klein oder fein, und gar oft nähert sich das Gestein einer dichten Masse. Nicht selten liegen wohl ausgebildete Gesteine von schwarzem Augit darin, manchmal kreuzförmig durchwachsen, wodurch das Gestein porphyrtartig wird. Auch ist es häufig mit Blasenräumen erfüllt, worin Kalk, Korallen, Borax, Opal, Magnete eingeschlossen, und darin Wandungen öfters mit Gränit überkleidet sind. Mitunter erscheinen in diesem Dolerit-Mandelstein die Blasenräume auch nur an den Wandungen dünn überkleidet von einzelnen der genannten Mineralien, bisweilen ganz leer, und mitunter so nahe an einander, daß das Gestein schwammig; oder wenn die Blasenräume eckig, und deren Wandungen nach innen mit einem glänzenden Schmelz überzogen sind, schlackenartig aussieht. Nach diesen verschiedenen Verhältnissen des Gesteins unterscheidet man körnigen, dichten, porphyrtartigen, mandelsteinartigen, schwammigen und schelfigen Dolerit. Als fremdbartige Beimengungen erscheinen sehr viele Mineralien, namentlich Olivin, Titanit, Apatit, Nephelin, Titanit, Melanit, Hornblende, Zirkon, Sphalerit, Schwefelkies, Magnetkies. Durch einige Verschmelzung der

Gemengtheile bildet sich der Dolerit dem Basalt, und in diesen Abänderungen erscheint auch basaltisches Olivin.

Der Luft ausgesetzt, bleicht er an der Oberfläche immer etwas aus und wird lichtgrau; später verwandelt sich der der Oberfläche zunächst liegende Magnetkiesstein in Eisenoxydhydrat, wodurch eine rothfarbige oder bräunliche Rinde entsteht, und wobei das Gestein aufgelockert, zerfließt, außen erdig wird und sich verwitterte Schalen von demselben ablösen, wodurch es nach und nach zerfällt. Zuletzt verwandelt es sich in eine schwärzlichgrüne oder bräunliche lockere Erde, man findet viele Körner und Crystallfragmente von schwarzem Augit liegen, und aus dem mit dem Magnet eine Menge sandigen Magnetisens, ausgezogen werden kann. Die doleritische Erde ist ungemein fruchtbar, setzt die Nährkräfte stark ein, hat eine angemessene Lockerheit, und ist, vermöge der verschiedenen Bestandtheile, die sie enthält, allen Culturen, namentlich dem Obst- und Weinbau, ungemein günstig.

Die besten Doleritabänderungen werden zu Chausseen, Pflaster- und Bausteinen, zu Abweissesteinen, Platten für Ofenstellen, zu Thür- und Fenstergestellen u. s. w. benutzt.

8. Gestein. Basalt.

Besteht aus einem innigen Gemenge von Labrador, Augit und Magnetkies, das sich durch große Dichtigkeit und beträchtliche Härte, eine dunkle, granlichschwarze Farbe, ein spezifisches Gewicht von 2,0 bis 2,2 und Einschluss von Olivin auszeichnet. Das Gestein wirkt immer auf den Magnet, hat einen schmelzigen oder splitterigen Bruch, und schmilzt für sich zu einem grünen Glase. Mit Salzsäure im sehr gepulverten Zustande behandelt, bildet der labradorische Gemengtheil eine Gaskarte.

Die sehr innige Vereinigung der Gemengtheile des Basalts erlaubt in der Regel deren Bestimmung auf mineralogische Weise nicht. Die chemische Zerlegung gestattet aber immer die Auscheidung von Augit und Magnetkies von dem geleitenden Labrador, und die Ausmittelung der quantitativen Verhältnisse dieser Mineralien.

Sehr dicke Basaltabänderungen haben Aehnlichkeit mit dem Obsidian. Der Olivin fehlt nie; bisweilen ist er in großer und

miteinander in solcher Menge vorhanden, daß das Gestein dadurch dunkelgrün wird und das Aussehen einer Gypssteinmasse erhält. Zuweilen zeigt der Basalt Blasenräume, hat die Beschaffenheit eines Mandelsteins und schließt in den Blasenräumen Zersetz, Nchat, Opal, Kalk, Arragon, Magneteisen. Manchmal liegen Hornblendenkörner oder Crystalle darin, Abwesen von Titan Eisen, Zinnstein, Diatag, Spazinth, Saphyr. Doch sind dies im All gemeinen seltene Beimengungen, und der gewöhnliche Basalt schließt weiße Silikatkörner, selten ein anderes Mineral, ein.

Basalten, doch weit seltener als der Dolerit, enthält der Basalt Blasenräume, und wird zum Mandelstein. (Basalt-Mandelstein). Gewöhnlich liegt in den Blasen Zersetz, oft auch Opal, Nchat, Kalkspath, Arragon, und ihre Wandungen haben häufig einen Überzug von Glimmer. Als weitere Beimengungen beobachtet man Zinnstein, Hornblende, Diatag, Titan Eisen, Obsidian, und als Seltenheit Spazinth.

Sehr oft verläuft der Basalt im Dolerit, auch uñhert er sich manchmal dem Klingstein.

Der Bitterung ausgesetzt erleidet der Basalt immer mehr oder weniger schnell eine Veränderung, je nach dem Grade seiner Dichtigkeit und der Quantität und Beschaffenheit der Beimengungen. Seine Farbe wird von der Oberfläche herab, lila, grau, so erscheinen Häute gelber und brauner Flecken, so bildet sich eine bräunliche Rinde, die sich abschält; das Gestein löst sich in einer runde Rinde auf; die auf die gleiche Weise weiter zerfallen, und so bildet sich eine Gerüstmasse, aus welcher nach und nach eine überaus fruchtbare Erde entsteht, die dem Getreide wie dem Obsidian, und vorzüglich aber dem Weinbau, höchst günstig ist. Der Boden ist reich an Thonerde, Kalk und Bittererde, Kali und Natron, wegen seiner dunkeln Farbe warm, stets feucht und allen Kulturen günstig.

Man benutzt den Basalt mit großem Vortheil zum Straßenbau und zu Mauersteinen. Zum Straßenpflaster ist er nicht zu empfehlen, obwohl er große Härte und Dauerhaftigkeit besitzt, da er durch Abreiben außerordentlich glatt wird, so daß ein nasses, etwas geneigtes Straßenpflaster aus Basalt, wegen seiner Schlüpfrigkeit, sehr schwer zu begehen ist, wozu man sich in Gasse und

den Stein abzubringen. Auch hat man die Gesteine wieder zu verschiedenen Schneidewerkzeugen benutzt. Und deshalb sind von diesem Stein mehrere Denkmäler aus dem Steinbruch zwischen Freiberg und Dresden.

5. Gestein. *Skapolith*. 5. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Besteht aus einer sehr grobkörnigen Grundmasse, die mit mehr oder weniger häufig sehr innig gemengt ist, und in welcher Crystalle von Labrador und Augit liegen. Die Grundmasse hat gewöhnlich eine gelbe oder gelbbraune, matte Farbe, wird aber auch bisweilen sehr licht, und manchmal so dunkel wie die Grundmasse des Basalts. Sie scheint aus feinen Körnern zu einem schwärzlichgrünen Masse.

Die Crystalle des Labradors sind meistens klein, selten so groß, daß sie $\frac{1}{2}$ bis 1 Zoll messen; theils grau und weiß, wenig durchscheinend, theils etwas dunkler gefärbt, durch Schmelzung der Grundmasse. Sie sind immer Zwillinge, symmetrisch, sehr feine, prismen, mit einer sehr breiten Seitenfläche. Ein und wieder sind sie fein nadelförmig. (Vergleiche die Abbildung des südlichen Norwegens nach v. Lach).

Die Augitcrystalle sind grünlich bis schwärzlichgrün, und dann gewöhnlich durchscheinend, oder schwarz und undurchsichtig; theils glatt und glänzend an der Oberfläche, und fallen dann beim Verschlagen des Gesteins häufig heraus, in dem sie Einschlüsse hinterlassen, an denen man ihre Form deutlich erkennen kann; theils sind sie matt und zerfallen zerfallen und dann sehr mit der Grundmasse zusammengewachsen. Meistens sind die Crystalle Kalkit, s. S. 267, namentlich in den Kalkitischen Metakonglomeraten.

Die relative Menge von Augit und Labrador ist sehr verschieden, selten ganz gleich; häufig ist einer der Gemengtheile vorherrschend, und bisweilen fehlt einer derselben beinahe ganz. Die Labrador-Crystalle liegen sehr oft mit ihren Hauptachsen oder ihren breiten Seitenflächen parallel, die Augit-Crystalle dagegen zerfallen in der Grundmasse. Die labradorreichen Abänderungen haben ein spec. Gewicht von 2,8 bis 2,9; die augitreichen sind etwas schwerer, indem ihr mittleres spec. Gew. = 2,9 bis 3,1 ist.

Als fremdbürtige Beimengungen findet man Gips, Gipsstein und Hornblende mit Mühe verwerthen.

Witunter erscheint das Gestein mandelsteinartig. In den Blasenräumen finden sich Zeolith, Kalkspath, Pistazie, Quarzabänderungen. Die dichten Abänderungen des Melaphyrs zeichnen sich durch große Festigkeit und ungemeine Zähigkeit aus, und sind deshalb äußerst schwer in Formstücke zu schlagen.

Bei der Verwitterung verhält sich das Gestein beynahe wie der Basalt. Es zerfällt aber schneller als dieser. Der Boden, der bei seiner völligen Verwitterung entsteht, ist sehr fruchtbar.

Mehrere Abänderungen von Melaphyr, namentlich die Laven vorreithen, zeichnen sich durch schöne Farbe und Politurfähigkeit aus, und sind schon von den Alten mehrfältig verarbeitet worden. Das unter dem Namen Serpentine verde antico, durch Schönheit der Farbe, der Grundmasse und der eingeschlossenen Labrador-Erystalle ausgezeichnete, und darinn unübertroffene Gestein gehört zum Melaphyr. Gegenwärtig werden in den Schmelzen von Catharinenburg und von Kalywan schöne Abänderungen des Ural'schen und Altai'schen Melaphyrs verarbeitet.

10. Gestein. Leucitaphyr.

Syn. Leucitgestein, Leucitmelan.

Besteht aus einem körnigen, crySTALLINISCHEN Gemenge von Augit, Leucit und Magneteisen. Das Gestein ist schwarz und weiß gesprenkelt, und wenn es sehr dicht ist, von grauer Farbe. Oefters liegen einzelne Crystalle von Augit, und Leucit in einer innig gemengten Grundmasse, wodurch ein Porphyre-Charakter hervorgerufen wird. Auch ist das Gestein mitunter blasig oder schlaefig. Es gehören zu demselben viele leucitführenden Laven. Manchmal liegen Crystalle von Melanit darin. Der Leucit ist der Verwitterung stark unterworfen, und führt ein baldiges Zerfallen des Gesteins herbei, welches sich in eine sehr fruchtbare Erde umwandelt. Beste Abänderungen werden als Baustein benutzt.

11. Gestein. Basalt.

Mit diesem Namen hat man ein Gestein belegt, welches dem Basalt nahe verwandt ist, und ebenso mit manchen Doleriten in näher Beziehung steht. Die Gesteinsstücke scheinen dieselben

zu Teyn, mit sehr feinen Einschlüssen: Das Gestein hat eine dunkelgrüne
Farbe, schließt bisweilen Olivin ein, hat öfters eine mandelförmige
artige Beschaffenheit, und die Einschlüsse sind meistens aus
Grolithe, Kalkspath u.s.w. Zuweilen zeichnet es sich durch eine
rothe und ein gewisses schalenartiges Aussehen aus. (Voll-
ständigen Beschreibungen) erscheinen Glimmer, (Schwefel-
kies, Granat, Nephelin u. e. a. Die porösen, schalenartigen
Veränderungen widerstehen der Witterung sehr lang, und end-
lich daraus bestehende Massen ist sehr zerbröckelt, und nicht
mehr zu gebrauchen. Die westlichen Basalte werden zu Hausteinen benutzt, und
die feinsten so viel zu Mauersteinen verwendet, namentlich zu
Hiebsteinen und Wägen, unsere Untersuchungen haben gezeigt,
dass Gestein in den Rheingebirgen unter dem Namen Märlstein
ganz allgemein bekannt ist. In der Gegend von Trier, wo es sehr
häufig vorkommt, ist es sehr weich, und lässt sich leicht bearbeiten.
Es ist ein sehr feines, sehr weiches, sehr leichtes Gestein, welches
man sehr leicht zu einem sehr feinen Mauerstein verarbeiten kann.

Gesteine, welche durch Serpentin charakterisiert sind, sind:

1. Gestein, Serpentinfels.

Besteht aus einer Grundmasse von Serpentin, die mit
anderen Mineralien wie Magneteisen und Gastein von Asbest ge-
mengt ist.

Das Gestein ist dicht, und hat in der Regel eine dunkel-
grüne Farbe. Bisweilen ist die Farbe lichter, grünlichgrau, gelb,
roth, braun, und mitunter erscheinen mehrere dieser Farben neben
einander, und das Gestein hat dadurch ein geflecktes buntes An-
sehen. Die Härte ist gering. Nur sehr kleine schwarze Ver-
änderungen erscheinen mitunter härter. Von fremdartigen Be-
mengungen erscheinen besonders Chromeisen, Platin, Glimmer,
Kalk, Magneteis, Granat, Schwefelkies, Magnetkies, Asbestkies
und Grolithe. Kupfer. Der Witterung ausgesetzt beschlägt der
Serpentinfels gelb oder braun, vermöge der höheren Oxydation
seines Eisengehaltes und der Bildung von Eisenoxydhydrat, die
äußerste Lage des Gesteins löst sich sehr langsam auf und
wird erdig. Die ganze Masse krumm, und bald fallen stumpf-
eckige Stücke ab. Die Klüffelflächen zeigen eine blaue schillernde
Haut. Allmählich verwandelt sich das ganze Gestein in einen
gelben fruchtbaren Thonboden.

Die dichten Mäandungen werden zu ergiebigsten Benutzungen verwandt. Das lebhaft blaugrüne Serpentin bei Monte Catone, gegenüber Prato, sieht man zu Florenz, wo ein Vorwerk Prato heißt, nachfolgend an Facaden von Kirchen. Noch verarbeitet man den Serpentin zu Matten, zu Decken, Tischplatten u. s. w. und zwar hauptsächlich zu Tischplatten. Auch mag man ihn zu Gesein, Opfsteinen u. s. w. verwenden. In der Gegend von Arezzo und Kahl, wo man letzteres das dichten und körnigen Zustand oder als Kalkspath vorfindet. Der Kalk ist gewöhnlich weiß, und steht daher sehr gegen den grünen Serpentin ab, so daß das Weisse sehr gelehrt ist. Die Vermengungen sind oft an den Grenzen in Mäandern geflossen, oft nicht sehr, der Kalk in Mäandern und Spalten zwischen dem Serpentin durch. Als Vermengungen bemerkt man: Schieferstein und Magnetit. Dieses Gestein ist der Ophit der Alten. Daraus gearbeitet sieht man acht sehr schöne Säulen am Hauptaltar der Kathedrale in Florenz.

6. Sipschaft. Thongesteine.

Das Gestein, deren Grundmasse oder charakteristischer Gemengtheil Thonstein ist oder eine andere thonige Masse. Sie verhalten sich im Wesentlichen wie Silicate der Thonate, und entstehen beim Aushauchen eines Thongewässers.

1. Gestein. Thonstein.

Besteht aus Thonsteinmasse, deren Eigenschaften sich angegeben werden sind. Man unterscheidet, wie oben, gemeinen Thonstein und Eisenthon.

1. Der gemeine Thonstein kommt theilbar ohne Vermengungen vor. Gewöhnlich bildet er die Grundmasse eines Porphyrs (Thon- oder Thonstein-Porphyr), indem die letzteren von Quarz, im feinen, Masse liegen und einzeln keine Feldspathcrystalle. Häufig haben diese ein matten Aussehen und keine ganz scharfe Begrenzung, öfters sind sie in eine weiße, thonige, kugelförmige Masse umgewandelt, und nicht selten liegen an ihrer Stelle einzelne Punkte und schmale Streifen einer solchen Substanz. Manchmal liegen kugelförmige Stücke eines härteren Thonsteins in der vorherrschenden Masse,

und öfters Ruten, Rosteln und Wurzeln von Eisen. Sparsam erscheint es in andresitähnlich, und in den Abhängen der großen Abfälle gewöhnlich zunächst eine Rinde von Grünstein, dann Basalt, Basaltabänderungen, Schot, Kalkstein. Auch und man ist das Gestein blasig.

2. Der Eisethon tritt im Allgemeinen auf dieselbe Weise auf, selten dicht und unvermengt, gewöhnlich als Porphyrgewandmasse (Eisethon-Porphyr) mit den Hauptcharakteren des gewöhnlichen Thonporphyrs, öfters aber erscheint er blasig und als Mandelstein, mitunter vollkommen schwammig und schlackig.

Beide Abänderungen des Thonsteins sind bisseits sehr häufig und führen öfters Augit; im letzteren Falle fehlen die Anorthite, dagegen treten als Beimengungen auf Bismut, Hornblende, Epidot, Magnat, Magnetitstein und mehrere andere Mineralien. Bei größerem Augitgehalt, und wenn dieses Mineral nicht nur in Kristallen, sondern auch in Körnern eingewirkt ist, zeigt sich die Farbe dunkler, grau oder braun, und oftmals ins Schwarze ziehend. Oft hat das Gestein zu gleicher Zeit Porphyre oder Mandelstein-Beschaffenheit. Jederzeit wird es, wenn es Augit einschließt, durch das Vorkommen angitisch besonders bezeichnet.

Die Witterung bewirkt bey dem wasserabsaugenden Gestein bald eine mechanische Zertheilung seiner Masse, und darum liegen die Abhänge der Berge, die aus ihm bestehen, aller Orten mit Bruchstücken desselben überdeckt. Aber nur langsam schreitet die Verwitterung weiter und bewirkt sie das völlige Zerfallen in Erde, etwas schneller im Allgemeinen bey dem weniger festen Eisethon, der indessen einen sehr eisenreichen, leicht austrocknenden Boden liefert, welcher wenig fruchtbar ist. Der Vegetation günstiger ist das Erdreich, welches bey der Verwitterung des gemeinen Thonsteins entsteht. Als Baustein taugt er, wegen der angegebenen Eigenschaften, nicht viel.

2. Gestein. Thonschiefer.

Besteht aus einer schlackigen, liegenden Thonmasse, welche mit Wasser nicht bildsam wird, kein Ansehen thut, sich wenig an die feuchte Lippe hängt und aus variablen

Verbitungen von Kieselsteine und Thonsteine besteht, deren Gattungen von Kalk, Mergel, Gips und Kalk beygemengt sind. Manche Thonschiefer entstehen aus einer Masse, die sich durch Behandlung mit Säuren in einen dazwischen liegenden und in einen kohligen Theil trennen läßt. Kohlige Theile tödten, nebst Gips, die fürwahr Entstehung auf.

Diese Thonschiefermasse sind häufig andere Mineralkörper beygemengt, und demnach unterscheidet man folgende Abänderungen:

1. Reiner Thonschiefer. Thonschiefermasse ohne fremdartige Beymengungen. Dünnschieferig, grau, von sehr gleichmäßigem Ansehen.

2. Glimmeriger Thonschiefer. Mit Glimmerblättchen gemengte Thonschiefermasse. Die Glimmerblättchen liegen in größerer oder geringerer Menge zwischen den Schieferlagen des Gesteins.

3. Quarziger Thonschiefer. Quarzige, kieselige, mitunter glimmerführende Thonschiefermasse, in welcher sich häufig Quarz in Adern, Schnüren, einzelnen Lagen oder in Körnern abgesondert zeigt.

Diese beiden Abänderungen zeigen verschiedene Farben. Die vorherrschende graue geht oft in eine grüne, blaue, bläuliche über, und bisweilen ist die Färbung völlig roth durch eingemengtes Eisenoxyd, welches dann und wann in solcher Menge vorhanden ist, daß man den Schiefer wie einen armen Eisenstein benutzen kann. Auch zeigen beide Abänderungen bisweilen eine sehr bestimmte prismatische Structur, vermöge welcher sie beyem Zerbrechen in griffelähnliche Stücke zerfallen (Griffelschiefer).

4. Porphyrartiger Thonschiefer. Selten schließen die vorhergehenden Abänderungen einzelne Feldspathcrystalle ein, und in diesem Falle erscheinen sie porphyrartig.

5. Kohliger Thonschiefer. Der ganzen Masse nach von kohligen Theilen durchdringener Thonschiefer, von graulich- und sammet-schwarzer Farbe, meistens etwas glimmerführend. Bezieht auf den Schieferflächen einen Schimmer; brennt sich weiß. Meistens ist er sehr dünn und vollkommen geradeschieferig, leicht spaltbar, und dann heißt man ihn Drahschiefer, weil ihn diese

Eigenschaften zur Bedeckung sehr geeignet machen. Manchmal enthält der kohlige Thonschiefer eine starke, fieselige Beimengung; und dann ist die Schieferung unvollkommen und die einzelnen Platten sind dicker.

6. Brandschiefer nennt man einen so stark mit schmelzbaren Theilen beladenen Schiefer, daß er in der Hitze brennt.

7. Kalkiger Thonschiefer. Kalkthonschiefer. Die Theile von kohlensaurem Kalk gemengte Thonschiefermasse, welche dieserwegen mit Säuren aufbraust. Oft liegt der Kalk auch in Körnern und Ranten in der Gesteinsmasse; und manchmal wechselt er in dünnen Lagen mit der Thonschiefermasse im Blättern ab, wodurch der Schiefer nicht selten kantenförmig wird.

Die gewöhnlichste Beimengung ist Schwefelkies, der, zumal in der kohligen Abänderung, nie ganz fehlt, und oft in einzelnen Crystallen und nierenförmigen Stücken darin liegt. Ueberdies finden sich im Thonschiefer öfters Chalkolith und Staurolith, ferner Eall, Chlorit, Granat, Hornblende, Wollastit.

Der kohlige Thonschiefer verläuft durch Ueberhandnahme von Quarz in Kiefelschiefer; der glimmerige nähert sich häufig dem Glimmerschiefer, und Zunahme von Chlorit bringt ihn dem Chloritschiefer nahe. Eingemengte Quarz- und Feldspathkörner machen ihn dem Grauwackenschiefer ähnlich.

Der Verwitterung ist der Thonschiefer sehr stark unterworfen, und um so stärker, je dünnschieferiger er ist, weil das Wasser dann sehr leicht zwischen seine Blätter eindringen, und beyus Frost sie zersprengen kann. Die äußerste Lage, Spaltungs- und Blattsflächen beschlagen gelb oder braun, bald zerfällt das Gestein in ein Haufwerk von Schieferblättchen, das sich allmählich in einen thonigen, im Allgemeinen sehr fruchtbaren Boden umwandelt. Namentlich bildet der quarzige Thonschiefer einen sehr guten Boden, indem der Quarz viel zur Lockerheit und Wurzelaufnahmefähigkeit desselben beiträgt. Dunkel gefärbte, kohlige Abänderungen liefern zumal einen warmen Boden. Der kieselige, sich dem Kiefelschiefer nähernde Thonschiefer verwittert weit langsamer. Die schwarzgefärbten Abänderungen bleichen an der Luft nach und nach aus.

Kiesreiche, thonige Abänderungen beschlagen bey der Ver-

witterung an der Oberfläche mit einem weissen Pulver von schwefelsaurem Etenoxydul und schwefelsaurer Thonerde, werden mit Kneben zur Maaufabrication benutzt, und deshalb auch Maauschiefer genannt.

Die Anwendung des dünn- und geradeschieferigen Dachschiefers ist allgemein bekannt. Schwarze, kieselige Abänderungen werden bekanntlich zu Schreibtafeln, und kleinerer auch zu Tischplatten benutzt.

3. Gestein. Schaalstein.

Besteht aus einem innigen Gemenge von Thonschiefermasse und kohlensaurem Kalk, das geringe Dichtigkeit, ein deutliches, dickschieferiges Gefüge, eine geringe Härte hat und mit Säuren aufbraust. Weicht beim Anhauchen thonig und hat unreine, grüne, gelbe, grüne, braune und rothe Farben.

Der Kalk befindet sich in diesem Gestein in der Regel in Nistern, spärlichen, crySTALLINISCHEN Theilen, und durch Ueberhandnehmen desselben, und tätiger Verschmelzung der Kneben, geht das Gestein in einen etwas thonigen Kalkstein über, so wie andererseits durch Abnahme des Kalkgehaltes das Gestein sich dem eigentlichen Thonschiefer nähert und in diesen verläuft. Nicht selten ist Chlorit eingemengt, der eine grüne Färbung bewirkt, und wenn er reichlicher auftritt, den Schaalstein einer dickschieferigen Abänderung von Chloritschiefer nähert.

Ofters ist die Grundmasse dem Eisenthon ähnlich, gelb, braun, roth, erdig. Die Schieferung verschwindet, das Gestein ist in dicken Lagen abgetheilt, und der durch die ganze Masse verbreitete Kalk liegt häufig in kleinen, kugelförmigen, sphäroidischen und mandelförmigen Theilen von matter weißer Farbe und crySTALLINISCHEM Gefüge in der Grundmasse ausgesondert, wodurch das Gestein mandelsteinartig wird (Blätterstein). Häufig ist dieser Abänderung Chlorit beigemengt, und oft in solcher Menge, daß das Gestein eine linsgrüne und blassgrüne Farbe hat, und sich dem Chloritschiefer nähert. Nicht selten liegen Feldspathblättchen darin, und oft ist ein ansehnlicher Gehalt von Etenoxyd in der Masse, wodurch es dunklere Farbe und größeres specifisches Gewicht erhält. Bisweilen ist kein Eisenthon grünsteinartig.

Der Verwitterung widersteht der an Thonschiefermasse reiche, dichtere Schaalstein ziemlich lange. Der Boden, der aus seiner Zersetzung entsteht, ist fruchtbar. Der kalkige Schaalstein zerfällt schneller, und bildet keinen so fruchtbaren Boden, da der in ihm enthaltene körnige Kalk lange unverändert in der Erdmasse liegen bleibt. Bey mandelsteinartigen Schaalstein lösen sich bey der Einwirkung der Witterung oft einzeln Kalkkugeln los, fallen aus der Grundmasse heraus, und dabey wird das Gestein an der Oberfläche löcherig. Nicht selten beschlägt es auch rufsfarbig.

8. Gypssteine, Kalkgesteine.

Zu den Kalkgesteinen rechnet man diejenigen Gesteine, welche als Hauptmasse oder als charakterisirenden Gemengtheil kohlensaure Kalkerde enthalten. Sie brausen mit Säuren auf, leuchten stark, wenn man sie heftig glüht, und brennen sich dabey ab.

1. Weiche Kalkstein.

Die Hauptmasse dieses Gesteins ist kohlensaure Kalkerde. Diese findet sich in den Kalksteinen in verschiedener Reinheit, Dichtigkeit und mit verschiedenen Structurverhältnissen. Darnach unterscheidet man folgende Abänderungen:

a. Reiner Kalkstein. Mit unbedeutenden Beymengungen von Thon, Eisenoxyd oder dessen Hydrat.

1. Körniger Kalkstein, wie er S. 232 und 233 beschrieben worden ist. Derselbe schließt er als fremdartige Beymengungen ein: Crystalle und crystallinische Theile von Quarz, Feldspath, Granat, Glimmer, Chlorit, Talc, Augit, Hornblende, Magneteisen. Der *Marino cipollino* ist ein mit Blättchen von Glimmer und Talc gemengter körniger Kalk.

Trozt der Witterung im reinsten Zustande Jahrtausende. Seine Beugung ist S. 236 angegeben.

2. Dichter Kalkstein, S. 233. Man unterschreibt gemeinen dichten und schieferigen dichten Kalkstein, und nennt letztern auch Kalkschiefer.

3. Rogenartiger oder porphyrischer Kalkstein. Rogenstein, S. 235.

4. Erdiger Kalkstein. Kreide, S. 234.

b. Thoniger Kalkstein (Mergelkalkstein). Kalkstein mit Thongehalt, der sich durch den beim Anhauchen hervortretenden Thongeruch zu erkennen gibt, beim Auflösen des Gesteins in Säuren ungelöst zurückbleibt, und bis auf 20 Procente ansteigt. Erdiger Bruch.

c. Kohliger Kalkstein. Durch kohlige Theile dunkel, oftmals ganz schwarz gefärbter Kalkstein. Lucullan. Brennt sich weiß; entwickelt mit Salzsäure öfters Schwefelwasserstoff, und enthält manchmal auch bituminöse Theile.

d. Bituminöser Kalkstein. Durch bituminöse Theile braun und schwarz gefärbter Kalkstein. Gibt beim Zerbrechen und Herreiben einen unangenehmen, oft sehr widrigen Geruch aus (Stinkkalk), ebenso beim Erwärmen, bey der Auflösung in Säuren. Brennt auf glühenden Kohlen hin und wieder eine zeitlang mit heller Flamme.

e. Kieseliger Kalkstein. Von Kiesel Erde durchdrangener Kalkstein, bey welchem ein Theil der Kalkerde manchmal in chemischer Verbindung mit Kieselerde ist, und diese sich an einzelnen Stellen als quarzige Masse ausscheidet. Oft porös.

f. Kalktuff-Deckstein. S. 234.

Der Verwitterung widerstehen die reineren, dichteren Abänderungen außerordentlich lange. Durch Einfluß des Frostes werden sie nach und nach zerklüftet. Bey einem Gehalte an Eisen beschlägt die Oberfläche rostgelb. Die kohligen und bituminösen Theile werden durch Einfluß der Luft, des Wassers und des Lichtes an der Außenseite des Gesteins zersezt, und dabey bleicht sich die dunkle Färbung aus. Die thonigen Abänderungen, welche Wasser einsaugen, zerfallen an der Luft bald, und verwandeln sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden. Der kieselige Kalkstein widersteht der Witterung sehr lange, und liefert eine unfruchtbare Erde.

2. Gestein. Dolomit.

Besteht aus einer chemischen Verbindung von kohlensaurer Kalkerde und kohlensaurer Bittererde. Härter und schwerer als Kalkstein. Das specifische Gewicht nicht unter 2,8. Braust mit Salzsäure häufig nicht, oder nur vorübergehend, im gepulverten Zustande auf; in der Wärme löst er sich aber

mit lebhaftem Brausen auf. Die gesättigte, neutrale Auflösung gibt mit Kaltwasser einen weißen, flockigen Niederschlag von Bittererde.

Man unterscheidet körnigen und dichten Dolomit, S. 243. Die dichteren Abänderungen schließen häufig als fremdartige Beimengungen ein: Feuerstein, Hornstein, Barpt, Bleiglanz, Kupferlasur, Steinsöl; in den crystallinischen, körnigen Abänderungen findet man Glimmer, Chlorit, Talk, Schörl, Hornblende, Schwefelfies u. e. a.

Die crystallinischen festen Abänderungen widerstehen der Witterung sehr lange; ebenso die dichten. Dagegen zerfallen lockere körnige Dolomite sehr bald. Die Erde, welche aus der Verwitterung der verschiedenen Dolomitabänderungen hervorgeht, ist im Allgemeinen dem Pflanzenwachsthum nicht ungünstig.

3. Gestein. Mergel.

Der Mergel besteht aus einem Gemenge von kohlensaurem Kalk und Thon, bey welchem der letztere nicht unter 20 und nicht über 60 Procent beträgt. Er ist weicher als Kalkstein, riecht beim Anhauchen stark thönig, braust mit Säuren auf und wird im gepulverten Zustande mit Wasser mehr oder weniger plastisch. Eisenoryd, dessen Hydrat, bituminöse und kohlige Theile erscheinen als färbende Beimengungen. Ofters ist auch Quarzsand beigemengt und kohlensäure Bittererde. Die Farben sind various.

Nach der Zusammensetzung des Gesteins unterscheidet man: Mergelstein, die festere, und Mergelerde, die lockere Abänderung. Nach der relativen Menge der zu diesem Gestein verbundenen Substanzen unterscheidet man ferner:

1. Kalkmergel. Der Gehalt an kohlensaurem Kalk ist der weit überwiegender, und steigt bis auf 75 Procent.

Man macht weiter folgende Unterabtheilungen:

a) Dichter Kalkmergel. Dichtet seine Masse nicht so gelöst.

b) Schieferiger Kalkmergel. Zeigt eine deutliche Absonderung in schieferige Stücke von verschiedener, im Allgemeinen aber geringer Dicke, und gar oft ist er dünn-schieferig. Mergelschiefer. Mitunter ist diese Abän-

derung von bituminösen Theilen durchdrungen. Bituminöser Mergelschiefer.

- c) Erdiger Kalkmergel (kalkige Mergelerde). Besteht aus locker verbundenen Theilen. Färbt ab.
- d) Tuffartiger Kalkmergel (Mergeltuff). Porös, löcherig, mit Abdrücken von organischen Resten, mit Einschlüssen oder als Ueberzug derselben; auch in dichteren, stalactitischen, knolligen und nierenförmigen Stücken.

2. Dolomitmergel. Gemenge von Dolomitmasse mit Thon. Ist häufig mit Sand gemengt, öfters auch mit Glimmerblättchen. Er findet sich dicht und schieferig.

3. Thonmergel. Thon bildet die stark vorwaltende Masse. Der kohlensaure Kalk beträgt bisweilen nur wenige Procente. Saugt begierig Wasser ein und klebt stark an der Zunge. Man unterscheidet ebenfalls dichten und schieferigen.

4. Sandmergel. Mit Sandtheilen sehr stark beladene Mergelmasse. Tritt dicht und schieferig auf.

Ofters sind dem Mergel auch Schwefelkies, Gyps und kleine Quantitäten von Kochsalz, so wie von phosphorsaurem Kalk, beigemengt.

Der Mergel zerfällt, als ein immer wassereinsaugendes Geschiebe, an der Luft sehr bald, und namentlich verwandeln sich die Thon- und Sandmergel in kurzer Zeit in einen lockeren Boden. Alle Abänderungen liefern eine sehr fruchtbare Erde. Die thonigten und kalkigen werden mit großem Nutzen zur Verbesserung sandiger Felder benutzt.

9. Gypschaft. Gypsgesteine.

Gesteine, welche als Hauptmasse schwefelsaure Kalkerde enthalten. Sie schmelzen für sich in starkem Feuer zu einem weißen Email, das, wenn es kalt geworden ist, nach einiger Zeit zerfällt. Mit Flußspath schmelzen sie leicht zu einer klaren Perle.

1. Gestein. Gyps.

Besteht aus wasserhaltiger, schwefelsaurer Kalkerde, S. 246 u. 247. Die dichten und körnigen Abänderungen

treten allein als Gestein auf. Ist im Großen immer mehr oder weniger mit Thon verunreinigt. Die übrigen Abänderungen erscheinen untergeordnet.

Den atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt, zerklüftet sich der Gyps an der Oberfläche in kurzer Zeit, er zerbröckelt und zerfällt zu einer leichten, lockeren Erdmasse. Die Regenwasser greifen ihn stark an, da er sich in 450 Theilen Wasser löst. Er wird aufgelöst, ausgespült, und seine Felsen zeigen daher allenthalben die Erscheinungen einer starken Auswaschung und Corrosion. Der Gypsboden ist der Vegetation im Allgemeinen günstig, wenn er mit Thontheilen untermengt ist. Reiner Gypsboden sagt nur einer kleinen Anzahl von Pflanzen zu.

2. Gestein. Anhydrit.

Besteht aus wasserfreier, schwefelsaurer Kalkerde, S. 248 und 249. Nur die körnigen und dichten Abänderungen kommen in großen Massen vor; die anderen treten nur unter untergeordneten Verhältnissen auf.

Er zieht aus der Atmosphäre Wasser an, vermehrt dabei sein Volumen, berstet, zertheilt sich in kleine Stücke und zerfällt. Im übrigen stimmen seine Verwitterungsverhältnisse mit denen des Gypses überein.

10. Gipschaft. Salzgesteine.

Gesteine, welche als Hauptmasse ein lösliches Salz enthalten.

1. Gestein. Steinsalz.

Mehr oder weniger reine, oft mit Thon oder Gyps, oder mit beiden vermengte Steinsalzmasse, welche im reinen Zustande aus Chlor-Natrium besteht, S. 287.

2. Gestein. Alaunfels.

Besteht aus einem Gemenge von Alaunstein, S. 285, und Quarz. Ofters ist Schwefelkies beigemengt. Die Quarzmasse herrscht öfters vor. Der Alaunstein durchzieht alsdann die Quarzmasse in Adern, wodurch das Gestein das Ansehen eines Trümmergesteins erhält. Mitunter verläuft sich dasselbe in eine weiße, erdige Masse.

11. Stoffschaft. Eisengesteine.

Gesteine, deren Hauptmasse oder charakterisirender Gemengtheil aus einem Eisenerz besteht. Sie haben unter allen Gesteinen das größte specifische Gewicht.

1. Gestein. Magnet Eisenstein.

Besteht aus derber Magnet Eisensteinmasse, S. 320. Ist öfters gemengt mit Quarz, Hornblende, Glimmer, Talk, Feldspath, Chlorit.

An der Luft zerfällt die Masse nach und nach in eine sandige Masse, die man Eisensand nennt, und vielfältig durch Wasser fortgespült in den Rinnisalen der Bäche antrifft.

2. Gestein. Eisenschiefer.

Besteht aus einem Gemenge von blätterigem Eisenglanz (Eisenglimmer) und grauem Quarz in Körnern, wobey ersterer prwaltet, das Gestein ein schieferiges Gefüge besitzt und gewöhnlich ein streifiges Ansehen hat. Als Beymengenungen erscheinen Schielegold, Schwefelkies, Talk, Cyanit, Strahlstein und Crystalle von Eisenglanz. Man hat Uebergänge dieses Gesteins bemerkt in quarzigen Talkschiefer (Itacolomit), Chlorit- und Thonschiefer. Eine Abänderung dieses Gesteins ist der sogenannte Itabirit vom Pic Itabira in Brasilien, welcher, außer Eisenglanz und Quarz, auch noch Körner von Magnet Eisenstein enthält. Erleidet an der Luft eine mechanische Zersetzung. Wird mit Nutzen auf Eisen verschmolzen.

2. Abtheilung. Nicht crystallinische Gesteine.

A. Conglutinatr.

Gesteine, deren Theile durch eine Masse verbunden sind, welche sich zu jenen wie ein Verkittungsmittel verhält.

1. Stoffschaft. Sandsteine.

Conglutinate, welche aus Quarzkörnern bestehen, die durch ein einfaches oder gemengtes Bindemittel zusammengekittet sind. Sehr oft sind Blättchen von weißem Glimmer beigemengt, Körner von Grünerde und Feldspath.

2. Gestein. Quarzsandstein.

Das Bindemittel.

Die Quarzkörner sind durch ein weisses, quarziges Bindemittel verkittet. Das Gestein hat eine grosse Härte, Festigkeit, ist sehr spaltbar und besitzt weisse und graue, so wie durch Eisenoryd bewirkte rothe Färbungen. Es verläuft sich einseitig durch innige Verwachsung der einzelnen Quarzkörner in das unter dem Namen Quarzfels betrachtete Gestein, andererseits durch Aufnahme eiliger Stücke anderer Gesteine in Klüftcongglomerat.

Widersteht der Verwitterung äusserst hartnäckig.

2. Gestein. Thonsandstein.

Die Quarzkörner sind durch ein thoniges Bindemittel von verschiedener Zusammensetzung verkittet. Nicht beim Anhauchen thonig. Hat verschiedene weisse, graue, gelbe, grüne, rothe und braune Farben, die vom Bindemittel herrühren. Je nachdem ein gewöhnlicher eisenarmer Thon die verkittende Masse ist, oder ein eisenreicher, roth oder braun gefärbter, unterscheidet man gemeinen Thon-Sandstein und Eisenthon-Sandstein. Beim ersteren ist das Bindemittel häufig in geringer Menge vorhanden, öfters vollkommen weis, dem Kalk ähnlich. Eine gewöhnliche Beimengung sind Glimmerblättchen, die öfters in solcher Menge in parallelen Lagen im Gestein liegen, daß sie dasselbe schleierig machen. Der Eisenthon-Sandstein hat rothe und braune Färbungen, gewöhnlich eine größere Menge Bindemittel, und deswegen im Allgemeinen auch eine geringere Festigkeit. Glimmereinmischung macht ihn gleichfalls manchmal schleierig.

Die locker verbundenen und die bindemittelreichen Thonsandsteine zerfallen an der Luft bald, und geben bei einer etwas stärkeren Quantität Bindemittel einen fruchtbaren, lockeren Boden. Die bindemittelarmen aber zerfallen nach und nach zu einer unfruchtbaren Sandmasse.

3. Gestein. Kalksandstein.

Ein Sandstein, dessen Körner durch kohlensauren Kalk zusammengeklebt sind. Braust mit Säuren stark auf und zerfällt darinn. Enthält häufig Glimmerblättchen und Körner

von Gränerde, welche die herrschende graue Farbe öfters ins Grüne ziehen. Härte und Festigkeit sind im Allgemeinen gering. Verschiedene Menge des Bindemittels und der Beimengungen bewirken mannichfaltige Abänderungen dieses Sandsteins. Er verwittert ziemlich bald, und verwandelt sich in eine fruchtbare Erde.

4. Gestein. Mergelsandstein.

Das Bindemittel besteht aus einem Mergel, der bald Thon, bald Kalkmergel ist. Die Quarzkörner sind in der Regel klein; nicht beim Anhauchen thonig, und braust mit Säuren mehr oder weniger auf. Besteht verschiedene graue, grüne, gelbe, rothe, braune Farben, hat gemeinlich eine Beimengung von Glimmer, und erscheint beim Ueberhandnehmen desselben, so wie des Bindemittels, manchmal schieferig.

Verwittert bald und zerfällt zu einem Erdschiebe, das sich durch Lockerheit und Fruchtbarkeit auszeichnet.

Bekanntlich werden die Sandsteine allgemein zu Bauten der verschiedensten Art verwendet.

2. Gipschaft. Conglomerate.

Conglomerate nennt man solche Gesteine, bey welchen eckige oder abgerundete Stücke verschiedener Mineralien, einfacher und gemengter Gesteine, durch ein Bindemittel zusammengeklittet sind, das theils ein einfaches, theils ein gemengtes ist.

1. Gestein. Kiesel-Conglomerat.

Abgerundete oder eckige Stücke verschiedener Quarzarten sind durch ein kieseliges, einfaches oder gemengtes Bindemittel verklittet. Gewöhnlich bestehen die verklitteten Theile aus gereinigtem Quarz; Hornstein, Kiefelschiefer, Feuerstein, Jaspis, Chalkedon erscheinen seltener. Die Größe der Stücke ist sehr verschieden. Als Beimengungen treten Thon, Feldspath, Glimmer, Schwefelkies auf. Härte und Festigkeit des Gesteins sind groß. Man unterscheidet, je nachdem die verklitteten Stücke abgerundet oder eckig sind, eigentliche Conglomerate und Breccien.

Das gemeine Kiesel-Conglomerat enthält vorzüglich abgerundete Quarzstücke von verschiedener, häufig von weißer, Farbe. Das kieselige Bindemittel ist in sehr verschiedener Quantität, öfters in sehr geringer, vorhanden.

Der sogenannte **Pudding Stein**, ist ein Kiesel-Gonglomerat, bey welchem in einer grauen, gelben oder bräunlichen, Sandmasse aus Hornstein oder Feuerstein, abgerundete Stücke derselben Mineralien liegen, die gewöhnlich eine, von der Farbe des Bindemittels verschiedene, gelbe, braune oder dunkelgraue Farbe haben.

Die Kiesel-Breccie enthält gelbe Stücke, von Quarz, Hornstein, Eitenkiesel, Salsp.

Feldspathige Kiesel-Breccie nennt man eine Abänderung, welche Körner und Blättchen von Feldspath im frischen oder mehr und weniger zerfetzten Zustand, einschließt. Statt Feldspath liegt hiaweilen eine thonige, kassienartige Substanz in der Masse. Als Beymengungen kommen darinn vor: Glimmer, Kalkspath, Flußspath, Baryt, Schwefelsäure, Zinkblende, Bleiglanz, Eisenspath, Eisenglanz u. e. d.

Das Kiesel-Gonglomerat verlaufe in Sandstein, in dem die eingeschlossenen größeren Stücke abnehmen und Quarzkörner an deren Stelle erscheinen; in Quarzfeld, wenn Bindemittel und eingeschlossene Theile in einander verfließen, und endlich in Granit-Gonglomerat, durch Einmischung von Feldspath und Glimmer.

Die festen Abänderungen tragen der Witterung hartnäckig; die feldspathigen, die thonigen, werden dagegen bald angegriffen und zerfallen zu einem Haufwerk.

2. Gestein. Kalk-Gonglomerat.

Stücke von dichten oder ragenartigem Kalkstein, meist abgerundet, sind durch ein kalkiges Bindemittel verflochten.

Dieses ist öfters mergelig oder sandig, enthält hiaweilen Kalkspathkörner. Selten liegen in diesem Gonglomerate auch Stücke anderer Gesteine, Bruchstücke von Granit, Gneis, Quarz, Thonschiefer, Grünslein. Mitunter ist das Bindemittel selbst ein Gonglomerat von feinem Korn.

Der Witterung widerstehen, diesen Abänderungen sehr lange, bey denen die eingeschlossenen Stücke klein sind, und das Bindemittel ziemlich rein kalkig ist. Abänderungen aber mit großen Stücken und mergeligem oder sandigem Bindemittel zerfallen bald, und das Bindemittel liefert hierbey einen fruchtbaren Boden.

Die festen Abänderungen, von kleinem Korn, liefern gute

Baussteine, werden zu Haussteinen benutzt, zu Fenstern und Thür-
gestellen, Treppentufen u.s.w. verwendet.

3. Gestein: Augit-Conglomerat.

Einige Stücke von Augit, von mehreren Substanz bis
herab zur Größe eines Sandkorns, sind durch eine weiße Kalk-
masse verkittet. In Zwischenräumen zwischen diesen und den
Augitstücken befinden sich oft zierliche Kalkspatkrystalle. Man-
mal liegen auch Stücke von dichtem Kalkstein in der Masse, und
fein eingemengte Augitkörnchen färben sie bisweilen dunkel.

4. Gestein: Eisen-Conglomerat.

Dieses aus Stücken von Magnetkiesstein und Eisen-
glanz, meist eckig, seltener abgerundet, die durch eine ockerige,
aus Brauner- oder Rostkiesstein bestehende Masse verkittet sind.
Unter den verschieden großen Eisenstücken liegen hin und wieder
Stücke von quarzigem Talkkies. Als Beimengungen erschei-
nen Glimmer, Chlorit, Talk, nicht selten auch Blättchen von
Gediegen-Gold. Das Gestein taugt auf Eisen und Gold be-
nutzt werden.

5. Gestein: Bimsstein-Conglomerat.

Einige auch abgerundete Stücke von Bimsstein sind durch
ein zähflüssiges Bindemittel, oder eine aus zerriebener Bims-
steinmasse bestehende, erdige Substanz verkittet. Das Gestein
ist porös, leicht und von geringer Festigkeit. Als fremdartige
Beimengungen zeigen sich Blättchen von Glimmer, Opal, Stücke
von Trachyt, Perlstein, Obsidian und des unterliegenden Gesteins.

Eine bindemittelreiche Abänderung von grauer ins Gelbe
und Braune gehender Farbe, wofür nur wenige Bimssteinstücke
liegen, die eine erdige Beschaffenheit hat und dicht ist, nennt
man Lava.

Das Gestein zerfällt an der Luft und gibt einen fruchtbaren
Boden. Das leichte Conglomerat wird in den Rheingegenden,
namentlich um Eobach, Rembich, Andernach, als Bausstein zu
leichtem Bauteil, zu Kaminen, Zwischenmauern u.s.w. verwendet,
und der Traß ist das allgemein bekannte und geschätzte Material
zu Wasserbauten aller Art, da er mit Kalk einen Mörtel bildet,
der im Wasser hart wird, eine bedeutende Festigkeit erreicht und
kein Wasser durchläßt.

6. Gestein. Basalt-Conglomerat.

Eckige und abgerundete Stücke verschiedener Abänderungen von Basalt, Diabas, augitischem Efsenthon und Thonporphyr sind durch eine erdige Masse verkittet, welche aus einem der genannten Gesteine oder aus einem Gemenge einiger derselben entstanden ist. Die Farbe ist im Allgemeinen dunkel, grau, braun, schwarz oder roth. Die verkitteten Stücke sind von sehr verschiedener Größe, und das Bindemittel ist in sehr abwechselnder Menge vorhanden. Wartet es ab, und sind die eingeschlossenen Stücke klein und sparsam vorhanden, so hat das Gestein ein mehr gleichartiges Ansehen, ist ein Bruch erdig und wird Basalt-Luff genannt. Beygemengt findet man Glimmer, Magnetkies, Titankies, Hornblende, Augit, Olivin, Diopsid, Feldspath, Kalispath, und hin und wieder auch fremdartige Gesteine, welche die Unterlage über die Stücken bilden, Kalkstein, Mergel, Sandstein, Granit, Gneis, Thonschiefer u.s.w.

Die Festigkeit ist sehr verschieden. Manche Abänderungen lassen sich als Bausteine benutzen. Die bindemittelreicheren, weicheeren, haben wenig Bestand, und zerfallen bald zu einem Boden, welcher sich an Fruchtbarkeit dem Basaltboden anschließt.

7. Gestein. Trachyt-Conglomerat.

Besteht aus Bruchstücken der verschiedenen Trachyte Abänderungen, die meist eckig, seltener abgerundet, und durch ein thoniges Bindemittel verkittet sind, welches ein Product der Zersetzung des Trachyts ist. Oefters liegen auch Stücke von Basalt, Diabas und anderen in der Nähe vorkommenden Gesteinen darinn. Die Farbe ist vorherrschend licht, gelblich- und graulichweiß, grau, seltener braun oder roth. Die verkitteten Stücke sind von sehr verschiedener Größe, und häufig etwas zersezt, thonig, zerreiblich. Die fremden Beymengungen, Glimmer, Augit, Hornblende, Rhyaokith u.s.w., zeigen sich in der Regel besser erhalten, und lassen sich gemeinlich leicht heraus lösen. Manche Abänderungen des Gesteins besitzen eine ziemliche Festigkeit und werden als Bausteine benutzt, und da sie in der Hitze nicht leicht springen, mitunter auch zur Construetion von Herden und Backöfen. Größere Stücke werden zu Trögen verwendet.

Die weicheen Abänderungen verwittern schnell, und liefern einen sehr fruchtbaren Boden.

8. Gestein. Klingstein, Conglomerat.

Eckige und abgerundete Stücke von Klingstein sind durch ein thoniges Bindemittel verkittet, welches gemeiniglich von kohlensaurem Kalk durchdrungen ist. Es braust in diesem Fall mit Säure auf; damit in der Wärme digerirt, gibt es eine Gallerte. Die vorherrschende Farbe ist grau, und geht seltener ins Gelbe und Braune über. Die verkitteten Theile sind meistens etwas aufgelöst. Das Bindemittel herrscht in der Regel vor. Als Beimengungen erscheinen häufig Glimmer, Kalkspath, Horablende, Magnetkies. Oefters liegen darinn auch Bruchstücke fremdartiger Gesteine. Die Festigkeit ist häufig von der Art, daß man das Gestein zu Bauten benutzen kann. Es widersteht indessen der Verwitterung nicht lange, wenn es der Luft ausgesetzt ist, und die weicheen, mehr thonigen Abänderungen zerfallen bald zu einer lockeren Erde, die sehr fruchtbar ist.

9. Gestein. Vulkanischer Tuff.

Syn. Asche.

Besteht aus Bruchstücken schlackiger, von Kratern ausgeworfener Gesteine, die durch eine sandige und aschenähnliche, gleichfalls von Vulkanen ausgeworfene Masse verkittet sind. Man unterscheidet drey Arten von vulcanischem Tuff.

1. Steintuff. Tufa litoides der Italiener. Besteht aus einer erdigen, rothbraunen Masse, in welcher orangefarbige Stücke einer schlackigen Lava liegen, welche man in Unteritalien *Lapillo* nennt. Hart und fest. Schließt mehrlige Leucite ein, braunen Glimmer, Crystalle von Augit und mitunter Feldspath. Bisweilen liegen Stücke von Kalkstein darinn. Das Korn des Gesteins ist hin und wieder so fein, daß es das Ansehen einer dichten, gleichförmigen Masse hat.

Seine ansehnliche Festigkeit macht es sehr geeignet zu Bauten. Dazu wurde es auch schon in der älteren römischen Zeit verwendet, in welcher zu Rom die Tuffsteingruben am capitolinischen Berge angelegt wurden. Aus diesem Steintuff ist die *Closca maxima* erbaut, und der am Berge anliegende Theil der Substructionen des Tabulariums am Capitol. In länglicht vier-

edige Platten geschnitten sieht man diesen Tuff in den Resten der Gänge des Marcellus-Theaters, sodann am Eckturm des neuen Capitoles. Wahrscheinlich ist es dieses Gestein, welches die Alten Lapis quadratus nannten, und die Römer in sehr frühen Zeiten zum Pflastern der Fußwege gebrauchten. Ebenso scheint dasjenige Steintuff zu seyn, was Vitruv Populus ruder nannte.

2. Bröckeltuff. Tufa granularo. Besteht aus einer schwärzlich- und gelblichgrauen, leichten, zerreiblichen Masse, aus groben Körnern zusammengesetzt, die schwach zusammenhängen, und vermengt sind mit mehligem Leucht, Augitbrocken, Glimmerblättchen, und bisweilen mit schwärzlichgrauen Klümpchen verschlackter Gesteine. Er scheint aus der Zersetzung einer porphyrischen Lava hervorgegangen zu seyn. Farbe, Festigkeit und Gefüge zeigen sich verschieden nach dem Grade seiner Zersetzung. Manchmal hat er noch ziemlich den Character der schlackigen Masse, aus welcher er entstanden ist; mitunter ist er aber auch so zerreiblich und aufgelöst, daß er einer erdigen Masse gleich ist. An der Witterung verwandelt er sich in einen plastischen, wasserbindenden Thon, der zur Anfertigung von Backsteinen benutzt wird. In St. Agata in Campanien macht man Gefäße daraus, und aus ihm bestehen auch die am Albaner See aufgefundenen, roh gearbeiteten Aschenurnen.

In der Masse dieses Bröckeltuffs liegen alle Catacomben in Rom, mit Ausnahme derjenigen von St. Valentino. Die römischen Catacomben sind die Aronariae, Gräbigruben, der Alten. Heut zu Tage noch heißen die Puzzolangeruben zu Frosinone und Segni „le Aronaro.“ Die Puzzolanderde selbst ist nichts anderes als eine Abänderung dieses Tuffs, und wahrscheinlich die Arona nigra des Vitruv; während die Arona rufa, welche dieser Baumeister den anderen Arten dieses Gesteins vorzieht, vielleicht die rothe Puzzolanderde ist, welche auch heute noch für die beste gilt. Bekanntlich liefert die Puzzolanderde mit Kalk einen vortrefflichen Mörtel, den man vielfältig in den Bauten des alten Roms antrifft, und der sich auch sehr gut zu Wasserbauten eignet.

3. Posilliptuff. In einer blaß strohgelben oder gelblich-

weißen, matten, erdigen, leichten und spröden Masse, liegen sehr gehäuft lippen große Stücke von weißem Bimsstein und von schwarzer, poröser Lava, welche letztere öfters obdian- oder pechsteinartig aussehen und größer vorkommen. Gestein erscheint eine weitere Vermengung. Die Festigkeit des Gesteins ist gering, und leicht können sich daher Neapels Sazaroni Höhlungen in dasselbe graben, wovon das Gestein in der Nähe der Stadt voll ist, und worinn auch an der östlichen Seite desselben die weitläufigen Catacomben liegen, so wie die Posilipogrotte selbst.

Alle drey Tuffarten leiden an der Luft mehr oder weniger, namentlich zerfällt der Bröckeltuff bald. Der Posilipstuff wird stark ausgespült; die lockeren Theile zerfallen und werden fortgeführt, die festeren bleiben und bilden Hervorragungen, die sich nebstomig über die Oberfläche der Felsen ziehen.

Die Erde, welche aus der Verwitterung des vulcanischen Tuffes entsteht, ist sehr fruchtbar, wenn Bimssteinstücke nicht in großer Menge darinn liegen. In ihr wurzelt die Rebe der Falerner Hügel, und in der Gegend von Neapel sehen Aloe, Lorbeer, Feigen, Pinen und Sympressen darauf.

10. Gestein. Deposin.

Syn. Pfefferstein, Poparino.

Erdige Geschiebe oder abgerundete Gerölle von Basalt, Dolerit, Basanit und eckige Stücke von weißem körnigem Dolomit, sind durch eine aschgraue, feinerdige und weiche Masse verkittet. In dieser liegen überdies noch viele Glimmerblättchen und länglichte Glimmerparthien, mit Augit und Magneteisenern dazwischen, so wie einzelne ausgebildete Leucit- und Augitcrystalle. Das Gestein zeichnet sich durch sein frisches Ansehen aus. Durch Ueberhandnehmen der basaltischen Theile gewinnt es öfters das Ansehen einer Zusammenhäufung von lauter Basaltstücken; mitunter herrschen auf gleiche Weise die Dolomitstücke vor.

An der Witterung verwandelt sich das Gestein in eine graue, fruchtbare Erde. Man sieht es häufig an den Bauwerken der Alten; es kam jedoch wahrscheinlich später als der Tuff in Anwendung, da die ältesten Gebäude aus diesem aufgeführt sind.

11. Gestein. Gneiss-Conglomerat.

Besteht aus einem Gemenge von Theilen des Granits, aus Granitgrus und einzelnen mehr oder weniger aufgestellten Granitstücken, die durch eine thonige Masse verkittet sind, welche öfters durch Eisen gelb, braun oder roth gefärbt und aus verwittertem Feldspath entstanden ist.

Der eingeschlossene Feldspath ist in der Regel weich, erdig; der Glimmer liegt in kleinen Blättchen zerstreut in der Masse. Manchmal liegen darinn auch Stücke von Gneiss oder Glimmerschiefer. Die Festigkeit ist mitunter so groß, daß man das Gestein zu Bauten verwenden kann. Gewöhnlich zerfällt es an der Luft bald, zumal wenn das Bindemittel vorwaltet, und dabey verwandelt es sich in eine sehr fruchtbare Erde.

12. Gestein. Eisenthon-Conglomerat.

Körner und größere, theils eckige, theils abgerundete Stücke von Quarz und Bruchstücke verschiedener Gesteine, wie von Granit, Gneiss, Thonschiefer, Kiefelschiefer, Quarzfels, Porphyr, Glimmerschiefer, sind durch eine rothe, eisenreiche, thonige Masse verkittet, welche dem Eisenthon nahe kommt. Das Bindemittel ertheilt dem Gestein im Allgemeinen eine rothe Farbe, und ist, so wie die verkitteten Theile, in sehr abweichenden Verhältnissen vorhanden. Ebenso variiren die letztern auch außerordentlich in der Größe. Je weniger Bindemittel vorhanden ist, das sich in der Regel sparsam vorhanden zeigt, wenn die verkitteten Stücke größer sind, desto mehr Festigkeit hat im Allgemeinen das Gestein. Ganz besonders groß ist diese bey manchen Abänderungen, deren Bindemittel eine kieselige Beschaffenheit besitzt. Gewöhnlich sind Glimmerblättchen eingemengt, festener Feldspathkörner, oder weiße laglinartige Macthlen.

Die meisten Abänderungen, mit mehr oder weniger kieseligem Bindemittel, widerstehen der Witterung sehr lange, und diese werden auch vielfältig als Baustein benutzt, zu Mählssteinen verwendet, zu Thür und Fenstergeßellen, Treppentufen, Bodenplatten u.s.w. verarbeitet. Die bindemittelreichen Abänderungen zerwittern dagegen schnell, und ebenso die weniger festen, welche sehr große Gesteins-Bruchstücke einschließen. Der Boden, welcher aus der Verwitterung des Gesteins hervorgeht, ist fruchtbar.

13. Gestein. Porphyr-Conglomerat.

Eckige und abgerundete Stücke verschiedener Porphyre, vorzüglich aber von Feldstein- und Thonporphyr, sind theils für sich, theils in Verbindung mit Bruchstücken von Quarz oder anderer Gesteine, durch eine thonige oder mehr und weniger kieselige Masse verkittet. Die Bruchstücke anderer Gesteine bestehen meistens aus Granit, Thonschiefer, Kieselstiefer. Das thonige Bindemittel ist gewöhnlich roth, und das Gestein in der Regel von feiner groben Festigkeit. Solche Abänderungen jedoch, welche ein kieseliges Bindemittel enthalten, besitzen öfters eine außerordentliche Festigkeit, und stellen sich, wenn die eingeschlossenen Stücke eckig sind, als eine ausgezeichnete Porphyr-Brecie dar, die sich vortreflich zum Straßenbau eignet.

14. Gestein. Grauwacke.

Eckige und abgerundete Körner und Stücke verschiedener Quarzabänderungen, unter welchen der gemeine Quarz am gewöhnlichsten auftritt, sind durch ein feinkörniges, granitisches Bindemittel verkittet, welches aus feinen Körnern von Feldspath und Quarz besteht. Die verkitteten Theile messen in der Regel weniger als einen Zoll. Härte und Festigkeit sind beträchtlich, die herrschende Farbe grau. Man unterscheidet gemeine und schieferige Grauwacke.

Bei der gemeinen Grauwacke haben die verkitteten Theile gewöhnlich die Oberhand, und ist das Bindemittel so sparsam vorhanden, daß man es aussuchen muß. Bisweilen sind die Quarzkörner sehr klein, und das Gestein hat alsdann, bei bedeutender Härte und Festigkeit, das Aussehen einer gleichförmigen, quarzigen Masse. In den Abänderungen von größerem Korn, und zumal in denselben, worin größere Bruchstücke liegen, fehlen selten zerstreut eingenestete Stimmerblättchen. In diesen liegen auch oft Bruchstücke von Thonschiefer, die, wenn sie häufig und schwarz sind, dem Gestein eine dunkle Färbung geben, und oft kommen darinn auch Bruchstücke von Granit, Gneis, Stimmerschiefer, Feldsteinporphyr, Serpentin und Kalkstein vor. Auch liegen öfters Quarzstämme in dem Gestein, knollige und kugelige Stücke feinkörniger Grauwackenmasse, und manchmal liegen in einem solchen zählreiche, abgerundete und eckige, feine

örnige Grauwackensteine, gemengt mit Fragmenten von Granit, Gneis und Thonschiefer.

Die schieferige Grauwacke ist durch ihre schieferige Structur ausgezeichnet, und wird auch Grauwackenschiefer genannt. Sie besteht aus einer feinkörnigen Grauwackenmasse, in welche öfters viele Glimmerblättchen eingemengt sind, die ihm Schimmer erteilen, und mitunter dem glimmerigen Thonschiefer nahe bringen.

Gar oft ist der Grauwacke eine eisenhaltige, thonige Substanz beigemengt, die nicht selten Einfluß auf ihre Farbe hat, und die Ursache ist, daß das Gestein beim Befeuerten thonig riecht. Beigemengt findet man Feldspath, Schwefelkies, Kalkspath, Anthracit, Steinmark u. c. a.

Die gemeine Grauwacke widersteht der Witterung in der Regel lange. Die schieferige aber, vielfach von Rissen durchzogen, erleidet bald eine mechanische Zertheilung und zerfällt zu einem sandigen Thonboden, welcher der Forstkultur sehr günstig ist. Man benützt die festere Grauwacke als Baustein; die kieseligen Abänderungen werden zu verschiedenen Ofen-Constructionen verwendet.

15. Gestein. Nagelfluh.

Bruchstücke verschiedener Gesteine, größtentheils abgerundet, seltener eckig, sind durch ein mergeliges oder sandsteinartiges Bindemittel verkittet. Das Eigenthümliche der Nagelfluh besteht darin, daß die verkitteten Theile von sehr ungleicher Größe sind, und die größeren derselben Zwischenräume zwischen sich lassen, in welche sich kleinere Stücke eingelagert haben, die abermals ähnliche Zwischenräume bilden, in welchen wiederum kleinere Stücke liegen, und dieß wiederholt sich weiter und herab bis dahin, wo man die verkitteten Theile nicht mehr vom Bindemittel unterscheiden kann. Manchmal ist dieses selbst eine Nagelfluh von sehr kleinem Korn. Gar oft ist das Cement auch ein wirklicher feinkörniger Kalksandstein, der bisweilen in Nestern ausgesondert in der Nagelfluhmasse liegt. Mitunter besteht der Kitt auch aus einem Mergel, der sich in Wasser erweicht. Die größeren der verkitteten Stücke sind in der Regel abgerundet, und nur dann nicht, wenn sie einem schieferigen Gesteine angehören; die kleineren

Stücke sind mehr eckig. In der Größe variiren sie von Blöcken von 3 Fuß Durchmesser bis herab zur Größe eines Sandkorns. Der größte Theil der eingeschlossenen Stücke besteht aus Kalkstein in verschiedenen Abänderungen, womit Kalksandsteine und Quarze gemengt sind. Oefters aber liegen Trümmer der verschiedenartigsten crystallinischen Gesteine darinn, Stücke von Granit, Syenit, Porphyr, Gneis, Glimmerschiefer, Serpentin, Gabbro, Grünstein.

Das Gestein hat in der Regel eine große Festigkeit; die Abänderungen mit einem mergeligen Cement haben geringeren Zusammenhalt und zerfallen an der Witterung, wenn das Bindemittel durch Wasser erweicht wird. Schläßt die Nagelfluh verwitternde crystallinische Gesteine ein, so führen diese durch ihr Zerfallen die Zerstörung des Gesteins herbe. Aus dieser geht endlich ein Boden hervor, der fruchtbar, und zumal wenn das Bindemittel mergelig, oder die eingeschlossenen Trümmer felspathig sind, der Vegetation sehr günstig ist. Es liegen in den Vorälpen die schönsten Wälder auf Nagelfluh. Ist sie aber sehr fest, dann widersteht sie der Verwitterung hartnäckig. Bey geneigten Bergwänden rollen alle losgelösten Stücke in die Tiefe, werden alle entstandenen erdigen Theile abgeschwemmt, und erscheint daher das Gestein auf große Strecken unbedeckt, entblößt von aller Vegetation, da diese auf den kahlen Nagelfluhfelsen eben so wenig Wurzel fassen kann, als auf nackten Kalksteinmassen. Man benutzt die Nagelfluh als Baustein, und namentlich als Straßenmaterial.

10. Gestein. Muschel-Konglomerat.

Bruchstücke verschiedener fossiler Muscheln und Schnecken, mitunter auch guterhaltene Individuen derselben, sind durch ein kalkiges oder mergeliges, seltener durch ein kieseliges Bindemittel mit einander verbunden. Oft sind Stücke von Kalkstein eingemengt, Körner und kleinere Stücke von Quarzabänderungen, Sand, Kalkspath. Das Gestein hat mitunter eine ziemlich Festigkeit und widersteht der Verwitterung lange. Balket das Bindemittel vor, so besitzt es geringe Festigkeit, und zerfällt an der Luft bald zu einem Haufwerk, aus welchem man nicht selten ziemlich erhaltene Conchylien auslesen kann. Die meisten Abän-

derungen werden als Baustein benutzt. Man steht sie mehrfältig an den Resten der alten Burgen im Hegau.

17. Gestein. Knochen-Conglomerat.

Knochen, ganz oder in Bruchstücken, mehr und weniger fossil, verschiedenen Thieren angehörig, namentlich Säugthieren, Vögeln, Amphibien, sind durch ein thöniges, kalkiges oder mergeliges Cement ver kittet. Beygemengt findet man öfters Muschel- und Schneckenreste, Stücke von Kalkstein, Quarz und einigen anderen Gesteinen. Manchmal ist Kalkspath durch die ganze Masse verbreitet, und hin und wieder tritt er als Hauptbindemittel auf. In diesem Falle hat das Gestein eine ziemliche Festigkeit, die sonst in der Regel gering ist.

B. Congregate.

Darunter begreift man diejenigen nicht crystallinischen Gesteine, deren Theile schwach zusammenhängen, ohne daß ein Bindemittel als Kitt auftritt, oder die neben einander liegen, ohne daß sie zusammenhängen, wobey sie als lose Gemenge erscheinen.

1. Eigenschaft der Thone.

Schwach zusammenhängende Gesteine, deren Hauptmasse aus einer in der Dryctognosse geschilderten thönigen Mineralsubstanz besteht, S. 207 f. f. Sie besitzen geringe Härte und Festigkeit, sind zum Theil zerreiblich, erweichen sich im Wasser und bilden damit eine plastische Masse. Sie geben beym Anhauchen einen starken Thongeruch aus, hängen mehr oder weniger an die feuchte Lippe, ziehen sich in der Hitze stark zusammen und erhärten dabey. Sie sind bald mehr, bald weniger gemengt mit Eisenoryd oder dessen Hydrat, mit Kalterde, Bittererde, Manganoxyd, Quarzsand, Glimmerblättchen, kohligen und bituminösen Theilen, enthalten nicht selten Kali oder Natron, Einmengungen von Feldspath, Gyps, Schwefelfies, Binarfies und öfters von Pflanzenresten.

1. Gestein. Porzellanerde.

Tritt mit den Characteren, die S. 210 von ihr angegeben sind, öfters in ansehnlichen Massen auf, die sich im Großen mehr

und weniger verunreinigt, und öfters mit Bruchstücken von Granit, Körnern von Quarz und Feldspath, Glimmerblättchen verunreinigt zeigen.

2. Gestein. Thon.

Man unterscheidet in der Geognosie Thpferthon, Lehm, Letten und Schieferthon, von welchen die drey ersten in der Dryctognosie, S. 207—209, beschrieben worden sind. Der Schieferthon ist ein dickschieferiger Thon, welcher in der Regel durch kohlige und bituminöse Theile dunkelgrau und schwarz gefärbt, beynahe immer mit Glimmerblättchen gemengt ist. Gewöhnlich liegen Crystalle, crystallinische Theile oder Körner von Schwefel- oder Binarkies darin, von welchen auch bisweilen seine ganze Masse durchdrungen ist. Die kohligen Abänderungen schließen häufig Pflanzenreste ein, oder zeigen Abdrücke derselben (Kohlenschiefer), namentlich von Farn, Eycopodien und Equiseten. Öfters ist die Schiefermasse mit kohlensaurem Kalk gemengt, und in diesem Falle braust sie mit Säuren auf. Die kiesreichen Abänderungen werden auf Alaun und Vitriol verarbeitet (Alaunschiefer). Der Witterung ausgesetzt, zerfallen die Thonarten sämmtlich in kurzer Zeit. Ihre Anwendungen sind in der Dryctognosie angegeben. Die aus ihnen entstehenden Bodenarten sind im Allgemeinen fruchtbar, wenn sie durch Beymengungen aufgelockert sind. Namentlich zeigt sich der lehmige Boden sehr fruchtbar.

3. Gestein. Polierschiefer.

Schieferige, erdige Masse, von gelblichgrauer, einerseits ins Weiße, andererseits ins Braune fallender Farbe. Sehr weich, saugt Wasser ein, ohne zu zerfallen. Im Bruche feinerdig. Enthält 79 Kiesel Erde, 4,0 Eisenoryd, 1,0 Thonerde, 1,0 Kalk Erde und 14,0 Wasser. Wird in Böhmen (Kutschlin), Hessen (Habichtswald) und Sachsen (Planitz) zum Putzen und Polieren von Metallen verwendet.

2. Eigenschaft des Grases.

Unter Grus begreift man lockere Congregate von groben Körnern, sowohl einfacher als gemengter Gesteine, welche sich in einem mehr oder weniger aufgelösten Zustande befinden. Der

Grus, den man auch **Gries**, und wenn die Stücke etwas größer sind, **Grand** und **Kies** nennt, ist das Resultat einer ziemlich weit vorgeschrittenen Zerküderung oder Zerküchung der Gesteine. Oft besteht er aus den Resten eines einzigen Gesteins, oft aber aus Zerkümmern mehrerer.

Als besondere, aus den Resten einzelner Gesteine zusammenge-
 setzten, häufig vorkommende Gruse, unterscheidet man nament-
 lich den **Granit**, **Gneis**, **Syenit**, **Glimmerschiefer**, **Serpentin**,
Basalt, **Dolerit**, **Trachyt**, **Schlacken-Grus** u.s.w., den **Kalk**,
Mergel und **Muschel-Grus**. Ueberhaupt bildet jedes Gestein
 einen Grus, wenn es bey seiner Zerküchung in gröbliche Körner
 zerfällt.

2. Eigenschaft des Sandes.

Eodere Gemenge, deren Hauptmasse Quarzkörner aus-
 machen, die bald eckig, bald mehr oder weniger abgerundet sind,
 und sich in verschiedenem Verhältnisse mit Körnern und Blättchen
 verschiedener Mineralien und mit Grustheilen von Gesteinen ge-
 mengt zeigen.

1. Gestein. Quarzsand.

Ein Sand, welcher beynahe ganz allein aus Quarzkörnern
 besteht, die in der Regel eine weiße, graue oder gelbe Farbe
 besitzen. Die Beymengungen sind ganz unbedeutend. Zeigen die
 Quarzkörner dunklere, gelbe, rothe, braune Farben, so rührt dieß
 von anhängenden Eisentheilen; sind sie grün, so liegt der Grund
 davon gewöhnlich in einer Umhüllung von Gränerde. Die Größe
 der einzelnen Körner ist sehr verschieden, und wechselt von der-
 jenigen einer kleinen Erbse bis zur Größe eines Hirsekorns. Am
 häufigsten sieht man Sand von kleinem und feinem Korn, selten
 grobkörnigen. Der Quarzsand der Quellen, Bäche und Flüsse ent-
 hält in der Regel viel mehr fremde Beymengungen als der
 Quarzsand der Niederungen, der Ebenen und Steppen. Dieser
 zeigt sich nicht selten beynahe vollkommen frey von Beymengungen,
 während man in jenem jederzeit Glimmerblättchen und Körner
 von Magnet Eisen, und vielfältig überdieß Körner von Chrom-
 essen, Granat, Spinell und anderen Edelsteinen findet, und hin-
 und wieder Blättchen von Gold. Auch liegen in ihm nicht selten

Ueberreste von Pflanzen und Thieren. Die verschiedenen Anwendungen des Sandes sind bekannt.

2. Gestein. Eisen sand.

Besteht der Hauptmasse nach aus Körnern von Magnet-eisenstein, ist durch dunkelgraue und schwarze Farbe, so wie durch Schwere ausgezeichnet. Der Magnet zieht den größten Theil seiner Körner an. Mit den Eisenkörnern sind häufig Glimmerblättchen oder Körner von Augit, Hornblende, Feldspath, Olivin gemengt. Seltener erscheinen Körner oder kleine Crystalle von Quarz, Spinell, Korund, Melanit und einigen anderen Mineralien darinn.

Außer diesen Sandgattungen kann man noch einige andere unterscheiden, welche jedoch von keinem Belange sind.

4. Eigenschaft der Kohlen.

Kohlige, brennbare Massen, die in allgemeiner Verbreitung und in großen Massen vorkommen.

1. Gestein. Steinkohle.

Die Steinkohle tritt mit den Characteren und in den verschiedenen Abänderungen auf, welche S. 307 und 308 angeführt worden sind.

2. Gestein. Braunkohle.

Braunkohle in dicken Massen, mit den S. 308 und 309 angegebenen Characteren. Erscheint vorzüglich in den Abänderungen als gemeine, holzartige, erdige Braunkohle und als Moorkohle.

3. Gestein. Torf.

Kohlige Substanz, welche aus Pflanzenresten, Humus-säure, Humuskohle, Wachs harz in sehr verschiedenen Verhältnissen zusammengesetzt, und oft mit erdigen Theilen vermengt ist. Die Farbe ist braun oder schwarz, der Zusammenhang gering und das anderweltige Verhalten sehr verschieden nach seiner Zusammensetzung. Im feuchten Zustande röthet der Torf das Lakmuspapier, wegen seines Gehaltes an freyer Humus-säure. Im trockenen Zustande ist er brennbar, leicht entzündlich und zwar zum Theil leichter entzündlich als Holz. Man unterscheidet folgende Hauptabänderungen:

1. Rasentorf oder Moostorf. Besteht der Hauptmasse nach aus Pflanzenresten, die so wenig verändert sind, daß man sie noch gut als grasartige Gewächse oder Moose zu erkennen vermag. Die Farbe ist gelbbraun, die Consistenz locker, die Masse sehr elastisch.

2. Fasertorf. Besteht aus einem Gemenge von mehr oder weniger zersetzten Pflanzentheilen und den oben genannten Substanzen, die zu einer innig gemengten, schwarzbraunen, im feuchten Zustande schlüpferigen Masse vereinigt sind, welche die Pflanzenreste umhüllt.

3. Pechtorf. Besteht vorzüglich aus Humusäure, etwas Humuskohle, vielem Wachsharz und sehr wenigen Pflanzenresten. Schwarzbraun. Im feuchten Zustand eine schlüpferige Masse. Zieht sich beim Austrocknen stark zusammen, wird dabei sehr hart, und im trockenen Zustande mit dem Fingernagel gestrichen wachsglänzend.

Alle drei Abänderungen sind bald mehr, bald weniger mit erdigen, salzigen und metallischen Substanzen verunreinigt, die man in seiner Asche findet, und die Quarzsand, Kiesel Erde, Thonerde, Kalkerde, Gyps, Bittererde, phosphorsaure Kalk, Eisen- und Manganoxyd, Kochsalz sind. Bisweilen enthält der Torf auch Schwefelkies, Eisenvitriol, erdiges Eisenblau, Retinit. Torfe mit einem sehr großen Gehalt an erdigen Substanzen werden als eine weitere Abänderung mit dem Namen

4. Torferde, erdiger Torf belegt. Sie sind schwerer, zerreiblicher, weniger brennbar als die anderen Abänderungen, und ballen sich im feuchten Zustande.

Häufig findet man im Torfe Stücke von Bäumen, ganze Baumstämme, Thierreste, bisweilen selbst Menschenreste und Gegenstände eines ungebildeten Kunstfleißes.

Die Anwendung des Torfes als Brennmaterial ist bekannt, und seine Wichtigkeit in dieser Beziehung beachtet. In neuester Zeit hat man sich auch von der Anwendbarkeit des verkohlten Torfes, der Torfkohle, zu verschiedenen metallurgischen Arbeiten überzeugt.

5. Eigenschaften der Ackererde.

Unter Ackererde, Ackerboden, versteht man die lockere erdige Masse, welche der Standort der wildwachsenden, so wie der angebauten Pflanzen ist. Sie besteht aus einem Gemenge von mineralischen Substanzen, die im verschiedenen Grade zerkleinert und zersetzt sind, und von organischen Resten. Ihre Hauptmasse ist aus mineralischen Stoffen zusammengesetzt, die Sand, Gerölle, Geschiebe, Grus oder pulverförmige, erdige Theile sind. Der Sand ist in der Regel Quarzsand, selten besteht er aus Kalk-, Feldspath-, Glimmer-, Augit-, Magnetiseisen-Theilen. Die Gerölle und Geschiebe bestehen aus den verschiedenartigsten Gesteinen. Die erdigen Substanzen sind vorzugsweise Kiesel-erde, Thon-erde, kohlensaure Kalk- und Bitter-erde, Oxyde des Eisens und Mangans, Kalk-, Natron- und Ammoniaksalze, Humus-säure und humus-saure Salze, Humus-kohle, Wachsharz. Damit sind mehr oder weniger organische Reste gemengt, und ein Gehalt an Wasser und Luft verbunden.

Quantität und Qualität der Gemengtheile bedingen eine außerordentliche Mannichfaltigkeit der Ackererde. Ihre wichtigsten Abänderungen sind die folgenden:

1. Sandige Ackererde, Sandboden. Besteht, seiner Hauptmasse nach, aus Sand. Die davon abschlämmbaren Theile, Kalk-, Bitter-, Thon- und Kiesel-erde, Eisen- und Manganoxyd betragen höchstens 8 bis 10 Procent. Wird mit Wasser nicht plastisch, hat wenig oder gar keinen Zusammenhang, und hängt sich selbst im feuchten Zustande sehr wenig oder gar nicht an die Ackerinstrumente an. Besitzt im Allgemeinen eine lichte, graue, gelbliche oder graulich- und gelblichweiße Farbe. Nimmt wenig Wasser auf, bindet es schwach und verliert es schneller wieder als jeder andere Boden. Einmal stark ausgetrocknet, nimmt er Wasser nur sehr langsam wieder auf, und immer um so langsamer, je feinkörniger er ist. An den Sonnenstrahlen erhitzt er sich sehr stark, und nur sehr langsam läßt er die aufgenommene Wärme wieder fahren.

Man unterscheidet beym Sandboden ferner:

- a) Lehmgien, der 10—12 Procent abschlämmbare Lehmtheile enthält;

- b) mergeligen, dessen Sandbrüner mit Mergeltheilen vermengt sind;
- c) humosen, der durch Humusheile dunkel, grau, braun oder schwärzlich gefärbt ist.

2. Lehmige Ackererde, Lehm Boden. Enthält an abschlämmbaren Lehmtheilen 30—40 Procent; das Uebrige ist Sand. Der Lehm enthält selten über $\frac{1}{2}$ Procent Kalkerde, außerdem etwas Bittererde, Eisen- und Manganoxyd, Gyps, Kochsalz, Kali, phosphorsaure und humussaure Salze. Seine Farbe ist gelb, ins Rothe und Braune verlaufend. Man unterscheidet beim Befühlen die Sandbrüner. Er gibt beim Anhauchen Thongeruch, zieht begierig und schnell Wasser ein, im trockenen Zustande 40 bis 50 Procent. Wird, damit befeuchtet, etwas bildsam. Er hält das Wasser länger zurück, als der Sandboden. Beim Austrocknen wird er sehr locker. Durch Bearbeitung noch weiter aufgelockert, zeigt er ein starkes Anziehungsvermögen gegen Luft, die er alsdann in ziemlicher Menge verdichtet.

Man unterscheidet, nach der Art seiner Zusammensetzung, folgende Arten:

- a) Sandiger Lehm Boden. Enthält 70—80 Procent Sand. Sehr locker.
- b) Eisenschüssiger Lehm Boden. Ist durch einen stärkeren Eisengehalt dunkler, roth, gelb oder braun gefärbt.
- c) Mergeliger Lehm Boden. Enthält so viel mit Thon vermengte kohlensaure Kalk- und Bittererde, daß er, mit Säuren übergossen, an seiner ganzen Oberfläche aufbrauset. Saugt sehr begierig Wasser ein, hält es stark zurück; bleibt lange locker, wenn er bearbeitet ist.
- d) Kalkiger Lehm Boden. Enthält größere oder kleinere Stücke und Körner von kohlensaurem Kalle, und brauset, mit Säuren übergossen, nur an denjenigen Stellen länger auf, wo sich die Kalkstücke befinden. Zieht weniger Feuchtigkeit an, als die vorhergehende Art, läßt das Wasser auch schneller fahren, und trocknet somit in kürzerer Zeit aus.
- e) Humoser Lehm Boden. Besitzt 5—10 Procent Humus, wodurch er mehr oder weniger dunkel gefärbt ist.

Erhält sich stets locker, und zieht viel Feuchtigkeit aus der Luft an:

- f) Salziger Lehm Boden. Ist durch einen größeren Gehalt in Wasser löslicher Salze characterisirt, von welchen Kochsalz, kohlensaures Natron, Salpeter, salzsaure Kalk- und Bittererde am gewöhnlichsten vorkommen.

3. Thonige Ackererde. Thonboden. Die vorwaltende Masse ist Thon, das Uebrige vorzüglich Sand, der durch Schlämmen abgetrennt werden kann. Die Farbe ist sehr verschieden weiß, grau, gelb, roth, graugrün, braun und schwärzlich, grau, wobei vorzüglich Eisen, humose und kohlige bituminöse Theile von Einfluß sind. Nimmt 60—70 Procent Wasser auf, hält es sehr stark zurück, wird damit schlüpferig und bildsam. Schrumpft beim Austrocknen zusammen, -erlangt dabey starken Zusammenhang, wird hart, bekommt viele Risse und Sprünge. Gibt im trockenen Zustande beim Anhauchen einen sehr starken Thongeruch aus. Man unterscheidet folgende Arten von Thonboden.

- a) Feinkörniger oder gewöhnlicher Thonboden. Enthält 50—60 Procent abschlämmbaren Thon, das Uebrige ist sehr feiner Sand. Im Thon sind meistens 8—10 Procent Kalkerde, Bittererde, Kalk, Natron, Eisen- und Manganoxyd, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Chlor, Humusäure und stickstoffhaltige organische Reste enthalten.
- b) Sandiger Thonboden. Enthält neben der vorwaltenden Thonmasse so viel Sand in feinen und groben Körnern, daß man sie schon durch das Gefühl unterscheiden kann. Weniger zähe als der gewöhnliche Thonboden, und geht bey anwachsendem Sandgehalte in Lehm Boden über.
- c) Kalkiger Thonboden. Enthält 6—10 Procent in Stücken und Körnern eingemengten kohlensauren Kalk, den man durch Schlämmen und Sieben absetzen kann.
- d) Mergeliger Thonboden. Enthält einige Procente kohlensauren Kalk kuglig eingemengt, brauset daher mit Säuren selbst im geschlammten Zustand auf.
- e) Eisenschüssigen Thonboden. Ist durch einen größeren Gehalt von Eisen roth oder braun gefärbt.

f) Humoser Thonboden. Ein durch Humuskohle, Humusäure und humusfaure Salze dunkel gefärbter Thonboden. Schwärzlichbraun und schwarz. Enthält 9—10 Procent humose Theile.

g) Salziger Thonboden. Enthält viele im Wasser lösliche Salze. Der Boden der Salzsteppen.

4. Kalkige Ackererde. Kalkboden. Ein Boden, der bis 75 Procent kohlensauren Kalk enthält, welcher theils im erdigen Zustande, theils in kleinen Körnern vorhanden ist. Damit sind in der Regel auch einige Procente kohlensaure Bittererde verbunden, so wie etwas Eisen- und Manganoxyd, phosphorsaure Kalkerde, Gyps, Humus, geringe Mengen von Thonerde, Kochsalz und Kali. Das Uebrige ist Quarzsand. Seine Farbe ist im Allgemeinen licht, weißlichgrau oder licht aschgrau. Er brauset, mit Säuren übergossen, stark und lange auf, fühlt sich meistens rauh an, da er selten ein feines Korn hat, zieht wenig Wasser an, verliert das angezogene bald wieder, und hängt sich selbst im nassen Zustande wenig an die Ackergeräthe an. Wird beim Austrocknen locker, und hat im völlig trockenen Zustand eine sehr geringe Consistenz.

Man unterscheidet folgende Arten von Kalkboden:

- a) Sandiger Kalkboden. Es sind dem Kalkboden 15 bis 20 Procent Quarzkörner beigemengt.
- b) Lehmiger Kalkboden. Enthält einen Thon- und Sandgehalt von 30—40 Procent. Hält sich lange feucht und locker.
- c) Thoniger Kalkboden. Enthält 20—25 Procent durch Wasser abschlämmbare Thontheile.
- d) Humoser Kalkboden. Ein durch Vermischung von Humusäure und Humuskohle dunkel, braun oder schwarz gefärbter Kalkboden.

5. Mergelige Ackererde. Mergelboden. Besteht aus einem Gemenge von 10—20 Procent kohlensaure Kalkerde, 30—50 Procent Thon und 30—50 Procent Sand. Der Humusgehalt steigt nicht über 5 Procent. Gibt beim Anhauchen Thongeruch, brauset, mit Säuren übergossen, auf, und zeigt mannfaltige graue, gelbe, grünliche, rothe und braune Färbungen,

die durch Eisen- und Humustheile bewirkt werden. Zieht im trockenen Zustand viel Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an, hält sie lange zurück, bildet mit Wasser einen mehr oder weniger bildsamen Teig, zieht sich beim Austrocknen zusammen und wird fest, ist aber leicht zu zertheilen. Von allen Bodenarten der fruchtbarste. Enthält neben den obengenannten Substanzen immer kleine Mengen von Kali, Natron, Chlor, Schwefel, Phosphor, stickstoffhaltigen Substanzen, welche, wie wir wissen, einen wesentlichen Einfluß auf das Pflanzenwachsthum haben.

Man unterscheidet folgende Abänderungen:

- a) Sandiger Mergelboden. Enthält 60—70 Procent Sand.
- b) Lehmgiger Mergelboden. Ist durch eine größere Menge von Thon und Sand characterisirt, als dieser Boden im Durchschnitt enthält.
- c) Thoniger Mergelboden. Ein Mergelboden, welcher 50—60 Procent Thon, 15—20 Procent kohlensaure Kalkerde, 15—25 Procent Sand und 5—15 Procent Humus enthält. Zieht viel Feuchtigkeit aus der Luft an, beynahe so viel als der Thonboden, trocknet aber schneller wieder aus. Ballt sich im feuchten Zustande sehr stark, bildet große Schollen, zieht sich beim Austrocknen stark zusammen, wird sehr fest und bekommt viele Risse.
- d) Kalkiger Mergelboden. Ein Mergelboden mit eingemengten Körnern und Bruchstücken von Kalkstein.
- e) Talkiger Mergelboden. Enthält 8—10 Procent, und darüber, kohlensaure Talk- oder Bittererde.
- f) Humoser Mergelboden. Ein Mergelboden, der 10 bis 15 Procent Humus enthält. Der große Humusgehalt hält diesen Boden stets locker. Er ist zugleich reich an den übrigen Stoffen, welche zur Pflanzennahrung gehören, und bringt deshalb an manchen Orten, in Ungarn, Podoilien, Böhmen und Mähren seit einer Reihe von Jahren reiche Erndten hervor, ohne jemals gedüngt worden zu seyn.
- g) Salziger Mergelboden. Ein mit vielen Salzen vermengter Mergelboden.

6. Humose Ackererde. Humusboden. Ein Boden, dessen charakterisirenden Bestandtheil Humus ausmacht. Er enthält außerdem erdige Theile, einige Metakörper und Salze. Der Humus, wie er aus der Verwesung organischer Stoffe entstanden ist, enthält hauptsächlich Humusäure, Humuskohle, Wachscharz und noch unzersehte organische Reste, überdies Kiesel-erde, Thonerde, Kalkerde, Bittererde, Kali-, Natron- und Ammoniaksalze, Eisen und Mangan, Chlor, Phosphorsäure und Schwefelsäure.

Der Humusboden hat eine gelb- oder schwarzbraune oder schwarze Farbe, ist sehr locker, zieht Wasser stark und in großer Menge an, wie ein Schwamm. Die humusreichsten Arten binden über 100 Procent Wasser, ohne dabey tropfend naß zu werden. Hat er einen größeren Gehalt von freier Humusäure, so reagiert er sauer.

Man unterscheidet folgende Arten:

- a) **Milder Humusboden.** Sehr lockerer, im trockenen Zustande pulverförmiger Humusboden von gelbbrauner Farbe, die sich durch Befuchten des Bodens in eine schwarzbraune verwandelt. Reagiert im feuchten Zustande gar nicht oder nur schwach sauer, und enthält keine kenntlichen Pflanzenreste, dagegen viele humusfauren Salze, namentlich die Verbindungen der Humusäure mit Thon-, Kali- und Bittererde, Eisen- und Manganoxyd, Kali und Ammoniak. Der Gehalt an freier Humusäure ist gering. Weiter aber enthält der milde Humusboden Thontheile, etwas Quarzsand und die oben mehrfach genannten Substanzen, somit alle Körper, welche den Pflanzen als Nahrung dienen.
- b) **Kohligharziger Humusboden. Heideboden.** Schwarzlichgrauer oder schwarzer Humusboden, welcher Humusäure, einige humusfaure Salze, viel Humuskohle, etwas Quarzsand, wenig Eisen- und Manganoxyd, Spuren von Gyps und Kochsalz, und nebst dem viel Wachscharz enthält, oftmals 10—12 Procent. Auf seinen Hauptgehalt an Humuskohle und Wachscharz bezieht sich der erstere Name; der letztere auf sein Vorkommen

in Gegenden; wo das Heidekraut in Menge wächst. Er enthält gewöhnlich keine Kalkerde, nimmt wenig Feuchtigkeit auf; wird durch die Sonnenstrahlen stark erwärmt, und verliert das wenige aufgenommene Wasser viel schneller als der milde Humusboden. Sein Zusammenhang ist gering.

- e) Saurer Humusboden. Moorboden, Moosboden. Gelb- oder schwarzbrauner Humusboden, der viel freie Humusäure enthält, und deshalb immer sauer reagiert. Es fehlen ihm die erdigen Substanzen gewöhnlich beynahe ganz, dagegen enthält er immer, und öfters ziemlich viel, Eisenorydul und Manganorydul. Sowohl die übermäßige Nässe, in welcher sich dieser Boden beynahe fortwährend befindet, als der Gehalt an genannten metallischen Substanzen, ist dem Wachsthum der Kiebsgräser, Binsen, Moose u.s.w., kurz der Vegetation der sogenannten sauren Pflanzen sehr günstig, welche auch allenthalben in Menge auf dem Moorboden wachsen, während er den guten Futterkräutern und den Getreidearten so nachtheilig ist, daß sie gar nicht auf ihm vorkommen. Gutzieht man aber diesem Boden das Wasser, versetzt man ihn mit Kalk, Mergel, Sand, Holzasche, so wird er in eine sehr fruchtbare Bodenart umgewandelt.

Außer den hier beschriebenen allgemein vorkommenden Bodenarten, kann man noch einige andere, selten vorkommende Bodenarten unterscheiden, als: den Gypsboden, welcher aus der Verwitterung des Gypses, den Talkboden, welcher aus der Verwitterung des Dolomits entsteht, den Eisenboden, welcher aus der Zersetzung eisenreicher Gesteine hervorgeht, und 15—30 Procent Eisenoryd enthält; den Torfboden, der sich an der Oberfläche trockener Torfmoore aus den obersten Lagen des Torfs und den seit langer Zeit darauf vegetierenden Pflanzen bildet, endlich nennt man das Erdreich, welches durch Flüsse herbeigeführt, oder vom Meer an den Küsten abgesetzt wird, Marschboden.

Alle diese Bodenarten erleiden nun durch Vermengung von Geröll, Schlick, Gras, Bruchstücken und Körnern einzelner

Mineralien mannichfaltige Abänderungen, und es können sich durch Veränderungen in den quantitativen Verhältnissen ihrer Bestandtheile zahlreiche Uebergänge. Auch ist die feste Unterlage, worauf die Ackererde ruht, die man den Untergrund nennt, immer von sehr wichtigem Einfluß auf ihre Beschaffenheit. Ein und derselbe Boden verhält sich, namentlich gegen die Vegetation, sehr verschieden, je nach der abweichenden Beschaffenheit des Untergrundes.

Zweyte Abtheilung.

Orographie.

Die Gesteine setzen die größeren Gebirgsmassen zusammen, woraus die feste Oberfläche der Erde besteht. Diese Gebirgsmassen lehrt die Orographie oder Gebirgsmassenlehre nach allen ihren äußeren und inneren Verhältnissen kennen. Sie entwickelt ihre Form, Structur und Lagerung, macht uns mit den organischen Resten bekannt, die sie einschließen, und mit den Verhältnissen ihrer Bildung und Veränderung.

Von der Form der Gebirgsmassen.

Die Oberfläche der Erde zeigt eine unendliche Zahl von Unebenheiten. Erhöhungen und Vertiefungen wechseln unaufhörlich. Dem Begriff Erhöhung entspricht im gewöhnlichen Sprachgebrauch das Wort Berg; dem Begriff der Vertiefung das Wort Thal. Wir beurtheilen die Erhöhungen theils nach ihrer Höhe über der Meeresfläche oder nach ihrer absoluten Höhe, theils nach ihrer Höhe über irgend einem anderen Punkte des Landes oder nach ihrer relativen Höhe. In letzterer Beziehung unterscheiden wir vorzüglich Berge und Hügel.

Von den Bergen.

Berge sind durch Gebirgsmassen gebildete Erhöhungen, welche ihre Umgebungen um einige hundert Fuß überragen. Der höchste Theil eines Berges heißt allgemein Gipfel; wenn er abgerundet ist auch Kuppe, und wenn er spitzig zuläuft Spitze.

Den unteren Theil nennt man Fuß, und was zwischen diesem und dem Gipfel liegt die Seiten oder auch Abhänge. Der Gipfel eines Berges fällt in der Regel zuerst, und oft schon aus weiter Ferne, in die Augen. Seine Beschaffenheit ist immer von wesentlichem Einfluß auf den Character der Berge. Die Seiten oder Abhänge haben sehr verschiedene Neigungen. Beträgt die Neigung weniger als 10 Grad, so sagt man, daß sie sich verflachen, und heißt sie wohl auch Verflachungen. Der Name Abhang wird bis zu einem Winkel von 45 Grad gebraucht; darüber und bis zu 70 Grad heißt man die Seiten Abstürze, und bey noch größerem Neigungswinkel Wände.

Gewöhnlich ist die Neigung der Seiten gering, 10 bis höchstens 20 Grad, und man heißt den Abhang alsdann sanft. Schon selten beträgt die Neigung mehr, und erhebt sie sich bis zu 30 Grad. Sie ist dann schon beträchtlich, und der Abhang wird steil genannt. Bey 35 Grad Neigung läßt sich ein Abhang frey nur noch dann ersteigen, wenn er treppenartige Abstufungen hat, oder wenn man Stufen einhaut oder Steigeisen anwendet. Ueber 44 Grad kann man nur eigentlich kletternd ansteigen, und nicht ohne Gefahr. Spricht man von schwach geneigten Bergseiten, so nennt man ihre Neigungswinkel die Verflachung, und diese steht mit der Größe des Neigungswinkels immer in einem umgekehrten Verhältnisse.

Der Fuß der Berge hat in der Regel eine viel geringere Neigung als die Seiten. Dieß rührt vorzüglich davon her, daß die Stücke des Gesteins, welche sich von den oberen Theilen des Berges loslösen, gegen seinen Fuß herabrollen und sich an demselben anhäufen.

Die meisten Berge zeigen eine vorwaltende Ausdehnung in die Länge; der Gipfel solcher Berge wird Rücken genannt, und häufig nennt man einen in die Länge gezogenen Berg einen Bergücken.

Die Höhe der Berge ist außerordentlich verschieden. Damit man sie in dieser Beziehung leicht mit einander vergleichen kann, bestimmt und gibt man ihre absolute Höhe, ihre Erhebung über die Meeresfläche, an, auf welche überhaupt alle Höhen auf der Erdoberfläche zurückgeführt werden. Berge, welche sich bis

zu 6000 Fuß übers Meer erheben, sind schon beträchtlich hoch; schon selten steigen sie bis zu 10,000 Fuß an, und diejenigen, welche sich darüber erheben, gehören zu den höchsten der Erde. Die allerhöchsten übersteigen etwas die absolute Erhebung einer geographischen Meile. Aber selbst die Höhe des höchsten bekannten Berges der Erde, des riesigen Dhawalagiri im Himalaya-Gebirge, der bis zu 26,340 par. Fuß ansteigt, kommt nicht dem tausendsten Theil des Aequatorial-Durchmessers der Erde gleich.

Das Messen der Höhen geschieht theils mit geometrischen Instrumenten, theils mit dem Barometer. Mit letzterem lassen sich alle Höhen bestimmen, die zugänglich sind; die unzugänglichen können aber nicht anders, als geometrisch bestimmt werden. Dieß geschieht durch Messen von Verticalwinkeln, vermittelst eines Theodolits mit Verticalkreis, oder vermittelst eines dioptrischen oder reflectirenden Wiederholungskreises. Für den Geognosten, so wie für jeden Reisenden, hat die Höhenmessung durch das Barometer entschiedene Vorzüge, weil der dazu gehörige Apparat leicht ist, und überall hin mitgetragen werden kann, während die geometrischen Instrumente ungleich schwieriger zu transportieren sind. Die geometrische Methode gibt zwar genauere Resultate, allein die barometrischen Messungen sind, mit möglicher Genauigkeit ausgeführt, für die Zwecke des Geognosten, und überhaupt des Reisenden, immer so gewiß, daß bey Höhen von 3000 Fuß der Fehler nicht leicht über 10 Fuß, bey Höhen von 10,000 Fuß und darüber wohl nicht über 40 Fuß geht, somit eine Genauigkeit bis auf $\frac{1}{250}$ erhalten wird.

Der Nutzen, den barometrische Höhenmessungen geben, ist daher für den Naturhistoriker, den Forstmann, Deconomen u.s.w. immer sehr groß. Darum wird auch der 19. September des Jahres 1648 immerhin ein denkwürdiger Tag bleiben, an welchem *Perrier* zu Clermont, aufgefordert durch seinen Schwager *Pascal*, welcher vermuthete, daß das Barometer auf den Bergen niedriger stehen würde, als in den Thälern, mit dem Barometer den Puy de Dome bestieg, dabey das Quecksilber in demselben um 3 Zoll $1\frac{1}{2}$ Linien fallen sah, und so die erste barometrische Höhenmessung ausführte.

Von den Hügeln.

Die Hügel sind niedriger als die Berge, Erhöhungen, welche gewöhnlich nicht über 200 Fuß über ihre Grundfläche ansteigen. Ihre Formen sind mehr gerundet, ihre Dimensionen gleichförmiger. Der höchste Theil der Hügel wird Rücken oder auch Höhe genannt. Die Seiten sind meist flach geneigt, der Fuß stark verflacht.

Von der Verbindung der Berge.

Selten stehen Berge vereinzelt; sie sind gewöhnlich mit einander verbunden. Hängen sie nach der Längenausdehnung zusammen, so nennt man ihre Gesamtheit eine Bergkette. Eine solche Verbindung findet bald vorzüglich nach einer vorherrschenden Richtung, oder nach mehreren Richtungen Statt. Die Gesamtheit nach bestimmten Richtungen mit einander verbundener Berge nennt man ein Gebirge. Es hat immer eine mehr oder weniger scharfe Begränzung, und unterscheidet sich dadurch, und durch Anordnung seiner Theile nach bestimmten Richtungen, von einer Gesamtheit von Bergen, welche in der Form eines Haufens erscheint, und die man Berggruppe nennt, so wie von einer Anzahl mit einander in Berührung stehenden Bergen, die nach unbestimmten Richtungen an einander gereiht sind, und deren Gesamtheit man bergiges Land heißt.

Gebirge mit beträchtlicher Längenausdehnung nennt man Kettengebirge. Sie bestehen niemals aus einer einzigen Kette, sondern immer aus mehreren größeren und kleineren, die theils unter sich parallel laufen, Parallelketten sind, wobey eine als höchste und mächtigste, Haupt- oder Centalkette, erscheint, theils von dieser unter Winkel ablaufen, und alsdann Seitenketten, auch Gebirgsäste, genannt werden, weil sie, Nessen ähnlich, von einem gemeinschaftlichen Gebirgsstamm auslaufen. Von diesen Nessen gehen wieder kleinere Ketten ab, Nebenketten oder Gebirgszweige, und von diesen wieder andere kleinere, so daß das ganze Gebirge das Ansehen eines mehrfach verästelten und verzweigten Stammes hat.

Oft läuft eine einzelne Seitenkette über den allgemeinen Fuß des Gebirges hinaus, und erstreckt sich in die Ebene hinein. Man nennt sie alsdann Gebirgsarm. Lauft ein solcher hoch in das Meer hinaus, so bildet er ein Vorgebirge oder Cap. Bleibt zwischen auslaufenden Ästen ein mittlerer zurück, während die andern weiter vorspringen, so entsteht ein Gebirgsbusen. Fällt ihn das Meer aus, so nennt man ihn Meerbusen oder Golf, wenn der eingeschlossene Meerestheil im Vergleich zum ganzen Ozean von beträchtlichem Umfange ist; dagegen wird er Bay oder Bucht genannt, wenn sein Umfang klein ist. Die kleinsten Buchten sind die Häfen, welche den Schiffen Sicherheit gewähren.

Hat ein Gebirge eine ziemlich gleiche Ausdehnung in Länge und Breite, und besteht es aus einer Ansammlung von Bergen, die um einen höchsten, mehr oder weniger in der Mitte liegenden, Punkt geordnet sind, der als Gebirgsstock auftritt, so heißt man das Gebirge Massengebirge. Hier können keine Ketten unterschieden werden; es fehlen zusammenhängende Rücken, Einzelne Berge, mitunter in kurze Reihen geordnet, schließen sich bald dem Gebirgsstock an, bald einem andern, seitlichstehenden, größeren Berge der Gruppe, und in den Zwischenräumen liegen zerstreut wieder einzelne Berge umher (Harz).

Eine Gesamtheit kegelförmiger Berge, die nach bestimmten Richtungen an einander gereiht sind, sich aber gewöhnlich nur mit dem Fuße berühren, heißt man Regelgebirge (Regau).

Ein Gebirge, welches sich nicht über 3000 Fuß erhebt, wird ein niederes genannt; erhebt es sich bis zu einer absoluten Höhe von 4000 Fuß, so heißt man es Mittelgebirge. Hohe Gebirge nennt man solche, die sich über 4000 und bis zu 6000 Fuß erheben. Steigt ein Gebirge bis zu 6000 Fuß über die Meeresfläche an und darüber, so heißt es ein Hochgebirge. Darüber und bis zu den höchsten bekannten Höhen ansteigende Gebirge heißen Alpengebirge. Nimmt ein solches Gebirge, sowohl nach Länge als nach Breite, einen bedeutenden Flächenraum ein, so nennt man das damit bedeckte Land ein Alpenland.

Man unterscheidet, als wesentliche Theile eines Gebirges,

den Gebirgskamm, den Abfall und den Fuß des Gebirges. Der Gebirgskamm wird durch das Zusammenlaufen der beiden Seiten des Gebirgs gebildet, und stellt sich als eine Linie dar, welche wir uns über die höchsten Punkte des Gebirges gezogen denken. Man nennt ihn auch Gebirgsrücken. Schneiden sich aber die Seiten scharf in eine Kante, so erscheint er als Graht. Das ist aber selten der Fall. Gewöhnlich hat der Kamm einige Breite, manchmal eine beträchtliche, und hin und wieder besitzt er eine ungewöhnlich große Breite, so daß er wie eine Hochebene erscheint, wie es bey'm Längfeld-Gebirge in Norwegen und bey der Andeskette in Mexico der Fall ist. Diese Verhältnisse des Kamms treten nur deutlich bey'm Kettengebirge auf; bey'm Massengebirge und Regelgebirge findet man sie nicht.

Die beiden großen Seiten des Gebirges nennt man die Abfälle. Sie besitzen selten eine gleiche Neigung. Der allgemeine Abfall eines Gebirges, den eine Ebene angibt, die man sich vom Kamm rechtwinkelig, nach dem parallelen Fuß gelegt, denkt, ist immer sehr gering, und beträgt nur einige Grade. Allein der Abfall ist niemals vom Kamm bis zum Fuß des Gebirgs ununterbrochen gleichförmig, nie derselbe, er hat im Gegentheil viele Unterbrechungen, ist aus vielen einzelnen, steileren Abfällen zusammengesetzt, die häufig 8—12 Grad Neigung besitzen.

Gebirge, welche große Vertiefungen einschließen, haben in der Regel ihren steileren Abfall gegen dieselben. Das Erzgebirge, welches sich gegen Norden allmählich verflacht, fällt weit stärker und schneller süblich gegen das Becken von Böhmen ab. Der Schwarzwald und die Vogesen haben ihren steileren Abfall gegen das Rheinthäl u.s.w.

Der Fuß des Gebirges wird durch den untersten Theil der Abfälle gebildet, und hat in der Regel die stärkste Verflächung. Er ist selten ganz scharf begränzt, sondern verläuft meistens durch vorliegende, niedrigere Berge, welche man, in Beziehung zur Hauptmasse des Gebirges, Vorberge nennt, in die Ebene, ober steht, vermitteltst derselben, mit einem bergigen oder hügeligen Lande in Verbindung, oder mit einem andern Gebirge. So zieht sich am westlichen Fuße des Schwarzwaldes und am östlichen der Vogesen eine Reihe von Vorbergen hin.

Man unterscheidet weiter an den Gebirgen, und namentlich an den Hochgebirgen und Alpengebirgen, Gebirgsgipfel, Pässe, Plateaus, Pforten und Terrassen.

Gebirgsgipfel nennt man einzelne Erhebungen auf dem Kamm des Gebirges. Sie tragen, nach Maßgabe ihrer Häufigkeit, Form und nach ihrem Ansteigen über den Kamm, sehr viel zu den eigenthümlichen, äußeren Verhältnissen eines Gebirges bey. Es ist bekannt, daß der Kamm der Pyrenäen nicht nur eben so hoch, sondern selbst etwas höher ist, als der Kamm der Alpen, und doch gewährt ihr Anblick nicht das Eigenthümliche, Großartige, Ueberraschende einer alpinischen Aussicht, nicht die Ansicht von Reihen hochanstrebender Gipfel und ausgezackter Hörner.

Im Hochgebirge sind die Gebirgsgipfel häufig Pyramiden oder Obeliskten ähnlich, schroff und spitz, zerrissen und ausgezackt. Man heißt sie alsdann Hörner, Pils, Nadeln (*Aiguilles*). Im mittelhohen Gebirge sind schroffe, spitze Gebirgsgipfel selten, und im niederen Gebirge werden sie kaum angetroffen. Bey geringerer Gebirgshöhe sind die Formen durchaus mehr gerundet, die Gipfel kuppen- und glockenförmig, und werden Köpfe, Koppen, Stöcke, Belchen (*Ballons*) genannt, Namen, welche wir in den niedrigeren Theilen der Alpen, im Riesengebirge, im Schwarzwalde und in den Vogesen häufig antreffen.

Pässe sind Uebergänge aus einem Thal in das andere, da wo eine Einsenkung des Gebirgskamms, ein Ausschnitt oder ein Sattel liegt. Sie sind den Hochgebirgen vorzugsweise eigen, vermitteln die Verbindung zweyer durch eine Gebirgskette von einander getrennter Gegenden, und haben davon ihren Namen erhalten. Die Römer hießen sie *Juga montium*, was das deutsche Wort Joch wieder gibt; im Französischen heißen sie *Cols*. Oesters sehen die Einschnitte im Kamm tief herab unter die Berggipfel. Sie erstrecken sich bald eine halbe bis andert-halb Stunden in die Länge, wie der Paß am Simplon, am kleinen Bernhardsberg, am Mont Genis, bald sind sie nur einige Duzend Schritte lang, wie am Splügen und am Stilsfer-Joch. Ungeachtet der beträchtlichen Einsenkungen des Kamms an der Stelle der Pässe, liegen diese doch immer noch in einer

bedeutenden Höhe. Viele Alpenpässe liegen über 7000 Fuß über dem Meere. Die höchsten Alpengipfel, der Mont blanc mit 14,764 Fuß, und der Monte Rosa mit 14,222 Fuß, steigen bis zur doppelten Höhe an.

Die absolute Höhe der merkwürdigsten Pässe in den deutschen, schweizerischen und savoyischen Alpen ist, in franz. Fuß angegeben, folgende:

Simplon	6,174 Fuß,
St. Bernhardin	6,238 "
Brenner	6,360 "
Mont Genis	6,360 "
Gottthard	6,390 "
Eplügen	6,498 "
Grimsel	6,652 "
Kleiner Bernhard	6,750 "
Septimer	6,980 "
Gemmi	6,998 "
Ferret	7,146 "
Bernina	7,181 "
Albula	7,238 "
Gries	7,338 "
Furca	7,455 "
Julier	7,631 "
Großer Bernhard	7,668 "
Stilfser-Joch	8,610 "
Mont Cervin	10,500 Fuß.

In den Anden, wo die Gebirgsgipfel noch viel höher ansteigen, als in den Alpen, wo in der östlichen Kette der peruanischen Anden der Illimani sich bis zu 22,519 Fuß, und der Nevado von Corata bis zu 23,692 Fuß erhebt, liegen auch die Pässe in größerer Höhe. Der Paß von Altos de los Huesillos liegt 12,736 Fuß, und der von Altos de Toledo 12,736 Fuß über dem Meere. In der westlichen Kette erhebt sich der Paß von Apo, auf welchem ein Posthaus liegt, sogar zur Höhe von 16,550 Fuß.

Im Durchschnitt liegen in den Alpen und in den Anden die Pässe in der halben Höhe der höchsten Gebirgsgipfel. In

beiden Gebirgen befinden sich in der Höhe der Pässe noch einzelne Wohnungen; aber Gruppen derselben, Dörfer, erreichen jene Höhe nicht. Die höchsten in den Alpen sind die im Oberen Engadin in Graubünden, von welchen St. Morizio 5600 Fuß über dem Meere liegt; in Peru aber lebt ein Drittheil des Gebirgsvolkes in einer Höhe von 13,200 Fuß, und das Dorf Tacora ist daselbst 13,373 Fuß über der Meeresfläche erhaben, somit das höchste auf dem Erdboden.

Sind die Pässe eng und von steilen Felswänden eingeschlossen, so heißt man sie *Engpässe*. Sie sind alsdann leicht zu bewachende Pforten, natürliche Gränzscheiden benachbarter Völker. Sie scheiden auch zwischen den beiden Thälern, die sie mit einander verbinden, die Wasser, sind Wassertheiler, und daher auch der Name *Scheide* für den höchsten Theil derselben, wo sich die Wasser nach verschiedenen Meeren scheiden. So fließen vom Julierpaß die Wasser einerseits dem Rheine zu, und sofort in die Nordsee, andererseits zum Inn und in das schwarze Meer. Am Bernina fließen die Wasser einerseits dem Po zu und ins Adria-Meer, andererseits in den Inn und durch diesen zur Donau.

Schon diese Verhältnisse lassen uns die Gebirgspässe als höchst interessante Eigenthümlichkeiten des Hochgebirges erscheinen. Sie haben aber auch noch ein weiteres, hohes, historisches Interesse, als Uebergangspunkte bey den Wanderungen der Völker. Die Römer überstiegen, wenn sie ihre Legionen nach Deutschland entsendeten, die rhätischen Alpen vom Comer-See her, vermittelt des Septimer-Passes oder des Juliers. Hannibal stieg über den Paß des kleinen Bernhardsberges nach Italien hinab. Auf der Straße durch das Thal von Aosta führten die römischen Feldherren ihre Heere über den Paß des kleinen und großen Bernhardsberges, und Caecina, einer der Legaten des Vitellius, führte, nach Tacitus *), seine schwerbewaffneten Legionen noch im Winter über den letzteren Paß, über welchen Buonaparte, nach vielen Zerstörungen, erst im Sommer nach Italien vorzubringen wagte.

*) Histor. lib. 1. cap. 70. *Penino subsignanum militum itinere et grave legionum agmen, hibernis adhuc nivibus traduxit.*

Gruppen von Gebirgsgipfeln, aus welchen einer derselben sich mächtig über die anderen erhebt, nennt man Gebirgsknoten, auch Gebirgsschädel. Sie bilden sich da, wo einige Gebirgsketten zusammenstoßen. Der Montblanc stellt mit seinen nächsten Umgebungen einen solchen Gebirgsknoten dar. Das von Süden heraufziehende Alpengebirge stößt dort zusammen mit dem vom Gotthard her in westsüdwestlicher Richtung laufenden Theil des Alpengebirges.

Ebenen, welche auf der Höhe eines Gebirges liegen, heißen Hochebenen oder Plateaus. Terrassen nennt man die Abfälle, welche sich am Abfall eines Gebirges befinden.

Zwischen zwey oder mehreren Gebirgen liegende Plateaus von bedeutender Erstreckung, auf denen sich Hügelreihen, Berge oder kurze Bergzüge erheben, nennt man Hochländer. Haben ausgedehnte Plateaus dagegen wellenförmige Erhebungen und Vertiefungen, so nennt man sie Tafelländer. Asien schließt die höchsten und größten aller Hochländer ein, die Wüste Gobi, die Tartarey, Tibet und die große Bucharey.

Von der Verbindung der Hügel.

Die Hügel erscheinen weit häufiger isoliert, als die Berge. Wie durch niedere Höhe, öfteres isolirtes Auftreten, unterscheiden sie sich von den Bergen auch noch durch die Art ihrer Verbindung. Sie liegen nehmlich in der Regel gruppenweise beisammen, oder bilden kurze Reihen, selten ausgedehntere, oder in bestimmter Richtung weit fortziehende Ketten. Ihre Gruppen zeigen gewöhnlich eine ziemlich gleiche Ausdehnung in Länge und Breite. Einen mit Hügeln besetzten, ausgedehnteren Theil der Erdoberfläche nennt man ein Hügel land.

Ofters liegen Hügel am Fuße der Gebirge, und vermitteln gleichsam deren Uebergang in die Ebene. Die Vertiefungen zwischen den Hügeln sind klein und flach. Selten erhebt sich in einer Hügelgruppe ein einzelner Hügel so stark über die anderen, daß man auf seiner Höhe deren Gesamtheit überblicken kann.

Von den Höhenzügen.

Höhenzüge wollen wir die unbedeutenden, stark verflachten Erhebungen nennen, welche zwischen den Quellen der Bäche und


Flüsse hinziehen. Sie sondern häufig Flußgebiete von einander, und erscheinen als die allgemeinsten Wasserscheiden. Als eine wichtige Wasserscheide tritt der Höhenzug von Polen und Rußland auf, welcher sich zwischen der bothnischen Bucht und dem Eismeere hinzieht. Von dieser Art gibt es noch mehrere große Strecken der Erdoberfläche, über welche Höhenzüge hinziehen, die eine fortlaufende Wasserscheide bilden. Man sieht hieraus, wie irrig es ist, die Gebirge allein als Wasserscheiden zu betrachten, und demzufolge vorauszusetzen, daß, wo eine Wasserscheide vorhanden ist, auch ein Gebirge seyn müsse.

Von den Thälern.

Die Vertiefungen zwischen den Bergen und Hügeln nennt man Thäler. Ihre Beschaffenheit ist immer abhängig von den Verhältnissen der sie einschließenden Erhebungen. Ein Thal ist immer auf zwey Seiten von Bergen begrenzt, und dieser Name bleibt einer derartigen Vertiefung immer, wenn sie breit ist und sich weithin erstreckt. Ist sie aber schmal und kurz, so heißt sie eine Schlucht. Im bergigen Lande, zwischen einzelnen Bergen liegende Thäler nennt man Bergthäler; zwischen Rücken, Ketten u.s.w. im Gebirge liegende Thäler heißen Gebirgsthäler. Man nennt diese Längenthäler, wenn ihre Richtung mit der des Gebirges zusammenfällt, und Querthäler, wenn dieselbe die Hauptrichtung des Gebirges unter einem starken Winkel schneidet. Thäler ferner, welche zwischen einem Gebirge und dessen Vorbergen liegen, sich somit an der Außenseite des Gebirges befinden, nennt man Außenthäler, und solche endlich, welche zwischen zwey verschiedenen Gebirgen liegen, Zwischenthäler. Solcher Art ist das große Rheinthal zwischen Basel und Mainz, von dem Schwarzwalde, den Vogesen und den nördlich von diesen fortschenden Gebirgszügen eingeschlossen. Laufen zwischen zwey oder mehreren parallelen Ketten oder Bergzügen Thäler hin, so heißen sie Parallelthäler.

Ein Thal, welches ein Gebirge ganz oder einen großen Theil desselben durchzieht, wird ein Hauptthal genannt; kleinere Thäler, welche sich mit demselben verbinden, heißen Seiten-

thäler, und solche, welche sich wieder mit diesen vereinigen, Nebenthäler. Die Linie A B, nebenstehender Figur, soll ein Hauptthal vorstellen. Die damit sich verbindenden



Thäler ed und ef sind Seitenthäler, und gh ist ein Nebenthäl. Der Punct, wo ein Thal in ein anderes ausläuft, heißt seine Mündung; dsh sind also Thalmündungen. Die Seitenthäler münden gewöhnlich in der Richtung des

Hauptthals in dasselbe aus, und zwar in der Regel unter einem spitzen Winkel. Parallelthäler sind häufig durch Querthäler mit einander verbunden, welche ziemlich senkrecht gegen jene laufen, wie M N und i k der Figur zeigen. Dadurch werden Thalkreuze gebildet, an welchen sehr oft beckenförmige Erweiterungen liegen.

Der Anfang oder Ursprung eines Thales besteht in der Regel in einer engen, öfters spaltenförmigen Vertiefung. Selten ist die Vertiefung daselbst becken- oder kesselförmig, oder von drey Seiten von Felsen umschlossen, wie ein Circus oder ein Amphitheater, wo alsdann durch die vierte offene Seite das Thal nach abwärts fortsetzt. Von dieser Beschaffenheit ist der Ursprung mehrerer Thäler in den Pyrenäen, und namentlich des Thales von Baréges, den die Gebirgsbewohner Oulo de gavarrio nennen. Oulo bezeichnet in ihrer Sprache einen Topf oder Kessel. Der größte bekannte Circus liegt am Anfang des Thales von Anasco, am Fuße des Monte Rosa. Er ist beynahe zirkelrund, hat über 2 Meilen im Durchmesser, und ist von verticalen, reichlich 2000 Meter hohen, Felsenwänden eingeschlossen.

Der Boden der Thäler, welchen man Thalsole nennt, senkt sich von ihrem Ursprung bis zu ihrem Ende immer tiefer und tiefer herab. Auf diese Weise sind die Thäler im Allgemeinen auch die Ableitungscanäle des Wassers vom Weiland in das Meer, denn die auf ihrem Boden zusammenfließenden Wasser müssen nach der Neigung desselben abwärts laufen. Die Rinne, worinn das Wasser fließt, die tiefste Linie der Thalsole, heißt Thalsweg. Das Fallen der Thalsole ist niemals gleichförmig,

und bey Thälern im niedrigeren Gebirge und bey breiten Thälern gewöhnlich schwach. Bey Thälern im mittelhohen Gebirge ist es schon weit stärker, und oft absatzweise. Die stärkste Neigung hat in der Regel die Sohle der Querthäler, namentlich im Hochgebirge. Hier sind auch die Seiten, die Thalmwände, höher, steiler, rauh, mit Felsen versehen, durch herabfließende Wasser ausgefurcht, die sich oft über Abfälle stürzen und Wasserfälle bilden. Die Thalmwände laufen selten parallel, und nur bey sehr engen, spaltensförmigen Thälern. In der Regel nähern sie sich bald, bald entfernen sie sich von einander, und so entsteht eine Reihe von Verengungen und Erweiterungen, von Engen und Becken, die bey den mehrsten Thälern, vom Ursprunge an bis zu deren Ende, ununterbrochen auf einander folgen.

Die wässerigen Meteore, Regen, Nebel, Thau, Schnee, Eis liefern das Wasser, welches, wie alles Flüssige, das Streben zum Fall hat, in die Erde eindringt, der Tiefe zufließt und durch Ritzen und Klüfte des Gesteins niedergeht, bis ihm geschlossene, undurchbringliche Gesteinslager, Thon- oder Lettenschichten, darinn Schranken setzen. Seitenklüften folgend, oder durch Druck des nachfließenden Wassers in die Höhe gehoben, tritt es nun als Quelle an den Tag. Hier nun beginnt abermals die Fallthätigkeit des Wassers. Es fließt entweder frey ab, oder sammelt sich in einem Becken, das bald moorig oder sumpfig, bald von reinem, stehendem Wasser erfüllt, ein See ist, und fließt erst aus diesem weiter. So geht das Wasser jedes Thales aus einer freyablaufenden Quelle hervor, oder es fließt aus einem Moor oder Sumpf heraus, oder es ist endlich der Abfluß eines Sees. Mehrere zusammentretende Quellen bilden nun einen Bach, mehrere sich vereinigende Bäche einen Fluß. Verbinden sich Flüsse, und fließen alle diese verbundenen Gewässer direct ins Meer ab, so nennen wir sie einen Strom. Der Weg, welchen die Wasser von der Quelle an bis dahin durchlaufen, wo der Strom das Meer erreicht, heißt Stromlauf, der ganze Landstrich, der seine Gewässer einem Strom zusendet, Stromgebiet, die Gegend, welche dieselben einem Flusse zuschickt, Flußgebiet, und derjenige Landstrich, aus welchem die Gewässer zu einem Flusse zusammenfließen, und wo deren Quellen liegen, Quellenbezirk.

Der Wasserlauf läßt sich im Allgemeinen in den Ober-, Mittel- und Unterlauf unterscheiden, da jeder dieser seine besonderen Verhältnisse zeigt.

Der Oberlauf ist durch das Maximum des Gefälles characterisirt, da die Neigung der Thalsohle hier sehr stark ist, ja häufig Abfälle bildet. Die Wasser fließen hier daher außerordentlich schnell ab, stürzen sich, im eigentlichen Sinn des Wortes, in Hochgebirgsthälern brausend über die Felsen und Blöcke, und bilden häufig Wasserfälle, die, bey kleiner Wassermasse, meistens durch hohen Fall ausgezeichnet sind. Der wilde, oft tobende Lauf dieser Gewässer hat zu den Benennungen Gießbäche, Wildbäche u.s.w. Veranlassung gegeben.

Der Mittellauf ist durch ein schwächeres Gefälle, ein breiteres Bett und durch viele Krümmungen characterisirt. Der Thalweg wechselt häufig von einer Seite zur andern. Inseln liegen zerstreut zwischen den Krümmungen, Thalengen schnüren die Wassermasse ein und veranlassen Stromschnellen, das heißt eine stellenweise größere und wachsende Geschwindigkeit, und einzelne Abfälle bewirken, obwohl viel seltener als beym Oberlauf, Wasserfälle, die nun durch ihre große Masse imponieren, wie der Fall des Niagara. Größere und kleinere Parthien des Bettes sind oftmals feicht, und bilden Untiefen.

Der Unterlauf zeigt das Minimum des Gefälles, die Wassermasse ist breiter, und nimmt, zur Zeit der Anschwellungen, an Breite zu. Zu dieser Zeit ist jeder Strom mit Schlamm beladen. Wo er das Meer erreicht, an seiner Mündung, hemmt der Widerstand des Meerwassers, namentlich zur Zeit der Fluth oder bey Stürmen gegen die Küste, den freyen Ausfluß. Die Geschwindigkeit des Wassers erlischt hier mehr oder weniger, und nun setzen sich die aufgeschlemmten Massen ab, erhöhen das Bett, wachsen zu Riegeln und Barren an, die sich endlich über den Spiegel des Wassers erheben und den Strom theilen. Laufen nun die beiden Arme getrennt, in Gabeltheilung in das Meer, so hat der dazwischen liegende Landtheil die Gestalt eines Dreiecks, oder eines griechischen D (Δ , Delta), und wegen der Aehnlichkeit des zwischen den Mündungen liegenden Landtheils mit jenem Buchstaben, nannten ihn die Griechen auch Delta, ein Namen,

der später allgemein zur Bezeichnung von Landstrichen beibehalten worden ist, welche zwischen getheilten Strommündungen liegen.

Die beckenförmigen Erweiterungen vieler Thäler sind zum Theil mit stehendem Wasser angefüllt, und stellen Seen dar. Meist liegen diese in ansehnlichen Höhen, treten bisweilen am Anfang der Thäler auf, wo dieser durch eine Streusubstanzbildung charakterisirt ist, wie z. B. der *Feldsee* am *Feldberg* im *Schwarzwalde*, der 3400 Fuß über dem Meere liegt. Oesters liegen sie auch auf der Höhe der Pässe, wie die Seen auf dem *Bernina*, oder auf Abhängen enger, stark abgestufter Thäler im Hochgebirge, wie der *Fehler*-, *Emteffer*- und *Seealp*-See in den *Appenzeller Alpen*. Diese Seen, wahre Gebirgsseen, sind nicht selten von mächtig hohen Felswänden umgeben, gewöhnlich klein und mit dem Wasser der Quellen oder der Gletscher erfüllt. In den größeren Thälern erreichen sie oftmals eine ansehnliche Ausdehnung, zumal der Länge nach. Bäche und Flüsse führen die Wasser dem Becken zu, dessen Uebermaaß mit der Stärke eines Flusses abläuft. So liegen im *Jura* der *Neuchâtel*- und der *Biener-See*; am Ausgange von *Alpen* Thälern der *Genfersee*, der *Bodensee*, der *Lago Maggiore*, *Lago di Como*, *Lago di Garda* u. s. f., im *Arth*al der *Brienzer*- und der *Thuner-See*, im *Reuß*thal der *Luzerner-See* u. s. w.

Das höchste und größte Seebecken auf der Erde ist das in einem hohen Längenthale der *Peruanischen Andes* gelegene Becken des Sees von *Titicaca*. Es liegt zwischen 14 und 17° südlicher Breite, und nimmt den nördlichen Theil des 11,800 Par. Fuß über dem Meere liegenden Hochgebirgsthales ein, zwischen den beiden dortigen parallelen Cordilleras. Den südlichen Theil dieses Thales durchfließt der *Desaguadero*. Dieses Seebecken besitzt einen Flächenraum von 3500 Quadratlieus, ist somit dreimal größer als die *Schweiz*, und von allen Seiten vollkommen geschlossen. Der See selbst bedeckt eine Fläche von 448 Quadratlieus, und ist somit zwanzigmal größer als der *Genfersee*. Seine Wasser finden nur in der Verdunstung einen Abfluß. Hier, an den Ufern dieses Sees, und auf seinen Inseln, hat das Reich der *Inkas* seinen Anfang genommen.

Sehr oft sind mehrere Seen mit einander verbunden, durch Bäche oder Flüsse, die von einem zum andern fließen. Auf diese Weise ist der Neuschateller-See durch die Thielle mit dem See von Bienne verbunden, der obere Bodensee durch den Rhein mit dem Untersee, der Thunersee durch die Aar mit dem Brienzensee, und auf eine ähnliche Weise sind in Nordamerika, die canadischen Seen, mit einander verbunden, der Wälder-, der Winnipeg-, der Athapascow- und der Sklaven-See, deren Wasser-Abfluß sowohl gegen Osten geht, durch den Albany und Sewernfluß, als gegen Norden zum arktischen Polarmeer, vermittelt des Mackenzie-Stroms und des Kupferminen-Flusses. Ebenso bilden die Seen, welche südlich von der Hudsonsbay liegen, eine zusammenhängende Seekette, die man die Lorenzo-Seenkette heißt. Fünf Seen, der Ober-See, der Huron, der Michigan, der Erie und der Ontario, sind durch kurze Flußläufe mit einander verbunden, und der Abfluß derselben bildet den St. Lorenzo-Strom.

Von den Ebenen.

Zeigen Theile der Erdoberfläche keine Unebenheiten oder nur unbedeutende, so heißt man sie Ebenen. Liegen sie nur wenig über dem Meerespiegel, so nennt man sie Niederungen, auch Tiefebene, zum Unterschiede von Ebenen welche hoch über der Meeresfläche liegen, und die man Hochebenen nennt. Zu den Tiefebene gehören die norddeutschen Ebenen, so wie die Ebenen Ungarns, die lombardische Ebene, und in America die Ebenen am Amazonasfluß und am unteren Orinoko. Liegt eine Tiefebene in der Nähe des Meeres, und tiefer als dessen Wasserspiegel, so heißt man sie negative Niederung. Befindet sich eine solche Tiefebene im Innern eines Landes, von Bergen oder Gebirgen umgeben, so nennt man sie Erdsenkung oder Versenkung. Einzig in dieser Art, und höchst interessant, ist die Erdsenkung im Westen Asiens, welche Hr. v. Humboldt beschrieben hat. Dort liegt ein Land von mehr als 10,000 geographischen Quadratmeilen Flächeninhalt, zwischen der Kuma, dem Don, der Wolga, dem Jais, der Obtschei Syrt, dem Kaspi-See und bis zum unteren Lauf des Euphrat (Tigris) und

des Amu (Orus der Alten), welches als eine merkwürdige Senkung eines bedeutenden Theils des asiatischen Festlandes erscheint. Die Oberfläche des caspischen Meeres und des Aralsees, welche 32—50 Toisen unter dem Spiegel der oceanischen Wasser liegen, bilden den tiefsten Theil derselben. Nur wenige einzelne Massen ragen beträchtlicher hervor und tragen dazu bey, die Gestaltung dieser wunderbaren Senkung des Bodens recht auffallend zu machen.

Gewöhnlich besteht die Oberfläche der Ebenen aus losen Massen, aus Schutt, Grus, Geröllen oder Sand, unter welchen die feste Gesteinsmasse sich da und dort hervorhebt. Die Wasser durchziehen langsam und in vielen Krümmungen diese einförmigen Landstriche. Sind sie vorzugsweise mit Haidekraut bedeckt, so nennt man sie *Haiden*. Solcher Art sind die Ebenen, welche sich von Fähtland aus durch Lüneburg und Westphalen bis nach Holland erstrecken, und wovon ein Theil unter dem Namen der Lüneburger Haide sehr bekannt ist.

Sind die Ebenen dagegen mit Gräsern bedeckt, oder mit kleinen dicotyledonischen Gewächsen, so nennt man sie *Steppen*. Dieser Art sind die ausgedehnten ungarischen Ebenen, die Ebenen der Songarey und das Land zwischen dem Don und der Wolga. Die größten Steppen sind die *Planos* (spanisch) Südamericas, die ungeheuren Ebenen von Caracas, Venezuela u.s.w. Das Gefälle der Wasser ist hier so außerordentlich klein, daß starke Winde und Meeresandrang öfters das Zurückfließen derselben gegen die Quellen bewirken.

Sind die Ebenen ganz ohne Vegetation, von nacktem, unfruchtbarem Sande bedeckt, so heißt man sie *Wüsten*. Ausgedehnte Wüsten gleichen Sandmeeren. Vom Winde gewellt liegt hier oft der lose Sand in Wogen und Hügeln viele Meilen weit fort. Darr und Ide zieht sich unabsehbar die stille, todte Sandfläche hin. Sparsam, weit aus einander, liegen da und dort Wasserstellen, grüne Oasen, die Inseln des Sandmeers.

Structur der Gebirgsmassen.

Jede größere Gesteinsmasse zeigt sich aus einzelnen kleineren Stücken zusammengesetzt. Man sieht Spalten, oft nach gewissen

Richtungen, die Masse durchziehen, und sich schneiden unter bis-
 weilen ziemlich constanten Winkeln. Die zwischenliegenden Stücke
 erscheinen im Allgemeinen parallelepipedisch, haben gewöhnlich
 eine dem Würfel oder Rhomboëder mehr und weniger genäherte
 Gestalt, und sind auch häufig tafelförmig. Gebirgsmassen von
 Grafit, Sandstein, Kalkstein, Thonschiefer zeigen diese Structur-
 verhältnisse häufig auf eine ausgezeichnete Weise, wie aus Fig. 1,
 Taf. I., zu ersehen ist, welche die gewöhnliche Structur des Granits
 darstellt. Gebirgsmassen, welche aus Basalt, Dolerit, überhaupt aus
 Gesteinen bestehen, welche unter Feuerwirkung gebildet worden
 sind, besitzen oft eine säulenförmige Structur. Die Säulen be-
 stehen theils der ganzen Länge nach aus einem Stücke, theils
 sind sie durch Querspalten in kleinere Stücke abgetheilt, geglie-
 dert, wie Fig. 2. Nicht selten sind gerade dieselben Gebirgs-
 massen, welche oft aus prismatischen Stücken zusammengesetzt
 scheinen, aus kugelförmigen Stücken zusammengefügt, so manche ba-
 saltische, doleritische, dioritische Gebirgsmassen, ja mitunter selbst
 der Granit, wie z. B. am Kynast in Schlesien. Die Bildung
 von Prismen und Kugeln nehmen wir bey vielen Substanzen
 wahr, die aus dem feurigflüssigen Zustand, unter gewissen Ver-
 hältnissen, in den festen Zustand übergegangen sind, und nach der
 Analogie dürfen wir daher schließen, daß die oben genannten
 Gesteine, welche prismatische und kugelförmige Structur besitzen,
 einmal in einem geschmolzenen Zustand gewesen sind, und bey
 der Abkühlung diese Structurverhältnisse angenommen haben.
 Auch die Structur vieler crySTALLINISCHER Gebirgsmassen kann
 auf eine ähnliche Weise entstanden seyn. Die Schieferige des
 Schiefers, Glimmerschiefers u.s.w. ist eine Folge der Crystalli-
 sation, welche bey der Masse, woraus diese bestehen, stattge-
 funden hat.

Bey den Gebirgsmassen, welche sich aus dem Wasser abge-
 setzt, oder unter Wassereinfluß gebildet und nach und nach erhärtet
 haben, wie bey Kalksteinen, Sandsteinen, Conglomeraten, ist die
 Structur eine Folge der Zusammenziehung ihrer Masse, bey dem
 Uebergang aus dem flüssigen oder halbflüssigen Zustand in den
 festen, mitunter wohl auch eine Folge einer mechanischen Er-
 schütterung oder eines Stoßes, wodurch mehr oder weniger regel-

mäßige Risse und Sprünge in der Masse hervorgebracht worden sind.

Spalten, welche die Gebirgsmassen in unbestimmten Richtungen durchsetzen, dieselbe in unregelmäßige Stücke zertheilen, und selbst innerhalb der Theile erscheinen, welche durch regelmäßige Structur gebildet sind, heißt man Klüfte. Das Zertheiltseyn einer Gebirgsmasse durch derartige unregelmäßige Spalten nennt man Zerklüftung.

Schichtung.

Sind die Gebirgsmassen durch parallele Spalten, welche weit aushalten, sich regelmäßig wiederholen und die ganze Masse gleichförmig durchsetzen, in plattensförmige Lager abgetheilt, so nennt man sie geschichtet. Die plattensförmigen Lagen selbst nennt man Schichten. Sie sind vollkommen von einander abgelöst. Die Flächen, womit sie bey der Aufeinanderlage sich berühren, sind mehr oder weniger eben, oder es verschwinden doch, im Vergleich zu ihrem gleichmäßigen, meilenweiten Fortsetzen, in einerley Ebene, die kleinen Unebenheiten derselben.

Dieses Verhältniß der Schichtung ist eines der interessantesten im Gebiet der Geognose, und folgenreich, wie kaum ein anderes. Es belehrt uns, wie die einzelnen Lagen sich nach einander, und allmählich aus dem Gewässer abgesetzt haben, gibt uns einen durchgreifenden Unterschied zwischen solchen Bildungen und denjenigen zu erkennen, welche, ohne alle Schichtung, nur Structurverhältnisse wahrnehmen lassen, keine regelmäßige Aufeinanderfolge zeigen, und unter andern Umständen gebildet worden sind. Die Schichtung steht ferner in naher Beziehung zur Richtung der Gebirge und zur Beschaffenheit der Thäler.

Man unterscheidet bey ihr zunächst das Fallen und das Streichen der Schichten. Unter Fallen versteht man die Neigung einer Schicht gegen den Horizont. Den Winkel, den sie damit macht, nennt man den Neigungswinkel. Unter Streichen versteht man ihre Richtung in Bezug auf den Meridian des Ortes. Eine Linie rechtwinkelig auf das Fallen gezogen, ist die Streichungslinie.

Man kann sich von diesem Verhältniß keine bessere und einfachere Vorstellung machen, als wenn man sich einige Bücher *a* in schiefer Lage auf einem Tisch liegend, und, etwa durch ein anderes dickes Buch *b*, gestützt denkt. Wenn nun der Tisch, wie Fig. 4, eine horizontale Fläche bildet, und die Bücher Schichten einer Gebirgsmasse vorstellen, dann ist der Winkel, den dieselben mit der Tischplatte machen, ihr Fallen, dessen Größe durch den Winkel bestimmt ist, den sie mit dem Tische machen. Das größere, zur Stütze dienende Buch *b* liegt horizontal, oder, wie der Bergmann sagt, schieflig, und hat somit gar kein Fallen. Die ganz aufrecht, mit nach oben gekehrtem Rücken stehenden Bücher haben das Maximum der Neigung, und geben das Bild einer senkrechten oder verticalen Schichtenstellung, welche der Bergmann auch eine seigere nennt. Die Streichungslinie ist durch den Rücken der Bücher bezeichnet. Diese haben nun entweder eine Richtung von Süd nach Nord, oder irgend eine andere dazwischenliegende.

In der geognostischen und bergmännischen Sprache werden zur Bezeichnung der angeführten Verhältnisse und einiger anderer, noch besondere Benennungen gebraucht. So heißt man senkrechte Schichten auch „auf dem Kopf stehende;“ nennt man das Fallen auch Einschießen; die Dicke oder Stärke der Schichten Mächtigkeit, und heißt man ferner Schichten, die über einen Fuß stark sind, Bänke. Die an der Oberfläche der Gebirgsmassen hervortretenden Schichten nennt man das Ausgehende, und die einzelnen, hervorragenden, Treppentufen vergleichbaren Theile der Schichten, welche in der Richtung des Einsinkens über einander liegen, Schichtenköpfe.

Die Bestimmung des Streichens und Fallens der Schichten geschieht mittelst eines kleinen Compasses, der mit einem Gradbogen und Senkel versehen ist. Diese Bestimmungen müssen immer mit Sorgfalt und Umsicht gemacht werden, da die zu untersuchenden Schichten gar oft nicht auf eine solche Weise entblößt sind, daß man sie leicht überblicken kann. Man findet sie nicht selten nur in Linien angedeutet, oder mit Thon, Lehm, Kalkfäuter u.s.w. überkleidet. Ihr ununterbrochenes Fortsetzen auf große Erstreckung, ihr Parallelismus, der sich bey allen

Biegungen gleich bleibt, zeichnet sie immer aus. Mitunter besitzt aber eine geschichtete Gebirgsmasse eine so ausgezeichnete Structur, daß, wenn die dabey vorhandenen Hauptspaltungsrichtungen nicht parallel laufen mit den Schichtungsebenen, die Bestimmung des wahren Streichens und Fallens der Schichten leicht unrichtig gemacht wird. Dieß kann namentlich bey'm Thonschiefer geschehen, der öfters eine ausgezeichnete Structur besitzt, deren Hauptspaltungsrichtung mit der Schichtungsebene einen mehr oder weniger großen, manchmal einen beynahe rechten Winkel macht. In solchem Falle thut man am besten, nachzuforschen, ob nicht irgendwo eine fremdartige Zwischenschicht, eine Lage von Thon, Letten, Kalk u.s.w. vorkommt, welche die wahre Richtung der Schichten angeben kann. Auch geben in den Schichten eingeschlossene Versteinerungen, Bruchstücke, Geschiebe ein gutes Anhalten, da sie immer so vertheilt in den Schichten liegen, daß die Richtung ihrer Verbreitung mit der Schichtungsebene zusammenfällt.

Wir haben oben schon im Allgemeinen die Wichtigkeit des Schichtungsverhältnisses ausgesprochen, und wollen nun an diesem Orte einige besondere Beziehungen desselben herausheben.

Es ist eine vielfach bestätigte, alte Regel, daß die Streichungslinie der Schichten fast immer mit der vorwaltenden Längenausdehnung der Gebirgsmassen zusammenfällt. Diese Gesetzmäßigkeit bemerkt man im Hügel- und im bergigen Lande, wie in den Gebirgen. Gleichförmig in einerley Richtung fortziehende Berg- und Gebirgsmassen zeigen gewöhnlich auch eine gleichförmige Schichtenstellung, wobey das Streichen der Schichten so lange das gleiche bleibt, als die Massen selbst die Richtung nicht ändern. Laufen Ketten parallel, so hat man auch die Erscheinung parallellaufender Streichungslinien. Der Scharfsinn Leopold v. Buchs hat darinn die Richtung mächtiger Spalten erkannt, welche in der Erdruste aufgerissen wurden, und durch welche ungeschichtete Gebirgsmassen aus dem Erdinnern herauf an die Oberfläche gestiegen sind. Die aufgerichteten und manchfach gewundenen Schichten deuten auch klar die mächtigen Einwirkungen an, denen sie ausgesetzt waren, und die bey Verstörungen und Spaltenbildungen vorkommen mußten.

Von großem Interesse ist ferner das Verhalten der Schichten in den Thälern. Enge, schluchtartige Thäler haben oft vollkommen das Ansehen von Spalten, sie können daher durch Aufreißen der Gebirgsmasse entstanden seyn, aber möglicher Weise auch durch Auswaschung. Die genaue Untersuchung und Würdigung der Schichtungsverhältnisse führt nun zunächst zur richtigen Ermittlung der Entstehung solcher Thäler, von welchen Fig. 4 A und B, Taf. I., eine Ansicht gibt. Sind die Wände des Thales A durch dieselben Schichten gebildet, die einander gerade gegenüber liegen und mit einander correspondieren, und zieht unter der Wasserrinne bey a eine nicht zerbrochene Gesteinsschicht durch, so ist es als ziemlich bewiesen anzusehen, daß das Thal nicht die Folge einer Spaltung der Gebirgsmasse, sondern die Folge einer Auswaschung und Aushöhlung durch strömendes Wasser und Rollsteine oder Felsblöcke ist, welche, durch die Gewalt des Wassers bewegt, Ausreibungen und Ausschleifungen der Felsen bewirken. Sieht man aber unter dem Bett des Baches oder Flusses keine geschlossene ganze Schicht, sondern eine Lage von Grus, Sand oder Geröllen, so kann man nicht wohl bestimmen, wie das Thal entstanden ist, da möglicher Weise die Schuttmassen, geborstene Schichten oder den tiefer niedergehenden Theil einer Spalte bedecken können, wie in B, obiger Figur. Sind aber gespaltene Schichten unter der Wasserrinne zu beobachten, oder das Niedergehen einer Kluft, so hat man Ursache anzunehmen, daß das Thal in Folge einer Verftung der Gebirgsmasse entstanden ist, wobey eine Spalte gebildet wurde.

Bemerkt man in einem engen, spaltenförmigen Thal, daß die Gesteinsschichten der Thalwände nicht mit einander correspondieren, daß die gleichartigen Schichten bey ihrer Verlängerung nicht auf einander treffen und in verschiedener Höhe liegen, wie bey Fig. 5, Taf. I., so zeigt dieß deutlich eine Verschiebung der durch eine Spalte zertheilten Masse an, und man hat ein solches Thal als ein entschiedenes Spaltenthal zu betrachten, auf welches auch noch die Wasser eingewirkt haben können, so daß seine jetzige Beschaffenheit als die Folge einer zusammengekehrten Wirkung erscheint, nämlich zunächst als Folge einer entstandenen

Spalte, und dann als Folge der Auswaschung durch ein die Spalte durchfließendes Wasser.

Ofters sieht man in Thälern von ringförmiger Gestalt, die man passend Ringthäler nennt, die Schichten, welche deren Wände zusammensetzen, in allen Richtungen, nach außen und abwärts geneigt, so daß die Schichtenköpfe einen steilen Abfall gegen den Thalgrund bilden, welcher der Neigung der Schichten gerade entgegengesetzt ist. In solchen Thälern sieht man nun offenbar, daß die Schichten sich hier nicht mehr in ihrer ursprünglichen Lage befinden, und daß diese Thalbildung nicht eine Folge der Auswaschung durch strömende Gewässer ist. Die Schichten sind hier offenbar in einem Puncte in die Höhe gehoben, dabey in den obersten Theilen aus einander gerissen oder zersprengt worden, und die Köpfe derselben bilden nun einen kreisförmigen Wall um die Kesselvertiefung. Aus dem fast ganz geschlossenen Thalgrund führt durch einen Einschnitt ein Bach oder ein Flüsschen die Wasser ab. Solche Thäler nennt man, mit Berücksichtigung der eigenthümlichen Stellung ihrer Schichten, Erhebungsthäler.

Ein schöneres und großartigeres Beyspiel eines solchen kreisförmigen Erhebungsthales, als dasjenige, welches das Thal von Pyrmont darbietet, ist bis jezt nicht bekannt. Fr. Hoffmann hat davon eine vortreffliche, hier benutzte, Beschreibung und die auf Taf. I. durch Fig. 6 gegebene Profilzeichnung mitgetheilt, welche die Eigenthümlichkeit des merkwürdigen Schichtungsverhältnisses besser als alle Worte erläutert. Die oberste, horizontalgestrichelte Gebirgslage ist Keuper. Darunter folgt der von der Linken zur Rechten wellenförmig linirte Muschelkalk, und hierauf Sandstein durch eine von der Rechten zur Linken schräg abwärts laufende Linierung angezeigt. Die Punctierung deutet Gyps an, und die senkrechten Striche die Entwicklung der Kohlensäure. Die obersten Ränder der Muschelkalkberge, welche die höchste Einfassung des Kessels bilden, liegen an den gegenüberstehenden Thalwänden bis auf eine halbe Meile weit aus einander, und erheben sich fast auf allen Seiten gleichförmig über die Thalsohle um 900 bis 1000 Fuß. Auf der Außenseite liegen die Keupermassen, die in einzelnen Bergen noch zu größerer

Höhe ansteigen, und eine zweyte ringförmige Einfassung bilden. Im Thalgrund liegt unter dem Muschelkalk der bunte Sandstein, der sich noch bis zu 400 Fuß über denselben an der Thalwand hinaufzieht. Seine obersten Gränzen gegen den aufliegenden Muschelkalk liegen an den gegenüberstehenden Abhängen nicht in gleicher Höhe. Wir sehen sie an der nördlichen und östlichen Seite um ein Beträchtliches höher hinauf gehen, als an der südlichen und westlichen, dort also weiter hinaufgehoben, und deshalb auch das Einfallen der über ihm liegenden Schichten nach Außen dort steiler. Wichtig ist ferner das Auftreten einer Gypsmaße auf dem Thalboden, an der Emmerbrücke bey der Saline, und von dem größten Interesse das ebenfalls im Thalgrunde stattfindende Ausströmen von Kohlensäurem Gas, welches in der berühmten Dunsöhle so bedeutend ist.

Man kann nach diesen Verhältnissen der Schichtung und den sie begleitenden Umständen hier nur annehmen, daß Gase die Schichten emporgehoben und zersprengt haben, und mag in der noch stattfindenden Kohlensäure-Entwicklung erkennen, daß die Herauswirkung unterirdischer Gasarten noch fortdauert, und der Verbindungsweg noch offen ist.

Ein vollkommenes, nur etwas verkleinertes Abbild des Pyramonter Erhebungsthales, ist das Thal von Driburg, bis auf die Größe, jenem Thale in allen äußeren Verhältnissen vollkommen ähnlich, aus dessen Thalgrund auch die Sauerquellen aufsteigen, welche, nach denen von Pyrmont, die stärksten sind, welche am linken Ufer der Weser vorkommen.

Gar oft sieht man in langen Thälern und in Parallelthälern die Schichten in einer Linie erhoben und zu beiden Seiten sich nach auswärts einsenken. Hier nun, wo die verlängerten Schichten zusammentreffen, wird ein Scheitel gebildet. An den innern Wänden solcher Thäler sieht man ferner häufig verschiedene unter einander liegende Gebirgsmassen hervortreten. Kann man bey solchen Thälern wohl eine Entstehung in Folge von Auswaschungen annehmen; können Wasserströme ihren Weg ursprünglich auf der Scheitellinie der Schichten genommen haben?

Hier sieht man nun klar, daß das Thal in Folge einer ver-

änderten Schichtenstellung entstanden ist. Wir können uns vorstellen, wie die Schichten in die Höhe gehoben worden sind, und sich da eine klaffende Spalte bilden konnte, wo die Scheitellinie derselben hingelaufen ist.

Liegen die Schichten in einem Thale, in ihrer ursprünglichen Lage, horizontal, völlig ungestört, zeigen sie sich an beiden Gehängen in gleichem Niveau auch vollkommen gleichartig, so ist deutlich, daß ein solches Thal nicht in Folge einer Verftung und Verschiebung der Schichten entstanden seyn kann. Bestehen horizontale Schichten aus weichen, thonigen, mergeligen oder kalkigen Gesteinen, so können mit Hefigkeit darüber wegströmende Gewässer, zumal wenn sie mit Schutt und Gesteinstrümmern beladen sind, oder diese mit sich fortwälzen, leicht Furchen, Einschnitte hervorbringen, welche bey fortdauernder Wirkung der Gewässer immer mehr vertieft, immer weiter ausgespült werden. Unter solchen Umständen können Thäler durch die zerstörende Kraft der Gewässer, durch Auswaschung, gebildet werden. Führen die Gewässer die lockeren Schichten nach und nach fort, und treffen sie darunter härtere, so geht der Angriff und die Spülung, bey dem stärkeren Widerstand der härteren Gesteine, sehr wenig in die Tiefe, dagegen stark in die Breite, das Thal wird flach und die tieferen harten Schichten werden dabey bloß gelegt. Unter solchen Umständen gebildete Thäler nennt man *Entblösungsthäler*.

Diese Spülungen und Auswaschungen können aber nicht durch diejenigen Wasser bewirkt worden seyn, welche heute noch in den Thälern fließen, da, in Betracht ihrer gegenwärtigen Stärke, die Wirkungen viel zu groß erscheinen, als daß man sie ihnen ganz zuschreiben könnte; ja, daß sie es nicht sind, welche die Thäler ausgewaschen haben, geht noch ganz klar daraus hervor, daß die heutigen Gewässer die Thäler nicht immer ihrer ganzen Länge nach durchströmen, sondern ihre natürlichen Rinnale öfters verlassen und seitwärts abfließen durch Spalten, welche die Gebirgsmassen durchschneiden.

Alle diese Verhältnisse zeigen uns deutlich die Wichtigkeit an, welche die Schichtungsverhältnisse, hinsichtlich der Beschaffenheit der Thäler, und bey Beurtheilung ihrer Bildungsweise, haben.

Von der Lagerung.

Das Verhältniß der einzelnen Gebirgsmassen zu einander, nennt man Lagerung. Eine Gebirgsmasse von großer Ausdehnung und einer eigenthümlichen inneren Beschaffenheit, heißt man ein Gebirgslager. Auch hier spielen die Schichtungsverhältnisse wieder eine wichtige Rolle. Fig. 7, Taf. I, soll einige der wichtigsten Lagerungsverhältnisse erläutern, die Art der Verbindung der Gebirgslager verdeutlichen und die dabey vorkommenden Schichtungsverhältnisse anschaulich machen.

Verühren sich zwey Gebirgslager in einer horizontalen oder schwachgeneigten Ebene, so zeigt sich immer deutlich das eine auf das andere gelagert, wie a, b, c der Figur 7, und ein solches Verbindungsverhältniß bezeichnet man mit dem Namen der Auflagerung. Die unter einem Gebirgslager b, oder auch einer einzelnen Schicht b, sich befindenden Massen a heißt man das Liegende; die darüber gelagerten das Hangende. Massen, deren Schichten parallel sind, wie a, b c, oder d, e f, und die also ein gleiches Streichen und Fallen haben, zeigen gleichförmige Lagerung; sind dagegen die Schichten nicht parallel, wie a und g, so heißt man die Lagerung eine ungleichförmige. Die unteren Schichten sind in der Zeit, welche zwischen ihrer Bildung und dem Absatz der darauf ruhenden verstrich, aus der horizontalen Lage in eine geneigte versetzt worden, und zwar entweder ohne daß dabey die Oberfläche wesentlich verändert worden wäre, oder aber es hat in dieser Zwischenzeit die Oberfläche des unteren, älteren Gebirgslagers einen mehr oder weniger starken Angriff, einen gewissen Grad von Zerstörung erlitten, in dem sie längere Zeit zerstörenden Einflüssen ausgesetzt war, und somit vor der Ablagerung a a' eine zeitlang das Ausgehende der älteren Ablagerung gebildet hatte. Ruht eine Gebirgsmasse auf zwey oder mehreren älteren, wie a a' auf i und g, so nennt man dieses Lagerungsverhältniß übergreifende Lagerung.

Bilden die, sehr selten auf weite Strecken horizontalen oder gleichförmig geneigten, Schichten Krümmungen, welche nach abwärts gehen, und Vertiefungen an der Erdoberfläche ähnlich sind,

wie h o, k d, Fig. 7, so heißt man diese Stellung der Schichten die muldenförmige, oder man sagt, die Schichten bilden eine Mulde. Die Linie, welche durch die tiefsten Punkte derselben läuft, nennt man die Muldenlinie. Geht die Krümmung der Schichten nach oben, bilden sie eine dachförmige Gestalt, wie d, o, f derselben Figur, so nennt man die Schichtenstellung eine sattelförmige, und die Erhöhung einen Sattel. Von der Höhe desselben neigen sich die Schichten nach entgegengesetzten Seiten. Die Linie, von welcher aus das Fallen auf diese Weise stattfindet, und die über die höchsten Punkte des Sattels hinläuft, nennt man die Sattellinie, oder auch, nach dem entgegengesetzten Einfallen der Schichten, die Antiklinallinie. Solche Sattellinien ziehen sich mitunter auf große Strecken höchst gleichförmig fort, und geben uns einen Beweis von ausgedehnten Hebungslinien. Ueberhaupt sprechen diese Verhältnisse deutlich aus, daß die Schichten auf mancfaltige Weise aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, daß Hebungen und Senkungen derselben stattgefunden haben. Nicht selten folgen bey hinter einander fortliegenden Bergen, oder bey parallel laufenden Zügen derselben, Hebungen und Senkungen mehrfach auf einander. Die erhabenen Punkte stellen die Sättel, die vertieften die Mulden dar, und erstere entsprechen häufig den Bergen, letztere den Thälern. Fig. 8, Taf. I., soll eine Vorstellung einer auf einanderfolgenden Sattel- und Muldenbildung geben, a zeigt die Sättel, b die Mulden an. Man sieht auf der Höhe der Sättel, die bald auf dem Gipfel der Berge, bald im Grunde der Thäler liegen, wie bey a', die Schichten sich nach entgegengesetzten Richtungen einsenken, und hat somit in der Streichungsrichtung eine Antiklinallinie (vom Griechischen *anti*, entgegengesetzt, und *kline*, neigen). In den Mulden neigen sich die Schichten gegen einander, und die Muldenlinie ist also zugleich auch eine Synklinallinie (ein Name vom *syn*, zusammen, und dem eben angeführten *kline*, gebildet).

Diese Veränderungen der ursprünglichen Schichtenstellung und Lagerung der Gebirgsmassen sind nicht nur an der Oberfläche der Erde vor sich gegangen, sondern auch in ihrem Innern. In Bergwerken beobachtet man sie in allen Tiefen, und hier

steht man häufig die Schichten und große Gebirgslager von Spalten durchseht, welche in unerforschte Tiefe niedergehen und manchmal meilenweit fortsetzen. Die dadurch getrennten Theile wurden an einander verschoben, und man nennt dergartige Veränderungen daher auch Verschiebungen, auch Verwerfungen, und die Spalten, welche mit solchen Verschiebungen im Causalnerus stehen, Rücken, Klüfte, Sprünge, Gänge. Sie sind bald mehr und weniger ausgefüllt, bald leer.

Fig. 9, Taf. I., wird diese Verhältnisse anschaulich machen. Es ist hier das Innere des Gebirges aufgeschlossen. Verschiedene Schichten sehen dasselbe zusammen; aber die zu beiden Seiten der Kluft liegenden Schichten correspondieren nicht mit einander, und die Schichten aa, bb, cc, dd, immer von gleicher Beschaffenheit, müssen einst zusammenhängend gewesen seyn. Die Kluft k hat den Zusammenhang unterbrochen, und es wurde dabey entweder der Theil A in die Höhe gehoben, oder der Theil B gesenkt, wobey, wie im vorliegenden Fall, die auf der Seite B befindlichen Schichten a, b, c, d durchaus tiefer liegen, als auf der Seite A.

Die Spalten sind gewöhnlich mit Thon, Lehm, Trümmern verschiedener Mineralkörper, mit Gesteinen oder auch mit Erzen ausgefüllt. Die mit Gesteinen und Erzen ausgefüllten Spalten nennt man Gänge, und nach der Art der Ausfüllung selbst unterscheidet man Gesteinsgänge und Erzgänge. Was bey den Erzgängen noch außer den Erzen als Ausfüllungsmasse vorkommt, nennt man Gangart. Das Gestein zu beiden Seiten einer solchen Spalte nennt man Nebengestein.

Einfluß der betrachteten Verhältnisse auf die Form der Gebirgsmassen.

Betrachtet man die mannfaltigen und so sehr von einander abweichenden Formen der einzelnen Berge und der Gebirge in ihrer Beziehung zur Zusammensetzung der Gebirgsmassen, zu ihren Structur-, Schichtungs- und Lagerungsverhältnissen, so kann nicht unbemerkt bleiben, daß diese einen ganz entschiedenen Einfluß auf jene haben. Harte, der Verwitterung trohrende Gesteine treten mit scharfen, eckigen Gestalten auf, zeigen Felsen-

bildung, ragen in Mauern, Pyramiden u.s.w. empor, während die Massen weicher, thoniger und mergeliger Gesteine sich durch starke Verwitterung abrunden und sanfte Formen annehmen. Bey wagerechten Schichten sind die Formen immer einförmiger und weniger ausgezeichnet, es erscheinen die Massen auf große Strecken in ununterbrochenem Zusammenhange, und in Folge dessen in länggezogenen Rücken oder sanft gerundeten und wellenförmig gebogenen Kuppen, Köpfen, Platten u.s.w. Sind dagegen die Schichten stark aufgerichtet, haben sie beträchtliche Hebungen und Senkungen erlitten, so sieht man den Zusammenhang vielfach unterbrochen, Spalten die Massen zertrennen, die Tafeln der Schichten sägenartig ausgezackt, in Säulen, Pyramiden, Obelisken und Nadeln zertheilt, die bey starker Aufrichtung und bedeutender Erhebung frey in die Lüfte ragen und einen malerischen Anblick gewähren. Sind geschichtete Bildungen mit solchen gelagert, welche keine Schichtung besitzen, so bedingt dieß immer eine große Abwechselung der Formen, und kommt dazu noch das oben erwähnte Verhältniß, großer, räumlicher Veränderungen der geschichteten Massen, Hebungen,erspaltungen u.s.w., so wird dadurch die größte Mannichfaltigkeit überraschender Formen hervorgebracht.

Von den geognostischen Formationen.

Gebirgsmassen, welche Schichtung zeigen, müssen sich nach und nach ruhig abgesetzt haben, und alle Schichten, welche in gleichförmiger Lagerung über einander liegen, sind während derselben Zeit der Ruhe gebildet worden. Störungen, die später eintraten, haben sie alle gleichmäßig betroffen, eine spätere Hebung hat alle in gleicher Zeit der Ruhe abgesetzten horizontalen Schichten gleichförmig aufgerichtet, und eine ungleichförmige Lagerung ist daher immer das Resultat gewaltsamer Störungen, welche die Zeit des ruhigen Absatzes unterbrochen hat. Auf diese Weise ergeben sich von selbst Perioden der Ruhe und gewaltsamer Vorgänge. Die Schichten einer Periode tragen immer einen eigenthümlichen Character, umfassen Absätze, welche unter denselben Umständen gebildet worden sind, zusammen ein Ganzes ausmachen, und daher immer zusammen und unter denselben Lagerungsverhältnissen

vorkommen. Den Inbegriff mineralischer Massen, die zusammen ein solches Ganzes ausmachen, nennt man eine Formation. Durch Bildungsperioden von einander geschieden, erscheinen die geognostischen Formationen, deren Unterscheidung wir dem Genie Werners verdanken, als selbstständige und unabhängige Ganze, und ihre Unabhängigkeit bekräftigt sich dadurch, daß sie auf Massen von verschiedener Beschaffenheit liegen und auf ältere unterliegende Bildungen, bald in gleichförmiger, bald in ungleichförmiger Lagerung abgesetzt sind.

Der bekannte und genauer untersuchte Theil der Erbrinde läßt eine bestimmte Reihenfolge solcher Formationen wahrnehmen, die mit großer Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit allgemein verbreitet sind, und die man deshalb auch allgemeine Formationen oder Gebirgsbildungen heißt. Diesen gegenüber unterscheidet man locale Bildungen, die durch besondere, durch Verhältnisse bedingte, oder an solche gebundene Charaktere sich auszeichnen, und keine allgemeine Verbreitung haben.

Die Schichten, welche sich während der Bildungszeit einer Formation abgesetzt haben, sind fast nie alle von ganz gleicher Beschaffenheit, und daher die Formationen, hinsichtlich ihrer Gesteinsverhältnisse, auch beynahe niemals einfach. Sie zeigen sich in der Regel aus verschiedenartigen Gesteinen, Kalksteinen, Sandsteinen, Conglomeraten, Thonen, Mergeln u.s.w. zusammengesetzt, welche gewöhnlich lagenweise auf einander folgen, öfters mit einander abwechseln und natürliche Abtheilungen des Formations-Ganzen bilden. Diese Abtheilungen treten als die einzelnen Glieder der zusammengesetzten unabhängigen Gebirgsbildung auf, bleiben aber nicht aller Orten gleich, sowohl an Anzahl als Stärke, ja sie werden nicht selten, während sie an einem Orte in bestimmter Mächtigkeit oder Abwechselung angetroffen werden, an einem andern Orte ganz vermißt, oder man sieht sie hier durch Massen von abweichender Beschaffenheit ersetzt. Dabey bleiben aber die Lagerungsverhältnisse unverändert, und man findet in diesen somit das Constante und Bezeichnende einer Formation, während die Gesteinsverhältnisse wechseln, in einer bestimmten Formation ein Gestein das andere ersetzt, als dessen Stellvertreter, als dessen Aequivalente auf-

tritt. Formationen, die gleiche Lagerungsverhältnisse zeigen, aber aus verschiedenen Gesteinen bestehen, nennt man auch *parallele Formationen*. So zeigt die Formation, welche zunächst das Becken von Paris erfüllt, und daselbst auf Kreide ruht, dasselbe Lagerungsverhältniß, was die thonigen Massen haben, welche im Becken von London zunächst die dortige Kreide bedecken, während aber in der Gegend von Paris das Gestein überwiegend kalkig ist, besteht die Gebirgsbildung, worauf London steht, vorzüglich aus Thonmassen.

Diese Verschiedenheiten in den mineralogischen Characteren der Formationen erschweren ihre richtige Erkennung in vielen Fällen ganz außerordentlich, namentlich wenn es sich um Vergleichung von Gebirgsbildungen handelt, die an weit aus einander liegenden Orten vorkommen. Dabey leisten alsdann solche Bildungen sehr nützliche Dienste, die wohl bekannt und ganz allgemein verbreitet sind, indem sie, wenn man bey einer solchen Untersuchung durch ihr Vorhandenseyn begünstigt ist, ganz vortreflich zur Orientierung dienen, und als sichere Anhaltspuncte gebraucht werden können. Man hat solche Bildungen deßhalb auch sehr passend geognostische *Horizonte* genannt.

Vorkommen von Versteinerungen.

Die mehrsten geschichteten Gebirgsbildungen schließen Versteinerungen ein, Ueberreste von Pflanzen und Thieren, deren organische Masse mehr oder weniger von mineralischen Substanzen überkleidet, durchdrungen oder ersetzt ist.

Diese Ueberreste, auch *Petrefacten* genannt, Gegenstand einer eigenen Sciencz, die man *Petrefactenkunde* heißt, liegen in den verschiedenartigsten Schichten begraben, bis hinab zu den aller ältesten, finden sich in jeder Tiefe, bis zu welcher man in geschichteten Bildungen niedergekommen, in jeder Höhe, bis zu der man hinangestiegen ist, 1000 Fuß unter der Oberfläche der Erde und bis zu 16,000 Fuß über dem Meeresspiegel.

In den untersten ältesten Schichten findet man im Allgemeinen Reste von Thieren und Pflanzen, welche den niederen Classen angehören, zumal Reste von Schal- und Gliederthieren, und die ausgebildeteren Formen nehmen in dem Maasse zu, als

man aus den älteren Schichten in die jüngeren aufsteigt, und zu gleicher Zeit werden sie auch zahlreicher. Man erkennt, bey der aufmerksamen Beobachtung der Vertheilung der Petrefacten in den verschiedenen Gebirgsformationen, eine deutlich ausgesprochene, fortwährende Entwicklung der organisierten Wesen, von dem ältesten Bildungen bis herauf zu den jüngsten, eine stufenweise vervollkommnung der Thiere und Pflanzen. Immer treten vollkommener organisierte Wesen auf, je weiter man aus den älteren Schichten in die jüngeren fortrückt, und in den jüngsten endlich findet man, mit den Pflanzen der vollkommensten Ausbildung, den Dicotyledonen, auch die Thiere einer höheren, vollkommeneren Organisation, Vögel und Säugethiere.

Der bey weitem überwiegende Theil der versteinerten organischen Reste besteht aus Schäusen von Schalthieren, welche im Meere lebten, und während langer Epochen der Ruhe den Meeresgrund bedeckten. Diese Schalen erscheinen bald abgerieben, zerbrochen und wie durch eine lange fortgesetzte Bewegung des Wassers in Form, Stärke und Größe verändert; bald finden wir sie ganz und wohl erhalten bis auf die zartesten Hervorragungen. Im ersten Falle scheinen sie von einer entfernten Stelle hergebracht und da aufgehäuft worden zu seyn, wo wir sie heute finden; im andern Falle scheinen sie an der Stelle gelebt zu haben, wo man nunmehr ihre Reste antrifft, oder nahe dabey. Die Schichten sind nicht selten mit solchen Resten ganz angefüllt, und schließen unzählige Quantitäten derselben ein, so daß man annehmen muß, das Meer habe lange und ruhig über solchen Stellen gestanden. Es waren auch in der That lange Zeitperioden erforderlich, zur Hervorbringung der oft sehr mächtigen Niederschläge, und nur während einer langen Zeit der Ruhe konnten so zahllose Schalthier-Individuen an einer Stelle leben und absterben. Jeder Ort, an welchem wir sie heute treffen, war einst Meeresboden, war vom Meere bedeckt, und Meere nahmen also einst die Stellen unserer heutigen Continente und Inseln ein.

Die Schalthierreste sind bisweilen microscopisch klein, und setzen uns dann ebenso durch ihre Kleinheit, wie durch ihre Zahl in Erstaunen. Eine in dieser Beziehung sehr interessante That-
sache erzählt uns Goldani in seinem *Saggio Orithographico*,

1780. Er untersuchte einen in den Hügeln von Casciana in Toscana gefundenen Stein von nahezu anderhalb Unzen Gewicht, und fand darinn 10,454 microscopisch kleine, gekammerte Conchylien. Der Rest des Stückes bestand aus Schalenbruchstücken, winzigen Schinitenstacheln und Kalkspath. Von einigen Arten dieser Schalthiere giengen 4—500 auf 1 Gran, und er nimmt an, daß von einer besonders kleinen Art, selbst 1000 Individuen kaum einen Gran wägen.

Gar oft haben die organischen Reste wesentlichen Einfluß auf die Anordnung der Theile eines Gesteins, und wir sehen namentlich Thon- und Mergellager dadurch öfters in dünne Blätter abgetheilt. In der Auvergne liegen in einem mächtigen Mergelgebilde zahllose Myriaden dünner Schalen von *Cypris faba*, von einem winzig kleinen Schalthiere, von welchem heut zu Tage noch einige Arten leben, die hurtig in den stehenden Wassern der Teiche und Sümpfe umherschwimmen. Der die Cyprisgehäuse einschließende, einige hundert Fuß mächtige, Mergel ist dadurch in papierdünne Blätter abgetheilt. Diese Thierchen werfen jährlich ihr Gehäuse ab, und konnten nur in sehr langer Zeit eine so unzählige Menge ihrer Schalen hinterlassen. Erwägt man diesen Umstand, so wie die Mächtigkeit des Mergelgebildes, so findet man darinn einen unumstößlichen Beweis, daß das Gebilde, während einer langen Zeit der Ruhe, langsam und allmählich abgesetzt worden ist.

In neuester Zeit hat man auch große Massen versteinerter Infusorien gefunden. Ehrenberg, der sie entdeckte, hat gezeigt, daß sie an vielen Stellen in Mineralien und Gesteinen angetroffen werden, und man namentlich in einer mehrfältig vorkommenden Ablagerung, in dem Polierschiefer, sie in solcher Menge findet, daß sie beynähe die ganze Masse desselben zusammensetzen. Diese Thierchen haben ungefähr einen Durchmesser von $\frac{1}{100}$ Linie, was $\frac{1}{10}$ von der Dicke eines Menschenhaares beträgt, oder der Größe eines Blutkugelhens gleichkommt. Eine Cubiklinie des Bilsner Polierschiefers enthält nahezu 23 Millionen solcher Thierchen, ein Cubikzoll 41,000 Millionen. Das Gewicht eines solchen Cubikzolls ist 220 Gran; 187 Millionen dieser Thierchen wägen einen Gran, und jedes wägt somit für

sich, das heißt, der fossile Kiefelschild jedes derselben, $\frac{1}{100}$ Millentel eines Grans.

An vielen Orten schließen die Schichten Meerthierreste zu gleicher Zeit mit Resten von Thieren ein, die im süßen Wasser leben; in Flüssen, Seen, Sümpfen, und mit Landthierresten. Solche Vermischungen der Reste von Meeres-, Süsswasser- und Landthieren erklären sich durch die Beobachtungen, welche man an vielen sich ins Meer ergießenden, großen Flüssen macht. An deren Mündungen leben Meer- und Flußbewohner beisammen, und Landthiere können in die Strommündung getrieben, oder es können ihre Gerippe vom Lande hergeschwemmt werden. Ein Wechsel von Schichten, die Meerthierreste einschließen, und von solchen, die Süsswassergeschöpfe enthalten, findet darinn seine Erklärung, daß ein dem Meere nahe gelegenes und damit in Verbindung stehendes Becken, welchem süße Wasser zufließen, bey Wechseln des Wasserstandes, bald von süßem, bald von salzigem oder brackischem Wasser auf längere Zeit erfüllt seyn konnte.

Diese im Vorhergehenden in ihren allgemeinsten Verhältnissen betrachteten Versteinerungen sind nun in den geschichteten Bildungen keineswegs verworren durch einander geworfen, sondern stellen einmal, wie schon oben bemerkt worden ist, eine ununterbrochene Entwicklungsreihe dar, und fürs andere sind gewisse Geschlechter und Gattungen immer in bestimmten Gebirgsbildungen eingeschlossen, so daß in denselben Schichten im Allgemeinen auch dieselben Versteinerungen vorhanden sind. Einige Familien kommen zwar in Schichten jedes Alters vor, dagegen sind andere sehr bestimmt auf gewisse Formationen beschränkt, und man bemerkt sehr gut das Aufhören ganzer Gruppen, und gewisse Abschnitte, über welche hinaus sich bestimmte Thier- und Pflanzenfamilien nicht mehr erstrecken.

Dieser Zusammenhang der regelmäßigen Aufeinanderfolge der Schichten, mit der bestimmten Vertheilung der Petrefacten in denselben, ist von der allerhöchsten Wichtigkeit. Wir haben durch dessen Erkennung die schätzbarsten und bestimmtesten Data von der Bildung der Erde erhalten, und durch die Versteinerungen, diese ächten historischen Documente, Einsicht in die Entwicklung

des Organischen, und in die Vorgänge gewonnen, die an der Oberfläche unseres Planeten stattgefunden haben.

Unstreitig sind die Versteinerungen für die Bestimmung geognostischer Formationen von der größten Wichtigkeit. Ihre Kenntnis ist bey'm Studium der Geologie unentbehrlich, und groß und wesentlich sind die Aufschlüsse, die wir durch sie erhalten. Darum können wir der Bemerkung nur beistimmen, nach welcher es eben so thöricht seyn würde, eine Untersuchung über Bau und Umwälzungen der Erde vorzunehmen, ohne auf die von den Versteinerungen dargebotenen Beweise zu achten, als es abgeschmackt wäre, die Geschichte eines alten Volkes schreiben zu wollen, ohne auf seine Münzen, Inschriften, Denkmäler, auf die Ruinen seiner Städte und Tempel Rücksicht zu nehmen. Doch dürfen wir niemals vergessen, daß nicht die organischen Reste das allein Charakteristische und Wesentliche der Schichten sind, und daß die Lagerungsverhältnisse immerhin den ersten Rang einnehmen; daß Bestimmungen und Schlüsse über Identität oder Verschiedenheit der Bildungen zunächst aus ihren räumlichen Verhältnissen abgeleitet werden müssen, und die Schlüsse nach dem Vorkommen von Versteinerungen nur dann volle Gültigkeit haben, wenn ihnen die Lagerungsverhältnisse nicht widerstreiten.

Die Vernachlässigung dieses Grundsatzes, die einseitige Ueberschätzung des Werthes der Petrefacten, führt immer zu Irrthümern. Wie kann man auch jetzt schon, ohne Irrthümer zu begehen, einzig auf den Grund hin, daß an entlegenen Punkten dieselben Versteinerungen vorkommen, die Identität solcher Massen behaupten? Kaum kennen wir einige Theile von Europa genauer; von den anderen Erdtheilen wissen wir noch ungleich weniger. Einige Bruchstücke und Angaben allgemeiner Verhältnisse, die wir Reisenden verdanken, reichen noch lange nicht hin, uns eine klare Vorstellung von den dortigen Verhältnissen zu geben. So lange wir aber nicht die ganze Erdoberfläche gleichmäßig kennen, dürfen wir nicht anders, als nach sämmtlichen Erscheinungen, den räumlichen und den petrefactologischen, Schlüsse über Identität der Massen ziehen.

Classification der Gebirgsbildungen.

Sämmtliche Gebirgsbildungen zerfallen ganz einfach und naturgemäß in zwey große Abtheilungen. Eine Abtheilung umfaßt

die geschichteten Bildungen, welche in regelmäßige, plattenförmige Lagen abgetheilt, in bestimmter Ordnung über einander abgelagert sind, und eine große zusammenhängende Reihe bilden; die andere Abtheilung begreift die ungeschichteten Gebirgsbildungen, die man auch massige heißt, bey denen die parallelen, weit aushaltenden und sich regelmäßig wiederholenden Spalten, und die lagenweise Aufeinanderfolge fehlen.

Die geschichteten Bildungen zeigen in der Regel einfache Producte mechanischer Aggregation; die ungeschichteten bestehen dagegen vorzüglich aus crystallinischen Gesteinen, sind meist aus mehreren Gemengtheilen zusammengesetzt, die häufig in ausgebildeten Crystallen auftreten, und nur ausnahmsweise ist durch die Structur eine durchgreifende Anordnung der Gemengtheile nach parallelen Ebenen bedingt.

Die Unterscheidung der Gebirgsbildungen in geschichtete und massige ist ganz geeignet, unsere Vorstellungen von der Bildungsweise der Gebirgsmassen zu unterstützen. In der Schichtenbildung kann man den successiven Absatz der Lagen aus Gewässern, nach Art eines Niederschlags, nicht verkennen, und findet man den unwiderleglichen Beweis der Entstehung von Gebirgsmassen unter Wassereinfluß, oder der Existenz neptunischer Bildungen.

Die massigen Gesteine weisen dagegen durch ihren Bestand aus Substanzen, die sich nicht in Wasser lösen, niemals aus wässerigen Flüssigkeiten crystallisieren, auf Verhältnisse hin, wo unter Feuereinwirkung Crystallisationen erfolgen, auf Schmelzungen, auf feurigen Fluß, aus welchen beym Erkalten und Erstarren der Massen unter unseren Augen so oft Crystallbildungen stattfinden; sie führen uns auf eine vulcanische Bildungsweise.

Betrachten wir nun die Art und Weise, wie die Bildungen beider Abtheilungen mit einander verbunden sind, untersuchen wir aufmerksam ihre Verschiedenheiten, hinsichtlich der Zusammensetzung ihres verschiedenen mineralogischen Characters, und studieren wir endlich genau die Verhältnisse, unter welchen heute noch, vor unseren Augen, Fortbildungen an der Erdoberfläche, theils unter Einwirkung des Wassers, theils unter Einfluß des Feuers geschehen, so müssen wir unseren Schläffen, wornach die ge-

schichteten Formationen neptunischen, die massigen vulcanischen oder plutonischen Wirkungen ihre Entstehung verdanken, den höchsten Grad von Sicherheit zugesiehet.

Nach dem jetzigen Stande unserer geologischen Kenntnisse kann man, mit Beybehaltung der Haupteintheilung Werners und der altblichen, allgemein bekannten Benennungen, unter Berücksichtigung der neueren Fortschritte der Wissenschaft, nachstehendes, leicht verständliche geologische System aufstellen:

I. Classe. Geschichtete Gebirgsbildungen.

- I. Ordnung. Aufgeschwemmtes Gebirge.
- II. " Tertiäres Gebirge.
- III. " Secundäres oder Flöhgebirge.
- IV. " Uebergangsgebirge.
- V. " Grundgebirge.

II. Classe. Massige Gebirgsbildungen.

- I. Ordnung. Vulcanisches Gebirge.
- II. " Plutonisches Gebirge.

Beide Classen beginnen mit den jüngsten Bildungen, oder mit solchen, die jetzt noch im Gange sind, und von welchen viele unter unseren Augen erfolgen.

Bey der näheren Betrachtung der einzelnen Gebirgsbildungen ist es unstreitig am zweckmäßigsten, mit den allerjüngsten zu beginnen, mit solchen, deren Entstehungsweise unter den verschiedenen, an der gegenwärtigen Erdoberfläche waltenden, Einflüssen wir zu beobachten Gelegenheit haben. Bey der Auffassung der heutigen oder der historisch nachweisbaren Vorgänge, erlangt man am besten Einsicht in die früheren Vorgänge auf unserer Erde, und gewinnt man die richtige Kenntniß der Ursachen und eine klare Vorstellung der Umstände, durch welche und unter denen die verschiedenen Gebirgsmassen gebildet worden sind. Wir befolgen daher diese Betrachtungsweise.

I. Classe. Geschichtete Gebirgsbildungen.

I. Ordnung. Aufgeschwemmtes Gebirge.

Das aufgeschwemmte Gebirge schließt die jüngsten Gebirgsmassen ein, Massen aus ruhigen und bewegten Wassern abgesetzt,

durch Fluthen angeschwemmt, zum größten Theil auf dem festen Lande gebildet, und zum Theil jezt noch in Bildung begriffen. Große, weitverbreitete und anhaltendere Wasserbedeckungen des Continents scheinen zur Zeit der Entstehung der ältesten derselben nicht mehr vorhanden gewesen zu seyn, da man sie nicht mit gleichförmigen Characteren ganz allgemein verbreitet antrifft, und sie häufig die Kennzeichen örtlicher Ablagerungen haben. Das bey weitem vorwaltende Masse derselben ist mechanisch zusammengehäuft, ein großer Theil der festen Bildungen aus verschiedenartigen Trümmern mechanisch zusammengefügt.

I. Formation. Alluvium.

Spn. *Reues Alluvium*, postdiluvianische Gebilde, *Terrains alluviaux*, Modern Group.

Das Alluvium bildet die oberste, jüngste Lage den Erdrinde. Seine Massen sind größtentheils locker, und liegen vorzugsweise in den Niederungen, erfüllen das Flachland, den Grund vieler Thäler, die Becken mancher trocken gelegter Seen, erscheinen häufig an den Ufern der Landseen, am Meeresufer, an den Küsten der Inseln, auf den Spitzen untermeerrischer Berge, an Ufern und Mündungen der Flüsse und Ströme, aber seltener auf Bergen oder Höhen der Gebirge.

Mechanische und chemische Kräfte, erstere vorzugsweise, sind bey der Entstehung der Alluvialmassen thätig gewesen und wirken zu ihrer Bildung noch fort, und selbst die jezt lebende Organisation liefert zur Constitution mehrerer derselben wesentliches Material, und mehrere lebende Geschlechter arbeiten fort und fort am unorganischen Bau der gegenwärtigen Periode.

Zahlreiche Reste von Thieren und Pflanzen, welche, mit weniger Ausnahme, Geschlechtern angehören, die gegenwärtig noch leben, und gewöhnlich selbst noch an den Orten, wo man ihre Ueberreste findet, sind in die Massen der hierher gehörigen Bildungen eingeschlossen. Wahrhaft, vollkommen versteinert, sind diese Reste nicht. Die Thierreste sind gewöhnlich von kohligem und bituminösen, oder von humosen Theilen durchdrungen, Knochen, Schalen mehr oder weniger calcinirt, ihrer organischen Bestandtheile theilweise beraubt. Die Pflanzenreste sind gewöhnlich

braun oder schwarz, bituminisirt, mehr oder weniger verkohlt oder in eine weiche Masse umgewandelt, deren Hauptbestandtheile Humusäure und Humuskohle sind. Man findet in diesen Bildungen selbst menschliche Ueberreste und verschiedenartige Erzeugnisse des menschlichen Kunstfleißes, Waffen, Denkmale, Geräthe, von den ältesten oder früheren Bewohnern des Landes hinterlassen, und von welchen manche mitunter einen niederen Grad von Ausbildung zu erkennen geben, wie ihn etwa die Kunstsergebnisse der Wilden Amerikas, oder die Produkte roher Insulaner beurfunden.

Um uns eine möglichst deutliche Vorstellung von der Entstehungsweise der jüngsten neptunischen Gebirgsbildungen machen zu können, wollen wir vor Allem die Veränderungen betrachten, welche durch die heute noch fortwirkenden, nicht vulcanischen Ursachen ununterbrochen an der Erdoberfläche hervorgebracht werden.

Verwitterung. Zerstörung der Felsen.

Alle Körper, welche dem Luftkreise ausgesetzt sind, werden davon angegriffen. Die Gesteine, den wechselnden, mannfaltigen Einwirkungen der Temperatur, des Wassers und der Luft preisgegeben, erleiden ununterbrochenen Angriff, und unterliegen endlich alle der Zerstörung. Schon die mechanische Einwirkung der Luft ist zerstörend. Ein Sturm reißt vorragende Theile nieder, ein Luftstrom, der lange Zeit Sand gegen oder über Felsen fährt, wirkt angreifend ein, wie die nackte, felsige Hochebene des Karst über Triest zeigt, dessen unbedeckte Kalkmassen dem Einfluß der heftigen Bora ausgesetzt sind. Selbst eine geringfügige Ursache ist bey unendlich langer Dauer von großer Wirkung. Auch die mechanische Gewalt des Wassers, wenn es als Regen, Hagel, Schnee herabfällt, ist nicht ohne Einfluß, es schabt hervorragende Theile ab und grabt Furchen aus, indem es über sie hingleitet. Lawinen ziehen Felsstücke mit in den Sturz und zerschmettern sie. Das flüssige Wasser bringt ferner in die Masse der Gesteine ein, vermindert dabey ihre Festigkeit, weicht sie auf und bewirkt ihr Zerfallen. Durch seine auflösende Eigenschaft zieht es Kalk, Gyps, Salze, alkalische Bestandtheile aus den Gesteinen aus.

Es wirkt in dieser Hinsicht besonders stark auf kalkige und silicathige Massen dann ein, wenn es Kohlensäure enthält, was bey dem aus der Atmosphäre herabfallenden Wasser immer mehr oder weniger der Fall ist. Am zerstörendsten aber wirkt das Wasser ein, wenn es von Gesteinen eingesogen, oder in ihnen eingeschlossen, zu Eis wird. Dabey dehnt es sich bekanntlich aus, und zwar mit solcher Kraft, daß es, in Spalten und Höhlungen selbst der stärksten Steine eingeschlossen, diese zersprengt und in kleinere Theile trennt, gleich wie ein eingetriebener, anschwellender Keil. Auch die Eismassen der Gletscher zerreiben unablässig die Gesteine, über welche sie sich fortbewegen, und die daraus abfließenden Bäche tragen in ihren trübten Wassern die Trümmer fort.

Die Atmosphäre wirkt noch in chemischer Beziehung wesentlich verändernd auf die Oberfläche ein, durch ihren Sauerstoffgehalt. Eine große Zahl von Gesteinen ist eisenhaltig. Das in ihnen enthaltene Eisenoxydul verwandelt sich durch Sauerstoffanziehung in Eisenoxyd, und dieses sofort, indem es Wasser annimmt, in rostfarbiges Hydrat. Dabey wird die Gesteinsmasse aufgelockert und allmählich zerstört. Auf diese Weise wirkt das Eisenoxyd, welches von den schweren metallischen Substanzen am allgemeinsten verbreitet ist, durch den Einfluß des Sauerstoffs der Atmosphäre auf eisenhaltige Felsen erzeugt, ganz wesentlich auf die Veränderungen ein, welche an der Oberfläche der Erde vor sich gehen. Diese oxydierende Wirkung übt der Sauerstoff vorzüglich dann sehr kräftig aus, wenn er, in Wasser gelöst, wie er sich in jedem lufthaltigen Wasser befindet, mit den mineralischen Massen in Berührung steht. Nebst dem Eisenoxydul wird namentlich der viel verbreitete Binarctes durch den Sauerstoffgehalt der Luft oxydirt, in Eisenvitriol umgewandelt, wobey, je nach der Zusammensetzung des Gesteins, das ihn einschließt, noch andere Salze gebildet, und immerhin Festigkeit und Zusammenhang derselben aufgehoben werden. Alle die bezeichneten, die Zerstörung der Felsen bewirkenden chemischen Vorgänge werden noch insbesondere durch Wärme begünstigt.

Die Electricität wirkt, als chemisches Agens, das bey allen chemischen Prozessen thätig ist, unverkennbar bey den Veränderungen mit, welche durch jene hervorgebracht worden,

und diese stille und langsame Wirkung, die sie haben, so wie bey den Verdunstungen von Wasser an der Oberfläche der Felsen auf diese ausübt, ist unstreitig wichtiger, als ihre großartige Einwirkung als Bliß, der schmilzt und zerschmettert. Dazu kommt endlich noch die zerstörende Einwirkung organisirter Wesen, der Flechten, Moose, Sträucher, Bäume, einer Vegetation, die nach dem Tode Stoff zu eigenthümlichen Gebilden hinterläßt.

Erwägen wir nun die Wirkung der geschilderten mechanischen Agentien und die chemische Thätigkeit der Luft und des Wassers, durch die Kraft der Electricität unterstützt, verbunden mit der angreifenden Wirkung der Vegetation, und betrachten wir ihren gemeinschaftlichen Einfluß auf die unorganischen Massen unseres Erdballs, so finden wir darinn die Erklärung einer ununterbrochenen Zerstörung, die immerwährend trennt, verfallen macht und Trümmer liefert, und erkennen wir die Kräfte, durch deren Thätigkeit aus diesem Material stets neue Gebilde erzeugt werden.

Solchergehalt liefert auch in der unorganischen Natur die Zerstörung das Material zu immer neuen Bildungen. Man hat diejenigen von ihnen, welche sich in der Gegenwart gestalten, auch mit dem Namen der gegenwärtigen Bildungen bezeichnet, und sie in eine besondere Gruppe zusammengefaßt. Für diese wendet man auch den oben gebrauchten Namen Alluvium an.

Erscheinungen, die eine Folge der zerstörenden Einflüsse der Atmosphären sind.

Den angeführten zerstörenden Einflüssen der Atmosphäre unterliegen, wie bemerkt, mit der Zeit die festesten Gesteine. Dabey werden hervorragende Gesteinsmassen, insbesondere auf den Höhen, auf den Gipfeln und an den Seiten der Berge, am Gehänge der Thäler, am stärksten angegriffen, und nach Beschaffenheit ihrer Zusammensetzung, nach ihren Structur- und Schichtungsverhältnissen, auf mannfaltige Weise verändert. Es entstehen die mannfaltigsten Formen, und werden häufig, durcherspaltungen und Einstürze, groteske, malerische Felsen gebildet. Das zeigen uns die nördlichen Vogesen, im Thal der Lauter, bey Dahn, und im Thal von Anweiler, bey Trifels, wo die rothen Sandsteine in Gestalten dastehen, die wie Trümmer und Mauerstücke von

Apinen aussehen, davon geben uns fernere die Felsen von Albersbach in Böhmen, die Sandsteinmassen der sächsischen Schweiz Beispiele, vor allem aber die Alpen, wo durch die starke Aufreißung der Schichten der Angriff der Atmosphärilien erleichtert und die wunderbaren Formen hervorgebracht werden.

Zu gleicher Zeit offenbart sich, mit dem Fortschreiten der Verwitterung, bey vielen Gesteinen ihre eigenthümliche, innere Structur, die man während ihres frischen Zustandes nicht wahrnehmen kann. Man beobachtet z. B. die kugelige Structur des Basaltes und Granites, steht wie sich Schale um Schale von größeren Kugeln abblät, erkennt darinn den Grund der Abnutzung prismatischer oder parallelepipedischer Blöcke und der Aushöhlung ausgefeilter Felsenflächen. Es erklärt sich daraus die Bildung der Schwanfsteine (Logan-stones) und der Felsenbecken (Rock-basins).

Felsen von Granit, mit deutlicher Structur und aus parallelepipedischen Stücken zusammengesetzt, werden durch den starken Angriff, den Ecken und Kanten erleiden, allmählich abgerundet, und nehmen, bey fortschreitender Verwitterung, immer mehr eine runde Form an. Die ebenen Auflagerungsflächen der einzelnen Blöcke werden dabey gewölbt, die Unterstüßungspuncte werden vermindert und die Blöcke fallen über einander, wenn ihr Schwerpunkt nicht senkrecht darauf steht. Unter gewissen Verhältnissen bleiben auch stark abgerundete Blöcke auf einander liegen, und mitunter liegt einer auf seiner convexen Unterlage so im Gleichgewicht, daß er in Schwingung gesetzt werden kann, ohne herabzufallen, also im wahren Sinne des Wortes ein schwankender Stein ist. Man findet solche Schwanfsteine vorzüglich auf den Granitbergen von Cornwall und Devonshire. Mehrere von diesen Steinen sind berühmt, namentlich der Logan-Rock am Vorgebirg Castle Erryn in Cornwal, welchen die Druiden als hohen, geheimnißvollen Richter ehrten, worauf der englische Dichter *Rasson* anspielt *).

*) Behold yon huge

And unknown sphere of living adamant

Which, pole'd by magic, rests its central weight

On yonder pointed rock: firm as it seems

Fig. 10, Taf. II., ist das von Dr. Paris gegebene Bild dieses interessanten Steines. Eine am Meeresufer hoch aufragende Gruppe von Granitfelsen trägt auf einer ihrer pyramidalen Spitzen den berühmten Stein. Er hat ein Gewicht von 60 Tonnen *), eine sphäroidische Gestalt, und steht in der Richtung seiner kürzeren Achse so im Gleichgewichte, daß, seiner Größe ungeachtet, die Kraft eines einzigen Mannes hinreicht, ihn in eine oszillirende Bewegung zu setzen.

Auf der Oberfläche von Granitblöcken, die eine innere kugelige, mit schalenigen Abblättern verbundene Structur besitzen, entstehen bei der Verwitterung, auf den derselben vorzüglich ausgesetzten Seiten, mitunter schüsselförmige Vertiefungen, die in Cornwall und Devonshire, an deren Granitblöcken man sie am häufigsten findet, Rock-basins, Felsenbecken, genannt werden. Man hat sie lange Zeit für ein Werk der Menschenhände gehalten, und sie für ein Werk abergläubischer Ceremonien der Druiden ausgegeben, die namentlich in Devonshire früher in Menge gelebt haben.

Der Fuß der Berge, der untere Theil der Gehänge der Felsen, ist überall mit Schutt bedeckt, der aus Bruchstücken den

Such is its strange, and virtuous property
It moves obsequious to the gentlest touch
Of him, whose heart is pure, but to a traitor
Tho' e'en a giants powers nerv'd his arm
It stands as fix'd as Snowdon.

Seht jenen Riesenstein dort oben!
Die Zauberkrast, die Keiner noch erfahrt,
Hat ihn auf schroffen Gipfel hingehoben;
Auf spihem Fels ruht schwebend seine Last.
Er scheint uns fest, wenn man ihn so erblicket;
Doch birgt er selbne, große Wundermacht:
Berührt den Stein, wen Dergensunschuld schmückt,
Bewegt er folglos sich, eh' man's gedacht.
Doch wenn des Freylers schuld'ge Hand es waget
Zu messen seine Kraft, so wankt er nicht;
Des Riesenarmes spottet er und raget
Wie Snowdon fest, im ew'gen Gleichgewicht.

*) Eine englische Tonne = 20 englische Sentner, = 1015,040 Kilogramme.

höher anstehenden Gesteine besteht, welche durch Verwitterung abgetrennt, und dann durch eigene Schwere, durch Regen, Schnee, Lawinen herabgeführt werden. In größeren Gebirgen ziehen häufig große Schutthalben an den Gehängen herab, oder in Schluchten und Dobeln. Sie haben in der Regel die Form eines Kegels, dessen Spitze der Anfangspunct der Halbe ist, und gegen welche hin die Bruchstücke immer kleiner werden.

Nicht selten lösen sich im Hochgebirge, namentlich im Frühjahr, ganz große Felsmassen ab, die mit fürchterlicher Gewalt in die Tiefe fallen, sich im Sturze zertrümmern und auf alles zerstörend wirken, was sich ihnen entgegen stellt. Die Wirkungen solcher Felsenstürze kann man sehr schön im Thal von Bevers, unsern Samaden, im oberen Engadin sehen, wo vor einigen Jahren Felsmassen vom Albula-Granit durch das bewaldete Gehänge des Bevers-Thales herabgestürzt sind. Man sieht hier starke Stämme, in 15—20 Fuß Höhe über dem Boden, geradezu abgesprengt, beynahe alle entgipfelt und entastet, viele oblig umgeworfen; eine entseßliche Zerstörung, so weit hin die Felsentrümmer im Sturze den Wald durchgebrochen haben. Sehenswerth ist auch der Felsensturz bey St. Marco, unsern Roveredo, im unteren Eschthal, unter dem Namen Lavini di St. Marco in der Gegend bekannt, und von Dante geschildert. Das Thal und seine Gehänge sind bis Scravalle herab mit Felsentrümmern übersäthet.

Werden Gesteine von Wasser durchweicht und aufgelockert, so lösen sich bey aufgerichteter Stellung der Schichten bisweilen ganz große Massen davon ab, und es erfolgen auf diese Art Bergfälle, Bergstürze. Dieß tritt namentlich dann ein, wenn das Gestein von thoniger oder mergeliger Beschaffenheit, oder wenn ein festeres Gestein auf einem thonigen aufgelagert ist, das durch eine größere Menge Wasser erweicht wird. Ein solcher Fall ereignete sich 1806 am Ruffberg in der Schweiz, dem Rigi gegenüber, wo von der auf einer Thonlage ruhenden Nagelfluhmasse des Berges, dessen Schichten unter einem starken Winkel gegen das Thal geneigt sind, am 2. September, nach einem heftigen Regen, um 5 Uhr Abends, der größte Theil herabstürzte, Goldau, Bußingen, Ober- und Unterröthen und Lowerg

verschüttete, und einige andere nahe gelegene Dörfer mehr oder weniger beschädigte. Die Stein- und Schuttmasse wurde durch den Fall bis in den kleinen See von Lowertz getrieben, und machte dessen Wasser 60—70 Fuß hoch steigen, so daß der am entgegengesetzten Ende gelegene Ort Seven von den stürmenden Wellen überschwemmt und hart bedrängt wurde.

Wo weiche, schieferige Gebirgsmassen dem zerstörenden Einfluß der Atmosphäre ausgesetzt sind, da werden immer große Trümmernmassen gebildet. Im Hochgebirge entstehen, unter solchen Umständen, nach und nach ungeheure Schutthalben, die sich bey steilem Gehänge der Berge öfters ablösen und in den tieferen Theil der Thäler herabrutschen. Solche Abrutschungen von Schuttmassen, die sich öfters weit in die Thäler hinauschieben, nennt man Bergschlipfe. Sie verursachen öfters große Verheerungen, zumal wenn sie Flußbette auffüllen und verstopfen, wo nachher, beym Durchbruch der Gewässer, ganze Landschaften mit Schutt überdeckt werden. Durch solche Bergschlipfe wurden die Thäler Domleschg und Prettigau in Graubünden mit unfruchtbaren Trümmern überschüttet.

Nach der Beschreibung von Escher lag die Ursache des Bergschliffes im Rolla-Thal bey Thufis, wodurch 1820 das Domleschger-Thal verwüstet worden ist, in ungeheuren Schutthalben eines thonigen und mergeligen Gesteins, das den Hintergrund des Thales bildet, und die darüber aufsteigenden Höhen bey Ober-Septina. Zusammenhängende Schuttmassen hatten vor diesem Ereigniß den Hintergrund des Rolla-Thales bogenförmig ausgefüllt, und sich, mit Wiesen und Wald bekleidet, weit an den Gehängen in die Höhe gezogen. Durch von oben her einsickernde Wasser, und durch Regen und Schnee allmählich durchwässert und aufgeweicht, glitschten gewaltige Massen davon herab, erfüllten das Bett der Rolla, stauten ihre Wasser auf, bis sie endlich durchbrachen, wobey die ungeheure Schuttmasse in das Bett des Hinterrheins getrieben und dort zu einem 40 Fuß hohen Damm aufgeschüttet wurde, welcher den Lauf des Rheins unterbrach. Sein Bett lag im Domleschg-Thal nun trocken, während das Rheinwasser hinter dem Damm zu einem langen See aufgeschwellt wurde.

Der Schuttschamm brach endlich durch, aber glücklicherweise nur ganz allmählich, so daß die angeschwollene Wassermasse Zeit zum ruhigen Abfluß fand. Der Kolla-Schutt wurde dabey längs dem linken Rheinufer hinabgetrieben und im erweiterten Rheinbett allmählig abgesetzt. Dadurch wurden aber die Wasser nach Elz herüber gedrängt, welches sich dabey in wenig Stunden alles seiner schönen und fruchtbaren niederen Fluren beraubt sah.

Durch diesen Bergschlupf ist die zusammenhängende und von Vegetation bekleidete Schuttmasse im Hintergrund des Kolla-Thales zerrissen und entblößt worden. Die fahlen Schuttmassen saugen nun alles Wasser ein, das ihnen aus der Atmosphäre und den höheren Gefirgsteilen zugeführt wird, werden immer mehr durchwässert und erweicht, so daß bey starken Regengüssen, schnellen Schneeschmelzen, Lawinen, früher oder später wieder gewaltige Schuttmassen in das Bett der Kolla herabglitschen werden. Nach dem regnerischen Sommer 1816 löste sich von der Spitze des basaltischen Hohen Höwen im Hagan ein großes Stück des an feinen Conglomerat-Mantel angelehnten mergeligen Stüchwassergebildes ab, und rutschte, sammt den darauf stehenden Bäumen und Sträuchern, tief herunter an den Fuß des Berges. Dabey wurde eine tiefe Schlucht in die conglomeratische Spitze des Berges eingerissen, und dieser bis auf seinen basaltischen Kern entblößt. Ähnliche Schlupfe hat man schon an vielen Orten beobachtet, wo thonige und mergelige Massen, bey starker Schichtenneigung, oder bey steiler Aufsehnung, von Wassern durchdringt und aufgeweicht worden sind.

Ackererde.

Bey der Verwitterung und Zerstörung der verschiedenartigen Gesteine wird endlich jene lockere, erdige Masse gebildet, welche von allen geognostischen Gebilden das oberste, allverbreitet und mit dem Namen Ackererde belegt ist. Es ist der Standort wildwachsender und cultivirter Pflanzen, und wird auch Ackerfrume, Ackerboden oder schlechweg Boden genannt. Der Landwirth unterscheidet die oberste Lage, welche er bey seinen Culturen umarbeitet, mit dem Namen Ackerfrume, und nennt die tieferen Schichten Untergrund. Diese Ackerfrume

enthält außer den mineralischen Stoffen, welche bey ihrer näheren Beschreibung, S. 536, aufgeführt sind, noch organische Reste, welche durch den Dänger und durch absterbende Pflanzen in sie gelangen, so wie Humusäure, humusfaure Salze, Humuskohle und Wachsharz, die man zusammen unter dem Namen Humus begreift.

Nach der Beschaffenheit des Gesteins, aus welchem durch Verwitterung die Ackererde entsteht, ist ihre Zusammensetzung mehr oder weniger verschieden, und sie wird auch durch den Einfluß strömender Gewässer, des Regens, des Düngers, der Pflanzung so verändert, daß ihre Bestandtheile häufig nicht genau den chemischen Constitution des Gesteins entsprechen, aus welchem sie ursprünglich hervorgegangen ist. In Gebirgsgegenden, an den Ufern der Flüsse, ist sie daher immer von mannichartiger Beschaffenheit. Ihre Fruchtbarkeit ist in der Regel größer in Vertiefungen als auf Höhen, weil das Wasser Salze, Thon, Humus von diesen herab in jene führt.

Torfmoore.

Wo in tiefen- und fesselförmigen Vertiefungen sich stehendes Wasser aufhalten, da stellen sich im gemäßigten Europa in der Regel bald Sumpfmooße und Algen ein, deren zarte Theile sich nach ihrem Absterben zersetzen und in dem Wasser zum Theil suspendiert bleiben, zum Theil aufgelöst werden, während ein anderer Theil davon zu Boden sinkt. Das Wasser wird nach und nach gelb und braun. Eine Pflanzengeneration erlischt nach der andern, durch die Ueberreste der früheren im Wachsthum begünstigt, und mit der Zeit wird das ganze Wasser von ihren mehr oder weniger zersetzten Theilen erfüllt. Haben die feinsten und feinstblättrigen Pflanzen den Anfang gemacht, und so den stärkeren gleichsam den Boden vorbereitet, so entstehen auch diese, entwickeln sich reichlich und es erscheint nun eine ausgezeichnete Sumpfvegetation. Vaccinien (*Vaccinia*), Niedgräser (*Carex*), Rinsen (*Scirp*), Simsen (*Junc*), Schilfrohr (*Arundo*), Bollgras (*Eriophorum*), Fegelsnospe (*Sparganium*) und viele andere bedecken nach und nach die ganze Oberfläche. Das flüssige

Wasser wird immer mehr und mehr durch die ihm jährlich in reichlichem Maasse zufallenden und sich darin zersehnenden Pflanzenreste gebunden, aufgesogen, und das Ganze bildet endlich ein beerartiges Moor, das fortwährend consistenter wird, an Festigkeit zunimmt, so daß sich endlich auch Sträucher und Bäume darauf ansiedeln. Auf diese Weise werden der Masse auch Holzreste eingemengt, und sie geht in einer Reihe von Jahren in Torf über. Diese, unter den gegenwärtigen Verhältnissen fortgehende Torfbildung, kann man häufig beobachten, und sie wird auch durch in Torfmooren gemachte Auffindungen von Baumstämmen mit unverkennbaren Anstößen, von Kunstproducten und selbst von Menschen mit erhaltenen Bekleidungen, außer allen Zweifel gesetzt. Nicht selten findet man auch in der Torfmasse heut zu Tage noch lebende Süßwassermuscheln, Lymneen, Planorbien, Paludinen, Cyclostomen.

Sehr oft liegen in den Torfmooren Baumstämme, am häufigsten von Eichen, Fichten, Erlen und Weiden. Die Stämme sind mitunter plattgedrückt, brennen nach dem Trocknen öfters noch leicht und hell, und können, wie in Pommern und Ostpreußen, fein gespalten zu Lichtspähnen verwendet werden. Seltener findet man Knochen von Ochsen, Hirschen, Pferden, Rehen, Schafen u. d. a., auch Reste von Schildkröten. Einige der im Torfe aufgefundenen Thiergattungen leben heute nicht mehr, wie z. B. der große Ochs (*Bos priscus*), der im Torfmoor der badischen Saline Dürkheim gefunden worden ist, so wie das riesenhafte Eleuthier, das man in irischen Torfmooren gefunden hat (*Corvus giganteus*). Doch scheint dieses noch mit dem Menschen gelebt zu haben, da man in Lancashire Knochen davon in Torfmooren fand, worin auch roh gearbeitete Boote entdeckt wurden. Im Rheinthale sieht man aber Reste dieses Thiers auch in derselben Gebirgsbildung (Eß), worin Reste von Elephanten liegen, die in Europa bekanntlich nicht mehr leben. Das Riesen-Elenn hat also die Catastrophe überlebt, bey welcher die Elephanten in Europa vertilgt worden sind. Einige von den Thieren, deren Knochen im Torfe liegen, leben zwar heute noch, aber nicht mehr an den Orten, wo man ihre Reste findet; so die Schildkröten, die im Torfe von Dürkheim auf dem Schwarz-

waß vorkommen, der Auerods, dessen Gebeine in den schônischen Torfmooren begraben sind.

Ofters kommt blaue Eisenerde an einzelnen Stellen, und meist als pulveriger Anflug, in Torfmooren vor, und hin und wieder Binarties und Eisenvitriol, und zwar in solcher Menge, daß man den Torf Vitrioltorf nennen und auf Vitriol benützen kann. Ein solcher Vitrioltorf kommt zu Ramnig und Schmeltzsdorf bey Reisse in Schlesiën vor, und wird dort von zwey Vitriolhätten benutzt.

Welches wichtige Brennmaterial der Torf ist, und wie man ihn als solches allgemein schätzt, ist bekannt. Bey einer vollständigen Torfwirthschaft kann man des Nachwachsens, oder der fortschreitenden Bildung des Torfes, ganz gewiß seyn, wie es das Alt-Warmbrücher Torfmoor bey Hannover bestätigt, das gegenwärtig zum zweytenmale abgestochen wird, so wie die Moore in der Bodensee-Gegend, in welchen seit 24 Jahren sich eine neue Torfmasse von 3—4 Fuß gebildet hat. Abgestochene Torfmoore können ferner auch in nützbringende Erdenbestände umgewandelt werden. Mit Kalkmergel untermengter Torf verwandelt sich bey längerem Liegen und öfterem Umwenden auch in einen guten Dünger.

Durch starken anhaltenden Regen schwellen die Torfmoore bisweilen stark auf, wie ein Schwamm; werden durch die Wasser mitunter blasenartig in die Höhe gehoben, und es ereignen sich dabey, wenn die Blase berstet, und in Folge der oft sehr starken Gasentwicklung, welche die Gährung der vegetabilischen Masse begleitet, Ausbrüche der Moore, wodurch große Schlammmassen in Strömen ausgegossen werden, die weithin verwüstend wirken. Solche zerstörende Moorausbrüche haben sich schon öfters in Irland ereignet. Wir haben in neuester Zeit aus Lulamoore im Jahr 1821 Nachricht von einem Ausbruch erhalten, der im Juny desselben Jahres, innerhalb $\frac{1}{4}$ Stunde 200 Acres Landes verwüstete; im Jahr 1836 von einem Bruch eines Theils des großen Sloggen-Moores, des beträchtlichsten im nördlichen Irland, wobey ein Schlammstrom sich verwüstend eine Meile weit, bis in das Bett des Mainesflusses wälzte, durch dessen Wasser er endlich fortgerissen wurde.

Die Unterlage der Torfmoore besteht in der Regel aus einer wasserdichten Thonmasse, oder aus einem geschlossenen, festen Gesteine, das die Wasser hält. Die günstigen Bedingungen der Torfbildung finden sich besonders in den Niederungen und haben sich von jeher da gefunden, wo in Flußthälern, um Seen, Beriesamplungen eingetreten sind. Man trifft deshalb auch die Torfmoore vorzüglich in großen Flußthälern, und überhaupt in Niederungen, wie z. B. in den großen norddeutschen Niederungen von Holland bis gegen Preußen hin, in den baltischen Ländern, in den Niederungen und breiten Thälern von Irland u. s. w. An vielen Orten sieht man aber auch Torfmoore auf Höhen liegen, and mitunter auf beträchtlichen, da nemlich, wo bey der Verwitterung der Gesteine auf Hochflächen, Terrassen, thonige Lagen entstehen, welche die Wasser halten. So ist es der Fall auf den Gebirgen von Schottland, auf dem Harz, im Erzgebirge, auf dem hohen Venn im rheinischen Schiefergebirge, in den Vogesen und im Schwarzwalde, in welchem letzterem Gebirge viele Moore in einer Höhe zwischen 3000 und 4000 Fuß liegen.

Untermeerische Wälder.

An mehreren Punkten der Erdoberfläche, namentlich an den Küste von England, Schottland und Frankreich, liegen mit Torf vermengte Ansammlungen von Holzstämmen und anderen vegetabilischen Resten, in Lagen, die sich unter dem gegenwärtigen Wasserstande der Meeresfluth befinden. Diese Anhäufungen werden daher zur Ebbezelt, oder beym Angriff des Strandes durch die Wellen, entblößt. Man hat sie, ihrer Lage und Zusammensetzung wegen, untermoertische Wälder genannt. Die Baumstämme sind mit den jetzt noch wachsenden völlig identisch, können aber nicht an diesen Stellen bey einem Meeresstande gewachsen seyn, der mit dem heutigen übereinstimmt. Die Bäume wuchsen auf einem trockenen, vom Meere nicht bedeckten Boden, der sich entweder später gesenkt hat, oder welcher in Folge eines späteren Steigens des Meeresniveaus gegenwärtig überfluthet wird.

Die Stämme liegen öfters mit ihren Gipfeln alle nach einerley Weltgegend gerichtet, ihre Lagen haben das Ansehen von Windbrüchen, und es ist nicht zu zweifeln, daß die Bäume, von

bären die Stämme, durch Stürme niedergeworfen worden sind. Neuere Ereignisse bestätigen diese Annahme. In der Mitte des sebzehnten Jahrhunderts wurde unweit Lochbroom in Schottland, ein Wald durch einen Ozean umgeworfen. Fünfzig Jahre später stellte er schon eine mit Stämmen untermengte Lorinsasse dar. Ein Wald bey Drumsanrig, der im Jahr 1756 durch einen Ozean niedergeworfen wurde, ist ebenfalls nunmehr ein mit Baumstämmen erfülltes Lorinsbor. Birken, Fichten, Eichen, Erlen, lassen sich in diesen Ablagerungen deutlich erkennen, und oft sind die Wurzeln noch ganz in ihrer natürlichen Stellung, die Stämme dagegen wie umgefallen.

Ausgedehnte solche untermeerische Wälder liegen an der Westküste von England, in den Niederungen zwischen dem Mersey und Dee flusse in Cheshire, an den Küsten von Schottland im Firth of Forth, an der Südwestküste von Cornwall, in der Mount's bay bey Penzance und auf Mainland in den Orkney Inseln.

Obgleich diese Anhäufungen von Baumstämmen selbst zur Zeit der Erde unter dem Meerespiegel, so müssen wir annehmen, daß seit ihrer Bildung eine Niveauveränderung zwischen der See und dem Lande und ein Sinken des Landes stattgefunden habe. Er scheint ihre Lage aber nur zur Fluthzeit tiefer als der Meerespiegel, so können sie in Folge von Anschwellungen und Dünenaufbildungen entstanden seyn, und man braucht weder ein Sinken des Landes noch ein Steigen des Meeres zur Erklärung ihrer Lage anzunehmen, Da sich, wie wir wissen, hinter Sandablagerungen und Dünen an den Küsten häufig stagnierende süße Wasser bilden, in welchen sich eine Sumpfbegetation einstellt, welche nach und nach die Wasserbeden ausfüllt und zur Bildung von Torf oder sogenannten untermeerischen Wäldungen das Material liefert.

2) Eisenkieseisenstein.

An vielen Orten kommen Eisenerze im Torfe vor. Sie gehören zu dem G. 362 beschriebenen Geschlechte Eisenkieselstein, dessen Bildung ununterbrochen fortgeht. Bey der Zersetzung organischer Substanzen die eisenhaltig sind, oder mit

eisensfährenden Körpern in Berührung stehen, werden immer Verbindungen der entstandenen Humus-, der Quells- und der Quellsäure mit Eisenoxyd gebildet, welche sich als Rost ausscheiden, nach und nach erhärten und auf diese Weise die verschiedenen Abänderungen von Raseneisenstein darstellen, die unter den Namen von Sumpf-, Wiesen- und Morast-Erz bekannt sind. Auch der Phosphorsäuregehalt der organischen Substanzen wird vom Eisen gebunden, und es enthielten die Raseneisensteine deshalb immer auch einige Procente Phosphorsäure. Auf diese Art erklärt sich das häufige Vorkommen dieses Eisensteins in Torfmooren, Märrästen, stehenden Wassern, wie z. B. auf dem Grunde vieler kleinen schwedischen Seen, so wie in Niederungen, wie in der Lausitz, im Mäntzschischen und Lingenischen; woselbst die Raseneisensteine Ablagerungen, in nächster Beziehung zum Torf, stehen und selbst mit ihm wechselagern. Auf eine ähnliche Weise mögen diese Erze, früher in anderen Niederungen entstanden, sein, wo gegenwärtig keine Torfbildung, oder keine Zersetzung größerer Massen organischer Substanzen mehr vor sich geht, wo aber die ganze Beschaffenheit des Bodens und der Erze auf ähnliche Ursprung hindeutet. Es ist der Raseneisenstein, welchen auf dem Gange des nördlichen Karbolans in außerordentlichem Ueberschusse abgelagert ist und in einem eisenhaltigen Sande liegt, nach K. u. H. z. g. Beobachtungen voll vegetabilischer Reste, die zum Theil unzerstört, zum Theil in Erz umgewandelt sind.

Man benutzt den Raseneisenstein zum Eisenschmelzen, er hält aber, wegen seines Phosphorsäuregehaltes, aus ihm gewöhnlich ein schlechtes, kaltbrüchiges Eisen. Auffallend genug, daß die Arbeiter, welche, nach K. u. H. z. g. Bericht, das Erz im Karbolan auf die allerroheste Weise, in kleinen Sandgruben mit Holzkohlen, unter Anwendung eines sehr dünnen Blaseblasses, auszumachen, daraus ein sehr gutes, geschmeidiges Stahlisen bereiten.

Von der beschriebenen Bildung des Raseneisensteins ist eine andere, noch fortwährende, von A. Lindler beobachtete Bildung von Eisenerz, eine Art Bohnererz, Bildung aus weissen Kieseln, wo Nadelhäuser auf eisenhaltigem Sandboden wachsen, da stehen die Wurzeln, indem durch den Vegetationsprozeß ein

eigenthümliche Säure aus ihnen in den Boden übergeht, die Eisentheile aus dem Sande aus. Das Wasser führt die Eisenslösung an tiefere Punkte herab, und setzt an der Luft, und wenn es über Moose rieselt, eine große Menge eines gelatinösen Eisensorgschlammes ab, der, wenn die Quellen durch Regen anschwellen, weggespült und in den benachbarten Niederungen als eine Schlamm-
schichte abgesetzt wird. Versiegen die Moose, so trocknet sie aus, sie trennt sich in ungleich große Stücke, deren Ränder sich bey stärkerer Austrocknung heben, und es bilden sich hohle Scheiben, deren nasser Mittelpunkt noch am Boden verbleibt. Der erste kräftige Windstoß reißt diese Scheiben los, rollt sie über den Boden weg, und es entsteht so eine hohle Kugel, eine Art Bohnerze, das vom Winde verweht wird. Der Hauptunterschied bey der Bildung des Raseneisensteins und dieser Bohnerze scheint also nur darin zu liegen, daß bey jenen keine solche Austrocknung stattfindet.

Allmähliche Erhöhung des Bodens.

Die betrachtete, ganz eigenthümliche Bildung des Torfes trägt fortwährend zur allmählichen Erhöhung des Bodens bey. Die vielen Fälle der Auffindung von Werken menschlichen Kunstfleißes in verschiedenen Tiefen des Moore, beweisen dieses un-
widersprechlich, und ein recht auffallendes Beispiel einer sich weit erstreckenden Bodenerhöhung, in Folge des Fortwachsens der Torfmasse, ergab sich im Jahr 1818, als man in den Niederlanden in der Landschaft Drenthe, unter einer bis vier Meter hohen Torfschicht eine Holzstraße von vier Meter Breite auf eine Länge von 15,000 Meter (zwey geogr. Meilen) fand.

Ganz besonders wirkt auch die Menschenhand auf Erhöhung des Bodens hin, und ganz auffallend da, wo viele Menschen beisammen wohnen. Fortwährend bearbeitet der Mensch in der Nähe seiner Wohnungen den Boden, und der Ackerbau und alle Arten von Baulichkeiten erhöhen denselben beständig, und so werden die Hüfen und der Boden aller Städte und Dörfer immerfort erhöht. Davon findet man unzählige und recht in die Augen fallende Beweise an alten, seit uralten Zeiten von großen Menschenmassen bewohnt gemessenen Orten. So findet sich in

einem großen Theil der Ebenen von Morea, am Fuße von Anhöhen, eine regelmäßige Schicht abgelagert, die aus einem Gemengsel von Ziegeln, Backsteinen, Töpferwaaren, allerley Werken der Menschenhand, besteht, und mit Ackererde und durch Wasser zusammengeschwemmtem Boden untermischt ist. Dieses Gebilde, welches H. Bobblay beschrieb, der die französische Morea-Expedition als Geologe mitmachte, erhielt den Namen *Keramische Bildung*, vom griechischen Worte *Koramos*, das Töpfererde und Töpfergeschirr bezeichnet.

In der Gegend des alten Roms sind viele vordem gepflasterte Stellen nunmehr mit einer Erdlage bedeckt. Der *Campo Vaccino* ist hoch mit Erde bedeckt; die *Via Appia* trägt Anhöhen über sich. Die *Via Flaminia* fand man zwischen *Otricoli* und *Castel nuovo* auf eine Länge von 3 Meilen tief unter der Erde. In *Bologna* findet man mehrere alte Straßenpflaster lagenweise über einander, unter dem heutigen; zu *Warschau* fand man im Jahr 1821 beym Fundamentgraben, in einer Tiefe von mehr als 6 Fuß, ein Backsteinpflaster und mehrere Wästen und Stützen; in Nordamerika in *Virginien*, 20 Fuß unter der Oberfläche, eine eiserne Art; unweit *Philadelphia*, auf dem *Red*, 19 Fuß tief, ein altes Schwert, und in einem Hause zu *Cincinnati* am *Ohio* ließ ein Hausbesitzer auf einer Anhöhe einen Brunnen graben, wobei er in 60 Fuß Tiefe einen Baumstamm mit Ästchen, neben welchem die abgehauenen Splitter lagen, fand.

Alle diese Beispiele, denen wir leicht noch viele andere beysügen könnten, sprechen deutlich für eine allmähliche Erhöhung des Bodens auf dem trockenen Lande, ohne alle Anschwemmungen durch Meer und Flüsse.

Bildung der Gerölle und Fortschaffung derselben durch strömendes Wasser.

Gelangen Bruchstücke von Gesteinen, eckige Geschiebe, Trümmer, die bey dem Vorgange der Verwitterung und Zerstückung der Felsen aus größeren Massen entstehen, in den Rinnal der Bäche und Flüsse, so werden sie von dem strömenden Wasser fortbewegt, durch Reibung abgerundet und auf diese Weise in

Gerölle umgewandelt. Je größer das Gefälle und die Wassermasse, je gewaltiger die Strömung ist, um so größere Blöcke wälzt sie fort, und desto zahlreicher und verschiedener nach Gestalt und Größe sind auch die Bruchstücke, welche fortgerollt werden. Alles was sich aber der Bewegung der Wassermasse hindernd entgegenstellt, was ihre Strömung schwächt, die Schnelligkeit ihres Laufes vermindert, als: vorspringende Felsen, geringere Neigung des Rinnsals, Verbreiterung desselben, Einfließen des Wassers in Seen, in das Meer, bewirkt eine Ablagerung der Gerölle. Das langsamer fließende oder ganz zur Ruhe gekommene Wasser läßt die schwereren fremden Theile fallen, die es bis dahin fortgeschafft hatte. Während dieses Transports werden die Bruchstücke selbst durch Stoß und Reibung noch fortwährend verkleinert und mehr und mehr abgerundet. Mit Bezug auf dieses Verhältniß hat man den Geröllmassen, welche das Wasser fortbewegt und absetzt, auch den Namen Detritus gegeben, abgeleitet vom lateinischen Worte *Detritum*, was einen durch mechanische Kräfte abgeriebenen Körper bezeichnet.

Bekanntlich ist die Geschwindigkeit eines Wasserstroms in seiner Mitte immer am stärksten. Sie vermindert sich gegen die Seiten und ist an den Ufern am geringsten. Hier sehen sich demzufolge auch die meisten Gerölle ab. Da der Absatz nach dem Verhältniß ihrer Schwere erfolgt, so sind die Gerölle im Allgemeinen immer größer und größerer, je weiter man stromaufwärts geht, wo die Strömung stärker ist, und je näher man ihrer ursprünglichen Lagerstätte kommt. Nimmt die Schnelligkeit des Wassers ab, so fallen natürlich die größeren Blöcke, die größeren Stücke sogleich nieder, und es werden nur die kleineren, feineren Theile, kleine Gerölle, Sand und Thon fortgerissen.

Inselbildung in den Flußbetten.

Wird die Schnelligkeit eines mit Detritus beladenen Stromes an einer Stelle seines Bettes stark vermindert, so setzt sich, dem angeführten zufolge, da sogleich eine starke Geröllmasse ab. Ragt diese nun bey niederem Wasserstande über die Fläche des Wassers hervor, so erscheint sie als Insel. Diese Inselbildung zeigt sich gar schön bey dem Rheinstrom, in seinem Mittellauf zwischen

Basel und Mannheim. Von seinem Ausfluß aus dem Becken des Bodensees bis herab nach Basel ist der Rhein zwischen steilen felsigen Ufern und Gebirgen eingeschlossen. Seine Geschwindigkeit ist in dieser Strecke sehr groß, und wird noch durch die Wasserfälle von Schaffhausen und Laufenburg vermehrt. Die Schweizerflüsse und die reißenden Bäche des Schwarzwaldes führen ihm bey hohem Wasserstande auf dieser Strecke große Massen von Geröllen zu. Bey Basel, bis wohin der Strom in schmalem Bette eingeschlossen westlich geflossen war, wendet er sich schnell nach Norden, tritt in das weite Thal zwischen Schwarzwald und Vogesen ein, breitet sich aus und verliert an Gefälle. Nun lagern sich sogleich Gerölle ab. Wo das Wasser nun durch irgend eine Ursache, namentlich durch Krümmungen, an Geschwindigkeit verliert, da erhöht sich durch Geröllabfaß das Bett, und hat sich die Geröllmasse einmal bis nahe unter den hohen Wasserspiegel angehäuft, so wird die Geschwindigkeit des Wassers über derselben wieder bedeutend vermindert, und es fallen an dieser Steile nun auch feitere Theile aus dem Wasser nieder, Sand, und wenn endlich die Masse sich dadurch bis beynähe zum Wasserspiegel erhoben, das Wasser über derselben eine sehr kleine Geschwindigkeit hat, so setzt sich auch feiner Thon und Schlamm ab. Die Grundlage der Rheininseln wird immer durch eine Geröllmasse gebildet, die eine wahre Musterkarte von Gesteinen der Alpen, des Schwarzwaldes und der Vogesen ist, und worunter häufig Kalksteine von Bergcrystall liegen, die man Rheinkiesel heißt. Darauf folgt Sand, und zu oberst liegen Thon und Schlamm. Beym niederen Wasserstand steht eine solche Ablagerung nun als Insel da. Jetzt werden gewöhnlich zuerst die wolligen Saamen der Weiden benachbarter Inseln oder der Ufer auf ihrer Oberfläche abgesetzt, und bald ist die Insel grün durch eine Bedeckung von jungen Weiden. Jedes große Wasser erhöht die Insel noch mehr, da die Pflanzen nun den Boden vor Angriff schützen, und ihr Wurzelnetz, ihr dichter Stand, sehr viel Schlamm zurückhält. Es sprossen Schilfrohr, Schafröhren, Tamariske, Seekreuzborn auf, und in dem dichten Gesträube häuft sich, so lange das hohe Wasser noch über die Insel weggeht, immer Thon und Schlamm, so wie Erde, die

von Ufer abgepflückt wurde, und Pflanzenreste, die auf der Oberfläche daherschwimmen. Endlich wird die Insel mir noch bey den höchsten, ungewöhnlichen Wasserständen überfluthet. Erleien und Espen wachsen kräftig in die Höhe, und zuletzt erhebt sich die Silberpappel, der größte Baum der Rheinfelsen, aber das Heil der Weiden und das dicke Duschwert der waldbühnlichen Vegetation.

Stetlich entstehen auf diese Weise neue Inseln, aber immer werden auch wieder ältere, zumal bey sehr hohem Wasserstande, angegriffen, je nachdem die Richtung des Stromes, oftmals gerade in Folge der Bildung einer neuen Ablagerung, sich ändert, und dabey werden sie theilweise oder auch ganz wieder fortgerissen. Dadurch wird denn auch das Fahrwasser auf dieser Rheinstraße, der sogenannte Thalweg, vielfach verändert; bald läuft er in der Mitte, bald wird er gegen das rechte, bald gegen das linke Ufer geworfen. Dieß nöthigt die Uferstaaten zu ununterbrochenen Bauten und macht die Schifffahrt beschwerlich.

Annagung und Ausreibung der Felsen durch fließendes Wasser, das mit Detritus beladen ist.

Die annagende Kraft des Wassers wird noch bedeutend vermehrt, wenn der Wasserstrom mit Detritus beladen ist, weil alsdann noch eine sehr starke Reibung stattfindet. Dadurch werden Spalten ausgehöhlt und erweitert, durch welche die Strömung geräuschloser Wasser geht, und so werden schluchtartige Höhlen ausgewaschen, von derjenigen Beschaffenheit, die S. 364 näher bezeichnet worden ist. Sind die Gesteinsmassen, über welche sich ein solches Wasser fortbewegt, weich, so graben sich selbst kleine Bäche in kurzer Zeit Canäle aus, die bald auf mehrere Fuß vertieft sind. Stürzt sich ein schuttbeladenes Wasser auf horizontale oder schwachgeneigte Gesteinsplatten, so gräbt es sich in denselben bald eine beckenförmige Vertiefung aus, worin einige größere Gerölle liegen bleiben, welche durch das einfallende Wasser fortwährend im Kreise herumgetrieben werden, und dabey das Becken immer tiefer und weiter ausreiben. Auf diese Weise werden verticale Cylinder ausgehöhlt, die wie ausgebohrt aussehen, 3—4 Fuß Durchmesser und öfters eine Tiefe von mehreren

Die Unterlage der Torfmoore besteht in der Regel aus einer wasserbichten Thonmasse, oder aus einem geschlossenen, festen Gesteine, das die Wasser hält. Die günstigen Bedingungen der Torfbildung finden sich besonders in den Niederungen und haben sich von jeher da gefunden, wo in Flußthälern, um Seen, Berieselungen eingetreten sind. Man trifft deßhalb auch die Torfmoore vorzüglich in großen Flußthälern, und überhaupt in Niederungen, wie z. B. in den großen norddeutschen Niederungen von Holland bis gegen Preußen hin, in den baltischen Ländern, in den Niederungen und breiten Thälern von Irland u. s. w. An vielen Orten sieht man aber auch Torfmoore auf Höhen liegen, and mitunter auf beträchtlichen, da nemlich, wo bey der Verwitterung der Gesteine auf Hochflächen, Terrassen, thonige Lagen entstehen, welche die Wasser halten. So ist es der Fall auf den Gebirgen von Schottland, auf dem Harz, im Erzgebirge, auf dem hohen Venn im rheinischen Schiefergebirge, in den Vogesen und im Schwarzwalde, in welchem letzterem Gebirge viele Moore in einer Höhe zwischen 3000 und 4000 Fuß liegen.

Untermeerische Wälder.

An mehreren Puncten der Erdoberfläche, namentlich an der Küste von England, Schottland und Frankreich, liegen mit Torf vermengte Ansammlungen von Holzstämmen und anderen vegetabilischen Resten, in Lagen, die sich unter dem gegenwärtigen Wasserstande der Meeresfluth befinden. Diese Anhäufungen werden daher zur Ebbezeit, oder beym Angriff des Strandes durch die Wellen, entblößt. Man hat sie, ihrer Lage und Zusammensetzung wegen, untermeerische Wälder genannt. Die Baumstämme sind mit den jetzt noch wachsenden völlig identisch, können aber nicht an diesen Stellen bey einem Meeresstande gewachsen seyn, der mit dem heutigen übereinstimmt. Die Bäume wuchsen auf einem trockenen, vom Meere nicht bedeckten Boden, der sich entweder später gesenkt hat, oder welcher in Folge eines späteren Steigens des Meeresniveaus gegenwärtig überfluthet wird.

Die Stämme liegen öfters mit ihren Gipfeln alle nach einerley Weltgegend gerichtet, ihre Lagen haben das Ansehen von Windbrüchen, und es ist nicht zu zweifeln, daß die Bäume, von

weiter rückwärts: etc., und steigt die Spalte immer weiter herauf gegen den Erie-See. Genaue Beobachtungen beweisen, daß der Fall in den letzten 40 Jahren volle 50 Yards (45,7 M.) rückwärts gegangen ist. Von seinem jetzigen Stande bis zum Erie-See sind es noch 35 englische Meilen. Wenn nun dieses Rückwärtsgehen des Niagara gleichmäßig auch in der Folge stattfindet, wie in den 40 letzten Jahren, so erreicht der Fall den Erie-See in einem Zeitraum von etwa 35,000 Jahren. Dann ziehen seine Wasser durch den bis zu seinem Spiegel rückwärts eingegrabenen Canal völlig ab, und sein Becken wird trocken gelegt, wenn es bis dahin nicht schon ganz mit Schutt ausgefüllt ist, da dieser See eine sehr geringe Tiefe hat (von beyläufig 22 Meter), und ihm alljährlich eine große Menge Detritus zugeführt wird. In Anbetracht dieser Verhältnisse erscheint die in Nordamerica allgemein verbreitete Meynung nicht unbegründet, daß der Fall des Niagara einst unten bey Queenstown war, und er nach und nach eine rückgängige Bewegung bis zu seiner jetzigen Lage gemacht habe.

Ablagerungen von Detritus in Seen und im Meere.

Führt ein mit Schutt, Sand und Thon beladener Fluß oder Bach seine Wasser in einen See, so bildet sich am Einfluß in solche mit stehendem Wasser erfüllte Becken immer eine Ablagerung. Die Gerölle werden zunächst am Einfluß abgesetzt, die trüben, mit den feineren Theilen beladenen Wasser aber weiter in den ruhigen See hineingeführt, die Strömung vermindert sich dabey, hört bald ganz auf, und das trübe, schwerere Wasser sinkt in Wolken nieder und setzt den feineren Sand und Schlamm ab. Je mehr Geschwindigkeit das trübe Wasser dabey hat, desto weiter bringt es in den See vor und um so weiter wird auch noch größerer Detritus geführt. Auf solche Weise wird der Boden erhöht und das Wasser an den Einmündungen der Flüsse und Bäche seicht. Da wo die Hauptströmung hingeht, grabt sie einen Canal in der Ablagerung aus, zu dessen beiden Seiten sich fortwährend Detritus ablagert. Ein gutes Beyspiel dieser Art gibt der Einfluß des Rheins in den

Eilen haben. Diese höchst interessante ausreibende Wirkung anmehrender, mit Schutt beladener Wasser, kann man nicht wohl schöner und großartiger sehen, als in der Schlucht der Savaglia, ganz nahe bey dem gleichnamigen Dorfe, am östlichen Abfall des Bernina, woselbst eine Reihe tief niederagebohrter Cylinder im Felsenbett des Baches steht. Aehnliche Ausreibungen, wobey schüssel- und topfartige Vertiefungen gebildet werden, sieht man in allen Gebirgen, verschieden in Größe und Form, nach Maassgabe der Wassermenge und der Geröllmasse, die fortbewegt wird, und nach dem Verhältniß des Falls, so wie endlich der Zeit, während welcher die Einwirkung stattfindet. Allenthalben, wo ein Wasser über Felsen herabfällt, erfolgt eine derartige Ausreibung. Dabey wird immer der Felsen selbst unterwaschen, über welchen das Wasser herabstürzt, und rückwärts ausgegraben. Doch erfolgt dieß gewöhnlich so allmählich, daß man es während der kurzen Dauer eines Menschenalters nicht beobachtet. Der Niagara-Fall macht indessen hievon eine äußerst belehrende Ausnahme. Dieser Wasserfall wird durch den Abfluß des Wasserüberschusses des Erie-Sees gebildet, und liegt zwischen diesem und dem Ontario-See. Vom oberen Theil dieses Sees erhebt sich ein Plateau a b, Fig. 111. T. II., das bis zum Erie-See c d fortsetzt. Ueber dieses Plateau, das den Damm bildet, der vor dem Erie-See liegt, stürzen die gewaltigen Wasser in die Tiefe, in eine Spalte, die sie sich selbst ausgegraben haben, und die sich in dem Plateau bis an dessen Ende, 7 englische Meilen weit, bis zur Stadt Queenstown hinab, erstreckt, allwo der Fluß in die Niederungen austritt, welche sich bis zum Ontario-See ausdehnen und diesen umgeben. Das erwähnte Tafelland hat eine sehr gleichförmige, geognostische Zusammensetzung. Die oberste Lage besteht aus sandigem Diluvium, darunter liegt ein harter Kalkstein o in wagerechten Schichten, ungefähr 90 englische Fuß mächtig, und unter diesem ein weicher Schiefer f, der durch die Wasser- und Windstöße, die der Fall bewirkt, unaufhörlich angegriffen wird, zerbröckelt und in Schutt g zerfällt. Der restlere Kalkstein wird auf diese Weise unterhöhlt, bildet vorragende Felsenplatten, die ihrer Unterstüßung beraubt, von Zeit zu Zeit mit Donnergetöse einstürzen. Dergestalt grabt sich das Wasser immer

weiter rückwärts etc., und steigt die Spalte immer weiter herauf gegen den Erie-See. Genauere Beobachtungen beweisen, daß der Fall in den letzten 40 Jahren volle 50 Yards (45,7 M.) rückwärts gegangen ist. Von seinem jetzigen Stande bis zum Erie-See sind es noch 25 englische Meilen. Wenn nun dieses Rückwärtsgehen des Niagara gleichmäßig auch in der Folge stattfindet, wie in den 40 letzten Jahren, so erreicht der Fall den Erie-See in einem Zeitraum von etwa 35,000 Jahren. Dann ziehen seine Wasser durch den bis zu seinem Spiegel rückwärts eingegrabenen Canal völlig ab, und sein Becken wird trocken gelegt, wenn es bis dahin nicht schon ganz mit Schutt ausgefüllt ist, da dieser See eine sehr geringe Tiefe hat (von beyläufig 22 Meter), und ihm alljährlich eine große Menge Detritus zugeführt wird. In Anbetracht dieser Verhältnisse erscheint die in Nordamerica allgemein verbreitete Meynung nicht unbegründet, daß der Fall des Niagara einst unten bey Queenstown war, und er nach und nach eine rückgängige Bewegung bis zu seiner jetzigen Lage gemacht habe.

Ablagerungen von Detritus in Seen und im Meere.

Führt ein mit Schutt, Sand und Thon beladener Fluß oder Bach seine Wasser in einen See, so bildet sich am Einfluß in solche mit stehendem Wasser erfüllte Becken immer eine Ablagerung. Die Gerölle werden zunächst am Einfluß abgesetzt, die trüben, mit den feineren Theilen beladenen Wasser aber weiter in den ruhigen See hineingeführt, die Strömung vermindert sich dabey, hört bald ganz auf, und das trübe, schwerere Wasser sinkt in Wolken nieder und setzt den feineren Sand und Schlamm ab. Je mehr Geschwindigkeit das trübe Wasser dabey hat, desto weiter bringt es in den See vor und um so weiter wird auch noch größerer Detritus geführt. Auf solche Weise wird der Boden erhöht und das Wasser an den Einmündungen der Flüsse und Bäche seicht. Da wo die Hauptströmung hingeht, grabt sie einen Canal in der Ablagerung aus, zu dessen beiden Seiten sich fortwährend Detritus ablagert. Ein gutes Beispiel dieser Art gibt der Einfluß des Rheins in den

Bodensee zwischen Rorschach und Lindau, T. Fig. 11. Taf. II.
 Die Geröllmassen sind dort durch die Wasser des Rhodans weit in den See vorgeschoben, bilden Vorsprünge und Erhöhungen, und der Detritus erstreckt sich auch unter dem Wasser weit hinein in den See, als nachweisbare Erhöhung des Bodens, so daß unmittelbar vor der Einmündung des Flusses der Geröllboden nur 9 Fuß unter dem Wasserspiegel liegt, zu beiden Seiten der Schuttanlagerung aber sich schnell in die Tiefe senkt. Weiterhin gegen Bregenz fließt bey Merzerau die Maas in den See, welche schutteladen aus den Gebirgen des Bregenzer Waldes herabfließt, ebenfalls Geröllmassen in den See vorstößt, und dessen Boden erhöht.

Auf eine ähnliche Weise nimmt der Genfersee den Detritus der Rhone auf, der Comersee die Gerölle der Adia, der Lago Maggiore die Schuttmassen des Tessin u.s.w., wobey ihr Boden an den Einflüßpuncten der Gewässer beständig aufgeschüttet und erhöht wird.

Fortschaffung des Detritus ins Meer.

Die Seebeden, in welche sich mit Geröllen beladene Bäche und Flüsse ergießen, setzen der Weiterführung des Detritus Schranken, und werden, da derselbe sich gänzlich in Thon absetzt, davon nach und nach aufgefüllt. Geht die Strömung der Flüsse aber ununterbrochen fort, so wird auch die Detritusmasse fortgeschoben und es finden, wie wir schon gesehen haben, nur an solchen Stellen Ablagerungen statt, wo die Geschwindigkeit der Strömung vermindert ist. Flüsse, welche große Continente, unbewohnte Länderstrecken durchlaufen, wie die Flüsse Amerikas, führen zur Zeit der Schwellungen oder Fluthen, unzählige Quantitäten von Geröllen, Sand, Schlamm und überdies noch Pflanzenteile, ja oft ganz große Massen von Baumstämmen. In dieser Beziehung ist besonders der Mississippi ausgezeichnet. Bekanntlich beträgt der Abstand seiner Quellen, von der Mündung, 320 deutsche Meilen, und der Flächenraum seines Stromgebietes 53,000 deutsche Quadratmeilen. Zahlreiche Nebenflüsse führen ihm ihr Wasser zu. Sein Lauf ist so lang, daß seine ganze Stromentwicklung, mit Einschluß der Krümmungen, 720

deutsche Meilen ausmacht, und die Elimate der Länder, die er durchströmt, sind so verschieden, daß die Fluthen der Nebenflüsse zu sehr verschiedenen Zeiten eintreten, wodurch es geschieht, daß ihm fortwährend Schutt- und Schlamm-Massen, bald durch diesen, bald durch einen andern Nebenfluß zugeführt werden. Sein Gefälle ist schwach; daher die vielen Krümmungen. Zur Fluthzeit werden oft zwischenliegende Landungen durchbrochen, ältere Ablagerungen, Uferstücke und darauf stehende Wälder fortgerissen, neue Ablagerungen gebildet, die später dasselbe Schicksal haben. Eine unermessliche Masse von Geröll, Sand, Thon und Schlamm wird fortgewälzt, und eine große Menge von Baumstämmen wird aus den waldigen Distrikten herabgetrieben. Diese häufen sich an einzelnen Stellen an, und bilden wahre Flüsse, welche die ganze Breite des Flusses einnehmen, mit diesem fallen und steigen. An der Mündung ins Meer hat der Strom ein ungeheures Delta von Thon und Schlamm, mit Pflanzenthellen und Treibholz untermengt, gebildet, das in unzählige Ströme, Seen und Sümpfe getheilt und von Alligatoren bewohnt ist. Die herabgetriebenen Schuttmassen verändern das Fahrwasser beständig, und die während der Anschwellungen herabgefloßten Millionen Baumstübben und Stämme, machen die Schifffahrt zu dieser Zeit gefährlich. Ein 10—20 Meilen breiter Saum von unbewohnbarem Lande umgibt, nach Capitän Hall, die Mündungs-Rüste dieses Stromes.

Ueberall, wo Flüsse sich in Meere ergießen, die keine Fluth und Ebbe haben, oder nur eine schwache, da werden Deltas weit ins Meer hinausgeschoben, wie es die Donau, Wolga, Rhone, der Po und der Nil zeigen. Sie werden selbst da gebildet, wo die Strömungen des Flusses die Fluthen und Wogen des Meeres überwinden, wie am Ganges. Am bekanntesten ist das Nil-Delta, eine unerschöpfliche Kornkammer, schon von den alten Aegyptern als ein Geschenk des Flusses betrachtet.

Auswaschung und Zerstörung der Küsten durch die Wellen, und Bildung von Geschiebebänken, Sandbänken und Dünen.

Wo die Meeresküste hoch ist und aus Felsen besteht, da wird sie von den Wellen angegriffen, die Gesteine werden aus-

gewaschen und nach und nach zerstört. Je steiler die Küste ansteigt und je weicher das sie zusammensetzende Gestein ist, desto sichtbarer erscheint die zerstörende Einwirkung des Meeres. An ausgefachten Küsten schlagen die Wellen bey schweren Stürmen mit solcher Kraft gegen die Felsen, daß sie zu erzittern scheinen. Weichere Gesteine werden dabey schnell zerstört, unterwaschen, ausgehöhlt, und überhängende Massen stürzen seewärts ein. Bey horizontaler Lage der Schichten, bey verticaler Stellung derselben, sind sie der Zerstörung sehr unterworfen, und eben so, wenn sie sich landeinwärts neigen, wobey die vorragenden Köpfe gegen das Meer sehen. Nur wenn die Schichtenneigung seewärts ist, zeigt sich die Einwirkung der Wellen schwach. Seewärts einfallende Schichten eines nur einigermaßen festen Gesteines, wirken schützend gegen den Angriff des Meeres, wie ein Damm.

Auf diese Weise werden die Küsten, je nach der Beschaffenheit des Gesteins, der Stellung seiner Schichten, der Ausdehnung des Meeres vor ihnen, ganz verschiedentlich angegriffen, und darauf beruht denn auch die Gestaltung der Küsten. Aber selbst die allerverfesten Gesteine widerstehen der ausnagenden Kraft der Wellen nicht. Sie höhlen Löcher aus, und zernagen die Felsen auf die wunderlichste Weise. Mitunter werden große Höhlen ausgebohrt, und gerade eine der bekanntesten Höhlen am Meer, die Fingalsöhle auf Staffa, ist durch Einwirkung der Wellen auf die gegliederten Säulen des basaltischen Gesteins gebildet worden.

Die seewärts hereingebrochenen Felsenstücke bleiben theils an dem Fuße der Klippen liegen, namentlich wenn die Stücke groß und sehr hart sind, und schützen alsdann die Küsten gegen den Wellenschlag. Gewöhnlicher aber werden sie sogleich vor der Brandung ergriffen, gerollt, abgerundet, fortwährend zerkleinert und endlich zu Sand zerrieben. Werden die Stücke von der Fluth fortgerissen und gegen flache Küsten getrieben, so werden an denselben Geschiebe- und Sandbänke abgelagert, welche in der Richtung der herrschenden Winde und des vorherrschendsten stärksten Wellenschlages vorrücken. Auch Gerölle und Sand, welche die Flüsse ins Meer führen, werden auf gleiche Weise gegen die flachen Küsten gewieken, und zu gleicher Zeit treibt

das Meer Corallen, Muscheln, Seepflanzen, die auf Untiefen entstehen, gegen das Land. Diese Bänke, welche sich in Ketten vor den niedrigen Küsten hinlegen, schützen das flache Land gegen die Angriffe des Meeres, und modificieren häufig die Beschaffenheit der Küste, da sie an Stellen, wo Flüsse und Bäche einfallen, öfters den Abfluß der Wasser hindern, indem sie sich quer vor die Mündung legen, Barren bilden, den Ausfluß ablenken und nicht selten Versumpfung bewirken, und sind endlich, wenn sie aus Sand bestehen, die Ursache der Verbreitung des Sandes über benachbarte Gegenden.

Die Wellen, welche die Gerölle nicht mehr fortbewegen; werfen doch noch den Sand auf die Küste, und die Wellenspitzen führen ihn beim Sturm leicht außerhalb des gewöhnlichen Wellenbezirks. Er trocknet nun bey niedrigen Fluthen und gutem Wetter durch die Sonnenwärme aus, und wird vom Seewinde landeinwärts geführt und zu kleinen Hügeln aufgehäuft. Solche Sandhügel an den Meeresküsten heißen Dünen. Man findet sie an sandigen Küsten in allen Theilen der Erde. Ihre Längenerstreckung stimmt genau mit der Richtung des gegen die Küste blasenden, herrschenden Seewindes überein, und ihre Gestalt ist gewöhnlich die eines spitzen Dreiecks, dessen Basis der Küste zugekehrt ist, während die Spitze nach dem Innern des Landes steht.

Wird der lockere Sand nicht durch Pflanzen befestiget, so führt ihn der Seewind weiter landeinwärts, und die Dünen schreiten immer weiter vor und verheeren Feld und Wald, Dörfer und Dörfer. Von dieser zerstörenden Versandung durch vorrückende Dünen gibt die Gascogne Beweis. Dort bringt an der Mündung der Garonne und des Adour der Dünenand unwillkürlich vor. Er hat bereits mehrere Dörfer zerstört, die in Jahrhunderten des Mittelalters aufgeführt sind, und ein Sandhügel von 60 Fuß Höhe rückt gegen das kleine Städtchen Mimizan vor, dessen Bewohner schon seit 30 Jahren mit dem gelben Sande kämpfen. Bremon tier hat berechnet, daß an dieser Küste die Dünen jährlich um 60—70 Fuß vorrücken. Nur wo sich die Düne von selbst mit Pflanzen bekleidet, oder wo man sie durch Bepflanzung befestiget, ist man vor der verheerenden Versandung geschützt. Im Bas-Boulonnais werden die Dünen seit den Arbeiten

von Cassini mit *Arundo aronacia* bepflanzt, die darauf recht gut fortkommt und den Sand hindänglich befestigt.

Die furchtbarste Versandung hat bekanntlich ein Theil von Africa erlitten, der die doppelte Größe des mittelländischen Meeres hat. Das Sandmeer Lybiens, die große Wüste, ist dadurch gebildet worden. Von 32° nördlicher Breite bis herab zum 20.° ziehen sich an der Westseite des Welttheils Sandbänke und dürre Flugsandbänke an der kahlen Küste hin. Von dieser aus wird der Sand durch die herrschenden Nord- und Nordwestwinde ununterbrochen ins Innere des flachen Landes getrieben. Stellenweise hat sich, durch das immerwährende Nachrücken des Sandes, die Wüste schon bis zum Niltal ausgedehnt, und an einzelnen Stellen ist sie schon in dasselbe hinabgestiegen. Gipfel alter Städte ragen hier aus dem dürren Sande hervor, und man wandert über Ortschaften, die der Sand der Wüste verschlungen hat. Längst würde ein großer Theil des linken Nilufers aufgehört haben bewohnbar zu seyn, hätte nicht der Niltwall, eine Kette von Bergen, die lybische Kette, welche über dem linken Nilufer aufsteigt, dem Eindringen des Sandes ein Ziel gesetzt.

Gegenwärtige Bildungen von Conglomeraten und Sandsteinen.

Sehr häufig werden Gerölle oder Sand, die mit einem ockerigen, mergeligen oder kalkigen Schlamm in Berührung stehen, durch diesen verklebt, und es bilden sich so unter unsern Augen Conglomerate und Sandsteine. Ganz besonders verklebend wirkt das Eisenorydhydrat, das an der Luft die Beschaffenheit eines wahren Eisenvosses annimmt, dessen festes Anhaften an Gegenstände der verschiedensten Art und dessen verklebende Kraft allgemein bekannt ist. Der Kitt solcher jugendlichen Gebilde ist manchmal so fest, daß man eher die Gerölle zerbricht, als sie vom Bindemittel losreißt.

Am häufigsten beobachtet man die Verkitungen von Geröllen, Muscheln und Sand an den Meeresküsten, namentlich südlicher Länder. Bei Messina, an der Küste von Sicilien, geht durch Verkitung hochgeführter Sandmassen, vermittels eines eisen-schmelzenden Mangels, fortwährend eine Sandsteinbildung unter dem.

Wasserspiegel vor sich, und auf ähnliche Weise, mit Annäherung der Oberfläche der Insel, an allen anderen Riffen. Der Stein enthält in 20 Jahren so sehr, daß er zu Wühlsteinen verwandelt werden kann. Ähnliche farbdauernde Gestein- und Conglomeratbildungen, gefunden an der Küste von Tranquebar in Indien, an den Küsten von Kleinasien, Griechenland, Neuholand, an den Küsten des Mittelmeeres, des Mittelmeeres, des Indischen. Hierher gehört namentlich das jugendliche Gestein, welches in: Grotte de laoupe Menschenreste einschließt. Es liegt auf La grande terre, nahe beim Roulehafen, und besteht aus Bruchstücken von Corallen und Muschelschalen des benachbarten Meeres, Stücken von Kalkstein, schließt außer den Muschelschalen, kleine Stücke der sandsteinartige Röhren geadelapocaris ein, ferner Holz von: Terebinth, Roeten, Zähne von Gaimans, Scherben von Töpfen, gefundene: Mollusken aus: Basalt- und Porphyrmasse, und sogar Schiefer, aus: Guajaholz. Die menschlichen Skelette rühren wohl von: bey einem Schiffbruch. Narungslacken her,

Wird der merkwürdigsten: Bildungen jugendlichen Gesteins, ist die: Bildung des: Gesteins und Stein an der Küste von: Japan: Kamaoka, die L. v. Buch, beschrieben hat. Sie geht zwischen: den Stadt: Kamaoka und den Inseln unmittelbar am Meeresufer ununterbrochen fort. Den heftige: Westwind, welcher den: Sommer hindurch: ununterbrochen weht, erhebt die leichten Stücke: zerbrochenen: Muscheln, Kiesel, abgerundete: Trachyte, und Basaltstücke: treibt sie über die: schmale: Sandenge von: Kamaoka: herüber und bildet Dünen von: 20—40 Fuß Höhe. Hinter den Dünen: beschauen die: Wellen den Sand und verfluten ihn durch einen: kaligen: Absatz, den sie hinterlassen. In einer: neuen: Masse. Man bricht: dieselbe: zur: Erdezeit, formt sie in: Basen, worin man: Mögen aufbewahren, und verfährt: dieselbe: über alle: Inseln der Gruppe. Das: Wasser: setzt die: Unreinigkeiten in den: porphyren Stein ab, durchdringt ihn, verdunstet an der Oberfläche und erhält dadurch: den: Zustand des: Gefäßes, kühl.

Dieser jugendliche Stein, hat sehr viele Ähnlichkeit mit einem: Kalkstein. Seine: Körner haben meistens: einen Kern von: Trachyte, Basalt oder von einem: Muschelsplinter, den von einem: Kalkstein umgeben ist, und haben somit: eine: ähnliche

Construktion, wie die Rogensteinföhrner. Die vielen Druckschläge von Muscheln und die Sandföhrner fehlen auch nicht darinn, wie in den jurassischen Rogensteinen. Kurz, eine solche Uebereinstimmung, daß man die Bildung des Gesteins der Isola für eine noch fortdauernde Rogensteinbildung betrachten muß, und zu der Annahme berechtigt ist, die Rogensteine der älteren Gebirgsbildungen seyen auf ähnliche Weise entstanden, und als Riffen oder Litorälgebilde zu betrachten.

Coralleninseln und Riffe.

Im stillen, indischen und rothen Meere finden sich häufig Bänke, Riffe, Inseln, die von steinerzeugenden Corallen thierisch erbaut sind. Ueber solchen Oertern des stillen Meeresgrundes an den Riffen, oder auf den Gipfeln unterseelischer Berge, aber Felsen, die nicht oder wenig über den Seespiegel emporhaben sind, setzen sich Corallenthiere an und bauen im klaren Seewegten Wasser bis an die Oberfläche des Meeres, und selbst etwas über dieselbe heraus. Es sind Madreporen, Scleroporen, Milleporen, Astriden, Favien, Caryophyllen, Madamollinen, Pallasoporen, Seraphanoporen u. s. w. (Muschelstübe, Kronenriffe, Laufendsternriffe, Sterncorallen, Basencorallen, Kettencorallen, Bechertüfe, Kronencorallen) unregelmäßig durch einander, wie Blumen auf einer Wiese, untereinander nicht verflochten, sondern getrennt, Geßkrone, Polypen, auf erhabenen Stellen die weichen Lebercorallen, Seranemolliden, Strauchcorallen, Schwammcorallen, mit einer zahlreichen Menge sehr kleiner Würmer und Wirbelwürmer. Zwischen Inseln, und vornehmlich am Fuß des Corallenbänke, liegt Sand. Es hat es sich von dieß beg gründlicher Untersuchung im rothen Meere gefunden: Solche Riffe und Inseln sind theils rissförmig, baubartig, wellenförmig, reihenweise parallel der Küste gebildet (im rothen Meere), theils ring- oder thichterförmig, mit einem offenen Wasserfeld in der Mitte (im Südmeere), wenn sie an Ozeanländern oder dem Rande eines Erhebungsstrates angelegt sind. Die Corallenstämme stehen alleenthalben nur den Meeresspiegel unterseelischer Felsen, und ihre Höhe beträgt im rothen Meere meistens mehr als höchstens 1 1/2 Klafter, im Atlantischen nach Anonius Salmasius

25—30 Fuß. Sie setzen sich nirgends auf Sand an, immer nur auf festem Felsenboden. Die größten und schönsten Corallen befinden sich am Außenrande der Riffe und Inseln, an der Windseite, und hier sind es meist Dabalinien, keine verästelten Formen; aber dicht neben dem schroffen Außenrande, noch ganz von der Brandung überfluthet, treten die ästigen Formen am schönsten auf; weiter entfernt, vom Winde abliegend, sind die Formen schon kleiner, die Riffe und Inseln werden in dieser Richtung flacher, die Corallen bilden hier einen flachen breiten Saum, und es zeigt sich auch, von der vorherrschenden Brandung abgewendet, eine Sandanhäufung. Das Meer wirft mit jedem Winde, der die Wellen gegen diese Schilde treibt, Sand, Tang, Muscheln auf dieselben, die Zwischenräume des löcherigen Gebäudes werden nach und nach ausgefüllt, dasselbe dadurch erhöht, und es siedelt sich endlich die Vegetation darauf an.

Quellenabsätze.

Das Wasser der Quellen ist wohl niemals ganz rein. Das allerreinste enthält noch Spuren einer Chlorverbindung. Gewöhnlich enthalten die Quellwasser Kohlensäure, welche das Meteorwasser schon aus der Luft anzieht, und die häufig, da sie oft aus dem Innern der Erde in Strömen aufsteigt, den Wassern begegnet und sich darinn löst, in größerer Menge in denselben enthalten ist. In diesem Falle lösen die Wasser immer sehr viel Kalk auf, wenn sie durch kalkige Schichten laufen, durch Kalksteine, Mergel, kalkige Sandsteine, Conglomerate, Thone. Sie nehmen ferner gewöhnlich auch Eisen, Mangan, Bittererde auf, Gyps, Kochsalz, etwas Kieselcerde, und letztere in ziemlich großer Menge, wenn sie kohlensaures Natron enthalten.

Treten die kalkigen Wasser an den Tag, oder in Spalten, Höhlungen, so entweicht durch Verdunstung der Antheil von Kohlensäure, durch welchen der Kalk im Wasser gelöst war, und er scheidet sich nun als einfaches, in Wasser unlösliches Carbonat ab, bildet Tropfstein, Incrustationen, Luff. Die fortdauernde Bildung dieser Kalkabsätze kann man in allen Kalkgebirgen, auch in allen Sandsteingebirgen sehen, wenn der Gesteinskitt von kalkiger

Beschaffenheit ist, ja man beobachtet sie bey vielen Wasserleitungen, wie z. B. in der großen Römischen aus der Eifel nach Coblenz, und selbst bey künstlichen Gewölben, bey denen Kalkmörtel als Bindemittel verwendet ist, wenn Wasser durch dieselben sickert. Der Kalktuff oder Travertino, wie die Italiener die Masse nennen, hat eine ganz allgemeine Verbreitung, und an vielen Stellen eine beträchtliche Mächtigkeit, wie z. B. in der römischen Ebene und um Tivoli. Aus ihm ist die Peterskirche zu Rom erbaut. Im Allgemeinen ist der Kalktuff porös, voll Blasen und Höhlungen, und gewöhnlich schließt er Pflanzenreste ein, häufig Land- und Süßwassermuscheln, und bisweilen selbst Menschenknochen. Durch Einschluß der letztern besonders ausgezeichnet ist der Kalktuff von Martres-de-Veyre in der Auvergne. Er tritt als ein graulichweißer, ziemlich homogener Kalkstein auf, der einzelne Quarzkörner und viele gebogen-röhrenförmige Höhlungen enthält, eine noch in der Gegend lebende Helix- und eine Pupa-Art, und liegt mit einer Mächtigkeit von 10 Fuß und mit Andeutungen einer horizontalen Schichtung auf einer Diluvialschicht im Allierthal. Die eingeschlossenen Menschenknochen liegen stark an der Spitze, und haben eine schwammig gelblichweiße Farbe. Dieser Kalktuff bildet das 600 Meter lange Plateau Saint-Martial, das von drey Seiten vom Allier umflossen ist. Man sieht deutlich, daß der Tuff der Kalkabfah zweyer Quellen ist, wovon die eine nahe am Fundort der Knochen, die andere an der höchsten Stelle des Plateaus hervorgetreten, und, wie diese letztere, durch den Abfah selbst nach und nach verstopft worden ist. Untersuchungen über die Veränderungen des Allier-Laufes machen es wahrscheinlich, daß man die Epoche, in welcher die Menschenknochen in die Tuffmasse eingeschlossen wurden, nicht wohl über 2000 Jahre zurück datiren darf.

Auch warme und heiße Quellen bilden öfters bedeutende Abfähe. So gerade die warmen Quellen der Bäder von San Filippo in Toscana und die heißen Quellen von San Vignone eben daselbst, und ganz nahe bey Radicofari. Das Wasser von San Vignone setzt so rasch und in solcher Menge Kalk ab, daß in der Zuleitungsröhre zu den Bädern, die eine Neigung

von 30° hat, jedes Jahr sich eine Luffmasse von $\frac{1}{2}$ Fuß Stärke sich absetzt. Die Quelle tritt auf dem Gipfel eines etwa 100 Fuß hohen Fagels hervor, der aus schwarzem Schiefer b besteht, Fig. 13. Taf. II. Der Luff a zieht sich einerseits östlich herab gegen S. Bignone, deutlich geschichtet und mit einer Neigung von 6°. Eine Lage desselben von etwa 15 Fuß Dicke, aus vielen über einander liegenden dünnen Schichten zusammengesetzt, ist sehr fest und gilt als ein vortrefflicher Baustein. Im Jahr 1828 wurde aus ihr ein 15 Fuß langer Quader gehauen, den man zum Bau der neuen Brücke über die Orcia verwendete. Westlich zieht sich der Luff a' auf eine Länge von 250 Fuß, mit verschiedener Mächtigkeit, die bis auf 200 Fuß steigt, herab bis zum Orcia-Fluß, an welchem er mit voller Mächtigkeit steil absetzt. Die Strömung des Wassers spült ihn hier immer weg, und setzt seiner weiteren Ausdehnung Schranken. Wenn man nun hier von einer einzigen Quelle einen so großen Kalkabsatz gebildet sieht, und dabey bedenkt, daß unendlich mehr von der kalkigen Masse mit dem Flußwasser fortwährend dem Meere zugeführt, als auf der kurzen Strecke vom Ursprung der Quelle bis zum Flussbett abgesetzt wird, so kann man sich ungefähr eine Vorstellung von der Mächtigkeit und Ausdehnung derartiger Ablagerungen machen, wenn ihre Bildung ungestört und unter günstigen Verhältnissen durch einen langen Zeitraum fortgeht.

Warme und heiße Quellen setzen öfters auch Kiesel-erde ab. Am bekanntesten sind die kieseligen Absätze des Geyfers auf Island. Die heißen Quellen von Washita in den Rocky mountains setzen sehr viel Kiesel-erde nebst Kalk und Eisen ab, ebenso mehrere heiße Quellen in Indien. Die heißen Quellen auf San Miguel in den Azoren setzen ebenfalls viel Kiesel-erde ab, und von dieser bis zu Furra's nebstdem noch große Massen Thon, so daß Gräser, Blätter, Holzstücke davon schnell incrustiert, dicke Kieselmassen abgesetzt, zusammengeworfene Lagen wieder zusammengeklittet und Ablagerungen von mehr als 2 Klafter Stärke gebildet werden.

Von ganz besonderem Interesse sind die Absätze von Eisen, welche einige eisenreiche Quellen setzen, die in dem Gebirgskessel von Wehr bey'm Laacher See hervortreten. Sie setzen

eine solche Menge Eisenerde ab, daß man stellenweise 10 bis 12 Fuß mächtige Lager dieser Substanz antrifft, die als Farbmateriale benutzt wird. Gräbt man in solchen Lagen bis dahin nieder, wo die Quelle hervorsprudelt, so findet man hier den Absatz aus graulichweißem kohlensaurem Eisenoxydul bestehend, das völlig die Zusammensetzung des Eisenspath's besitzt, während die höheren Lagen ganz aus Eisenoxydhydrat bestehen, das wie der Brauneisenstein zusammengesetzt ist. Der Grund davon liegt darin, daß die Quellen unmittelbar kohlensaures Eisenoxydul absetzen, das, wenn es vor der Einwirkung der Luft geschützt ist, sich erhält, während derjenige Theil, welcher der oxydierenden Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt ist, sich in Eisenoxydhydrat umwandelt.

Abatz aus Seen.

Gewisse Seen setzen fortwährend in ihrem Wasser gelbste salzige Stoffe ab, in Folge der Wasserverdunstung. Hierhin gehören namentlich viele Seen, die zwischen dem Jail und der Wolga, in der niedrigen karabinischen und irtischischen Steppe und in der Krimm liegen, und aus denen sich alljährlich eine außerordentliche Menge Steinsalz absetzt. Die flachen Seen Aegyptens liefern Natron; mehrere Seen in Fezzan setzen Trona, anderthalb-kohlensaures Natron ab, das sich auch in America, woselbst es Urao genannt wird, unfern Merida, bey Lagunilla, aus einem See ablagert.

Muschelmassen und Strandgeschiebe über dem gegenwärtigen Meerespiegel.

Im Norden von Europa findet man, vorzüglich an der Küste von Schweden, namentlich in der Nähe von Uddevalla, große Muschelanhäufungen zwischen Gneisfelsen bis zu 200 Fuß über dem Meere. Die Muscheln stimmen mit denen überein, welche heute noch im benachbarten Meere leben. Man findet darunter Meeresecheln, Balani, die noch vest am Felsen sitzen, der einst Meeresklippe war. Im Süden findet man eine ähnliche Muschelablagerung auf der Halbinsel St. Hospice, unfern Nizza. In Südamerica hat man zu Conception

Bänke von Muscheln die gegenwärtig noch in den nahen Meeren leben, an Puncten über dem Meerespiegel gefunden, bis zu welchen die Fluthen des heutigen Meeres nicht mehr ansteigen. Strandgeschlebe, durch Wellenschlag abgerundete lose Steine, die längs der Küste hin, im Niveau der Fluth, liegen, sieht man bey Plymouth bis 30 Fuß höher abgelagert, als gegenwärtig die Fluth steigt, und auf der Insel Jura in den Hebriden unterscheidet man 6 bis 7 über einander liegende Ablagerungen von Strandgeschleben, wovon die höchste wohl 40 Fuß über dem gegenwärtigen Meerespiegel liegt. Diese Erscheinungen haben ihren Grund in

Hebungen und Senkungen des Bodens.

Sie sind eine Folge der Erhebung der Küste, Erdbeben können zum Theil die Ursache solcher Erhebungen seyn. Sie bringen bekanntlich sehr oft Hebungen und Senkungen des Bodens hervor, und wir haben in der neuesten Zeit ein großartiges Beispiel von Erhebung eines beträchtlichen Theils der westen Erdrinde durch ein Erdbeben gehabt. Während der Erschütterungen, nämlich welche 1822 die Küste von Chili erlitt, wurde dieselbe auf eine Erstreckung von mehr als 200 Meilen in kurzer Zeit um 3—4 Fuß in die Höhe gehoben. Eine ähnliche Hebung hat sich im Februar 1835 an der Küste von Chili ereignet. Im Norden dagegen beobachtet man seit langer Zeit eine allmähliche Hebung des Landes. Sie beträgt in Schweden, nach der Untersuchung von Merkzeichen, die in Felsen eingehauen wurden, von Rahölmén bis Esfgrundet, in dem Zeitraum von 100 Jahren, im Durchschnitt $4\frac{1}{2}$ Fuß. Hier müssen wir also eine langsame, gegenwärtig noch fortdauernde Wirkung annehmen.

An anderen Küstenstrecken bemerkt man eine Senkung des Bodens bey unverändertem Meerespiegel. So namentlich an der felsigen dalmatischen Küste und an der flachen italienischen. Bey Pola, Fiume, Zara, Sebenico, auf Lissa u.s.w. sieht man vielfältig den Fußboden antiker Gebäude vom Meere bedeckt, Aschenurnen, Mosaik unter dem Meerespiegel. An der äußersten Spitze der Insel Bragniza sieht man hart am Lande

eine ganze Reihe von Steinsarcophagen, regelmäßig an einander gestellt auf dem wenig tiefen Meeresgrund. Zu Ravenna und Venedig hat man Steinpflaster gefunden, die unter der jetzigen größten Wasserhöhe liegen, auch mosaikische Arbeit und viele Alterthümer.

Ebenso hat man an der Westküste von Grönland Senkungen des Bodens beobachtet. Schon in den 70er Jahren des verfloffenen Jahrhunderts vernahm Aretander in dem Fiarde Igakkto, daß ein kleines, felsiges und flaches Eiland, das einen Kanonenschuß von der Küste entfernt ist, zur Fluthzeit gänzlich unter Wasser stehe, während sich doch darauf 5 Fuß dicke Mauerreste eines 52 Fuß langen und 30 Fuß breiten Hauses befinden. Ein halbes Jahrhundert hernach fand Dr. Pingel die Insel schon so weit versunken, daß sie beständig vom Meere bedeckt war, und nur die Ruinen des Hauses aus dem Wasser hervorragten. Mehrere andere Punkte der Westküste zeigen ähnliche Erscheinungen. Die Senkung des Bodens ist hier von den Bewohnern dieser Küste so gut gekannt, daß um Verentwiffen kein geborener Grönländer sein Haus nahe ans Wasser baut. Er weiß, daß später die Fluth in dasselbe tritt.

Diese Senkungen des Bodens hängen eben so gut, wie die Hebungen, von vulcanischen Ursachen ab. Es ist höchst interessant wahrzunehmen, wie beide Erscheinungen noch fortbauern, und durch die Geschichte beschäftigt werden.

Eines der merkwürdigsten und lehrreichsten Beispiele von successiver Senkung und Hebung einzelner Theile der Erdoberfläche seit den historischen Zeiten, gibt uns die Beschaffenheit des Serapis-Tempels bey Pozzuoli, an der Bucht von Baja, unsern Neapel. Dort stehen noch aufrecht und an ihrer ursprünglichen Stelle drey Marmorsäulen, S. Fig. 14. Taf. II., welche in etwa 15 Fuß Höhe über dem jetzigen Meerespiegel, einen 3 Fuß breiten Streifen haben, der von Bohrmuscheln durchlöchert, etwas dünner und mit einer kalkigen Kruste bekleidet ist. Der untere Theil der Säulen, der bey der Ausgrabung in der Erde stand, ist wohl erhalten; der obere dagegen von der Witterung angegriffen. Auch die im Innern des Tempels liegenden Marmorsäulen sind von allen Seiten von Bohrmuscheln durchlöchert, und

nur die harten Granitsäulen blieben unverfehrt. Dagegen zeigen auch diese sich mit einer kalkigen und unreinen Kruste überzogen, welche das Meer allenthalben auf Gegenstände absetzt, die von seinen Rändern berührt werden. Hier müssen wir nun, bey Erwägung aller obwaltenden Umstände, annehmen, das Meer sey einst, in Folge einer Senkung der Rüste, ins Innere dieses Tempels eingedrungen, habe ihn lange Zeit bedeckt, zahlreiche Bohrmuscheln genährt, und den Tempel später, bey erfolgter Wiedererhebung der Rüste, verlassen, von welcher Zeit an er in dem Zustande verblieb, in welchem man denselben bey der Ausgrabung im vorigen Jahrhundert fand. Die Zeit der Senkung des Tempels ist ungewiß. Seine Wiedererhebung aber hat wahrscheinlich gegen das Ende des fünfzehnten und den Anfang des sechszehnten Jahrhunderts stattgefunden. Um jene Zeit nämlich, wurden, nach Urkunden, in den Umgebungen des Serapis-Tempels ansehnliche Landstrecken vom Meere entthöht, und von der Regierung größtentheils an geistliche Stiftungen verschenkt. Damals aber wurde bekanntlich Pozzuoli mehrfach von starken Erdbeben heimgesucht, und in jener Zeit (1568) wurde auch der Monte Nuovo herausgehoben. Beweise genug, daß jene Rüstengegend, während der angeführten Periode, mehrfältige Bewegungen erlitten hat.

Die Ablagerungen von Muschelmassen und Strandgeschieben, die man an vielen Orten über dem gegenwärtigen Meerespiegel, und bis auf Höhen von 30 und 40 Fuß über demselben findet, Bildungen, die einst am Meeresrande abgesetzt wurden, sind also durch eine später erfolgte Hebung der Rüste in ihre jetzige Lage gebracht worden. Sehen wir mehrere solche Ablagerungen terrassenweise über einander, so geben diese uns den Beweis von wiederholten Hebungen des Bodens.

Gletscher und Polareis.

Der trockene, krySTALLINISCHE Schnee, der im Hochgebirge fällt, und die körnigen Schneemassen bildet, die man Firne heißt, verwandelt sich durch Erweichung, Zusammenfließung und Wiedererhärtung in den tieferen Lagen in eine Eismasse, welche an geneigten Stellen d. h. ihr Gewicht sich aber dieselben herabzieht,

durch Schrände, Döbel und Thäler bis zu den Bohnflätten herabsteigt, und die man Gletscher nennt. In den Alpen steigen einzelne Gletscher bis zu 3200 Fuß herab (Grindelwald). Ihre obere Gränze ist in diesem Gebirge ziemlich regelmäßig bey 7600 Fuß. Die stete Erneuerung des Firns unterhält die fortdauernde Bildung des Gletschereises, das in Döbeln und Thälern bis zu einer Stärke von 120, ja selbst bis 180 Fuß anwächst. Vielfältig senden die Firnmassen auf diese Weise Gletscher in Streifen, Facken oder Franzen gegen die tieferen Gegenden herab.

Das Gletschereis besteht aus stumpfseitigen Stücken von 1 bis 2 Foss, die, wie man es, zumal am untern Ende des Gletschers, beobachten kann, locker und gleichsam gelenkartig mit einander verbunden sind. Die einzelnen Stücke sind farblos, außen rauh, wie überhaupt die ganze Oberfläche des Gletschers. Größere Massen zeigen eine blaue Farbe, die vom lichtesten Himmelblau ins Smalteblaue und reinste Lasurblaue übergeht. Manchmal ist bey Blau ein grüner Ton beygemischt. Diese Färbungen sieht man besonders rein und von unbeschreiblicher Schönheit in tieferen Löchern, Spalten und Klüften der Gletscher.

Die Temperaturveränderungen, denen das Gletschereis ausgesetzt ist, das Fortrücken desselben auf geneigtem Boden, bewirken mannfaltige Trennungen seiner Masse, und alle Gletscher sind daher mehr oder weniger von Spalten und Schränden durchschnitten, und diese sind immer um so zahlreicher und größer, je geneigter die Lage des Gletschers ist. Ueber hohe Felsenabfälle heruntersehbende Eismassen, erscheinen wie Wassermassen, die in wildem Sturze erstarrt sind. Die Spalten laufen meistens parallel der Längeerstreckung des Gletschers; seltener schneiden sie die Richtung desselben. Wo die Unterlage ein festes, geschlossenes Gestein ist, da ruht die ganze untere Fläche der Eismasse gleichförmig darauf; ist dagegen das Gestein verwittert, zerborsten, aufgelockert, besteht der Boden aus Trümmern, Geschieben, so schmilzt die darüber hingehende Eismasse an ihrer unteren Fläche ab und wird dabey über solchen Stellen ausgewölbt. Es entstehen auf diese Weise Gewölbe, die manchmal eine beträchtliche Größe haben, und die man wohl auch Eiskeller genannt hat.

Der Gletscher ruht alsdann mit einzelnen Füßen, die wie Pfeiler eines Gewölbes dastehen, auf der Unterlage.

Der Felsboden, über welchem sich die Eismasse fortbewegt, wird abgeschliffen, wie polirt, und an den Felsenwänden werden parallele Furchen ausgerieben, in der Richtung, nach welcher sich das Eis bewegt.

Von den umgebenden Felsen lösen sich durch Verwitterung fortwährend Stücke los. Viele davon fallen auf den Gletscher herab. Sind diese Stücke klein, so sinken sie nach und nach in die Eismasse ein, da sie als undurchsichtige dunkle Körper, und, vermöge ihrer Wärmecapacität, am Tage viel stärker erwärmt werden, als das Eis, und somit von diesem mehr schmelzen, als die directen Sonnenstrahlen. Dieses Einsinken der Steine findet vorzüglich auf dem tieferliegenden Theile der Gletscher, in einer Höhe von 4—5000 Fuß, statt, und es werden dabey Löcher gebildet, in welchen sich Wasser sammelt. In der warmen Jahreszeit werden die obersten Wassertheilchen durch warme Winde erwärmt, dadurch specifisch schwerer und sinken unter. Dabey lösen die warmen Wassertheilchen immer Eis auf, und es werden auf diese Weise größere Vertiefungen, die sogenannten Eislöcher gebildet, die häufig mehrere Fuß tief und mit Wasser angefüllt sind. Den Stein, der die Veranlassung ihrer Entstehung war, findet man gewöhnlich auf ihrem Grunde.

Während das Wasser der Eislöcher in das Gletscherreis der Wände eindringt, verdrängt es die in seinen Poren vorhandene atmosphärische Luft, absorbiert davon mehr Sauerstoff als Stickstoff, und daher bestehen die aus Eislöchern aufsteigenden Luftblasen aus einer sauerstoffarmen Luft, die nicht ganz 10 Procent Sauerstoffgas enthält. Dadurch kommt dann eine an Sauerstoff ärmere Luft in die Atmosphäre über den Gletschern, die aber schnell in dem großen Lustmeere aufgelöst und dadurch wirkungslos auf die Respiration wird.

In größeren Höhen sinken kleinere Steine weniger ein. Große Steine aber sinken nicht nur gar nicht ein, sondern erheben sich im Gegentheil scheinbar, ruhen auf einige Fuß hohen Eisfüßen und bilden die über die Gletscheroberfläche erhabenen, sogenannten Gletschertische. Große Steine werden

nämlich nicht durch und durch erwärmt, ihre untere Fläche bleibt auf dem Gefrierpunkte und eben so das Eis darunter, während das umliegende Eis in den Sommertagen bey jedem Sonnenschein schmilzt und sich dabey senkt. Dergeſtalt bleibt die Eisunterlage des Steins in gleicher Höhe, während die Gletscheroberfläche sinkt, und die geschüpften Eisteile bilden den hervorragenden Fuß des Fisches.

Fallen mehrere große Steine neben einander hin, oder bedecken starke Schuttlagen die Oberfläche des Eises, so wird die nämliche Erscheinung, nur in größerem Maasstabe, hervorgerufen. Es bilden sich größere hervorragende Eisküſte, wellenartige Erhöhungen, die bey dem Fortrücken des Gletschers sich in die Länge ziehen, und da immer frischer Schutt nachfällt, über die ganze Oberfläche desselben, in der Richtung seiner Längenerstreckung, fortlaufen. Man nennt diese, mit Steinen und Schutt bedeckten Eismäſſe, Sufferlinien. Gegen das untere Ende der Gletscher werden die Sufferlinien breiter, und häufig nehmen sie am Ausgang die ganze Oberfläche des Gletschers ein. Der Grund davon liegt darin, daß die Sufferlinie in den tieferen Theilen der Gletscher, vermöge des hier stärkeren Schmelzens des umliegenden Eises, höher liegt und steiler ist, wobey einzelne Steine, deren Unterlage schwächer wird oder in Schmelzung geräth, leicht abrollen und so der Sufferlinie eine größere Breite geben.

Bey dem ununterbrochenen Fortrücken des Gletschereises nach der Neigung des Bodens, gelangen Steine, die im Hintergrunde eines Gletscherthales auf das Eis fallen, allmählich herab bis an den Fuß des Gletschers, bey dessen Abschmelzen sie herabrollen, und vereinigen mit der Trümmermasse, welche der Gletscher durch Aufreibung des Bodens vor sich her schiebt, einen Hauf von Schutt und Trümmern bilden, den man Moraine heißt, eine Musterkarte der Gesteine und Mineralien der Gletscherumgebung.

Am Fuße schmelzen die Gletscher fortwährend ab. Ist die abschmelzende Eismasse derjenigen gleich, die nachrückt, so bleibt der Gletscher stationär; schmilzt weniger ab, als nachrückt, so bewegt sich der Gletscher vorwärts; schmilzt im Gegentheil unten mehr ab, als von oben nachrückt, so zieht sich der Gletscher

zurück. Beschaffenheit der Sommer, der Umgebungen und namentlich auch die Verhältnisse der Vegetation, wirken darauf wesentlich ein.

Gegen die Pole hin sind auch niedrige Berge von Schnee und Eis bedeckt; im nördlichen Lappland gehen die Gletscher bis zum Meere herab, und um die Pole ist selbst das Meer mit Eis bedeckt. Das Polar-Eis, wie man das Eis nennt, welches sich um die Pole in den Meeren, an den Küsten und in den Buchten der Polarländer bildet, wird durch Meeresströmungen gegen Süden getrieben, in den wärmeren Himmelsstrichen geschmolzen, und auf diese Weise stellt die Natur das Gleichgewicht her, ohne welches eine fortwährende Vermehrung des Polareises stattfinden müßte.

Im ganzen nördlichen Sibirien ist der Boden, selbst in der heißesten Jahreszeit, von einer gewissen Tiefe ab, die nach Fruchtbarkeit und geographischer Breite verschieden ist, gefroren. Dieses Bodeneis hat an den ostwärts gelegenen Orten, wie namentlich bey Jakutsk unter dem 62. Breitengrad, dessen mittlere Temperatur der Monate December und Januar — 33° R. ist, wo also das Quecksilber während zwey Monaten des Jahres im Freyen nicht aufthaut, eine beträchtliche Stärke. Man hat daselbst bey einer Brunnengrabung, 357 engl. Fuß (1 engl. Fuß = 0,304 M.) tief, den Boden fest gefroren, und erst darunter weiches Erdreich gefunden. Dieses Bodeneis ist über den 59. Breitengrad hinaus durch ganz Nordasien verbreitet. Der Boden bleibt hier überall in einer Tiefe, bis zu welcher die Sonnenwärme nicht mehr eindringt, fortwährend gefroren. In Obdorsk müssen, wie A. Erman erzählt *), die Gräber selbst im Sommer durch Feuer ausgehöhlt werden. Als im Jahr 1821 auf einem der beiden dortigen Kirchhöfe eine Nachgrabung gemacht wurde, fand man den Sarg des von Peter dem Großen hierhin verbannten und daselbst vor 92 Jahren verstorbenen Fürsten Menschitschikow in dem gefrorenen Erdreich, und darinn die Leiche nebst deren Bekleidung völlig unverändert und wohl

*) Reise um die Erde durch Nordasien und die beiden Oceane, 1828 bis 1830 ausgeführt. Erster Band. Berlin 1832.

erhalten. Es kann uns daher nicht befremden, wenn man an der Mündung der Lena, an den Ufern des Wilui, so wie im Kokebue-Sund, Elephanten- und Rhinoceros-Reste, im Eise antrifft, die noch mit Muskelfleisch und anderen weichen Theilen bekleidet sind. S. Bd. 7. S. 1182 f.f.

Da man weiß, daß heute noch ein Tiger aus dem Süden Asiens während der Sommerzeit hoch nach Sibirien hinauf streift und dort öfters erlegt wird (ein Exemplar eines solchen in Sibirien erlegten Tigers befindet sich in der zoologischen Sammlung zu Moskau), so begreift man auch, daß dickhaarige Pachydermen in früherer Zeit ähnliche Züge gemacht haben, und daß, wenn sie durch irgend ein Ereigniß in den eissigen Gegenden Nord Sibiriens getödtet und mit Erdreich bedeckt wurden, ihre Körper unverfehrt bleiben konnten.

Auch in Nordamerica hat man in der Umgegend der Factory York, an der Südwestküste der Hudsonbai, Bodencis beobachtet.

Organische Reste in den gegenwärtigen Bildungen.

Die organischen Reste, welche in die Gebilde des Alluviums eingeschlossen sind, stammen von gegenwärtig noch lebenden Thieren und Pflanzen ab. Einige wenige jedoch gehören zu untergegangenen Geschlechtern. Die in der gegenwärtigen Periode durch Klima, Boden u.f.w. bedingte geographische Verbreitung der Pflanzen und Thiere, ist die Ursache, daß die Reste, welche in verschiedenen Ländern zu gleicher Zeit, und unter den nämlichen Verhältnissen, in die Alluvialbildungen eingeschlossen werden, doch ganz verschieden sind.

Einige Thiergeschlechter, die seit der Existenz des Menschen und der Ausbreitung seiner Herrschaft ausgestorben, andere, die seit dieser Zeit von ihren ursprünglichen Wohnorten ganz oder zum Theil verschwunden sind, zeigen deutlich an, welcher Vergänglichkeit alles Organische unterliegt, und welchen Einfluß der Mensch darauf hat.

Der riesenhafte Firsch (*Corvus eurycorus*), dessen Geweih eine Länge von 8 Fuß hatte, und dessen Reste man in Torfmooren findet, soll, nach Professor Goldfuß, erst nach dem

Jahre 1550 unter den lebenden Thieren erloschen seyn. Er ist im Nibelungen-Lied unter dem Namen Schelch erwähnt, hat schon gelebt zur Zeit, als Mitteleuropa von Elephanten bewohnt war, denn man findet seine Reste mit Elephantenresten zusammen begraben.

Das Dlothier (*Mastodon giganteus*), der große Robon, von der Größe des Elephanten und, wie dieser, mit einem Rüssel versehen, aber gestreckter und plumper, mit höckerigen Backenzähnen, scheint im Anfang der gegenwärtigen Periode noch gelebt zu haben. Seine Reste, die man am häufigsten im Morast des Ohio in Nordamerica, und, so viel bis jetzt bekannt, nur in diesem Lande findet, sind meistens so vortrefflich erhalten, daß schon mehrere vollständige Skelete zusammengesetzt werden konnten, die sich in nordamericanischen Sammlungen befinden. Auch sollen Weichtheile dieses Thiers daseibst gefunden worden seyn, und dazu rechnet man einen häutigen Sack, der bey den Knochen lag, mit Klein zerlauten, jezt noch in Virginien wachsenden Pflanzen angefüllt war, und der Magen des Thieres gewesen zu seyn schien. S. Bd. 7. S. 1186.

Die Dronte (*Didus inoptus*), von holländischen Schiffen 1599 auf der Insel Morih gefunden, ein Vogel aus der Gunst der Trappen, von der Größe eines Schwans, der auch auf Bourbon lebte, ist in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wahrscheinlich durch die Portugiesen und Holländer ausgerottet, verschwunden. Seit jener Zeit hat niemand mehr eine Spur von diesem Vogel gefunden. Auf der Insel Rodriguez sind Knochen desselben in Kalktruff eingeschlossen vorgekommen. Siehe Bd. 7. S. 628 f. f. Auch der sonderbare Vogel Kiwi (*Apteryx australis*), der auf Neuseeland lebt und dort, seiner geschädigten Federn wegen, stark verfolgt wird, von Natur aus träg und unbehilflich, zum Schwimmen und Fliegen nicht geschaffen, wird wahrscheinlich in kurzer Zeit ausgerottet seyn. S. Bd. 7. S. 634.

Es ist beynahe unglaublich, wie zerstörend der Mensch auf die Thiergeschlechter einwirkt, und wie groß daher sein Einfluß auf das Vorkommen thierischer Reste in den gegenwärtigen Bildungen ist. Um davon nur ein Beispiel zu geben, wollen

wir nur der Seehund-Jagd erwähnen. Unmittelbar nach der Erforschung der Küsten von Süd-Georgien durch Capitän Cook 1771, fiengen die Amerikaner den Handel mit Seehundsfellen nach China an. Seit jener Zeit wurden von dort 1,200,000 Felle bezogen, und ungefähr die gleiche Zahl von der Insel Desolation. Die Zahl der Seehundsfelle, welche 1821 und 1822 auf den Süd-Schottland-Inseln erbeutet wurde, beträgt 320,000 Stück. Auf allen diesen Inseln ist der Seehund nunmehr völlig ausgerottet. Von den Neufundland-Fischern wurden in den 3. Jahren 1829, 1830 und 1831 nicht weniger als 1,552,000 Stücke Seehunde gefangen!

Fortwährend vermindert sich die Zahl der im Naturzustand lebenden Thiere, durch die rastlosen Nachstellungen der Jäger, ihr rücksichtsloses Niedermachen, und dadurch, daß die Menschen Länder und Seen, Wälder und Flüsse, die den Thieren Nahrung und Schutz gewährten, ihrer Herrschaft unterwerfen und ihren Zwecken aneignen. Am auffallendsten zeigt sich dies in Nordamerika. Hier weichen die Thiergeschlechter mit den Uebewohnern zurück vor der Fluth der Civilisation, und fallen ihr zum Opfer.

Dieser Einfluß des Menschen auf die Oberfläche der Erde hat natürlich schon wesentlich verändernd auf die übrige organische Welt eingewirkt, und die Ueberreste derselben, die sich in den Bildungen der gegenwärtigen Periode finden, werden daher aus diesem Grunde verschieden seyn von den Ueberresten einer früheren Periode, in welcher der Mensch noch nicht existirt, oder seine Herrschaft nicht so weit über die Erde verbreitet hatte.

Die Verminderung der Wälder hat unmittelbar in ihrem Gefolge eine Verminderung der fließenden Wasser, der Pflanzengeslechter und des auf Flüssen treibenden Holzes, und so werden einst die großen Flüsse Americas aufhören Massen Holzes gegen ihre Mündungen zu führen, und in ihren Delta's aufzuhaufen, wenn der Mensch die großen Wälder dieses Welttheils in Culturen genommen hat.

Von den thierischen Resten, welche im Alluvium gefunden werden, fallen besonders die Menschenreste auf, die man im Torf, in Schutt und Kalktuffablagerungen, im Sande und in Höhlen antrifft. Thierische Stoffe erhalten sich im

Torfe, vermöge seiner Zusammensetzung, s. S. 534, und der im Innern seiner Masse stattfindenden Entwicklung von Kohlenäure und Kohlenwasserstoff, wobei der eingebrungene Sauerstoff der Luft absorbiert wird, und der äußere beynahe ganz ausgeschlossen ist, außerordentlich lange. Die antiseptische Eigenschaft des Torfs ist auch allgemein bekannt. Es kann daher nicht so sehr befremden, wenn man in Torf menschliche Leichname findet, die, ungeachtet sie Jahrhunderte lang darinn vergraben lagen, doch noch ziemlich gut erhalten sind. Im Ganges-Delta wurden Menschenknochen 18 Fuß unter der Oberfläche in Schutt begraben aufgefunden. An der Küste von Guadeloupe fand man mehrere Menschenknochen in eine jetzt noch sich fortbildende Kalktuffmasse eingeschlossen, die Corallen- und Muschelreste des umliegenden Meeres und einige auf der Insel lebende Landschnecken enthält. Diese Menschenreste rühren ohne Zweifel von Individuen her, die an der Küste verunglückt sind. Im Sande der africanischen Wüste findet man öfters menschliche Leichen, die von der Sonne ganz ausgetrocknet sind. In Höhlen hat man in Frankreich und Belgien Menschenknochen, theils zusammen mit Werkzeugen von Menschenhand, theils mit Knochen jüngerer und älterer in jenen Gegenden verschwundener Thiere gefunden.

Findet man Menschenknochen mit Knochen von Thieren zusammen, die aus der gleichen Zeit abstammen, wie z. B. auf alten Schlachtfeldern, Menschenknochen zusammen mit Pferdeknöcheln, so zeigen sich die ersteren besser erhalten. Wenn man nun Menschenreste nur in den allerjüngsten Gebirgsbildungen findet, die unter unsern Augen noch fortgebildet werden, so kann man daraus nicht schließen, daß der Grund hiervon in ihrer größeren Vergänglichkeit liege, sondern findet die Ursache davon einfach darinn, daß der Mensch der jüngsten Epoche unserer Erde angehört. Die Existenz des Menschengeschlechtes beginnt erst nach dem Tode aller antediluvianischen Thiergeschlechter.

Einschließung organischer Reste in die Bildungen des Alluviums.

Die genauere Betrachtung der Art und Weise, wie in der gegenwärtigen Periode organische Reste begraben werden und in

einen versteinerten Zustand übergehen, ist schon an und für sich von Interesse, erlangt aber namentlich dadurch noch eine besondere Wichtigkeit, daß sie uns erläutert oder andeutet, auf welche Weise Ueberbleibsel von Pflanzen und Thieren in die älteren Formationen begraben, und wie sie versteinert worden sind. Wir wollen daher das Wesentliche einer solchen Betrachtung hier anreihen.

Beginnen wir diese mit den niedrigsten thierischen Organisationen, mit den Infusorien. Durch Ehrenberg's ausgezeichnete Untersuchungen hat sich ergeben, daß im Schlamm von Torfmooren, in Sümpfen und Lachen, in der darinn vorkommenden ockergelben, zarten Masse, die im ausgetrockneten Zustande wie Eisenoryd aussieht, sich unzählbare Mengen einer Infusorien-gattung aufhalten; die *Gaillionella ferruginea*, die nach ihrem Tode in die Zusammensetzung der Raseneisensteine eingeht. Zieht man diese Erze mit Salzsäure aus, so hinterbleiben die Kieselpanzerchen dieser Thiere. Eben so hat Ehrenberg im Kieselguhr von Franzensbad in Böhmen, der in einem Torfmoore vorkommt, Infusorien des Geschlechtes *Navicula* gefunden, und Gattungen darunter, die heute noch leben; eben so im franzensbader Torfe selbst. Daraus ersieht man, wie fortwährend Infusorien an den Orten selbst, wo sie leben, nach ihrem Tode in Versteinierung übergehen.

Die röhrenförmigen Polypen, Corallen, bauen, wie wir gesehen haben, Riffe und Inseln von untermeerischen Felsen herauf bis an die Oberfläche und darüber, sterben ab und bilden im stillen Ocean, in den indischen Meeren, im tropischen Theil des atlantischen Meeres und im rothen Meere große poröse Felsenmassen, die von kalkigen Absätzen des Meeres durchdrungen und zu fester Steinmasse verbunden werden. Einzelne Stämme von Corallen werden von den Wellen losgerissen, an die Ufer geworfen und gehen hier in Litoralbildungen ein. Diese Corallen-Felsenbildung der gegenwärtigen Epoche ist so groß und ausgedehnt, daß sie den alten corallenführenden Kalkbildungen an die Seite gestellt werden kann.

Muscheln und Schnecken, die im süßen oder im salzigen Wasser leben, an den Ufern oder auf dem Boden der Flüsse, an

den Meeresküsten, in seichten Meeresstellen, an Klippen, auf Sandbänken oder im tiefen Meere sich aufhalten, werden unter mancherley Umständen, in Sand- und Schlammsschichten eingeschlossen. Fluß-, See-, Ufer- und Hochmeerbildungen enthalten aus dem Grunde zahlreiche Muschelreste. Angeschwollene Flüsse führen mit anderen Gegenständen auch die Mollusken ihres Bezirks mit sich fort, und setzen sie mit Schlamm und Sand, und in diese eingewickelt, ab, theils auf Inseln im Flußlauf (wie wir es immer bey den Rheininseln sehen), theils in Seebetten, theils in Meeresbuchten, wo sie mit den dort lebenden Meeresconchylien untermischt werden. Oefters auch stoßen Stromwasser gegen Bänke an den Mündungen, wo im seichten oder brackischen Wasser zahlreiche Muschelgeschlechter seit langer Zeit gelebt und sich fortgepflanzt haben, oder es greift eine Meeresströmung solche Niederlassungen an und reißt sie los, und so werden Eborat- und solche Muscheln, die im seichten Wasser der Bayen und Buchten, oder an den Mündungen großer Flüsse leben, hinaus ins hohe Meer und auf den Grund desselben geführt, alwo sie nicht fortleben können und begraben werden. Nur die Geschlechter, welche sich in Sand und Schlamm versenken oder einbohren können, wie namentlich *Solen*, *Pholas*, *Cardium*, entgehen mehr oder weniger diesem Begräbniß. Die Anhäufungen großer Conchylienmassen, die man auf dem Grunde des tiefen Meeres zwischen Gibraltar und Ceuta, bey Lory-Island, zwischen den Shetland-Inseln und Nord-Irland u. s. w. gefunden hat, sind wohl einfach eine Folge der angeedeuteten Etwirkungen der Meeresströmungen auf Ansammlungen von Muscheln und Schnecken, die an den Ufern, in Buchten, auf Sandbänken u. s. f. leben. Werden derartige Conchylienlagen von Schlammabfällen durchdrungen und bedeckt, und wiederholen sich Schalen- und Schlammabfälle, so entstehen nach und nach Bildungen, deren Schichten von Schalthierresten ganz erfüllt sind.

Wellen, die gegen die Küste laufen, so wie die Brandung, werfen mit Sand und Geröllen, auch Schalthiere und andere organische Substanzen ans Land, und bilden Anhäufungen derselben, welche durch Kalk- und Schlammabfälle verwittert werden.

Landmollusken werden häufig an den Orten selbst, wo sie lebten, in die Lagen der Kalkerde eingeschlossen, da viele von ihnen sich in den Boden einsenken, in Löchern sich verbergen und da absterben, wobey ihre Schalen sich erhalten und in der Erde eingeschlossen bleiben. Andere, die ganz auf der Oberfläche leben, hinterlassen hier ihre Schalen. Flüsse, welche die Ufer angreifen, dieselben übersteigen und das anliegende Land überschwemmen, führen diese Schalthierreste mit anderen fort und setzen sie in Seebecken oder an den Mündungen ins Meer ab, wo sie gleich anderen Resten abgestorbener Organismen begraben werden und der Versteinierung unterliegen.

Die Würmer, wie *Serpula*, die gewöhnlich auf Muscheln sitzen, Meerigel, *Echinus*, *Cidaris*, *Spatangus*, Meersterne, von welchen namentlich der gemeine Rellenstern (*Pontacrinus*) *Isis astoria*, und *Pontacrinus europaeus*, den versteinerten Grinoideen so ähnlich sind, unterliegen denselben Versteinungsverhältnissen, wie die Meer-Schalthiere.

I n s e c t e n werden selten in Erdschichten eingeschlossen. Bisweilen findet man Reste derselben in jugendlichen Schlamm- und Thonablagerungen, unter Umständen, die andeuten, daß sie von Individuen herkommen, die auf die Fläche eines Sees oder Flusses gefallen, oder durch eine Ueberschwemmung überrascht und mit anderen Gegenständen im Schlamm eingewickelt worden sind. Die Krebse theilen die Verhältnisse der Schalthiere.

Fische, welche in Flüssen leben, suchen, während der Zeit der Anschwellungen, vor der größeren Wassermasse und Geschwindigkeit, so wie vor dem Detritus, der mit der Wassermasse fortbewegt wird, Schutz in ruhigeren Wasserstellen, und versammeln sich hier in großer Anzahl. Ungewöhnliche Anschwellungen und Strömungen ergreifen sie aber auch an solchen Stellen, führen sie in die schuttbeladene Masse, in welcher sie umkommen und wobey sie in Schuttmassen eingeschlossen werden, die sich im Rinnal des Flusses, in einem Seebecken oder an der Mündung ins Meer absetzen. In Seen und kleineren Wasserbecken lebende Fische kommen bey Austrocknungen um, oder wenn dem Wasser in größerer Menge Kalkerde oder ein Gas, wie kohlensaures Gas, Schwefelwasserstoffgas, zugeführt wird, und dabey

werden sie in die entstehenden Abfälle eingeschlossen. Die Meerfische werden häufig durch Stürme an die Küste geworfen und ihre Reste daselbst mehrfältig in jugendliche Schlamm- und Thonbildungen, in Conglomerate begraben. An den Küsten von Island werden bekanntlich häufig Fischreste in einen bläulichen Schlamm eingewickelt, der bald verhärtet, was uns andeutet, wie etwa die Fischreste, die im Saarbrücker Steinkohlengebirge vorkommen, in thonigen Sphärosiderit eingeschlossen worden sind. Brandung und Sturmfluthen werfen bisweilen selbst große Fische auf Sandbänke, auf den Strand, wo sie in Thon und Sand begraben werden, und Strömungen häufen bisweilen große Massen von Fischresten an, und mitunter liegen diese auf dem Meeresgrunde in ansehnlicher Tiefe. So fand Capitän Vidal an der Nordwestküste von Island, in einer Tiefe von 80—90 Faden, eine Lage Fischknochen in einer Ausdehnung von 2 Seemeilen, und zwischen den Shetland-Inseln und Island beobachtete man in $61^{\circ} 50'$ Breite und $6^{\circ} 30'$ Länge (Greenwich), in einer Tiefe von 45 Faden, eine $3\frac{1}{2}$ Meilen lange Fischknochen-Ablagerung. Sehen sich nun darauf Thon- oder Schlamm-Massen ab, so werden die Fischreste darinn vergraben, und es entsteht eine Schicht, die davon ganz erfüllt ist.

Die Amphibien, von welchen ein großer Theil an feuchten Orten und im Wasser lebt, namentlich in Flüssen, an ihren Mündungen oder in den Deltas; wie Crocodile, Alligatoren, sind den oftmals plötzlich eintretenden, verwüstenden Anschwellungen der Flüsse ausgesetzt, und gehen dabey mitunter zu Grund, wobei ihre Körper in die Schlamm- und Schuttmassen begraben werden. So war es namentlich der Fall bey der großen Flußüberschwemmung, welche auf Java 1699 in Folge eines Erdbebens eintrat. Dehnt sich eine solche Ueberschwemmung weit aus, greift sie das Land bedeutend an, so werden auch solche Amphibien, die auf dem Lande leben, getödtet, fortgeführt und in die Detritusmasse eingeschlossen. Die Meer-Amphibien sind denselben Verhältnissen unterworfen, wie die größeren Fische. Auf der Insel Ascension hat man, nach Lyell, in neuester Zeit Schildkröten-Eyer unter sehr interessanten Verhältnissen in ein Conglomerat eingeschlossen gefunden, das sich am Strande hin

aus Muschel- und Corallenresten, welche die Wellen anwerfen, immer fortbildet und mit der Zeit so erhärtet, daß es vielfältig als Baustein angewendet werden kann. Man fand nämlich in diesem Conglomerate mehrere beynahe vollkommen ausgebrütete Schildkröten-Eyer, in deren Innern man die Knochen des jungen Thieres sieht, zwischen welchen fest zusammengebackene Sandkörner liegen. Wahrscheinlich lagen die Eyer beynahe ausgebrütet im warmen Sande des Strandes, als eine große Welle dieselbe mit so viel Sand bedeckte, daß die Sonnenstrahlen nicht mehr durchbringen konnten, wobey der Fötus erkaltete und starb. Zu gleicher Zeit scheinen die Schalen der Eyer zerbrochen worden zu seyn, wobey Sand in das Innere drang.

Die Vögel, welche dem Luftkreise angehören und, vermöge ihrer Organisation, den Ereignissen, welche an der Oberfläche der Erde stattfinden, weniger als die mehrsten anderen Thiere unterliegen, da sie denselben ausweichen können, theils durch Fliegen, theils durch Schwimmen, werden nur selten in die Absätze der gegenwärtigen Periode eingeschlossen.

Die Säugethiere kommen auf mannfaltige Art um, und werden dabey häufig in Schichten des Alluviums begraben. Sie versinken in Moorgründen, Schlamm-Massen, brechen im Eise ein, stürzen in Spalten, werden in Höhlen verschüttet, in einigen Ländern in großer Zahl durch Ueberschwemmungen getödtet und vom Schutte bedeckt. A. v. Humboldt bemerkt, daß in den Savannen des südlichen Americas, während der periodischen Anschwellungen der großen Flüsse, jährlich sehr viele Säugethiere umkommen. Zur Zeit der Anschwellungen des Apure gehen Tausende der wilden Pferde zu Grund, die in den Savannen weiden, ehe sie die höher liegenden Planos erreichen können. Bey den Ueberschwemmungen, die von Sturmfluthen verursacht werden, die Regengüsse in den gemäßigten Zonen bewirken, kommen immer viele Quadrupeden um, und eben so bey ungleich selteneren, durch Erdbeben verursachten Ueberschwemmungen. Bey dem schon angeführten Erdbeben auf Java brachte der angeschwollene Bataviafluß, nebst einer unzähligen Menge von Fischen, auch getödtete Büffel, Tiger, Rhinoceros, Affen aus dem Gebirge herab. Unter allen angeführten Umständen werden die Körper

der getödteten Thiere häufig in Schlamm, Sand, Detritus eingeschlossen. Die weichen Theile sind bald zerstört; die Knochen aber erhalten sich und gehen in den versteinerten Zustand über, wenn Thon- oder Kalktheile an die Stelle des sich allmählich zersetzenden Knorpels, des thierischen Stoffes der Knochen, treten.

Auf eine eigenthümliche Weise werden Thierreste manchmal in Höhlen abgesetzt; wenn nämlich, durch Spalten herab, Bäche sich in dieselben ergießen, welche mit Thon und Sand auch thierische Reste mit sich führen. Eine sehr interessante Beschreibung eines solchen Verhältnisses verdanken wir Boblaye, der dasselbe in Morea, vorzüglich in der Gegend von Tripolizza, beobachtete. Eine Anzahl im Kalkgebirge liegender Höhlen ist daselbst mit der Oberfläche durch Spalten in unmittelbarer Verbindung. In der Regenzeit stürzen sich Gießbäche hinein und verschwinden darinn. Die Einwohner nennen diese Spalten *Katavothra*, Höhlenschlünde. Im Innern der Höhlen liegen in dem rüthlichen Schlamm, den die Wasser von der Oberfläche herabführen, Pflanzen- und Thierreste, und in einer dieser Höhlen fanden Boblaye und Virlet auch Menschenknochen, die von Erschlagenen des letzten Krieges herstammten. In der trockenen Jahreszeit wohnen Fische und Schakals in diesen Höhlen, und schleppen Thierreste, die ihnen zur Nahrung dienen, dahin. Dadurch werden diese mit jenen Resten vermengt, welche die Wasser hereinführen.

Von Pflanzen, die auf dem Lande, an Seen oder Flüssen wachsen, werden abfallende Theile, wie Blätter, Samen, Früchte, häufig auf die Oberfläche des Wassers geführt. Sie sinken nach einiger Zeit unter, oder werden durch Winde und Strömungen stellenweise aufgehäuft und nach und nach in Schlamm eingewickelt oder in Torf verwandelt. Wachsen sie am Rande incrustirender Quellen, so werden sie in die sich absetzende Kalktruffmasse eingeschlossen. Stehen sie an den Ufern eines Flusses der Anschwellungen hat, das Uferland unterspält und einreißt, so fallen größere und kleinere Pflanzengeschlechter, Strauch- und Baumgewächse, in die Fluth, schwimmen so lange, bis sie sich ganz voll Wasser gesogen haben, und sinken alsdann unter, oder werden an ruhigen Wasserstellen, hinter Dämmen und Warren,

in Buchten, in Seebecken oder an den Mündungen ins Meer, in Deltagegenden, abgesetzt und allmählich von Detritus bedeckt. Dehnen sich Flußüberschwemmungen über größere Länderstrecken aus, so werden auch Pflanzen, die im Innern des Landes wachsen, von Orten, die entfernter von Flüssen liegen, in die Strommasse getrieben, und erfolgen endlich Ueberschwemmungen in Folge starker Regengüsse, so werden Pflanzenreste von noch weiter entfernten Puncten, und auch von höheren Gegenden, der Flußrinne zugeführt. In den Tropenländern treiben die Flüsse mächtige Massen von Treibholz ins Meer, und asiatische und americanische Flüsse liefern die enormen Holzmassen, welche an die Küsten von Island, Spitzbergen, Grönland, an die Labradorküste u.s.w. antreiben. Viele auf solche Weise entstandene Anhäufungen von Pflanzenresten, werden in den Flüssen selbst, bey Inselbildungen, in Seebecken, in den Deltas oder wo sie sonst erfolgen, bald schneller, bald langsamer und allmählicher, von Sand, Thon, Schlamm oder Detritusmassen bedeckt und darinn begraben, und verwandeln sich nach und nach in eine kohlige Masse oder versteinern, indem sie von einer verdünnten, versteinern den Flüssigkeit, Wasser, welches Kiesel-erde aufgelöst enthält, oder in Kohlensäure gelbsten Kalk, Eisen u.s.w. allmählich durchdrungen werden, wobey die Flüssigkeit zuerst die Wände und Zellen durchbringt, und später auch die Höhlungen derselben selbst ausfüllt. Der Vorgang dieser Versteinernung ist also ein wahrer Imprägnations-Prozeß. Wasserpflanzen lassen ihre Reste in derselben Wassermasse, in der sie leben, und werden an Ort und Stelle begraben, wenn nicht Fluthen oder Strömungen sie an andere Stellen führen, in welchem Falle sie den oben geschilderten Verhältnissen unterworfen sind.

Die Kenntniß der Vorgänge, welche sich in der gegenwärtigen Periode an der Oberfläche der Erde ereignen, und der Bildungen, die sich unter unsern Augen gestalten, gewährt uns Einsicht in die Vorgänge, welche bey der Bildung der älteren Schichten der Erdrinde stattgefunden, deutet an, wie sie entstanden sind, und macht uns auf manche Umstände aufmerksam, welche dabey mitgewirkt haben. Das Studium der Bildungen des Alluviums, deren Entstehungsweise wir tagtäglich beobachten können,

und die so mannichfaltig sind, gibt daher die beste Vorbereitung und Einleitung zum weitem Studium der Geologie.

2. Formation. Diluvium.

Altes Alluvium.

Die Hauptmassen des Diluviums, welches stets unter den Bildungen des Alluviums liegt und mit denselben nie wechsellagert, bestehen aus Thon, Lehm, Sand, Mergel, Grus, Tuffen und Conglomeraten, aus Schutt- und Trümmerablagerungen. Sie haben eine außerordentliche Verbreitung, und die letzteren sind durch große Fluthen über ganze Länder abgelagert worden. Sie haben selbst Bergketten überstiegen, und befinden sich meist weit entfernt von der ursprünglichen Lagerstätte, in einer solchen Lage, daß sie gegenwärtig selbst beym höchsten Wasserstande, von den höchsten Fluthen, nicht mehr erreicht werden. Zerstreute Trümmer, Felsblöcke, in Schuttmassen eingeschlossen, haben nicht selten eine solche Größe, daß sie auf die erhabenen Punkte, an denen wir sie heute sehen, nur von ganz außerordentlichen Fluthen können abgesetzt worden seyn. Die Mächtigkeit der Ablagerungen ist im Allgemeinen viel größer als beym Alluvium, und beträgt öfters über 200 Fuß.

Zwischen den losen Massen dieser Gebirgsbildung, in Sand, Lehm, Thon und Schutt eingeschlossen, oder in thonige und kalkige Massen eingewickelt und in Spalten und Höhlen abgelagert, kommen viele organische Reste vor, zumal Thierreste. Diese Reste gehören zur Hälfte untergegangenen Gattungen an, mehrere untergegangenen Geschlechtern, und die lebenden Arten, welche den im Diluvium eingeschlossenen Fossilien entsprechen, findet man heut zu Tage zum Theil in der warmen Zone, was andeutet, daß die Temperatur an der Erdoberfläche zur Zeit der Ablagerung der Diluvialbildungen höher gewesen ist, als gegenwärtig.

Uebrigens verlangen die lebenden Thiergattungen, deren Analoga im Diluvium begraben sind, ein wärmeres Klima als Italien, Frankreich, Deutschland, England, Rußland gegenwärtig darbieten, wo man sie so häufig in Diluvialschichten findet. Ganz charakteristisch ist das Vorkommen der Fossilienreste eines Ele-

phanten, des *Elophas primigenius*, Blumenb., den die Russen *E. mamontous*, wir *Mammuth*, nennen. Er ist im mittleren Europa überall zerstreut, wird von den Felsen von Gibraltar an, und den Hochebenen von Chili, bis herauf zum 66.° nördlicher Breite, in den Diluvialmassen gefunden, und ist in Nordasien so häufig, daß die Stoßzähne einen Handelsartikel bilden. Die Querstreifen seiner Backenzähne sind parallel, wie beym noch lebenden asiatischen Elephant, aber die Blätter dünner und zahlreicher, als bey diesem. S. Bd. VII. S. 1181.

Nach diesen Elephantenresten findet man am häufigsten die fossilen Reste eines Nashorns, welches dem indischen sehr ähnlich ist, und von Blumenbach *Rhinoceros antiquitatis*, von Cuvier *Rh. tichorhinus* genannt worden ist. Außerdem kommen öfters die Reste eines colossalen Hirsches vor, *Corvus giganteus*, Blumenb., und einiger anderer Hirschgattungen, ferner Ochsen-Gattungen, namentlich *Bos priscus*, und *Bos primigenius*, Mastodonten, zumal *Mast. giganteum*, das Obiethier oder Mammuth der Americaner, Reste von Flusspferden, *Hippopotamus major*, *intermedius*, *minutus*, Cuv., sodann *Megatherium australe*, Olen, Bären-, Hyänen-, Tiger-, Tapir-, Pferde-, Hund-, Schwein-Reste und noch einige andere, endlich mehrere Vögel-, Wasser- und Landconchylien und viele Pflanzen-Reste.

Die Diluvialgebilde liegen theils am Fuße der Gebirge, in Thälern und Ebenen, theils an Abhängen, auf Hochflächen und zum Theil selbst auf den Gipfeln der Berge und den Rücken der Gebirge. Blöcke, die von entfernten Felsen stammen, deren Lage wohl bekannt ist, liegen mehrere Hundert Fuß höher als die Stammselsen. Keine Fluth der gegenwärtigen Zeit wäre im Stande, sie auf eine solche Höhe zu schaffen, und oftmals sind sie, mit anderen Geröll- und Schuttmassen, in einer Richtung verbreitet, die dem heutigen Flußsysteme nicht entspricht. Neue Fluthen sind also nicht nur der Richtung der vorhandenen Thäler gefolgt, sondern auch über diese und über Berge weggegangen. Da man verschiedene Richtungen in den Ablagerungen von Blöcken, Sand und Geröll beobachtet und weiter erkannt hat, daß die Fluthen, welche sie verbreiteten, mit den Erhebungen einzelner

Gebirge im Zusammenhange stehen, diese aber, wie uns zuerst L. v. Buch, und dann ausführlich E. de Beaumont gelehrt, zu ganz verschiedenen Zeiten erfolgt sind, so müssen wir auch verschiedene Fluthen und in verschiedenen Zeiten der Diluvialperiode gebildete Ablagerungen unterscheiden.

Lehm-, Thon-, Katten-, Sand- und Mergel- Ablagerungen.

Diese lockeren Gebilde sind allverbreitet im Gebiete des Diluviums, und bilden bedeutende Ablagerungen. Hinsichtlich der Zusammensetzung den analogen Gebirgsarten des Alluviums ähnlich, unterscheiden sie sich von diesen durch den Einfluß der organischen Reste.

Der Lehm ist öfters mit Sand und Geröllern untermengt, und schließt manchmal viele organische Reste ein, wie bey Cannstadt in Württemberg und bey Liebe, unweit Wolfenbüttel, wo man in einem Lehmlager sehr viele Knochen antediluvianischer Thiere gefunden hat. Diluviallehm bildet die oberste Lage des großen mexicanischen Plateaus, die Hauptmasse des salzigen Bodens der persischen Ebenen und die Oberfläche eines großen Theils der sibirischen Steppen.

Thonablagerungen erscheinen im Diluvium vorzüglich in Buchten und Mulden abgesetzt, am Fuße der Gebirge oder in Thälern, und treten mehr als Locale Bildungen auf. Zerstückte thonhaltige Gesteine scheinen das Material dazu herzugeben, zufließende Wasser den Thon ausgeschlemmt und in ruhigeren Wasserstellen abgesetzt zu haben. Im Rheinthale, am Fuße des Schwarzwaldes und der Vogesen abgelagerte Thonmassen, können auf diese Weise entstanden und abgesetzt worden seyn. Thontige Sandsteine, die am Gebirgsfuße anstehen, haben das Material geliefert zu den Ablagerungen bey Heimbach und Baden am Schwarzwalde, zu jenen von Safflenheim, Schirrhofen und Fischweiler an den Vogesen, und auf ähnliche Weise ist der Sandstein des Solling in der Wesergegend das Material zu den dortigen Thonablagerungen, namentlich zu dem Thonlager von Renne gegeben. Der Quarzsand der durch den Thon zum

Sandstein verkittet war, liegt oft in besonderen Schichten bey'm Thon oder ganz in seiner Nähe.

Lettenlager erscheinen in alten Seebecken, Flussbetten, Thälern, oft im Wechsel mit Sandablagerungen. Diese treten für sich und im Wechsel mit obigen, in großen Massen in Niederungen auf, in großen Thälern, wie im Rheinthale, und bilden vorzugsweise den Boden der Steppen und Wästen. Sandmassen bilden die Oberfläche der großen norddeutschen Ebene, und ziehen von Holland durch dieselbe fort bis nach Rußland. Bey Berlin und Potsdam hat man darinn viele Thierknochen gefunden. Mitunter wird der Sand durch Eisenoxydhydrat verkittet und zu einem Sandstein verbunden, der am Ufer der Ostsee bisweilen in einzelnen Bänken hervorragt. Die Rührungen des baltischen Meeres, schmale, weit fortsetzende Landzungen, sind alte Dünen.

Mergellager gehören zu den alten Fluss- und Seebildungen, die längs den Ufern oder an den Mündungen, öfters in ansehnlicher Höhe über dem gegenwärtigen Wasserstande, abgesetzt worden sind. Es liegen darinn häufig knollige und kugelförmige Stücke, zuweilen noch abwärts zackige, plattenförmige Massen von Kalkmergel, die durch Infiltration kohlensäurehaltigen Wassers gebildet worden sind. Stetsförmig liegen Knochen großer antediluvianischer Biersäfer darinn, Land- und Süsswasserschnecken, Gattungen, die theils ausgestorben sind, oder sich von den lebenden mehr oder weniger unterscheiden, oder mit denselben ganz übereinstimmen.

Hierhin gehören die Mergelablagerungen im nördlichen Deutschland, diejenigen des östlichen Ungarns, die Mississippi-mergel mit verkohlten Pflanzenresten, und die Mergelmassen im Donau-, Garonne-, Seine- und Rheinthale. Das gelblichgrane, lockere Mergelgebilde des Rheinthals ist besonders ausgezeichnet und wohl am besten bekannt. Man nennt diesen Mergel im Rheinthale Löss. Er ist, zumal zwischen Basel und Andernach, am Fuße der beiderseitigen Gebirge, mächtig abgelagert und auch in die Seitenthäler der Elsenz, des Neckars u. s. w. abgesetzt. Er erhebt sich durchschnittlich 400 Fuß über den Rheinspiegel, und enthält viele calcinierte Schnecken, von welchen *H. hiopida*, *H. arbastorum*, *Succinea oblonga*, *Pupa muscorum* und

Clanilla parvula am gewöhnlichsten vorkommen, und deshalb besonders charakteristisch sind. Ueberdies liegen häufig Mammuthknochen darinn, seltener Reste von *Rhinoceros tichorhinus*, *Corvus euryceros*, *Bos priscus*, *Equus caballus*. Reste darinn liegende Knauer von Kalkmergel heißen Kupfsteine.

Der Löss ist nicht geschichtet, liegt unmittelbar auf dem Rheinschuttland, auf Geröllen oder Sand, und ist in seinen untersten Lagen öfters damit vermengt. Er liegt an und auf allen Vorbergen der rheinischen Gebirge, ist von tiefen Hohlgräben durchschnitten, trägt die mannichfaltigsten Pflanzungen, muß aber, zur Verhütung von Abrutschungen und Einstürzen, gut terrassiert werden. Der Löss zeigt große Uebereinstimmung mit der obersten Schichte der Rheininseln, und scheint von einem strömenden Wasser abgesetzt worden zu seyn.

Geröllablagerungen und Conglomerate; Eisenwerke.

Gerollte Steine füllen den Grund vieler Thäler aus, bedecken große Ebenen, setzen kleine Hügel zusammen, und liegen öfters auf Terrassen, die weit über die höchsten gegenwärtigen Wasserstände erhaben sind, und mitunter entfernt von Seen oder Flüssen. Sand und Grus wechseln mit den Geröllen, die von der Größe des Hirseforns bis zur Faust- und Kopfgröße variiren. Größere Dimensionen sind selten. Die Gerölle sind meistens stark abgerundet, stammen bald von den nächsten Bergen, der unmittelbaren Unterlage, oder sind von entfernteren Punkten hergeführt. Die Mächtigkeit ist manchmal sehr bedeutend, und an vielen Orten noch unergründet. Im Rheinthale nennt man diese Geröllablagerungen kurzweg Kies; in der Gegend von München Schotter. Hin und wieder sind die Gerölle durch ein kalkiges Cement zu einem nagelfluhartigen Conglomerat verkittet; bisweilen auch durch Eisenrost. Mitunter liegen in Braunkohle umgewandelte Hölzer darinn.

An mehreren Orten enthalten solche Geröllablagerungen nupbare oder geschätzte Mineralien, Metalle oder Edelsteine, welche sodann durch Wascharbeiten gewonnen werden. Man nennt lockere Diluvialmassen, welche nupbare oder geschätzte

Mineralien einschließen; Seifenwerke. Mit den Geröllen, die in diesem Falle gewöhnlich klein sind, kommen vorzüglich Quarzsand, Thon und Lehm vor. Eisenrost erscheint häufig als färbende Substanz.

Man unterscheidet vorzüglich Gold-, Platin-, Zinn-, Demant- und Edelstein-Seifen.

Die Goldseifen sind die gewöhnlichsten. Sie führen Se-diegen-Gold in Körnern und Blättchen, und werden schon seit den ältesten Zeiten ausgebeutet. Die reichsten liegen in Africa (Manica, Monomotupa, Schabun, Fazoglo, Bouré), Asien (Ural) und America (Nord- und Süd-Carolina, Georgia, Mexico, Columbia, Brasilien).

Platinseifen liegen in America (Columbia, Brasilien) und Asien (Ural, hier 1822 entdeckt, und nunmehr die wichtigste Fundstätte).

Zinnseifen, die Körner von Zinnstein führen, sind seit den ältesten Zeiten in Cornwall bekannt, und liegen auch im sächsischen Erzgebirge. Auch in Mexico, Chili und Ostindien werden Zinnseifen ausgewaschen.

Demantseifen liegen in Ostindien, Brasilien, Sibirien und Nordafrika. Die indische Halbinsel war schon den Alten als die Heimath des Demants bekannt, und galt als solche ausschließlich bis zum ersten Decennium des verfloffenen Jahrhunderts, in welchem auch in Brasilien Demante aufgefunden wurden. Im Jahr 1829 endlich wurden sie auch am Ural entdeckt, und vor Kurzem in Nordafrika. Die reichsten ostindischen Demantseifen liegen zu Golconda. Sie bestehen aus einem lockeren Conglomerat, das aus Bruchstücken verschiedener Quarzabänderungen zusammengesetzt ist und ein thoniges Bindemittel besitzt. Die brasilianischen Demantseifen liegen in der Gegend von Lejuco, 40 Leguas von Villa Rica. Das Gerölle dieser Wäschchen besteht aus Quarz, Thonschiefer, Itakolumit, Brauneisenstein, Jaspis und aus Körnern von Topas, Corund, Chrysoberyll und Spinell, und enthält auch Gold und Platin. Am Ural finden sich die Demante auf der Westseite, unfern Nischne-Nura, unter Verhältnissen, die den brasilianischen sehr ähnlich sind.

Edelsteineisen liegen in Brasilien, Peru, Chili. Am böhmischen Mittelgebirge liegen granatführende Lager.

Gebirgsschutt und lose Felsblöcke.

In allen Ländern finden sich lose Felsblöcke, theils freiliegend in Ebenen, Thälern, selbst auf Berghöhen, bald einzeln zerstreut, bald in Gruppen zusammengehäuft, theils in Schuttmassen, in Sand und Gerölle, eingeschlossen. Sie bestehen, wie der sie umschließende Schutt, aus Gesteinen, die in ihrer jetzigen Umgebung nicht vorkommen, die ganz verschieden sind von den Gesteinen der umliegenden oder benachbarten Berge und Gebirge. Es sind von entfernten Orten herbeigeführte Massen, Fremdlinge in der Gegend, wo sie heute liegen. Unsern Altvordern schon fielen die fremden Blöcke auf, die der Sächse und Schweizer Findlinge heißt, der Italiener Trovanti und der Geologe auch erratische Blöcke (Felsblöcke) nennt, theils wegen ihres Vorkommens und Bestandes, theils wegen ihrer Größe. Sie haben häufig einen körperlchen Inhalt von 10—100 Cubikfuß, viele darüber und bis zu mehreren Tausenden, ja einzelne besitzen einen Körperlcheninhalt von 50 bis 60,000 Cubikfuß. Die Stücke, welchen den Schutt zusammensetzen und die kleineren Blöcke, sind abgerundet, die größeren dagegen mehrentheils eckig, und manchmal sogar scharfkantig.

Durch diese Vorkommnisse besonders ausgezeichnet sind der südliche und nördliche Fuß der Alpen, und dieser bis auf die Höhen des Jura und bis nach Oberschwaben hinein, die baltischen Ebenen, England, der Süden Scandinaviens und Nordamerica. Die Schuttmassen und Findlinge am Nordfuße der Alpen liegen am Jura bis auf eine Höhe von 4000 Fuß, und stammen sämmtlich aus den Alpen, aus dem Hintergrund in der Centralkette entspringender Alpenhöhlen, denen gegenüber man sie antrifft. Die Schutt- und Blöckmassen dieser verschiedenen Thäler lassen sich wohl von einander unterscheiden, und sind nur hin und wieder in flacheren Gegenden vermengt. Im oberen Rheinthale, im Becken des Bodensees und in Oberschwaben liegen die Granite, Gneise, Serpentine, Gabbro-Abänderungen und Kalle

Graubündens; im Reußgebiete die Gesteine des Gotthardt, im Aarthal die Gesteine des Berner Hochgebirges u.s.w.

In den Thalverengungen fehlen die Blöcke in der Regel ganz, in den Thalweiten liegen sie aber in größter Anzahl, eben so auf Berghöhen, die davon bisweilen ganz übersät sind. Am Jura sieht man sie vorzüglich an Stellen, welche den Alpenthälern gegenüber liegen, und hier gehen sie am weitesten hinauf; ist an solchen das Juragebirge durchgerissen, so findet man die Findlinge auch in Thälern, welche hinter der durchrissenen Stelle liegen. Die Felsenwände der Alpenthäler, durch welche heraus man die Verbreitung der Blöcke verfolgen kann, zeigen, und zwar oftmals in großer Höhe, Abschleifungen, Furchen und Kerben, in der Richtung ihrer Längenerstreckung.

Diese Verhältnisse der Ablagerung der Findlinge und des Gebirgsschutts haben große Ähnlichkeit mit den Verhältnissen der Geschiebeablagerungen unserer heutigen Ströme, und führen daher ganz natürlich auf den Gedanken, daß sie durch mächtige Wasserfluthen bewirkt worden seyen.

In neuester Zeit hat Benes eine Theorie aufgestellt, wonach die Blöcke in früherer Zeit durch Gletscher, welche die Thäler erfüllten, und noch hoch am Jura hinauf lagen, angehäuft und verbreitet worden seyn sollen. Der Schutt und die Blöcke ruckten, nach ihm, aus dem Hintergrunde der Thäler in Sufferlinien nach dem vorderen Rande der Gletscher, und häuften sich hier in Moränen an. Die Abschleifungen und Furchen der Felswände, die man bis dahin als Anzeigen alter Wasserströme betrachtet hatte, werden für eine Folge der Reibung des Eises gegen die Felswände erklärt. Diese Theorie nimmt also an, daß zur Zeit der Diluvialbildungen die Alpenthäler und das große Thal zwischen den Alpen und dem Jura von Gletschern eingenommen war, und über diese weg müssen Schutt und Blöcke bis auf den Jura und die Abhänge und Höhen der schwäbischen Molassehügel gerutscht seyn!

Treten wir in die norddeutschen Ebenen ein, so treffen wir eine andere, höchst ausgezeichnete Ablagerung von Schutt und Blöcken, die besonders dadurch merkwürdig ist, daß die Gesteine, woraus sie besteht, aus weiter Ferne stammen, von den

scandinavischen Gebirgen herkommen, und also durch ein Meer von ihrer Geburtsstätte getrennt sind. Von Holland an zieht sich diese Ablagerung durch alle baltischen Länder, durch Polen und Rußland bis in die Gegend von Moskau.

Schon in der Gegend von Dresden und Leipzig findet man finnländische Blöcke, und von da liegen scandinavische Abkömmlinge bis zum Meer. Jenseits desselben erscheinen sie in Seeland wieder, in den Umgebungen von Kopenhagen und hinauf bis Helsingör. Jenseits des Sundes findet man sie wieder in Schweden und durch den mittleren Theil von Schweden bis zum hüglichen Lande, an der Gränze gegen Norwegen. Die Schuttmassen und Blöcke bilden hier häufig parallellaufende, langgezogene, schmale Hügel, welche die schwedischen Geographen Åsar nennen, und deren lineare Richtung von N.-N.-W. gegen S.-S.-O. geht. Diese Åsar gleichen den Absätzen von Geröll, die sich in Flüssen unterhalb eines Gegenstandes anlegen, der die Strömung hemmt. An den Seiten der Gneis- und Granithügel, welche im Zuge der Åsar liegen, sieht man zahlreiche Kerben und Furchen in der Längsrichtung der Schutthügel eingegraben.

Alles deutet hier auf eine Fluth hin, welche Schutt und Blöcke vom Plateau des mittleren Schwedens herab nach Süden fortgerissen, über den Sund und die Ostsee in die baltischen Länder geführt hat. Oder wurden die scandinavischen Blöcke durch Gletscher fortgeschoben und über das Meer getragen?

Im östlichen Theile von England liegen Schutt und Blöcke zerstreut, die theils von den nördlicheren englischen, theils von den scandinavischen Gebirgen abstammen; in Nordamerica liegen weit hinab zerstreute Blöcke der nördlicheren Gegenden. Auch in den Gebirgen von Potosi, in Oberägypten, in der lybischen Wüste, selbst am Fuße des Himalaja, hat man das Phänomen erraticher Blöcke beobachtet.

Diluvial-Eisenerze.

Beynahe in allen Ländern findet man Ablagerungen von Eisenerzen, welche die unverkennbaren Zeichen eines Fluthlandgebildes an sich tragen. Die Erze sind von ganz verschiedener Beschaffenheit, Trümmer älterer Lagerstätten, stumpfedit,

Graubündens; im Kemptgebirge
 Arthol die Gesteine des

In den Thälern
 ganz, in den Thälern
 so auf Berghöhe
 Jura steht man
 gegenüber hier
 solchen das
 linge auch
 liegen.

man die
 zwar
 ben,

6
 7

*Die Thäler sind im Allgemeinen von Eifen- bis
 zu Eisen- und Kalksteinen, die in großen
 Massen auftreten, sind in Oefen, sind mit Thon,
 andern Gesteinen, mit Eifensteinen, mit
 Gesteinen und mit verschiedenen Ueberresten von Paläotho-
 ren, wie: Delf, Wolf, Fisch, Delf, Rhinoceros, Elephant u. f. w.
 Kalkbreccien.*

In westlichen Gegenden steht man zu Tage ausgehende
 Spalten mit Thon ausgefüllt, worinn Knochen antebiluvia-
 nischer Thiere liegen. Das thonige Gestein, gewöhnlich eisenhaltig,
 bisweilen auch sandig oder mergelig, verbindet die Knochen zu
 einer festemasseigen Masse. Darunter ist Kalk eingesintert, der
 die Knochen vermischt. Außer den Thierknochen sind theils
 die Schalen von Conchylien, theils nur Meerconchylien ein-
 geschlossen, und öfters auch Gerölle. Die Wandungen der Spal-
 ten sind nicht selten wie von einer Flüssigkeit angegriffen, und
 bisweilen von Bohrmuscheln angegriffen.

Man hat solche mit Knochenbreccie erfüllte Spalten vorzüg-
 lich an den Küsten des Adria- und Mittelmeeres, am dalmati-
 schen Litorale, sodann zu Gatte, Antibes, Nizza, Gibraltar, auf
 Corsica und Sardinien gefunden. Ein Theil der Spalten ist über
 dem Meere ausgefüllt worden, und dieser schließt Landschnecken
 ein; ein anderer Theil wurde ausgefüllt, während die Spalten
 unter dem Meere standen; und dabei wurden Meerconchylien mit
 eingeschlossen, und vor der Ausfüllung konnten Bohrmuscheln
 die Wandungen der offenen Spalten angreifen. Da auch solche
 Spalten heute beträchtlich über dem Meerespiegel erhaben sind,
 so folgt daraus, wie groß die Niveau-Veränderung zwischen Land
 und Meer seit der Zeit ihrer Ausfüllung gewesen ist.

Knochenhöhlen.

Höhlen im festen Gesteine, besonders in geschichteten Kalk-
 formationen, erscheinen als buchtige, unterirdische Ausweitungen.
 Sie zeigen häufig eine große Erstreckung, bieten zahlreiche Er-
 weiterungen und Verengerungen dar, und große Hallen sind oft
 durch enge Oeffnungen oder Canäle mit einander verbunden, durch

welche man nicht selten nur mit Mühe durchkriecht. Die niemals parallelen Wände sind gewöhnlich mit Tropfsteinen der verschiedenartigsten Gestalt ausgeschmückt, öfters sehen sie aus wie abgerieben oder wie angefressen von einer corrodierenden Flüssigkeit. Das Innere dieser Höhlen ist mehr und weniger ausgefüllt mit fremdartigen Massen, mit feinem Lehm oder Thon, mit gerollten Steinen, worunter bisweilen Fremdlinge der Gegend, mit Bruchstücken des Gesteins, worinn die Höhle liegt, und die von ihrer Decke herabgefallen sind. In dieser Masse liegen häufig viele Knochen von Raubthieren und Graßfressern, so daß sie oftmals jener Breccie sehr ähnlich ist, welche offene Spalten ausfüllt.

Höhlen dieser Art liegen in den verschiedenartigsten Kalkformationen, von den ältesten an bis herauf zu den neuesten. Bald befinden sie sich in der Nähe der Berggipfel oder der Plateaus, und haben hier ihre Zugänge, bald ziehen sie sich von den Abhängen oder vom Fuße der Berge ins Innere, und haben in diesem Falle ihre Oeffnungen an der Thalseite. Diese sind bald weit und groß, bald klein und hin und wieder so enge, daß man sie erweitern muß, um ins Innere zu gelangen. Oefters sind die Eingänge verstärkt durch eingebrochene Stücke des anstehenden Gesteins.

Der Boden der Höhlen ist gewöhnlich uneben, höckerig, und namentlich durch Massen von Kalksinter, die von oben herab gesintert sind, und öfters eine dicke Kruste über der thonigen Lage bilden, worinn die Knochen liegen. Diese Sinterbildung dauert noch fort, indem fortwährend die Wasser von oben eintbringen, und wie an den Seiten und am Gewölbe, so auch Kalk auf dem Boden absetzen.

Die Thierknochen, welche unter der Sinterkruste in Thon und Schlamm liegen, gehören zum größten Theil Bären- oder Hyänen-Gattungen an. Der Bär, dessen Knochen am gewöhnlichsten vorkommen, ist von Blumenbach Höhlenbär (*Ursus spelaeus*) genannt worden, und so wurde auch die Hyäne, die am öftesten gefunden wird, Höhlenhyäne (*Hyaena spelaea*) genannt. Im Verhältniß gegen die Reste dieser beiden Thiere, machen die der anderen nur einen geringen Theil aus. Bald

mehr oder weniger abgerundet, im Durchschnitt von Linien- bis CygröÙe. Sie liegen in flachen Mulden, Spalten, Kessel- und trichterförmigen Vertiefungen, selbst in Höhlen, sind mit Thon, Sand und Geröllen untermengt; mit Versteinerungen älterer Gebirgsbildungen und mit mannichfaltigen Ueberresten von Paläotherium, Hapfisch, Bär, Wolf, Pferd, Ochse, Rhinoceros, Elephant u. s. w.

Knochenbreccien.

In mehreren Gegenden steht man zu Tage ausgehende Spalten mit Thon ausgefüllt, worinn Knochen antediluvialischer Thiere liegen. Das thonige Gestein, gewöhnlich eisenhaltig, bisweilen auch sandig oder mergelig, verbindet die Knochen zu einer breccienartigen Masse. Mitunter ist Kalk eingesintert, der die Festigkeit vermehrt. Außer den Thierknochen sind theils Sand- und Salzwasser-Conchylien, theils nur Meerconchylien eingeschlossen, und öfters auch Gerölle. Die Wandungen der Spalten sind nicht selten wie von einer Flüssigkeit angefrissen, und bisweilen von Bohrmuscheln angegriffen.

Man hat solche mit Knochenbreccie erfüllte Spalten vorzüglich an den Küsten des Adria- und Mittelmeeres, am dalmatischen Litorale, sodann zu Gatte, Antibes, Nizza, Gibraltar, auf Corsica und Sardinien gefunden. Ein Theil der Spalten ist über dem Meere ausgefüllt worden, und dieser schließt Landschnecken ein; ein anderer Theil wurde ausgefüllt, während die Spalten unter dem Meere standen, und dabei wurden Meerconchylien mit eingeschlossen, und vor der Ausfüllung konnten Bohrmuscheln die Wandungen der offenen Spalten angreifen. Da auch solche Spalten heute beträchtlich über dem Meerespiegel erhaben sind, so folgt daraus, wie groß die Niveau-Veränderung zwischen Land und Meer seit der Zeit ihrer Ausfüllung gewesen ist.

Knochenhöhlen.

Höhlen im festen Gesteine, besonders in geschichteten Kalkformationen, erscheinen als buchtige, unterirdische Ausweitungen. Sie zeigen häufig eine große Erstreckung, bieten zahlreiche Erweiterungen und Verengerungen dar, und große Hallen sind oft durch enge Oeffnungen oder Canäle mit einander verbunden, durch

welche man nicht selten nur mit Mühe durchfriecht. Die niemals parallelen Wände sind gewöhnlich mit Tropfsteinen der verschiedenartigsten Gestalt ausgeschmückt, öfters sehen sie aus wie abgerieben oder wie angefressen von einer corrodierenden Flüssigkeit. Das Innere dieser Höhlen ist mehr und weniger ausgefüllt mit fremdartigen Massen, mit feinem Lehm oder Thon, mit gerollten Steinen, worunter bisweilen Fremdlinge der Gegend, mit Bruchstücken des Gesteins, worinn die Höhle liegt, und die von ihrer Decke herabgefallen sind. In dieser Masse liegen häufig viele Knochen von Raubthieren und Grasschnecken, so daß sie oftmals jener Breccie sehr ähnlich ist, welche offene Spalten ausfüllt.

Höhlen dieser Art liegen in den verschiedenartigsten Kalkformationen, von den ältesten an bis herauf zu den neuesten. Bald befinden sie sich in der Nähe der Berggipfel oder der Plateaus, und haben hier ihre Zugänge, bald ziehen sie sich von den Abhängen oder vom Fuße der Berge ins Innere, und haben in diesem Falle ihre Oeffnungen an der Thalseite. Diese sind bald weit und groß, bald klein und hin und wieder so enge, daß man sie erweitern muß, um ins Innere zu gelangen. Oefters sind die Eingänge verstäzt durch eingebrochene Stücke des anstehenden Gesteins.

Der Boden der Höhlen ist gewöhnlich uneben, höckerig, und namentlich durch Massen von Kalksinter, die von oben herab gesintert sind, und öfters eine dicke Kruste über der thonigen Lage bilden, worinn die Knochen liegen. Diese Sinterbildung dauert noch fort, indem fortwährend die Wasser von oben einbringen, und wie an den Seiten und am Gewölbe, so auch Kalk auf dem Boden absetzen.

Die Thierknochen, welche unter der Sinterkruste in Thon und Schlamm liegen, gehören zum größten Theil Bären- oder Hyänen-Gattungen an. Der Bär, dessen Knochen am gewöhnlichsten vorkommen, ist von Blumenbach Höhlenbär (*Ursus spelaeus*) genannt worden, und so wurde auch die Hyäne, die am öftesten gefunden wird, Höhlenhyäne (*Hyaena spelaea*) genannt. Im Verhältniß gegen die Reste dieser beiden Thiere, machen die der anderen nur einen geringen Theil aus. Bald

haben die Bären, bald die Hyänen-Knochen die Oberhand. Mitunter hat man auch schon Höhlen gefunden, welche nur Reste von Grasfressern einschließen, Knochen von Hirschen, Elephanten, Rhinocerossen u. s. w.

In Deutschland hatten die Höhlen seit langer Zeit schon größte Aufmerksamkeit erregt und die Phantasie des Volkes angesprochen. Wunderbares verlautete davon im Volksmunde. Die Knochen wurden für heilkräftig gehalten, sorgfältig zusammengesucht, und waren in den Apotheken als fossiles Einhorn (*Unicornu fossile*) vorrätzig.

Durch die Arbeiten von Leibniz ^{*)}, Blumenbach, Schmerring, Cuvier, Goldfuß und namentlich von Buckland, erhielten die Knochenhöhlen ein neues, erhöhtes wissenschaftliches Interesse.

Von den deutschen Knochenhöhlen wurde die Baumannshöhle am Harz frühzeitig berühmt. Sie liegt im Budethal, nahe bey Rübeland, im Grauwackenkalkstein. Ihre 6 Kammern sind durch enge Canäle mit einander verbunden, und schließen vorzüglich Bärenknochen ein, die, theils im zerbrochenen Zustande und mit gerollten Steinen untermengt, theils wohl erhalten, von Schlamm und Sand umgeben, in den tieferen Stellen liegen. Es mag diese Höhle dereinst von Bären bewohnt gewesen seyn. Die Gewalt, welche die Kalksteine bewegte und in dieselbe führte, kann einen Theil der Knochen zerbrochen haben. Nicht weit davon befindet sich die Schwarzfelser Höhle (Einhornshöhle), welche Knochen von Bären, Hyänen, Tigern oder Löwen enthält.

Der Knochenhöhlen wegen besonders interessant ist der fränkische Jura, in der Gegend von Gailenreuth und Ruggerndorf, alwo im kleinen Thale der Wiesent und in der nahen Umgebung 24 Höhlen im Dolomite des Jura liegen, von welchen viele Knochen enthalten. Am bekanntesten und reichhaltigsten an Bärenknochen ist die Gailenreuther Höhle. Die Knochen liegen theils in einer lockeren Erde, theils in einer harten Masse von Kalksinter, und sind bereits in solcher Menge

^{*)} Leibniz gab in seiner „Protogaea“ mit scharfen Sägen das erste gute Bild von einigen der wichtigsten Höhlen unseres Vaterlandes.

aus ihr hervorgezogen worden, daß ihre Zahl den Stelleten von Tausend Thieren entspricht. Von diesen gehören etwa 800 dem *Ursus spelaeus* an, 70 zwey anderen ausgestorbenen Bären-gattungen, 60 nämlich dem *Ursus arctoides* und 10 dem *Ursus priscus*; auf den Wolf, Bären und Bielesch kommen 180 Individuen, und auf die Hyänen 25. Die Knochen sind wohl erhalten, nicht abgerieben, obgleich gerokte Kalksteine und Kiesel dazwischen liegen, welche ohne Zweifel durch eine Wasserfluth hereingetrieben worden sind. Goldfuß folgert aus seinen Beobachtungen, daß der größte Theil der Thiere als Leichen durch eine Fluth mit den Geröllen in die Höhle getrieben worden sey. Die Röhloch-Höhle ist dadurch ausgezeichnet, daß sie weder Lehm noch Gerölle, sondern eine lockere, mit thierischer Materie durchdrungene Erde enthält, worin Knochen von Hyänen, Bären, Bären, vom Fuchs und *Rhinoceros* liegen. Dieß scheint anzudeuten, daß die Raubthiere in der Höhle gelebt und ihre Beute hineingeschleppt haben.

Merkwürdige Höhlen befinden sich ferner im Kohlenkalkstein in Westphalen, die Sundwiger-Höhle bey Iserlohn und die Höhle Hohlstein bey Rösenbeck. Die Höhle von Sundwig enthält eine überwiegende Menge von Bärenknochen, die den dreyerley Gattungen angehören, und welche die mannfaltigsten wieder ausgeheilten Verletzungen zeigen, was wohl davon herrühren kann, daß diese Thiere, während ihres Lebens, harte Kämpfe zu bestehen hatten; überdieß liegen in dieser Höhle Knochen von dreyerley Hirschen (*Corvus Elaphus somalis*, Goldf., *Cervus gigantous*, Blumenb., *Cervus dama*, Linn.), von Schweinen (*Sus priscus*, Goldf.), vom Bielesch und *Rhinoceros*. Von den Knochen der Pflanzenfresser sind viele augenagt. Engere Durchgangsstellen dieser Höhlen zeigen abgeriebene Seitenwände. Aus all diesem läßt sich ableiten, daß die Bären diese Höhle längere Zeit bewohnt und die übrigen Thiere als Beute hineingeschafft haben. Die Hohlstein-Höhle zeichnet sich vor allen anderen deutschen Höhlen dadurch aus, daß sie weit mehr Hyänen- als Bären-Knochen enthält; überdieß findet man in ihr Knochen vom Hirsch, Pferd, Bielesch und *Rhinoceros*. Diese Höhle scheint längere Zeit von Hyänen bewohnt gewesen zu seyn.

Sehr viele Höhlen befinden sich im schwäbischen Jura, und von denselben sind einige dreßzig genauer beschrieben. Man hat indessen erst in einer einzigen derselben, in der Carlshöhle bey Erpfingen, die erst 1833 geöffnet wurde, Knochen antediluvianischer Thiere, nämlich Knochen vom *Ursus spelaeus* und vom Vielfraß (*Gulo spelaeus*, Goldf.), gefunden.

Ein ganz besonderes Interesse gewährte die genaue Untersuchung der Höhle von Kirkdale, im östlichen Yorkshire, die wir H. Buckland verdanken. Sie wurde 1821 entdeckt, ist im Ganzen 245 Fuß lang, aber so nieder, daß ein Mensch nur an einigen Stellen darinn aufrecht stehen kann. Der Boden dieser Höhle war mit thonigem Schlamm bedeckt, der eine beynahe ganz ebene Lage bildete, und nur da, wo sich Tropfsteine darauf angeheft hatten, höckerig. Man kann annehmen, daß diese Höhle bey ihrer ersten wissenschaftlichen Untersuchung noch völlig unberührt war. Die Knochen liegen in dem Schlamm unregelmäßig zerstreut, der kalkig und weiter vom Eingang entfernt gröber und sandig ist. Hyänenknochen herrschen bey weitem vor; außerdem fand Buckland darinn Knochen vom Elger, Bär, Wolf, Fuchs, Wiesel, Ochs, Pferd, Reh, Hippopotamus, Rhinoceros, Elephant, Hasen, Caninchen, von der Ratte, Wasserratte, Maus und einige Vogelknochen, wie vom Raben, einer Taube und einer Entengattung. Viele von den Knochen sind zerbrochen, angenagt, und selbst auch Hyänenknochen. So findet man es gerade auch in den Schlupfwinkeln dieser heerdenweise bespammten lebenden und mit einander jagenden Raubthiere, welche nicht nur die Beute und verschiedene Cadaver in ihre Höhlen schleppen und dort verzehren, sondern selbst auch die Cadaver ihrer eigenen Gattung fressen. Wir können daher annehmen, daß die Kirkdale-Höhle lange Zeit von Hyänen bewohnt war. Das häufige Vorkommen von Excrementen dieser Thiere hebt jeden Zweifel darüber. Die hereinbrechende Fluth hat sie mit den Resten der anderen Thiere im Schlamm begraben.

Die größte aller bekannten Höhlen ist die Höhle von Adelsberg in Krain. Man geht in ihren weiten und hohen Kammern 3 Stunden lang fort, und gelangt alsdann zu einem unterirdischen See, der dem weiteren Vordringen Schranken setzt. Ein

kleiner Fluß, die Vinka, stürzt sich von der Seite her in die Höhle und verschwindet brausend in ihrer tiefen Spalte. Vielleicht bildet eine Ansammlung seiner Wasser diesen Höhlen-See. Einige Stunden von da entfernt tritt ein Bach bey Wallingradu aus dem Boden heraus, den man für das gleiche Wasser hält, aber Unze nennt. Man hat in dieser Höhle Bärenknochen gefunden.

In Frankreich hat man seit einigen Jahren eine große Zahl von Knochenhöhlen aufgefunden. Von diesen macht sich die Höhle von Argou, Dep. des Pyrenées, dadurch bemerklich, daß sie nur Knochen von Grasfressern einschließt. Sie sind vielfältig zerbrochen und mit Kalk- und Kieselgeschieben untermengt in einem Behm eingebettet, in welchem man auch außerhalb der Höhle, in Begleitung von Geröll, die gleichen Thierreste findet. Man sieht also, daß die Knochen in diese Höhle durch Wasser hineingetrieben worden sind.

Eine besondere Aufmerksamkeit haben in neuester Zeit einige Höhlen im südlichen Frankreich erregt, namentlich die Höhlen von Vondres und Sauvignarques, im Gard-Dep., in welchen man unter den Knochen antediluvianischer Raubthiere, unter Hyänen- und Bärenknochen, bey welchen auch Excremente liegen und Knochen von Ochsen, Schweinen, Hirschen, Vögeln, gut characterisirte Menschenknochen, aber auch Bruchstücke von Thpferwaaren gefunden hat. Bey genauerer Untersuchung der Verhältnisse, unter welchen die Menschenknochen mit den Knochen der vorweltlichen Thiere vorkommen, stellte es sich heraus, daß sie nicht von antediluvianischen Menschen, sondern von solchen Individuen stammen, welche später in die Höhlen gekommen sind. In der frühesten Zeit waren diese Höhlen ohne Zweifel von Raubthieren bewohnt, später wohl von Menschen, zur Zeit der ersten geringen Civilisation des Geschlechtes. Daß die Höhlen vielfältig auch Begräbnißplätze waren, ist wohl bekannt. Auch in Höhlen der Gegend von Lüttich hat man Menschenknochen unter ähnlichen Verhältnissen gefunden. Bis heute ist aber auch noch nicht eine einzige Thatsache bekannt, welche bestimmt darauf hindeutete, daß Menschen schon vor den Catastrophen gelebt haben, welche die Bildungen des Diluviums bewirkten.

Bewägen wir nun, unter welchen Verhältnissen Thierknochen in den angeführten Höhlen angetroffen werden, so stellt sich heraus, daß sie in dieselben auf eine sehr verschiedene Weise gekommen sind; einmal, indem vorweltliche Raubthiere darinn gelebt, ihre Beute in dieselben geschleppt haben, und endlich mit den Knochen der Thiere, die sie verzehrten, dort begraben wurden; oder indem Thiere darinn starben, welche bey herannahendem Tode sich hinein begaben, oder endlich indem Thierreste durch die Wirkung des Wassers in dieselben geführt worden sind.

Neuerlich versprechen einige Höhlen Brasiliens, die am Rio Francisco liegen, interessant zu werden, da der dänische Naturforscher Lund darinn vor Kurzem Affenreste in Kalktuff eingeschlossen gefunden, und somit das lange vermißte Vorkommen fossiler Quadrumanen bestätigt hat.

Diluvialeis.

In mehreren Gegenden der Erde liegen uralte Eismassen und gefrorenes Erdbreich, die Mammuth- und Rhinoceros-Reste einschließen. Um den Kopebue-Sund, in 66° nördlicher Breite, fand Eschholz über 100 Fuß hohe Eishügel, die mit etwas Lehm bedeckt, von einer Gras- und Moosvegetation überzogen sind und Knochen von Elephanten einschließen. In Sibirien liegen vom 55. Breitengrad an bis ans Eismeer, in lehmigen, sandigen, gefrorenen Erblagen zahlreiche Elephantenreste, hin und wieder auch Nashornreste, öfters noch mit Fleisch, Haut und Haaren. Die Hauzähne der Elephanten liegen an manchen Orten in Menge beyammen, und bilden einen bedeutenden Handelsartikel Sibiriens. S. Bd. VII S. 1191 u.f.

Diluvialtorf.

Die Torfbildung hat vor der Existenz des Menschengeschlechts begonnen, da wir Reste antediluvianischer Thiere darinn finden (*Bos primigenius* im Torfe zu Dürtheim auf dem Schwarzwalde). Seit jener Zeit geht sie ununterbrochen fort bis auf den heutigen Tag, so daß auch Reste von Thieren darinn vorkommen, die jetzt an den Stellen nicht mehr leben, an denen er sich erzeugt (*Canis europaea* v. *turfa* M., ebenfalls im Torf zu Dür-

heim), so wie endlich Reste von solchen Thieren, die heute noch die Gegend bewohnen.

Diluvialtuff und Mergel.

Die Bildung des Kalktuffs hat gleichfalls schon in der Diluvialperiode begonnen, und geht ununterbrochen fort in der gegenwärtigen Periode. Ältere und jüngere Kalktuffmassen sind aber häufig auf eine so innige Weise mit einander verbunden, daß man sie nur dann mit Bestimmtheit trennen, die Diluvialtuffe von den Alluvialtuffen unterscheiden kann, wenn sie organische Reste einschließen. In demselben Verhältnisse stehen manche Mergelgebilde. Als einen Diluvialtuff und hierhin gehörigen Mergel können wir einen Theil der Ablagerung von Cannstatt bezeichnen, in welchem sich *Helix hispida* und *Pupa muscorum* finden, die auch im Elß vorkommen. Auch den älteren römischen Kalktuff, den der Architekt vorzugsweise Travertino nennt, können wir hierher rechnen. Es ist der Stein, woraus die prachtvollen Facaden der römischen Kirchen und Paläste erbaut sind, es ist dieser Travertin der Baustein der Peterskirche. Hierher gehören auch manche Mergellager, die Lymnæen und Planorbien einschließen.

Muschelablagerungen über dem Meerespiegel.

In vielen Ländern sieht man an den Küsten Muschelablagerungen, welche sich hoch über dem gegenwärtigen Spiegel des Meeres befinden. So bey Neapel, auf Sicilien und Ischia, an der Südküste Frankreichs, in der Vendée, an der englischen, irischen, schottischen, scandinavischen Küste, an der Ost- und Westküste Südamericas u.s.w. Die Muscheln, größtentheils zertrümmert und mit Sand untermengt, gehören beynähe lauter gegenwärtig noch im nahen Meere lebenden Schalthieren an. Einige wenige davon sind ausgestorben, oder leben heut zu Tage nur noch in entfernten Meeren. Es ist klar, daß es gewaltiger Kräfte bedurfte, um solche Ablagerungen in ihre jetzige Lage zu bringen, sie 100—300 Fuß über den heutigen Meerespiegel zu erheben. Diese Erhebungen fallen in die vorhistorische Zeit.

Eine der interessantesten Ablagerungen dieser Art ist die von Ubbervalla, an der Westküste von Schweden. Sie befindet sich 200 Fuß über der Meeresfläche, in einer horizontalen Lage auf Gneissfelsen, an welchen man noch einzelne Balanen, Muscheln, die sich immer an die Felsen des Gestades befestigen, verständig antrifft.

Wenn bey solchen Ablagerungen der Sand vorwaltet, so ist die Masse oftmals so fest, daß sie als Baustein gebraucht werden kann; herrschen die Muscheln vor, so kann Kalk daraus gebrannt werden, wie dieß z. B. an der Küste von Bahia in Brasilien der Fall ist.

Diese verschiedenen Bildungen des Diluviums haben einige Gebirgsforscher auch unter dem Namen quaternäre Formation zusammengefaßt.

II. Ordnung. Tertiäres Gebirge.

Syn. Terrains tertiaires; Tertiary Rocks; (Gebirgs-) Gruppe über der Kreide.

Als Unterlage der Diluvialbildungen erscheint eine Reihe von Schichten, die durch reichlichen Einschuß bestimmter, eigenenthümlicher, organischer Reste als ein wohl characterisiertes Ganzes auftreten, das jedoch erst in neuerer Zeit erkannt worden ist. Man hat ihm zur Unterscheidung von dem schon früher bekannten Flözgebirge, das man auch secundäres Gebirge nennt, den Namen tertiäres Gebirge gegeben. Seine Schichten liegen zwischen dem Diluvium und der Kreidebildung, welche die untere Begrenzung ausmacht.

Die Hauptgesteine sind Kalksteine, Mergel, beide oft sandig, Thon, Sand, Sandsteine und Conglomerate. Die Festigkeit ist im Allgemeinen gering, die Gesteine zeigen sich oft zerreiblich, und nur ausnahmsweise fester und von starkem Zusammenhang. Dieß zeigt wohl an, daß sie keinem großen Drucke ausgesetzt gewesen sind. Immer noch erscheinen in dieser Periode viele mechanische Gebilde. Meer-, Sumpf-, Fluß- und Landbildungen treten in vielfältiger Abwechslung auf, aber nicht

in weichen zusammenhängenden Massen; sondern häufig unterbrochen und im Allgemeinen in Becken abgelagert. Daraus können wir schließen, daß zur Zeit der Entstehung des Tertiärgebirges schon große Bestände, viele einzelne Wasserbecken von verschiedener Ausdehnung, theils von Meereswasser, theils von süßem Wasser erfüllt, bestanden haben, daß sie nach einander diese verschiedenen Wasser einschloßen, daß Flüsse sich in dieselben ergossen und Abflüsse darin gemacht haben.

An organischen Resten sind die Schichten dieser Periode reicher als alle anderen. Besonders zahlreich sind die Schalthierreste, vorzüglich characteristisch die Reste von Säugethieren, die man häufig und nicht selten in wohl erhaltenen ganzen Skeletten antrifft. Die Fauna zeigt sich deutlich als Land-, Süßwasser- und Meeres-Fauna entwickelt. Die Flora zeichnet sich durch ein numerisches Uebergewicht der Dicotyledonen aus, vorzüglich der holzigen Gattungen derselben. Thiere und Pflanzen dieser Periode zeigen sich in gleichzeitigen Bildungen häufig verschieden nach Vertikalität und nach geographischen Verhältnissen, und dieß deutet darauf hin, daß in der tertiären Periode local verschiedene und von einander unabhängige Kräfte, geographisch-verschiedene Einflüsse thätig gewesen sind. Als solche müssen wir zunächst das Bestehen climatischer Unterschiede annehmen, welche eine zonenweise Verbreitung der Geschöpfe bedingen.

In den obern Schichten sind etwa 48 Procente der fossilen Schalthiergattungen von den jetzt lebenden verschieden; in den tieferen etwa 81 Procente, und in den untersten, ältesten 96 bis 97 Procente. So sehr umgestaltet erscheint die organische Welt während der Bildungszeit des Tertiärgebirges. Während in den untersten Lagen Reste von Pflanzen vorkommen, die denen der heißen tropischen Regionen ähnlich sind, treten in den obersten Schichten Pflanzen auf, welche die Vegetation großer Continente und gemäßigter Climate characterisieren, eine Temperatur und Beschaffenheit des Landes und der Atmosphäre anzeigen, welche von dem heutigen Zustand derselben wenig verschieden war.

Die große Reihe der verschiedenen Bildungen des Tertiärgebirges bildet, nach den Untersuchungen von H. Bronn, zwey

Gruppen, welche sich durch die in ihren Schichten eingeschlossenen organischen Reste unterscheiden.

Obere Gruppe.

Syn. Obere Tertiärformation. Molasse-Gruppe.

Von den organischen Resten dieser Gruppe kommen im Durchschnitt 40 Procent noch lebend vor. Sie zerfällt in zwey sich nahe stehende Abtheilungen, deren gemeinschaftliche Thierreste sind: *Collepore globularis*, *Clypeaster grandiflorus*, *Venericardia scalaris*, *Perna maxillata*, *Pecten cristatus*, *scabrellus*, *Trochus patulus*, *Turritella subangulata*, *Cerithium margaritaceum*, *crenatum*, *tricinctum*, *Pleurotoma cataphracta*, *Cancellaria varicosa*, *Tritonium cancellinum*, *Ranella laevigata*, *Murex spinicosta*, *Buccinum semistriatum*, *Mitra scrobiculata*, *Voluta Lamberti*, *Cypraea Duclosiana*, und von Säugethieren *Machairodus*, *Mastodon angustidens* und *giganteus*, *Tetracaulodon*.

Obere Abtheilung.

Syn. *Pliocene* Bildungen, *Ege II*; dritte oder obere Tertiärformation; Subappenninenformation.

Sie besteht aus Meeres- und Süßwassergebilden, Sand und alten Geschiebeablagerungen. Characteristisch sind die Reste folgender Säugethiere: *Hyaena*-Gattungen, *Elephas*, *Rhinoceros Pallasii*, *Hippopotamus*, *Cervus*-Gattungen, und namentlich *Ourycerus s. giganteus*.

Die Meeresbildung dieser oberen Abtheilung ist am mächtigsten und bezeichnendsten in Oberitalien entwickelt, wo sie längs der ganzen Apenninenkette, von Asti in Piemont bis Monteleone in Calabrien, in einer zusammenhängenden Reihe von Hügeln, welche man die subappenninischen heißt, auftritt, und fast bis zu den höchsten Höhen der Gebirgskette hinauf reicht. Sie besteht aus einem gelben, etwas thonigen Sand, voll See-Schalthiere, unter welchem in gleichartiger Lagerung ein blauer, thoniger Mergel liegt, der ebenfalls sehr viele See-Conchylien enthält, und zu unterst endlich liegt ein sandiger Mergel mit einzelnen Nagelthier-Schichten.

In diesem Gebilde hat man die Ueberreste großer Säugethiere,

Elephanten, Rhinocerosse, Delphine, und auf deren Knochen bis weilen Austern und Balanen wohl erhalten anstehend gefunden, was unabweislich anzeigt, daß diese Thiere zu einer Zeit allda begraben wurden, wie das Meer über diesem Boden stand. Bey Castel-Arquato, einer reichen Conchylien-Fundstätte, wurde das Skelett eines Wallfisches gefunden; das nunmehr im Mailänder Museum aufgestellt ist. Die Muschelreste sind aberaus-zahlreich. Es sind mehr als 700 Gattungen gefunden und genau untersucht. Etwas über 40 Procent gehören noch lebenden Gattungen an, die theils noch in den europäischen Meeren leben, theils im wärmeren atlantischen, rothen und indischen Meere wohnen. Am häufigsten kommen vor: *Turbo rugosus*, Linn., *Trochus magus*, Linn., *Solarium variegatum*, Lamé., *Tornatella fasciata*, Lamé., *Plourotoma vulpecula*, rotata, Brocchi, *Fusus crispus*, Bors., *Buccinum primaticum*, Bors., *Buccinum semistriatum*, Brocchi, *Mitra plicatula*, Brocchi, *Cassidaria echinopora*, Lamé., *Cytherea exolata*, Lamé. Die Schalen sind im Allgemeinen sehr gut erhalten, zeigen mitunter noch blasser Farben und Perlmutterglanz.

Die Süßwasserbildungen der Subapenninen, durch Lymneen und Planorben bezeichnet, schließen dieselben Säugethierrreste ein, die in der meerischen Ablagerung eingeschlossen sind, und müssen daher als gleichzeitig betrachtet werden. Zweifelsohne gehören zu dieser Formation noch manche Süßwasserbildungen, welche durch den Einschuß von Lymnea, Planorbis, Paludina und von Landschnecken, namentlich von Helix-Gattungen, bezeichnet sind, wie z. B. der Süßwassergyps von Höhenhöwen im Regau mit *Testudo antiqua*. Auch stimmt mit der Subapenninen-Formation die sandig-thonige Ablagerung des oberen Arnolds-Thales, bey Figline, überein, welche in einem alten Seebecken abgesetzt ist, da sie mehrere der bezeichnendsten Säugethierrreste mit jener gemein hat. Man findet darinn auch Paludinen, Anodonten und Neritinen.

Zu dieser Formation gehört auch der Trag der Engländer, ein muschelreiches Tertiargebilde, welches in den östlichen Theilen von Norfolk und Suffolk entwickelt ist, 450 Schalthiergattungen enthält, so wie die charakteristischen, oben genannten Säugethiere.

und eine Menge Säugethiere. Ferner sind hierher zu rechnen die tertiären Bildungen von Montpellier, Pézenas, Perpignan in Südfrankreich, die von Rizza in Sardinien, mehrere auf Sizilien, an der Südküste von Spanien, auf der Halbinsel Morea, in Algier, Nord- und Süd-America.

Auch gehören zur Subappenninen-Formation einige Tertiärbildungen Deutschlands, so diejenigen, welche in Westphalen und Hessen liegen. Von der Ebene von Osnabrück an zieht das Gebilde, jedoch vielfach unterbrochen, über Hellern, Akrupp, Kuhof, Melle, Bünde, Herford, Lemgo, Friedrichsfeld u.s.w. bis hinter Cassel fort. Das Gestein ist ein eisenhaltiger Sandmergel, mit einzelnen Sandsteinbänken, oder ein grauer verwitternder Kalkmergel, der einen fruchtbaren Boden bildet; bey Cassel besteht es aus einem eisenhaltigen, rostgelben, kalkigen Sande, worin eine große Zahl von Pecten, Cythereen und Cyprinen liegt. Jenseits der Weser-Lette sieht man diese Formation an vielen Orten zwischen Hannover, Braunschweig, Hildesheim, Ahlfeld.

In Süddeutschland ist das Gebilde an der Donau, von Dischingen bis Ortenburg bey Passau entwickelt.

Im westphälisch-hessischen Becken liegen überdies Saffwasserbildungen, Thone und Braunkohlen, wie z. B. bey Lemgo, im Wegathale bey Sonnenburg, bey Minden, Hörter, Almerode, am Habichtswald u.s.w.

Von den belgischen Tertiärbildungen gehören diejenigen des Antwerpener Beckens hierher.

Zu dieser oberen Tertiärbildung gehört wohl auch die Tertiärformation der Sewalik-Hügel im nördlichen Hindostan, in welcher man in neuester Zeit ein Sprunggelenk und ein beträchtliches Fragment des Oberkieferknochens eines Affen (*Somnopithecus*), mit einer ganzen Reihe von Backenzähnen, gefunden hat. Die große Seltenheit fossiler Affenknochen erklärt sich wohl dadurch, daß die Ueberreste von Affen eiligt von Hyänen, Wölfen, Schakals fortgeschleppt werden. In Indien, wo große Affengesellschaften die Mangobäume inne haben, werden Affenreste so selten gesehen, daß die Hindu meinen, die Affen beerdigen ihre Todten bey Nacht.

Bei den fossilen Affenknochen fand man auch *Anoplotherium*, *Sivalense*, Falc. u. Cantl., so wie *Crocodylus hiporcatus* und *gangoticus*, was anzeigt, daß Affen gleichzeitig mit einem Gliede des ältesten Pachydermen-Geschlechts von Europa und mit jetzt noch lebenden Amphibien gelebt haben. In demselben Gebilde finden sich überdies: *Camelus Sivalensis*, *Hippopotamus Sival* und *dissimilis*, *Rhinoceros*, *Elephant*, *Wastobba*, eine Antilope, Schweine, Pferde, zusammen mit einem merkwürdigen, riesenmäßigen Wiederkäuer, dem *Sivatherium giganteum*, das wie die Prunkhorn-Antilopen (*Dicranoceras*) 4 getheilte, gelappte Hörner hat. Hier finden sich ferner *Hyänen*, *Ursus sivalensis* und andere Raubthiere, sodann ein Moschusthier, Hundarten, *Felis cristata*, F. u. C., und von Vögeln Stelzläufer, die noch größer sind als *Mycteria argala*, s. Bd. VII. S. 545., *Caviale* von enormer Größe, wie *Crocodylus leptorhynchus*, *crassidens*, F. u. C., Schildkröten aus den Geschlechtern *Emys* und *Trionix*, von gewöhnlicher Größe, dabey aber auch Oberarm- und Oberschenkel-Knochen und Panzerfragmente einer Schildkröte, deren genannte Knochen so groß sind, als die entsprechenden des indischen *Rhinoceros*.

Man ersieht hieraus, daß das Tertiargebilde der Scavall-Hügel Nordhindostans eines der interessantesten ist, die man bis jetzt kennen gelernt hat.

Untere Abtheilung.

Syn. Eogel-formation; Miocene Bildungen Speßs.

Die Hauptmassen bestehen aus Sand, Thon, Mergel, mit untergeordneten Sandsteinlagen und aus Kalkstein, der theils aus dem Meere, theils aus süßem Wasser abgeseht worden ist. Die organischen Reste sind zahlreich, darunter Conchylien allein 677 Gattungen bekannt, und von diesen folgende charakteristisch: *Venericardia Jouanneti* und *Dreissena*, *Bullina Lajonkairiana*, *Strophostoma*, *Scollostoma*, *Natica compressa*, *Turritella Archimedis*, *Proto Turritella*, *Cerithium pictum*, *lignitarum*, *Pyrala rusticula*, *Pleurotoma tuberculosa* und *Borsoni*, *Buccium baccatum*, *Voluta rarispina*, *Ancillaria glandiformis*, *Oliva hiatala*, *Conus acutangulus*. Unter der Zahl bestimmter Gattungen sind

19 Procent noch lebend, die heut zu Tage meistens an den Küsten von Guinea und Senegambien wohnen. Besonders charakteristisch sind auch hier wieder die Säugethier-Reste. Alle in diesem Gebilde vorkommenden fossilen Säugethier-Gattungen sind ausgestorben; von den Geschlechtern viele. Pachydermen und Wiederkäuer herrschen vor. Die wichtigsten Säugethiere sind: *Macrotherium*, *Acrotherium*, *Urotherium*, *Hippotherium* und die mehrsten *Lophodon*-Gattungen.

Das Glied, nach welchem diese Formation benannt worden ist, der Tegel der Oesterreicher, besteht aus einem bitulisch-grauem, bisweilen glimmerhaltigen Thon, der an zahllosen Orten zu Dachziegeln, Backsteinen und verschiedenen Töpferarbeiten verwendet wird. Es ist besonders im Wiener Becken entwickelt, das, nach P a r t s c h, aus folgenden Schichten besteht:

In oberst liegt Ths mit Land-Conchylien und Elephas primigenius. Es folgen:

Sand und Kies mit Mastodon, Dinotherien, Anthracotherien.

Süßwasserfall mit Schalthieren.

Corallenkalk (Leithakalk) mit Schiniten, Pecten, Mastodon, Dinotherium.

Kalkige Breccie.

Oberer Tegel voll Schalthiere, mit Braunkohle.

Selber Sand mit Aустern, Corithium plectum u.s.w.

Unterer Tegel.

Weißer Sand, nicht durchsunken.

Ganz ausgezeichnet ist diese Tegelformation im Becken von Mainz entwickelt, allwo Süßwasser- und Meer-Conchylien mit zahlreichen Säugethierresten vorkommen. Man hat daselbst bereits 21 Geschlechter fossiler Säugethiere gefunden, wovon 12 völlig ausgestorben sind, und von den vorkommenden 36 Gattungen ist nur noch eine einzige am Leben. Die reichste Fundstätte dieser Reste sind die Sandlager von Eppelsheim und Effelsborn, unfern Alzey.

Man unterscheidet im Mainzer Becken folgende Lagen:

Sand und Sandstein. Die Hauptmasse des Sandes ist von feinem Korn, das in der Tiefe aber

gröber wird, wo der Sand auch öfters eine mergelige Beschaffenheit annimmt und zu einem Sandstein erhärtet ist. In unterm liegen gewöhnlich conglomeratistische Schichten, oder Kies, mitunter abwechselnd mit Sandschichten.

Diese oberste Lage schließt den größten Theil der Säugethierreste ein. Hierinn hat man 2 Gattungen *Dinotherium*, mehrere Gattungen *Rhinoceros*, 2 Gattungen *Tapir*, 2 Gattungen *Hippotherium*, einige Gattungen *Schwein*, 5 Gattungen *Hirsch*, mehrere Gattungen *Kahe*, eine neue Gattung *Bielstraß* (*Gulo diaphorus*), das *Agnotherium*, *Acerotherium*, *Chalicotherium*, *Pugmeodon*, *Mastodon longirostris* u.s.w. gefunden, welche alle in dem naturhistorischen Cabinet zu Darmstadt aufbewahrt und von Dr. Kaup aufs genaueste bestimmt sind.

Kalkstein und Mergel mit Meer- und Süßwasser-Conchylien. Von ersteren sind sehr häufig: *Cerithium margaritaceum*, *plicatum*, *eloctum*, *Cytherea laevigata*, *Mytilus Brardii* und *Faujasii*, *Cyprina islandicoides*, *Ostrea edulina*; von letzteren finden sich die Geschlechter *Helix*, *Paludina*, *Lithorina*, *Cypris*. Ueberdies kommen auch Säugethierreste vor. Man kann hieraus abnehmen, daß diese Lage sich aus einem brackischen Wasser abgesetzt hat.

Plastischer, mergeliger Thon mit Kalkbänken.

Sand, Sandstein, Conglomerate und Gerölle, worunter Granite, Porphyr, Quarze vorkommen. Der Sand wechselt öfters mit den anderen Gesteinen, ist voll Muscheltrümmer, und enthält Bruchstücke von Hayen und Getaceen.

Das Mainzger Becken scheint, vom offenen Meere abgeschlossen, längere Zeit von Salzwasser erfüllt gewesen, und durch Zufluß von süßem Wasser brackisch und nach und nach ausgefüßt worden zu seyn, indem ein beständiger Abfluß stattfand, welcher den Abflußcanal immer tiefer ausspälte, wobey der Wasserspiegel

sich in dem Becken allmählich senkte, Inseln entstanden, und endlich das Becken trocken gelagt wurde. Dabei konnten in der ersten Zeit nur eigentliche Meer-Conchylien in dem Becken leben, später auch Süsswasser-Schalthiere darin existieren, und endlich auf den Inseln Säugethiere leben.

In der Tegelformation gehören weiter die tertiären Schichten in der einförmigen Ebene der Touraine und der Gegend von Dax in Frankreich, im Becken von Bolyhynien, Podolien und Galizien. Die Zusammensetzung des Gebirges ist an diesen verschiedenen Orten den Gesteinen nach ziemlich abweichend. Die Schichten sind:

In Dax nach Grateloup.

Sandstein ohne Conchylien.

Sand und Kies ohne Versteinerungen.

Selber Sand mit Meerconchylien.

Bläulicher Sand mit Resten von Meerconchylien und Meeräugethiere.

In Bolyhynien und Podolien nach Du Bois.

Kalk mit *Serpula* und wenigen Meeresmuscheln, wie *Cardium lithopodolicum*.

Kalkstein mit *Cerithien*, auchoolithisch, mit einigen Univalven, als: *Cerithium baccatum*, *rubiginosum*, *Buccinum baccatum* u.s.w.

Sand und Sandstein mit vielen Meeresconchylien, bisweilen wahrer Muschelsand.

Thon, ohne fossile Reste.

In der Touraine nach Dujardin.

Faluns, voll Meerconchylien, mit *Mastodon angustidens*, *Palaeotherium magnum*, *Anthracotherium*, *Dinotherium*, *Rhinoceros*, *Hippopotamus*, Firsch, Manati, *Crocobis*.

Süsswasserkalk reich an Süsswasser-Schalthieren.

Quarz theils mit Thon durchmengt, theils zellig und porös (Moulière).

Thon mit Knauern von Eisenorydhydrat, Sand und Kiesel-Pudding.

In Galizien nach Boué.

Corallenbänke in Wechsellagerung mit Muschelsand, mit untergeordneten Lagen von Süßwasserlalk und Braunkohle.

Sand, kalkiger Sandstein und sandiger Kalk.

Thon mit Erdöl und Erdspeck.

Mergelthon mit Steinsalz, Gyps, Schwefel, in Begleitung von kalkigem Sandstein.

Die Salz- und Braunkohlen-Führung des galizischen Tertiärgebirges ist von großem Interesse. Die Salz-Massen der wichtigen Salzwerke Wieliczka und Bochnia liegen darin. Braunkohlen-Lager von mehreren Fuß Mächtigkeit liegen an vielen Orten in den Sand- und Sandsteinschichten, und in dem durch Podolien ziehenden Theil dieser Gebirgsbildung kommt auch häufig Gyps in Verbindung mit dem oberen Meereslalk vor. Von Podolien zieht sich die Tegelbildung durch Volhynien fort und bis in die Gegend von Moskau.

Wahrscheinlich wird man diese Formation noch in manchen anderen tertiären Ablagerungen erkennen, wie z. B. die tertiären Kalksteine der Baierschen Pfalz, von Neustadt an der Hardt bis in die Gegend von Unweiler, die Ablagerung zwischen Eibeswald und Radkersburg in Steyermarl, noch hierher gezählt werden können, so wie die Faluns, Muschelgrus-Ablagerungen, in der Touraine, im Anjou, in Bretagne und Basse-Normandie. Diese bestehen aus einem lockeren Aggregat von größtentheils zerbrochenen Meermuscheln und kleinbrünnigem Grus, mit einer Beimengung von Land- und Süßwasserthieren und Ueberresten von Mastodonten, Rhinocerossen, Hippopotamen u.s.w. Man hat seit undenklichen Zeiten diesen Grus zum Mergeln der Felder benutzt, wober die großen und langgezogenen Falunidros, Muschelerde-Gruben, entstanden sind, welche man in der Touraine sieht. Wahrscheinlich gehöret hierher auch der Calcaire Moëllon der Gegend von Montpellier, Narbonne u.s.w., aus welchem im südwestlichen Frankreich viele Bauten des Alterthums gebaut sind, wie gerade die Arena zu Nimes.

Der Tegelformation steht auch das große, wichtige Molasse-Oftens allg. Naturg. I.

Gebilde sehr nahe, welches am nördlichen Fuß der Alpen und im großen Thale zwischen diesen und dem Jura, so wie in Oberschwaben, mächtig entwickelt ist. Es besteht aus Sandstein und Nagelfluh mit untergeordneten Lagen von Sand, Thon, Mergel, Süsswasserkalk und Braunkohle. Der Sandstein ist herrschend, ein Kalk- oder Mergelsandstein von grünlich- und bläulichgrauer Farbe und im Ganzen von geringer Festigkeit, weshalb man ihm in der französischen Schweiz den Namen *Molasse* gegeben hat, welcher zur Bezeichnung des ganzen Gebildes adoptiert worden ist. Im Sandstein und Sand kommen stellenweise viele Schalthier-Versteinerungen vor und *Payssisch-Bähne*, zumal sind die oberen Lager reich daran, die man darum auch mit dem Namen *Muschel-Molasse*, *Muschel-Sandstein* belegt hat. Der immer deutlich geschichtete Sandstein wechselt bald mit den Nagelfluh-Lagen, bald tritt das *Conglomerat* in stockförmigen Einlagerungen auf. Der allbekannte *Rigi* ist ein Nagelfluh-Berg. In den oberen Lagen hat man an einigen Orten Säugethierreste gefunden, so am *Mollire-Berg* zu *Estavayer* bey *Neuchâtel*, *Elephanten*-, *Hyänen*-, *Rhinoceros*-*Reste* u. s. w., in Begleitung von *Payssisch-Bähnen* und *Meer-Schalthieren*; zu *Ballringen*, unfern *Biberach*, *Reste* von *Walross*, *Delfphin*, *Manati*, mit *Pferd*-, *Hirsch*- und *Rhinoceros*-*Resten*, also *Meer-Säugethiere* mit *Land-Säugethiern*. Als ein *Muschel-Conglomerat*, das Gerölle enthält und alle Kennzeichen eines *Ufergebildes* an sich trägt, worinn die *Schalthier-Geschlechter* *Corithium*, *Turritella*, *Conus*, *Voluta*, *Natica*, *Nerita*, *Chama*, *Pecten*, *Cardium*, *Ostrea*, *Arca*, *Patella* u. m. a. in mehrentheils zerbrochenem oder stark abgeriebenem Zustande vorkommen, zieht die *Muschel-Molasse* vom *Klettgau*, unterhalb *Schaffhausen*, am *Randen* her ins *Hegau*, auf der Höhe und am südlichen Abfall der *Juraberge* weiter ins *Donauthal*, und tritt als *Ufm* in vereinzelt Ablagerungen auf. Weiter unten an der *Donau* liegt die oben schon genannte *Tertiärbildung*, zwischen *Villingen* und *Passau*, welche ebenfalls hieher gehört.

Die *Braunkohlen-Lager* der *Molasse* sind an vielen Stellen so beträchtlich, daß sie mit Vortheil abgebaut werden können, wie die Lager von *Käpfnach*, *Elgg*, *St. Saphorta* u. s. w.

in der Schweiz, am Peiffenberg, um Tegernsee, bey Wiesbach u.s.w. in Baiern. Sie sind von Thon und bituminösem Süßwasser-Mergel oder Kalkstein begleitet, den man auch Stinkstein heißt, weil er sehr widrig riecht, wenn man ihn zerreibt. Es liegen gewöhnlich die Geschlechter *Planorbis*, *Lymnaea*, *Unio* und *Cyclas* darinn, und an mehreren Orten auch Pflanzenreste.

Ausgezeichnet und wahrhaft weltbekannt ist der in der oberen Abtheilung der Molasse liegende Stinkkalk von Deningen, unsern Constanx, in der Badischen Seegegend; die reichste Fundstätte von Pflanzen und Fischen, die bis jetzt im Gebiete der Tegelformation bekannt geworden ist.

Der größere Theil der Deninger Pflanzen besteht, nach A. Braun, aus Dicotyledonen, und gehört solchen Geschlechtern an, welche heute noch in der Umgegend wachsen. Aber die Gattungen (*Species*) differiren von diesen und stimmen näher mit solchen überein, welche jetzt in Nordamerika leben, einige auch mit Südeuropäischen. Mehrere Geschlechter sind der jetzigen Flora Europas fremd, namentlich *Taxodium*, *Liquidambar*, *Gleditschia*; auch das Geschlecht *Diospyros* kommt nicht mehr in Deutschland vor. Die mehesten Deninger Pflanzenreste bestehen in einzelnen Blättern von Laubbälzern, worunter diejenigen von Weiden, Pappeln und Ahorne die häufigsten sind. Blätter von Einden, Ulmen, Rußbäumen sind seltener. Auch vom Faulbeerbaum (*Rhamnus*), vom Potamogeton, *Isaetes*, von Gräsern und Farnen kommen Reste vor. Die vielen Blätter sind wohl nach dem gewöhnlichen Gang des Lebens der Bäume abgefallen, und meistens mit Blättern, Früchte und perfsistente Kelche mancher Blüthen, mögen durch Winde abgerissen worden seyn.

Von den Fischen, welche Agassiz bestimmt hat, kommt am häufigsten *Leciscus Oningensis* vor, ferner *L. pusillus* und *heterurus*, *Esox lepidotus*, *Tinca fureata* und *leptosoma*, *Gobio analis*, *Cottus cephalotes* und *contrahir.*, *Rhedeus latior* und *elongatus*, *Aspius gracilis*, *Anguilla pachyura*, *Cottus brevis*, *Percia lepidota*, *Lobias* (italienisch-arabisches Geschlecht) *perpusillus*, *Acanthopsis* (indisches Geschlecht) *angustus*.

Man hat in Denningen auch Reptilien gefunden, Schildkröten, Emys, ähnlich der *E. europaea*, und eine *Chelydra* (ein südamerikanisches Geschlecht), *Ch. Murchisoni* Bell. Hier endlich wurden auch die Thierreste gefunden, welche Schenckler für menschliche hielt, was ihn veranlaßte, die Abhandlung zu schreiben, welche die Aufschrift „*Homo diluvii testis*“ führt. Cuvier zeigte später, daß die vermeyntlichen Menschenknochen einem großen Salamander angehören. In neuester Zeit wurde in Denningen auch das Skelett eines Fuchses gefunden, der vom jetzt lebenden, gewöhnlichen Fuchsen kaum zu unterscheiden ist.

Das Molassegebilde erreicht in der Nähe der Alpen eine Höhe von 5000 Fuß, setzt große, ausgedehnte Gebirgsstöcke, hohe, breite Rücken zusammen, mit häufig sehr steilem Abfall und tief eingeschnittenen Thälern. In der Nähe des Jura sind die Molasseberge niedriger; aber auch hier sieht man tief darinn eingeschnittene Thäler, viele Querthäler, mit oft sehr steilen Gehängen, wodurch langgezogene, breite Rücken vielfältig unterbrochen sind.

Der Molasse-Sandstein verwittert an der Luft und liefert einen sehr fruchtbaren Boden.

Mit den Pflanzen des Deninger Steinfall's stimmen überein die Pflanzenreste der Braunkohlen-Ablagerungen der Wetterau, Niederhessens, der Gegend von Bonn und im Siebengebirge, am Fichtelgebirge, zu Comothau und Malsch in Böhmen, auf der Insel Ithakra in Nord-Griechenland. Auch in vielen Eon-Ablagerungen, welche Braunkohlenlager begleiten, finden sich analoge Pflanzen. Wahrscheinlich können wir noch viele Braunkohlenbildungen zur Tegel-formation zählen, wie z. B. die große Braunkohlenablagerung, welche von Magdeburg durch Preußen hindurch bis zur Ostsee geht, und hier namentlich durch ihre Bernstein-Führung ausgezeichnet ist.

Endlich müssen wir zur gleichen Formation noch mehrere Süsswasserbildungen zählen, wie den knochenreichen Süsswasserfall von Friedrichsmünd, Georgensmünd und Garth in Baiern, den Süsswasserfall vom Basteberg bey Wurweiler im Elsaß, den Süsswasserfall des Stübentals bey Steinheim unsern Ulm, die Süsswassermergel und

Thier-Sand-Schichten von Lobfau im Elfaß, mehrere Säu-
wasserbildungen des südwestlichen Frankreichs, wie diejenigen von
Montabusard bey Orleans, von Simorre und Sansan
im Gers-Dep., von Avaray im Loir- und Cher-Dep., sodann
diejenige von Fordwell auf der Insel Wight u.s.w.

Untere Gruppe.

Großkalkformation. Formation des London-Thons; Eocene Bildungen
Engl's.

Die untere Gruppe des Tertiärgebirges enthält, von unten
herauf gerechnet, die ersten Säugthiere, und bezeichnet somit
den Anfang einer eigenthümlichen Thier-Schöpfung. Es treten
namentlich viele Dicksäuter (Pochoythermen) auf, und beynahe alle
Thier- und Pflanzengattungen, die im Thon, Sand, Kalkstein
und Sandstein, den Hauptgesteinen, eingeschlossen sind, differiren
von den jetzt lebenden; von den genau bekannten 1400 fossilen
Schalthier-Gattungen dieser Gruppe leben nur noch 38, also nur
3 1/2 Procent, und diese halten sich heute in tropischen Meeren
auf, und nur einige finden sich nördlicher.

Das Gestein, wornach die Formation benannt ist, ein san-
diger, groberdiger Kalkstein, wurde zuerst im Becken von Paris
beobachtet, und in der vortrefflichen „Géographie minéralogique
des environs de Paris,“ von G. Cuvier und A. Brongniart
1810, von letzterem als „Calcaire grossier“ beschrieben. Die
Arbeit dieser Männer über die geologischen Verhältnisse des Par-
iser Beckens gab überhaupt den ersten Impuls zum Studium der
bis auf ihre Zeit beynahe völlig unbekannten Tertiärbildungen,
und ist eine der interessantesten und erfolgreichsten, welche in der
Wissenschaft erschienen sind. Bald zeigte sich, daß die Bildungen
des Beckens von Paris auch im großen Kreidebecken von Lon-
don im Wesentlichen sich wiederfinden, und es konnte die Gruppe
der Tertiärbildungen dieser Orte nunmehr als wohl bekannter
Anhaltspunct, als Typus zur Beurtheilung anderer Tertiär-
bildungen gelten. Sie blieben dieses auch bis auf den heu-
tigen Tag.

Charakteristisch für diese Gruppe ist, nach H. Bronn, der
gänzliche Mangel fossiler Wiederkäuier und das Vorkommen von
Anoplotherium und Palaeotherium, ferner das Auftreten vieler

regelmäßig gestalteter Eöcherpolyparien-Geschlechter, und insbesondere von *Turbinolia elliptica* und *Orbitulites complanata*. Von Schalthieren sind am bezeichnendsten: *Anomia tenuistriata*, *Pectunculus palvinatus*, *Natica epiglottina*, *Solarium plicatum* und *patulum*, *Trochus agglutinans*, *Turritella imbricata*, sehr viele Cerithien, namentlich *Cerithium lapidum*, *cornucopiae*, *Lamarki*, *Volata cronulata*, *Conus antediluvianus*. Von Pflanzen sind besonders einige *Chara*-Gattungen bezeichnend für die Süßwasserbildungen dieser Gruppe. Auch finden sich viele Fische und Reptilien.

Die Reihe der Schichten ist im Becken von Paris folgende:

1. Zu oberst liegen Süßwasser-Kalkmergel mit Planorben, Lymneen, Potamiden, Cyclostomen, gemengt mit Kiesel, der die gleichen Versteinerungen führt, und mit dem Mergel auch in Lagen wechselt. In diesen Schichten kommen *Chara*-Reste vor, und namentlich auch Früchte derselben. Darunter liegt poröser Kiesel, Eöcheriger Quarz (*Silox Mouillro*), ohne Versteinerungen, in derben Stücken in Sand oder Mergel eingeschlossen.
2. Nun folgen Sandstein und Sand mit Meerconchylien (*Grès et sables marins supérieurs*; *Grès de Fontainebleau*), und zwey Mergellagen mit Austern, zwischen welchen sich eine Lage mit Süßwasser-Schalthieren befindet.
3. Hierauf folgt die Ablagerung des Grobkalks (*Calcaire grossier*), von welchem die ganze Gruppe den Namen erhalten hat, und die eine ausgezeichnete, mit Süßwasser-Schichten wechselnde, Meeresbildung ist.
 - a. Seine obersten Lagen bestehen aus Kalkmergel mit Zwischenlagen von Sand, welchem Schichten von grauem Sandstein oder Hornstein mit vielen Meerconchylien folgen, namentlich mit einer außerordentlichen Menge von Cerithien (*Grès marin inférieur*).
 - b. Darunter liegt der eigentliche Grobkalk, ein unreiner, mit Sand und Eisentheilen gemengter,

groberdiger Kalkstein, in dessen zahlreichen Schichten sehr viele wohl erhaltene Meerschalthiere vorkommen, und in manchen Schichten namentlich eine unzählbare Menge von Milioliten, (Milioliten-Kalk) eines winzig kleinen Schalthierchens begraben ist. Diese Lage liefert den Baustein für Paris.

- c. Die unteren Schichten enthalten grüne Körner von Eisen-Silicat, sind oft sandig, locker, enthalten Nummuliten und das große *Corithium gigantum*, im Ganzen aber wenig Conchylien.
- d. Zwischen diesen beiden Grobkalklagen befindet sich eine Süßwasserschicht mit Lymneen, Planorben und mit Braunkohle.

Noch an mehreren Orten sieht man in diesem Grobkalkgebilde Süßwasserschichten, wie bey Baugirard, zu Vagney u.s.w. Mächtigkeit 100 F.

Im nördlichen Theil des Beckens liegt der Grobkalk am mächtigsten und reinsten entwickelt. Im mittleren Theile wechselt er aber mit Bänken von Süßwasserkalk, und im südlichen und östlichen Theile des Beckens ist Süßwasserkalk das vorwaltende Gestein. Es ist ein kieseliger, dichter Kalkstein, der an einzelnen Stellen Süßwasser- und Land-Conchylien einschließt, bisweilen löcherig und offenbar gleichzeitig mit dem Grobkalk abgesetzt worden ist (*Calcaire siliceux*).

- e. Im Mittelpuncte des Beckens liegt eine große Gypsmaße, einerseits, gegen Norden, im Wechsel mit den oberen Schichten des Grobkalks, andererseits, gegen Südosten, mit Schichten des Kieselskalks wechselnd, begleitet von Mergel und Kalkstein, und gerade da am mächtigsten entwickelt, wo im mittleren Theil des Beckens die kalkigen Moeres- und Süßwasser-Gesteine mit der geringsten Mächtigkeit austraten. Ueber dem Gypse liegen am Mont-Martre Mergel mit

Süßwasserconchylien, dann folgen die oben angeführten Mustern-Mergel, und zu oberst, bey den Windmühlen, der obere Meersandstein (*Grès marin supérieur*) mit vielen Cerithien. Die Unterlage des Gypses bildet theils sandiger Grobkalk, theils Kieselfalk. Mächtigkeit bis 170 Fuß.

Die Gypsbildung selbst besteht aus drey Hauptmassen, die durch Mergellagen geschieden sind. Am Fuße des Mont-Martre liegen Mergel mit kleinen Gypslagen, worinn viel späthiger, federartig gruppirter Gyps vorkommt. Darüber folgt eine zweyte mächtige Gypsmaße, worinn die schönen Gyps-Linsen liegen, deren Zwillingeverbindung in der Dryktognosie, S. 245, angeführt worden ist, und über dieser Masse, durch Mergellagen davon geschieden, die oberste mächtigste Gypsmaße, worinn zahlreiche Säugethierreste eingeschlossen sind (*Gypso à ossements*), und die den Hauptbedarf an Gyps für Paris liefert. In diesem oberen Gyps wurden die Paläotherien gefunden und die sonderbaren Anoplotherien (deren Füße zwey Behen haben, und deren Zähne, wie bey dem Menschen, in fortgesetzter Reihe stehen, ohne Lücken dazwischen), mehrere Fleischfresser, *Nasua*, *Viverra*, *Canis*, Johann Didolphys, *Myoxus*, *Sciurus*, Süßwasser-Schildkröten, ein Crocodil, Süßwasserfische, mehrere Vögel, und überdieß Süßwasser-Conchylien.

4. Das unterste Glied besteht aus Lagen von Thon, Mergel, Sand, Sandstein mit Braunkohle und Flußmuscheln, und aus einem Conglomerat mit vielen Vierfüßerknochen und Süßwasser-Conchylien.

Die obere Lage wird häufig durch sandige Thonmassen gebildet, welche die Arbeiter *saussos glaisos* nennen. Darinn liegen viele Süßwasser-Conchylien und Braunkohle. In den tieferen Lagen findet sich

gewöhnlich ein feuerfester Thon, der mit Wasser einen sehr bißsamen Teig gibt, und deshalb den Namen plastischer Thon (*Argille plastique*) erhalten hat. An mehreren Punkten wird dieses unterste Glied durch ein Kalk-Tonglomerat repräsentirt, worinn Süßwasser-Schalthiere und Reste von *Tapirotherium*, *Anthracotherium*, *Sciurus*, *Vulpes*, *Viverra*, *Lutra* vorkommen.

Diese sämtlichen Glieder des Pariser Tertiärgebirges ruhen auf Kreide.

Der geschilderte, wiederholte Wechsel von Meeres- und Süßwasserbildungen, ihr Zueinandergreifen, ihre räumliche Vertheilung und die mächtige Gypsmaße mit so vielen Thierresten im Centrum des Beckens, zeigen deutlich an, daß verschiedene Ursachen bey der Bildung dieser Pariser Tertiärschichten, theils nach einander, theils gleichzeitig gewirkt haben.

Das zunächst über der Kreide liegende Süßwassergebilde mit Braunkohle deutet an, daß das Becken zuerst mit süßem Wasser angefüllt war. Ein Fluß hat wohl Thon und Sand in dasselbe abgesetzt und von Zeit zu Zeit Treibholz hinein geführt. Später wurde das Becken mit Meerwasser erfüllt, und es erfolgte die Bildung des Grobkalks. Manche seiner Schichten sind voll Muscheltrümmer, durch Süßwasserschichten von einander getrennt, welche Lymneen, Planorben u.s.w. einschließen, und unter der großen Zahl Meer-Schalthiere treten die Cerithien in außerordentlicher Menge auf, deren heute noch lebende Gattungen sich vorzüglich da aufhalten, wo Flüsse sich ins Meer ausmünden und das Wasser brakisch ist. Alle diese Verhältnisse können die Folge der Einstromung eines Flusses in ein Meeresbecken seyn. Stellen wir uns vor, daß das Becken ein geschlossener salziger Landsee war, wie etwa das Caspi-Meer, und daß sich ungefähr da, wo heute Seine und Marne einfließen, ein großer Fluß in dasselbe ergoß, so konnten im Süden die Schichten des Kieselkalks abgesetzt werden, während im Nordtheil des Beckens die meerische Grobkalkbildung stattfand, und an den Grenzen der verschiedenen Abfälle mußten diese unrein ausfallen, Meer- und Süßwasser-Schalthiere in denselben Schichten eingeschlossen werden, oder die verschiedenen Abfälle sich im Wechsel

bilden. Die mächtige Gypsmaße hat sich aus süßem Wasser abgesetzt. Es liegen keine Meeresthierreste darin. Wenn wir lesen, wie ein Vulcan auf Java einen Bach ins Meer sendet, dessen Wasser durch Schwefelsäure gesäuert ist; so begreifen wir, auf welche Weise im Mittelpunct des Pariser Beckens eine Gypsmaße abgesetzt werden konnte, wenn sich gegen Ende des Grobkalk- und Kieselkalk-Absatzes von einem vulkanischen Punkte aus ein ähnliches Wasser in das Becken ergoß. Die Thiere, deren Reste der Gyps einschließt, konnte der Fluß herschwemmen. Meeresthiere, die in dem gesäuerten Wasser nicht leben können, findet man auch nicht im Gypse. Nach der Bildung des Gypses und seiner Mergel, muß das Becken wiederum vollkommen mit Meerwasser erfüllt worden seyn. Vielleicht kam es in dieser Zeit mit dem offenen Meere in Verbindung, in Folge der Oszillationen des Bodens während der Periode einer Gebirgs-Erhebung, der Py's der Auvergne, oder eines andern Gebirgssystems. Es setzte sich nun die reine obere Meeresbildung ab, der Grès marin supérieur. Nochmals trat das Meer aus dem Becken zurück, und an seine Stelle trat wieder süßes Wasser. Jetzt bildeten sich die oberen Süßwasser-Mergel und der Silex moulière mit den vielen Chara-Früchten, über denen unmittelbar die Massen des Diluviums liegen. Auf diese Weise sucht Constant Prevost die von ihm am genauesten nachgewiesenen Lagerungsverhältnisse und den zoologischen Character der Pariser Schichten einigermaßen zu erklären. Man muß zugeben, daß diese Erklärung die Thatfachen für sich hat.

Immerhin gibt uns das Pariser Becken einen recht anschaulichen Beweis von der abwechselnden Bildung von meerischen Absätzen und Süßwasserbildungen, in Folge von Oszillationen des Landes, welche nur durch heftig wirkende Kräfte bewirkt wurden; es gibt ferner den Beweis von einer gleichzeitig erfolgten Meeres- und Süßwasser-Ablagerung, so wie von einer Gypsbildung, die sich ruhig aus süßem Wasser abgesetzt hat.

Mit dem Pariser Becken stimmt das Becken von London, hinsichtlich der zoologischen Charactere seiner Schichten, aber keineswegs in petrographischer Beziehung überein; indem dort Thonmassen vorherrschen und die Kalkbildung ganz zurückgedrängt ist.

Die Schichtenreihe um London und in Hampshire ist folgende:

1. Zu oberst liegen Süßwasserschichten, Kalkstein und Mergel mit einzelnen Sandlagen. Die Mergel sind oft grün, wie die im Pariser Becken. Diese Bildung ist im Nordtheil der Insel Wight und an der gegenüberliegenden Küste von Hampshire entwickelt, und schließt einzelne Schichten ein, die nebst Süßwasser-Schalthieren auch Meer-Conchylien enthalten. Die in den andern Schichten liegenden Süßwasser-Conchylien sind die gewöhnlichen, und auch die vorkommenden Chamae-Reste denen in den Pariser Schichten begrabenen analog. In neuester Zeit hat man auf Wight auch Zähne vom Anoplotherium und Palaeotherium, und Reptilien-Reste in dieser Bildung gefunden.
2. Darunter folgt die Ablagerung des London-Thon (London Clay). Sie besteht aus zwey Gliedern.
 - a. Zunächst unter der Süßwasserbildung liegt eine Sandlage, der Bagshot-Sand, der zumal im S.-O. von London stark entwickelt ist, aus Sand und Sandstein besteht, mit einzelnen Zwischenschichten von Mergel. Er bildet die oberste tertiäre Lage im eigentlichen Londoner Becken. Es liegen in den Mergeln dieselben Meer-Conchylien, wie im untenliegenden Thongebilde, dieselben Hai- und Fische (Squalus und Raja), und in der Nähe von Quilsford hat man, nach Buckland, im Sande, der dort voll grüner Eisenkieselsäurekörner ist, neuerlich auch Fische von den Geschlechtern *Pristis*, *Tetrapturus*, *Edaphodon*, *Passalodon*, *Scaphognathus*, *Ctenostychos*, *Plelostychos*, *Amelobodon* und Reste einer *Emys* gefunden. Bisweilen liegt im Bagshot-Sand auch Braunkohle.
 - b. Der eigentliche London-Thon bildet das untere Glied. Er ist ein blauer oder schwärzlich-grauer Thon, der zuweilen in Kalkmergel über-

geht, bisweilen Sandsteinbänke und einzelne Schichten von Kalkstein einschließt. Es liegen viele Lagen ovaler oder plattgebräcker, mit Kalkspathadern durchzogener Stücke von thonigem Kalkstein darinn, die man *Septarien* nennt und zu hydraulischem Kalkmörtel verwendet. Von den im Thon liegenden Meerconchylien stimmt ein großer Theil mit denen völlig überein, die im Pariser Grobkalk liegen. Auch wurden darinn Reste von Crocodilen und Schildkröten, und auf der Insel Sheppey eine außerordentliche Menge nussartiger Früchte gefunden, welche denen des Cocosbaums und anderer tropischer Pflanzen ähnlich sind. Von 70—100 Fuß mächtig.

3. Zu unterm liegen Schichten von Sand, Kies, Lehm und Thon, die regelmäßig mit einander wechseln. Einige Thonschichten werden in Thpfereyen verarbeitet, sind sehr bildsam und mit Beziehung auf dieses Verhältniß hat man der ganzen Lage den Namen *Plastic clay* gegeben. Der Kies besteht aus abgerundeten Gneissteinen und Quarzstücken. Einige Thon- und Sand-Schichten enthalten ganz dieselben Conchylien, welche im London-Thon vorkommen. Diese Schichten haben bey London eine Mächtigkeit von 100 Fuß und in der Alum-Bay auf Wight eine Mächtigkeit von 1100 Fuß.

Bei der großen Uebereinstimmung der Schalthier- und Säugethierreste in den Schichten des Pariser und des Londoner Beckens ist die Gesteinsverschiedenheit dieser Schichten sehr auffallend. Während die Mitte der Pariser Schichten aus hellgefärbten Kalksteinen und aus Gyps besteht, tritt im Londoner Becken in der gleichen Stellung ein blauer Thon auf, und während die Pariser Gebilde nach oben von Kalkstein- und nach unten in der Regel von Thon-Schichten begränzt sind, bilden im eigentlichen Londoner Becken sandige Lagen die oberen und unteren Gränzen. In den untersten Schichten des Londoner Beckens, welche eine dem Pariser plastischen Thon analoge Stellung über der Kreide haben, hat man zur Zeit nur Meerthierreste gefunden, und das Londoner

Becken war demzufolge gleich im Anfange der Bildung seiner Schichten mit Meerwasser erfüllt, und blieb es bis ans Ende seiner Tertiärbildungen. In Hampshire aber und auf der Insel Wight waren die Becken in der letzten Periode mit süßem Wasser angefüllt, und das Meer trat in dieselben wiederholt auf kurze Zeit ein, woher die Vermischung von Süßwasser- und Meer-Schalthieren in einzelnen der oberen Schichten.

In Deutschland gehören, nach den Bestimmungen des Grafen Münster, die Schichten des sogenannten Mecklenburger Beckens, zu dem ältesten, den Pariser und Londoner Bildungen analogen, Tertiärgebirge. Seine wenigen kleinen Steinbrüche haben bereits 118 Schalthier-Gattungen geliefert, von denen 71 in dieser unteren Gruppe vorkommen, und 61 derselben eigenthümlich sind. Die meisten finden sich in braunem Sandsteine, mit vollkommen erhaltener Schale, haufenweise zusammengebacken. Einzelne Blöcke dieses Gesteins liegen auf den Feldern umher, und sind unter dem Namen „Sternberger Kuchen“ bekannt. Das Gebilde erstreckt sich über Mecklenburg, Lauenburg, Renvorpommern, Lübeck bis in die Mark Brandenburg. Ferner gehören hieher die Sandsteinschichten am Kreßenberg in Baiern, worinn die Thonsteinsteine liegen, und die oberen Schichten des benachbarten Soultzofen.

Stark entwickelt tritt diese Gruppe in Belgien, in der Gegend von Antwerpen, und Brüssel, auf. Die Gesteine bestehen hier vorzüglich aus Sand, Sandstein und Thon. Von den 200 bekannten Conchylien-Gattungen stimmen die meisten, und im kleinen Becken von Boom 66 Procent der darinn vorkommenden, mit den Schalthierresten des Londoner Beckens überein. Ein Verhältniß, welches seine Erläuterung in der Lage der Niederländer Becken findet, die dem Englischen gegenüber liegen.

In Frankreich zählt man noch die Ablagerungen zu Blaye im Bas-Medoc und um Balognes in der Manche hierher. Die Süßwassergebilde von Puy in Belay und von Aix in Provence, die manche hierher zählen, durch den Einschluß der Reste von Paläotherium und Anthracotherium, Testudo, Trionyx,

Crocodylus und vieler Fischreste so interessant, gehören wahrscheinlich zur Tegelbildung.

In Italien gehören die fischreichen Kalkschichten des Monte Bolca unfern Verona, die Kalksteine zu Castellgomberto im Vicentinischen und die Kalkbildungen im Val-Ronca hierher. Auch hat man in Ungarn und in der Moldau, am Dnieper, in der Ukraine und in Armenien Grobkalkschichten beobachtet.

In America ist die Gruppe stark entwickelt in den Vereinigten Staaten. Sie zieht sich vom Mexicanischen Meerbusen in zwey Richtungen, einerseits in N.W. durch den Alabama- und Mississippi-Staat bis Tennessee, andererseits in N.O. Richtung durch Florida, Georgia und Southcarolina. In Asien hat man hierher gehörige Schichten in den Kossia-Bergen bey Calcutta gefunden.

III. Ordnung. Secundäres oder Flözgebirge.

Der Name Flözgebirge soll zunächst anzeigen, daß die Bildungen, von denen die Rede ist, in regelmäßigen Lagen erscheinen, und ganz die Beschaffenheit von solchen Mineralmassen haben, die sich aus Wassern abgesetzt, oder durch Wasser angefüßt worden sind. Man begreift darunter die große Reihenfolge von Schichten, welche zwischen der unteren Gruppe des Tertiärgebirges und zwischen dem Hauptsteinkohlengebirge liegt. Schon Lehman hat 1756 einen großen Theil derselben im Allgemeinen gekannt, und sie zuerst unter dem Namen Flözgebirge zusammengefaßt, der bis auf den heutigen Tag beibehalten worden ist.

Die Gesteine, welche dasselbe zusammensetzen, im Wesentlichen dieselben, welche wir beym Tertiärgebirge angetroffen haben, besitzen in der Regel eine weit größere Festigkeit. Ein Wechsel von Kalk- und Sandsteinschichten tritt zwar hier wie bey den jüngeren Gebirgsbildungen auf, aber es erscheinen nicht mehr die mehrfältigen Abwechselungen von Schiefer- und Meerestalken.

An organischen Resten ist das Flöhgebirge ziemlich reich, und die Mehrzahl derselben besteht gleichfalls aus Schalthierresten. Diese sind aber in den Flöhgebirgsschichten wahrhaft versteinert, häufig mit Verlust der Schale, vollkommen von Kalkmasse, selten von Kieselmasse durchdrungen. Alle vorkommenden Gattungen sind gänzlich ausgestorben, ja sogar ganze Geschlechter, die in zahlreichen Gattungen in den Schichten des Flöhgebirges begraben liegen, sind völlig ausgestorben, wie: z. B. die Ammoniten. Die Säugethiere verschwinden beynahe ganz, dagegen treten viele Reptilien auf, namentlich Canrier, wahre Monstra der Urwelt, die theils durch ihre Größe, theils durch ihre sonderbar zusammengesetzten, außerordentlichen Formen in Erstaunen setzen.

Die Pflanzenreste gehören sämmtlich untergegangenen Gattungen an, ja selbst viele Pflanzen-Geschlechter dieser großen Periode kommen in den jüngeren Schichten nicht mehr vor. Die untersten Lagen des Flöhgebirges schließen vorzüglich Reste aus den Familien der Farnkräuter, Quisquiten und Lycopodiaceen ein, die namentlich durch ihren riesenhaften Wuchs von analogen Geschlechtern der gegenwärtigen Zeit verschieden sind. In den mittleren Lagen treffen wir zumal Pflanzenreste aus der Familie der Coniferen, einige Cycadeen und verschiedene Kryptogamen an; in den oberen Lagen findet man insbesondere eine überwiegende Anzahl von Cycadeen-Resten und viele Dicotyledonen.

Erzniederlagen haben wir in den bisher betrachteten jüngeren Schichten nur ausnahmsweise (Bohnerze) und in sehr untergeordnetem Verhältnisse, im Ganzen höchst sparsam gesehen. Hier, im Flöhgebirge, ist das Vorkommen von Erzen von großer Bedeutung. Die verschiedensten Metalle kommen in feinen Bildungen auf mannfaltige Weise, häufig und oft in großen Massen vor. Dergleichen ist das Auftreten von Salz, Gyps und Steinkohlen von großer Wichtigkeit.

Die Schichtung ist, mit seltener Ausnahme, durchaus auf eine höchst deutliche Weise ausgesprochen, und die Schichtenstellung gar mannfaltig. Im Flachlande, in Niederungen, liegen die Schichten häufig horizontal; in der Nähe von Gebirgsketten

aber, am Fuße derselben, ja häufig am Fuße und an den Seiten einzelner crystallinischer Massen, sind die Schichten in der Regel aufgerichtet, auf die mannichfaltigste Weise gehoben und gekent, gebogen, antikkinal gestellt, öfters in ihrem Zusammenhang unterbrochen und nicht selten zertrümmert.

Hinsichtlich seiner räumlichen Verhältnisse unterscheidet sich das Flözgebirge von den meistens in Niederungen und in gesonderten Becken liegenden Tertiärbildungen, vorzüglich durch sein Auftreten in großen zusammenhängenden Massen, die man in den verschiedensten Höhen sieht, die sich in Hügel, Berg- und Gebirgszügen weithin ausbreiten und über ganze Länder ausdehnen. Es hat eine ganz allgemeine, häufig über große Erdtheile beynahe ununterbrochene Verbreitung, eine Mächtigkeit, welche die jüngeren Ablagerungen niemals erreichen, und steigt vom Meere an bis zu den größten bekanntesten Höhen.

Die vielen Glieder, welche das Flözgebirge zusammensetzen, bilden folgende drey größere Abtheilungen:

Kreide-Bildungen.

Jura-Bildungen.

Trias- und Kupferschiefer-Bildungen.

Man bezeichnet diese Abtheilungen auch mit den Namen Kreide-Gebirge, Jura-Gebirge, Trias- und Kupferschiefer-Gebirge, indem man das Wort Gebirge für die Summe zusammengehöriger Schichten gebraucht.

Kreidegebirge.

Syn. Kreidegruppe, Kreideformation, Terrain crétacé, Cretaceous Group.

Im gewöhnlichen Leben versteht man unter Kreide den lockeren weißen Kalk, den man allgemein als Schreib- und Farbmateriale benutzt. Dieser bildet im Kreidegebirge des Geognosten nur untergeordnete, obwohl immer sehr ausgezeichnete Schichten, nach welchen die ganze Bildung benannt worden ist. Die Hauptmasse des Kreidegebirges besteht aus verschiedenartigen Kalksteinen, Mergeln und Sandsteinen, und ist allein durch ihre Stellung zwischen dem tertiären Gebirge und dem Juragebirge, so wie durch die fossilen Reste charakterisirt, die sie einschließt.

Die Kreideformation ist eine reine Meeresbildung, und erscheint in der oberen Abtheilung als eine kalkige, in der unteren als eine sandige Bildung, abgesehen von kleineren Unterabtheilungen und den Gesteinsverschiedenheiten einzelner Localitäten. Zum erstenmale treten hier Ammonshörner (Ammoniten) (S. Bd. 5, S. 530) und Belemniten (Bd. 5, S. 431) auf. Terebrateln (Bd. 5, S. 504) erscheinen in eigenthümlichen kleinen Gruppen. Die Geschlechter *Crania* und *Thecidea* hat man bis jetzt nur in der Kreidebildung gefunden, und so auch die merkwürdigen Hippuriten (Bd. 5, S. 502). Wir treffen darinn auch ausgezeichnete versteinerte Sumpfschnecken (Saurer) untergegangener Geschlechter, namentlich den riesenhaften *Mosasaurus* (Maas-Schnecke). Von Pflanzen findet man vorzüglich Fucoiden.

Man unterscheidet im Kreidegebirge, von oben nach unten, derzeit folgende Glieder:

1. Kreidetuff von Maastricht. Dieses jüngste Glied der Formation besteht aus einem zerreiblichen, gelblich- und graulichweißen, tuffartigen Kalk, der gewöhnlich an der Luft zerfällt, öfters ganz sandig, bisweilen aber auch so fest wird,

Oftens allg. Naturg. I.

daß er als Baustein gebraucht werden kann. Der Luff setzt dem Petersberg zu Maastricht zusammen, dessen außerordentlich ausgedehnte, unterirdische Steinbrüche seit langer Zeit schon die Aufmerksamkeit aller Reisenden in Anspruch genommen haben. Die ganze Mächtigkeit beträgt 200 Fuß. Die oberen Schichten enthalten einzelne, hellgefärbte Feuersteinknauer, schließen viele Corallenversteinerungen ein, zumal aus den Geschlechtern *Eschara*, *Colepore*, *Retepora*, *Millepora*, *Astroa*, *Ceripora*, mehrere *Terebrateln*, darunter die für diese Schichten charakteristische *Terebratula pectiniformis*, einige *Pectiniten*, darunter *Pecten sulcatus*, den charakteristischen *Belemnites mucronatus*, dessen Masse gewöhnlich aus bräunlichgelbem, durchscheinendem Kalkspath besteht, eine eigenthümliche große *Wasserschildekröte*, die *Maastrichter Chelone*. Die interessanteste Versteinerung dieser Schichten aber ist der *Mosaasaurus Hoffmanni*, die riesenmäßige Sumpfschnecke, welche eine Länge von 25 Fuß, in ihrem Rückgrath 130 Wirbel hat und einen hohen, flachen, nach Art eines verticalen Ruders gebildeten, Schwanz besitzt *).

*) Die Reste dieses merkwürdigen Thieres wurden 1770 aufgefunden, und von den Steinbrucharbeitern einem damals in Maastricht lebenden Sammler von Naturalien, D. Hoffmann, übergeben. Es sprach aber der Canonicus der Kirche, welche auf dem Petersberge steht, Namens derselben, als der Besitzerin des Berges, das Eigenthumsrecht an die merkwürdige Versteinerung an, und er erhielt dieselbe auch endlich nach langem Proceß. Sie blieb jahrelang in seinem Besitze und Hoffmann starb darüber. Da rückte, nach dem Ausbruche der französischen Revolution, die Armee der Republik vor die Stadt, und fieng an sie zu beschießen. Gelehrte, welche die Armee begleiteten, sprachen den Wunsch aus, daß die Artillerie ihr Feuer nicht auf jenen Stadtheil richten möchte, in welchem, wie man wußte, die berühmte Versteinerung aufbewahrt wurde. Es geschah. Der Canonicus merkte, warum seinem Hause eine so besondere Günst wiederfähre, und verbarg den Schatz in ein Gemüthe. Er ward aber, nach der Einnahme der Stadt, von den französischen Behörden genöthiget, denselben, den er unrechtmäßig erworben, herauszugeben, worauf er sogleich in die Sammlung des Jardin des Plantes gesendet wurde. Die Erben Hoffmann's erhielten von den französischen Commissären eine Belohnung.

Die unteren Schichten schließen zahlreiche Feuersteine von dunkler Farbe ein, welche meistens zusammenhängende, schmale Bänke bilden. Dieses oberste Glied der Kreideformation ist, außer der Mastrichter Gegend, nur noch zu Fooz-les-Caves in Brabant nachgewiesen.

2. Weiße Kreide. Craie blanche; Upper chalk. Durch einen Eisengehalt öfters gelblich oder röthlich, und mitunter viel härter und fester als die weiße Kreide, welche im Handel vorkommt. Zahlreiche Knauer und Lagen von Feuerstein charakterisiren dieses Glied, und bezeichnen seine im Allgemeinen unvollkommene Schichtung. Öfters liegen Crystalle und Körner von Schwefelkies darinn, die mitunter in Brauneisenstein umgewandelt sind. Als bezeichnende Versteinerungen erscheinen: *Belemnites mucronatus*, *Terebratula carnea* und *semiglobosa*, *Gryphaea vesicularis*, *Galerites vulgaris*, *Micraster cor anguinum*, in Feuerstein verwandelte Corallen, namentlich *Siphonia pyriformis*, ferner *Discoidea albogalera*, *Scaphites striatus* und viele Schiniten, besonders die Geschlechter *Cidaris*, *Echinus*, *Galerites*, *Ananchytes*, *Spatangus*, häufig verkieselt, mit Beibehaltung der Form in Feuersteinmasse umgewandelt. In manchen Gegenden ist dieses Glied ziemlich mächtig entwickelt; in England erreicht es eine Mächtigkeit von mehr als 350 Fuß.

3. Kreidemergel. Craie tufau, Lower chalk. Die Feuersteine des vorhergehenden Gliedes werden in seinen unteren Lagen seltener, und es tritt sodann ein mergeliges Gestein auf, theils mit wenig, theils ohne Feuersteine (*Chalk without flints*), das größere Festigkeit hat, als die weiße Kreide, einen ansehnlichen Thongehalt besitzt und öfters Quarzkörner und grüne Punkte von Eisenoxydul-Silicat einschließt. Die unteren Schichten sind manchmal ganz sandig, und erscheinen als Mergelsandstein. Diesem Gliede gehört der sogenannte Plänerkalk Sachsens und Böhmens an, und der Maigno Oberitaliens. Als Einmengungen findet man sehr oft Kalkspath und Schwefelkies. Von Versteinerungen erscheinen zumal *Belemniten*, *Scaphiten*, *Turrititen*.

Diese obere Abtheilung der Kreideformation ist vorzüglich

in England stark entwickelt, wo ihre Mächtigkeit von 600 bis 1000 Fuß geht. Der Plänerkalk ist in Sachsen und Böhmen der Repräsentant dieser Abtheilung. Durch ihn ist bey Obergau der große und schöne Tunnel der Leipzig-Dresdner Eisenbahn geführt. Der Kalk hat durch starke Einmischung von Eisenorydul-Silicat hier eine dunkelgrüne Farbe, liegt unmittelbar auf Granit und Gneis, und schließt in seinen untersten Schichten zahlreiche Bruchstücke davon ein. In Frankreich ist die weiße Kreide namentlich in der Champagne und Picardie verbreitet.

4. Ober-Grünsand. *Upper greensand, Sablos verts supérieurs.* Ein Mergelsandstein, in welchen der Kreidemergel in den untern Schichten öfters übergeht, grün gefärbt durch das Eisen-Silicat, bildet die Hauptmasse dieses Gliedes. Oft ist das Gestein sehr weich und zerreiblich, mitunter selbst ein lockerer, mit grünen Puncten untermengter Sand, der dann und wann auch roth oder braun gefärbt erscheint, durch das Oxyd, oder das Oxydhydrat des Eisens. Es treten hier zahlreiche Versteinerungen auf, namentlich Baculiten, Turrititen, Inoceramen, Ecdariten, Schiniten, Spatangien, Auster (besonders *Ostrea carinata*), Scaphiten, Hamiten, Alcyonien, Milleporen, und von Pflanzenresten Fucoiden, insbesondere *Fucoides Targioni*. In Menge liegen Körner und Crystalle von Schwefelkies in dieser Lage, häufig auch Feuersteinknollen. Sie erreicht in England eine Mächtigkeit von mehr als 100 Fuß.

5. Gault. In England, Frankreich und Belgien folgt auf den Ober-Grünsand ein mächtiges Thonlager, das die Engländer Gault oder Galt nennen. Der obere Theil desselben ist ein plastischer Thon von bläulichgrauer Farbe, der sich sehr gut zur Fabrication von Backsteinen und Töpferwaaren eignet, und den die zahlreichen Tuchfabriken von Bréviers in Belgien zum Walken der Lächer gebrauchen; der untere Theil ist gewöhnlich mergelig, und brauset daher mit Säuren auf. Er enthält Glimmerblättchen und einige Versteinerungen, unter denen in England *Inoceramus concentricus* charakteristisch ist.

6. Untergrünsand. *Lower greensand, Sablos verts inférieurs.* Unter dem Gault liegt wieder eine Grünsand-Lage, deren Gestein im Allgemeinen dem Ober-Grünsand ähnlich, doch

fters roth, braun und gelb gefärbt ist. Der Kalk- und Mergelsandstein wechselt mit Conglomeratschichten und reineren Kalksteinbänken, die bisweilen beträchtlich entwickelt sind. Dieses Kreide-Glied erreicht in England eine Mächtigkeit von 250 Fuß, und führt weit weniger Versteinerungen, als der Ober-Grünsand. Es wird dort *Trigonia alaoformis* als charakteristisch bezeichnet. Sandsteine dieser Lage sind es, in welchen die Steinbrüche von Blackdown liegen, welche für England die meisten Schleifsteine liefern.

In Norddeutschland ist die untere Abtheilung des Kreidegebirges durch eine Sandsteinbildung repräsentiert, welche von Werner wegen ihrer ausgezeichneten cubischen Structur mit dem Namen Quadersandstein belegt worden ist. Das Gestein ist ein hellfarbiger, feinkörniger Sandstein, mit thonigem, fters eisenhaltigem Bindemittel. Dieser Sandstein bildet die schönen Felsen der sogenannten sächsischen Schweiz, und erreicht eine Mächtigkeit von mehr als 700 Fuß. Wo dieser Sandstein eine geringere Mächtigkeit hat, da ist er reich an mergeligem Bindemittel, enthält viele grüne Körner von Eisen-Silicat, und knollige Stücke von Chalcodon und Hornstein. Ausnahmeweise ist er durch eine sandige Mergellage von 150—200 Fuß Mächtigkeit in eine obere und untere Lage abgetheilt, wie der englische Grünsand.

In der Gegend von Neuschâtel liegt in Thälern auf den obersten Juraschichten eine über 200 Fuß mächtige Ablagerung, die aus gelbem Kalk, der theils dicht, theils oolithisch ist, und aus gelbem und grauem Mergel besteht. Seine vielen Versteinerungen stimmen mit denen des Grünsandes überein, und es ist daher ein Aequivalent desselben. Man glaubte anfänglich darinn Versteinerungen beobachtet zu haben, von welchen ein Theil zwar dem Grünsande, der andere aber jurassischen Bildungen angehöre, und wollte dem Gebilde daher seine Stellung zwischen dem Kreide- und Juragebirge anweisen, und dieses durch den Namen *terrain jura-crétacé* andeuten. Nach der Stadt Neuschâtel sollte es auch *Néocomien* heißen. Wahrscheinlich gehört hiezu auch das Kalk- und Mergel-Gebilde der *Franche-Comté*, das Gyps und Eisenerze einschließt.

Die aufgeführten sechs Glieder stehen zwar unter sich in einer nahen Verbindung, doch sind sie nicht in allen Ländern gleichmäßig entwickelt, und es weichen insbesondere die Charactere der Gesteine verschiedentlich ab. Außer dem obersten Glied jedoch, das bis jetzt mit Bestimmtheit nur in den Mastrichter Schichten gefunden ist, lassen sich die übrigen an den mehrsten Stellen nachweisen.

Als wichtige untergeordnete Massen kommen im Kreidegebirge vorzüglich Gyps und Steinsalz vor. Als Gypsvorkommnisse in der Kreide sind uns bekannt in Norddeutschland die Gypse von Segeberg in Holstein, und von Lüneburg in Hannover, durch den Einschluß von Boracit-Crystallen berühmt. In Frankreich, Spanien, Sicilien, Aegypten kennt man ebenfalls Kreide-Gypse. Steinsalz kommt auf eine höchst ausgezeichnete Weise in der unteren Abtheilung des Kreidegebirges in Spanien vor. Es bildet dort den berühmten Salzstock von Cardona in Catalonien. Dieser, 100 Meter hoch, ragt, von Thon und Gyps begleitet, aus einem Halbzirkel von Anhöhen hervor, die aus grauen Sandsteinen und mergeligen grauen und grünlischen Kalkmassen zusammengesetzt sind, deren Schichten mantelförmig um den Salzberg liegen und nach allen Seiten von ihm abfallen, gerade so, wie wenn die Salzmasse von unten herauf in die Schichten derselben eingetrieben worden wäre.

Die Salzsoolen in Westphalen, so wie die Soolen von Lüneburg, kommen aus dem Kreidegebirge. An vielen Orten liegen darinn auch Eisenerze, in thonige, sandige oder mergelige Lagen eingeschlossen. Auf Bornholm liegen im unteren Grünsand Kohlenflöße, in Westschoonen Braunkohlenschichten.

Die obere kalkige Abtheilung des Kreidegebirges ist gewöhnlich undeutlich geschichtet, und zeichnet sich durch lichte Farbe aus, wodurch die Kreidefelsen an den Meeresküsten, wo sie, durch Wetter und Wellenschlag beständig angegriffen, häufig steile, nackte Wände bildend, weithin leuchten. Die Felsen des Königsstuhls und der Stubbenkammer auf Fasmund zeigen dieß auf überraschende Weise. Im Allgemeinen bildet das Kreidegebirge, indem es meistens in Niederungen und

Wätern abgesetzt ist, weder hohe Berge, noch zeigt es auffallende Bergform; man ist gewohnt, es in gerundeten niedrigen Bergen, Hügeln und Platten zu sehen. Die Thäler, welche darinn liegen, sind jedoch nicht selten enge, schluchtig, von steilen Wänden eingeschlossen und dann malerisch.

In den Pyrenäen, im langen und hohen Zuge der Alpen, in den Karpathen und in allen Ländern, die das mittelländische Meer umgrenzen, tritt das Kreidegebirge mit einem ganz eigenthümlichen Character auf. Es ist hier weit verschieden von der Kreideformation der Länder im Norden der Alpen. Wichtigkeit der Massen und Verschiedenheit der Gesteine fallen besonders auf. Die ganze Bildung tritt hier in einer solchen Ausdehnung auf, daß einzelne Glieder derselben für sich allein hohe Gebirge zusammensetzen, die in mehrere Ketten gespalten sind. Die Gesteine insbesondere stimmen so wenig mit den Kreidegesteinen der nördlichen Länder überein, daß dieses Verhältniß wegen lange Zeit diese so interessante und großartige Kreidebildung gänzlich verkannt wurde. Es sind meistens dunkelfarbte, oft ganz schwarze Gesteine; feste, harte, dunkle Kalksteine und Mergel; dunkelfarbige, oft kieselige Schiefer, Thonschiefer des Uebergangsgebirges ähnlich; feste, nicht selten quarzige Sandsteine, Kalkbreccien und der Nagelsäue ähnliche Conglomerate. Nur mit strenger Berücksichtigung der Petrefacten, welche diese Gesteine führen, läßt sich ihre richtige Stellung finden. Die Petrefacten zeigen aber unzweifelhaft an, daß diese Schichten dem Kreidegebirge angehören, und daß sie insbesondere der unteren Abtheilung der nördlichen Kreideformation, dem Grünsand, entsprechen.

Als Hauptglieder lassen sich, nach den Untersuchungen von Stur, Escher und nach meinen eigenen Beobachtungen, für jetzt, von oben nach unten, folgende unterscheiden:

1. Flysch. Dunkelgrane Mergel- und Kalkschiefer, letztere bisweilen dolomitisch, feinkörnige Kalk- und Mergelsandsteine von grauer, brauner und schwärzlicher Farbe, die einerseits in dichten, thonigen und sandigen Kalkstein, andererseits in quarzigen Sandstein verlaufen, bilden die Hauptmasse dieses obersten Gliedes. Untergeordnet erscheinen Breccien und

Conglomerate. Die Schiefer und Sandsteine enthalten Fossilien, namentlich *Fucus intricatus* und *Fucus Targioni*. Man nennt deshalb dieses Glied auch *Fucoiden-Sandstein*. Es bildet einen beträchtlichen Theil der nördlichen Kalkalpen, der Karpathen (*Karpathen-Sandstein*), der Apenninen (*Malcigno*). Hierher gehören auch die Schichten, die früher unter den Namen *Sandstein von Hög* (bey Salzburg) und *Wiener Sandstein* aufgeführt worden sind. Die Verbreitung des Gyps ist sehr bedeutend, da er im ganzen südlichen Europa und im nahen Africa und Asien vorkommt.

2. **Mummulitenkalk und Sandstein.** Dunkler, grauer oder brauner Mergelschiefer, der an der Luft zerfällt; dichter, grauer oder brauner Kalkstein, öfters thonig oder sandig, und mitunter so voll grüner Körner von Eisen-Silicat, daß das Gestein davon eine dunkelgrüne Farbe hat. Sandstein von feinem Korn, mit kalkigem oder kieseligem Bindemittel und dann in Quarzsets verlaufend, weiß, grau oder grün durch eingemengtes Eisen-Silicat, und zuweilen auch braun, röthlich und grünlich gefleckt oder gebändert, bilden dieses Glied. Es ist durch den Reichthum an Mummuliten ausgezeichnet, welche häufig die Mergelschiefer ganz erfüllen, und auch in großer Menge im Sandstein und Kalkstein vorkommen. Das Eisen-Silicat bildet mitunter größere Nester, und an einigen Orten (Hableren und Beatenberg, am Thunersee) liegen kleine Kohlenflöze darinn. Einzelne Stellen zeigen die interessante Thatsache, daß mit Petrefacten des secundären Gebirges auch viele solche vorkommen, die man zur Zeit nur im tertiären Gebirge gefunden hatte. Es sind die Geschlechter *Conus*, *Fusus*, *Corithium*, *Natica*, *Bulla*, *Cassidaria*, *Cytherea*, *Ampullaria*, *Turritella* und mehrere andere, die mit *Pecten*, *Cardium*, *Ostrea*, *Galerites*, *Spatangus*, *Clypeaster*, *Terebratula* u.s.w. zusammen vorkommen.

Der Mummulitenkalk ist außerordentlich verbreitet. Man sieht ihn namentlich an der Nordseite der Alpen, vom Rhone-Thal her, in mächtig hohen Ketten an den Thunersee, von da zum Luzerner-See, weiter durch Schwyz an den Wallenstädter-See, von da zum Rheinthal und weiter östlich durch das Aargau.

und Bockarberg nach Salzburg und Steiermark fortziehen. Perforationsvermengungen obiger Art sieht man in der Gosau im Salzburgischen, am Kressenberg in Baiern, an der Föhnere im Appenzell und auf den Diablerets. Zwischen dem Rhone-Thal und dem Thuner-See erreicht diese Bildung an mehreren Stellen (Diablerets 9682', Oldenhorn 9622') eine beträchtliche Höhe. Am Wallenstadter-See bildet es die bekannten zackigen Kuhfirsten; in Glarus liegen darinn die bekannten Schieferbrüche bey Matt, deren schwarze, kieselige Platten die vielen interessanten Fischreste einschließen.

3. Kalkschiefer und Mergel mit Spatangen. Dichter, dünngeschichteter Kalkstein von dunkler Farbe, in Kalkschiefer übergehend, und dunkle, oft sandige Mergelschiefer bilden das herrschende Gestein. Der Kalk ist öfters kieselig, oder schließt viele eckige Quarzkörner ein, welche bey verwitterter Oberfläche des Kalksteins hervorstechen. In den Mergeln liegen öfters kleine Bergkristalle. Außer den Spatangen schließen diese Schichten noch ein: *Diceras arietina*, *Ostrea carinata*, *Terebratulula octoplicata*, *Exogyra plicata*, *E. aquila* und *E. Couloni* und mehrere Corallen.

Dieses Glied tritt in dem oben angeführten Zuge des Rummulitenkalks zwischen dem Rhone- und Rhein-Thal stark entwickelt auf, und erreicht mehrfältig Höhen von 7 bis 9000 Fuß (Säntis 7663', Faulhorn 5312', Schwarzhorn 8923'), und eine noch größere Höhe erreicht diese Kalkbildung an der Jungfrau.

4. Schwarzer Kalk mit Inoceramen und Bauliten. Dichter, schwarzer, brauner oder schwärzlichgrauer Kalkstein mit eingemengten Quarzkörnern, und daher stellenweise Funken gebend am Stahl, eisenhaltig und schwer (2,7 bis 2,73). Öfters mit grünen Körnern von Eisen-Silicat. Ist charakterisirt durch *Inoceramus concentricus*, *Baculites Faujasi*, *Ammonites inflatus* Sow. *Hamites virgulatus*, *Trochus Gurgitis*, *Turrillites Bergeri*. Er ist gewöhnlich von einem braunen oder schwarzen Mergel begleitet.

Dieses Glied scheidet den plattenförmigen Spatangenkalk, oder den Rummulitenkalk, wo jener fehlt, von der nächstfolgenden.

lage, und ist ausgezeichnet am Gänisstock entwickelt, und hier petrefactenführend, vorzüglich am Gabelschuh und auf der Reglisalp. Man hat es auch bey Einsiedel, am Schwyzer Haggen, am Montagne de Fins und Reposoit in Savoyen beobachtet.

5. Hippuritenkalk. Dichter, grauer Kalkstein mit Hippuriten. Das Gestein ist mitunter davon ganz erfüllt, oft löcherig, zerspalten und schließt Höhlen ein. In Folge der zerklüfteten Beschaffenheit dieses Kalkes fließen die Wasser in ihm nicht selten auf große Strecken unterirdisch fort. Man findet darinn auch Corallen, Trugpyren, die *Ostrea earinata* und den *Spatangus rotatus*. Der Hippuritenkalk tritt ausgezeichnet in den schweizerischen und deutschen Alpen auf, im Gebirge am oberen Thunersee, am Pilatus, im Gänisstock und hier namentlich im Bräulldobel, und ausgezeichnet am Untersberg unfern Salzburg. Er erscheint sodann weiter am ganzen östlichen Litorale des adriatischen Meeres, von Triest an durch Dalmatien, Griechenland, Kleinasien bis Syrien. Es ist indessen sehr unwahrscheinlich, daß der Hippuritenkalk der Alpen, von welchem allein hier die Rede ist, mit den gleichfalls Hippuriten einschließenden Schichten anderer Länderzusammengefaßt werden kann. Die Verbreitung solcher Schichten ist außerordentlich. Der Hippurit, die merkwürdige Versteinerung, einem auf der Spitze stehenden Horn oder Regel ähnlich, wurde zuerst von La Peyrouse, vor etwa 36 Jahren, bey Met, am Fuß der Pyreniden, und bald hernach auch von Thompson am Cap Passaro auf Sizilien beobachtet. Jetzt weiß man, daß er von Lissabon an durch Spanien, Südfrankreich, die Alpen u.s.w. verbreitet ist.

Das Vorkommen des Kreidegebirges in den nordwärts der Alpen gelegenen Ländern, ist im Allgemeinen schon angegeben worden. In Deutschland ist die Kreideformation mehr im Norden als im Süden verbreitet. Dort steht man sie in dem Bufen von Münster und Paderborn, am Teutoburger Wald, am Nordabhang des niederrheinischen Schiefergebirges; zunächst am Nordrand des Harzes zwischen Braunschweig und Hildesheim, in Sachsen zwischen Oberau,

Meissen, Dresden und in der sogenannten sächsischen Schweiz. In Süddeutschland ist die Kreideformation, bey Regensburg längs der Laber entwickelt, und in den östlichen Alpen.

Artefische Brunnen.

Artefische Brunnen, *puits artésiens*, *puits forés*, *overflowing wells*, heißen solche Brunnen, welche durch Bohrarbeit hergestellt worden sind, und zwar deshalb, weil man in der ehemaligen Graffschaft Artois, dem heutigen Departement Pas-de-Calais, seit langer Zeit mittelst Bohrarbeiten zahlreiche Brunnen eingerichtet hat. Der Boden dieses so wie des Nord-Departements besteht aus Kreidekalk und einer darauf ruhenden Lage von Alluvial- und Diluvialmassen. Wo die Kalksteinschichten unbedeckt zu Tage anstehen, da fließen die Wasser der atmosphärischen Niederschläge durch das klüftige Gestein dem tieferen Lagen zu, die thonig sind und die Wasser zurückhalten. Es treten daher aus den untern Schichten an den Abhängen und am Fuße der Hügel, im Grunde der kleinen, in das Kreideplateau eingeschnittenen Thäler viele Quellen hervor, während die oberen Schichten wasserarm oder ganz wasserleer sind. An vielen Stellen ist aber der Kreidekalk von den Diluvial- und Alluvialbildungen bedeckt, die vorzugsweise aus Sand und Geröllen, abwechselnden Lagen von Thon und Sand bestehen, und gewöhnlich liegt dann auf dem Kalkstein eine wasser-dichte Thonschicht. Die Wasser gehen durch die lockeren Massen des aufgeschwemmten Gebirges bis auf diese Thonschicht nieder, und man bohrt in jenen Gegenden daher entweder in den untern thonigen Schichten des Kreidekalks, oder auf der Gränze zwischen diesem und den Alluvionen Wasser an. Die Kalkschichten sind schwach gegen Norden geneigt, die meisten artefischen Brunnen liegen nordwärts kleiner Hügel und Berge, oder am Nordrande des Kalkplateaus, und das Ausgehende der Kalkschichten nimmt häufig die höchsten Punkte der Landschaft ein.

Es ist somit klar, daß die artefischen Brunnen durch atmosphärisches Wasser gespeist werden, welches auf die Oberfläche niederfällt, zwischen den Kalksteinschichten und auf Klüften desselben, oder

zwischen seiner Oberfläche und dem aufliegenden Thon, oder endlich durch die lockern Alluvionen bis auf die Thonschicht über dem Kalle niederfließt und durch das Bohrloch emporsteigt, wie durch den kürzeren Schenkel eines Hebels, dessen längerer Schenkel im Gebirge liegt. Daraus folgt der für die Praxis sehr wichtige Satz:

Man kann überall da mit gerechter Hoffnung eines glücklichen Erfolgs Bohrversuche auf artesische Brunnen vornehmen, wo feste Schichten, gegen ein Thal oder gegen eine Niederung geneigt, aus verschiedenen kalkigen und sandsteinigen oder thonigen Massen zusammengesetzt, entweder unmittelbar anstehen, oder den Untergrund nicht allzumächtiger Alluvionen bilden.

Sehr oft trifft man auf den Grenzen, da wo sich verschiedenartige, geschichtete Gesteine berühren, starke Quellen, indem Thon- und Mergelstagen, welche die Wasser zurückhalten, mehrentheils auf solchen Grenzen liegen. In ungeschichteten Gebirgsmassen aber, in Sand- und Geschiebeablagerungen, ist keine Hoffnung zur Erbohrung artesischer Brunnen vorhanden. S. Fig. 15 und 16.

Juragebirge.

Syn. Dolithgebirge; Terrain jurassique, Oolitic group or Series.

Unter dem Kreidegebirge folgt eine große Reihe weitverbreiteter Schichten, welche in mächtiger Entwicklung auch die Masse des schweizerischen und deutschen Juragebirges zusammensetzen, das einen ununterbrochenen Zug von Ketten und Bergen bildet. Darnach ist der Name diesen Bildungen gegeben, die man ebenso auch die jurassischen nennt. Wegen der in einzelnen Gegenden häufig darin vorkommenden Kogensteinen, Dolithen, hat man nach dem Vorgange der Engländer die Schichten auch unter dem Namen Dolith-Gebirge zusammengefaßt. Dieser Name wird gegenwärtig sehr viel zur Bezeichnung dieser Bildungen angewendet, obgleich die Jurassischen weder im nördlichen England, noch im großen Zuge des deutschen Jura

Kongesteine einschließen. Wenn man aber dichte Kalksteine und Mergel, Sandsteine und Thonmassen *Dolithe* nennt, so ist es doch recht augenfällig, daß man damit Verwirrung verursacht und der Natur wahrhaft widerstrebt.

Die jurassischen Bildungen sind sowohl durch Thier- als Pflanzenreste im hohen Grade ausgezeichnet. Sie schließen, wie die Kreideschichten, in überwiegender Anzahl Conchylienreste ein, und am häufigsten die Geschlechter *Terebratula*, *Ammonites*, *Bolonites* in zahlreichen Gattungen. Die Geschlechter *Nerinea*, *Ostrea*, *Lima*, *Pecten*, *Modiola*, *Isocardia*, *Pholadomya*, *Pteroceras*, *Trochus*, *Turbo*, *Melania*, *Delthyris*, *Gryphaea*, *Trigonia* kommen in bezeichnenden Gattungen vor. Die Saurier treten in großer Zahl, und unter ihnen als charakteristisch insbesondere die Geschlechter *Plesiosaurus* und *Ichthyosaurus*, auf. Von Schindeln erscheinen vorzüglich *Cidaris* mit ihren Stacheln, *Echinus*, *Galerites* und *Nucleolites*; von Meeresternen, die gestielten, *Solanocrinites*, *Pentacrinites*, *Eugeniocrinites*, *Aplocrinites*, überdies viele Corallen. Von Pflanzenresten sind besonders die Nadelholzstämmen (*Polycotyledonen*) bezeichnend, mit welchen viele *Spadeen* und *Algaciten* vorkommen.

Man theilt die große Reihe von Schichten in drey Abtheilungen, in den oberen, mittleren und unteren Jura. Jede dieser Abtheilungen, ja sogar eine jede der einzelnen Unterabtheilungen derselben, ist auf eine merkwürdige Weise durch die organischen Reste charakterisirt.

Der obere Jura.

1. Wälderbildung.

a. Hilsdon.

In Norddeutschland liegt in der Hilsmulde in Hannover eine dunkle, oft schwarze Thonmasse, welche Römer als das oberste Glied des Juragebirges erkannt hat. Sie schließt am Elbiger Brinke bey Delligsen bauwürdige Eisensteinlager, bey Holzen, Duingen und Bardissen mächtige Gypsstöcke ein, und

von Versteinerungen häufig *Pecten lens*, ferner *Lima elongata*, *L. rigida*, *L. plana* und *L. striata*, *Boleminites subquadratus*, *Ammonites biarmatus* und *sublaevis*, *Exogyra spiralis* und mehrere andere, welche auch in älteren Gliedern des Jura gefunden werden. Man hat in dieser Bildung am Elliger Brinke auch *Ichthyosaurus*-reste gefunden. Neuersich hat Römer dieses oberste Juraglied auch am nördlichen Fuße des Deisters, bey Schandelohe, unweit Braunschweig, und auf beiden Abhängen des Salzgebirges bey Salzgitter aufgefunden, wo es ein mächtiges Gild von Eisenstein einschließt.

b. Wälderthon und Sandstein.

Engl. *Woad Clay, the Woaden.*

Die hieher gehörigen Schichten wurden zuerst im südöstlichen Theil von England beobachtet, und sind durch G. Mantell meisterhaft beschrieben worden. Sie nehmen die Landstrecke zwischen den Süd- und Nord-Downs ein, und ihre höchsten Massen bilden den Gebirgszug, welcher von O. nach W. unter dem Namen *Forest-ridge* zieht, und aus abwechselnden Schichten von Thon, Schiefer, Sand und Sandstein besteht. Er ist auf jeder Seite durch ein tiefes Thal begränzt, welches *Woad* heißt, und davon haben diese Schichten die Benennung erhalten. Man hat sie nicht nur in großer Ausdehnung und Mächtigkeit in England, sondern auch in Frankreich, Deutschland und zum Theil selbst in den Alpen gefunden. Die Steinbrüche des *Tilgate-Forest* schließen eine Menge interessanter Versteinerungen ein, und sind dadurch berühmt geworden. Mantell hat darüber ein besonderes Werk herausgegeben unter dem Titel: „*Fossils of Tilgate-Forest.*“

Die Abtheilungen, in welche diese Schichten in England gebracht worden sind, heißen:

- a. Wälderthon (die obersten Schichten): Dunkler blauer Thon oder Letten mit Mergelknuern, Thoneisenstein und Schichten von Kalkstein mit Süßwasser-Conchylien, bekannt unter dem Namen *Sussex* oder *Petworth-Marmor*.

6. Hastings-Schichten: Sand und Sandstein, letzterer in großen concretionirten Massen in Sandschichten eingeschlossen, (Tilgate Stone) offenbar durch Infiltration kältiger Wasser in die Sandlagen gebildet. Enthält Süßwasser-Conchylien, viele Knochen und Zähne von Reptilien und Stengel und Blätter von Pflanzen.
7. Ashburnham-Schichten: Thon und dunkel gefärbte Kalk- und Sandsteine.
8. Purbeck-Schichten: Thon, Sandstein, Kalkstein mit Süßwasser-Conchylien, Purbeck-Marmor genannt. Der Kalkstein schließt Baumreste in aufrechter Stellung ein (der versteinerte Wald von Portland gehört hieher), sowie Lagen von Pflanzenerde.

Diese Schichtenfolge 1) von Thon mit Kalklagern, 2) von Sand und Sandsteinen mit Schiefer, Braunkohle und Steinkohle, 3) von Thon, Schiefer, Kalk- und Sandsteinen, 4) mit einer Unterlage eines pflanzenreichen und muschelführenden Kalksteins, den Sandstein und Thon begleiten, zeigt sich im Wesentlichen überall, wo man das Gebilde seither in Deutschland und Frankreich in größerer Entwicklung aufgefunden hat.

Die organischen Reste bestehen aus Blättern, Stämmen, Zweigen tropischer Gewächse, es sind Farren, *Clathraria Lyellii*, *Lonchopteris* und *Sphenopteris Mantelli*, Equiseten, Coniferen, den Palmen verwandte *Monocotyledonen* (*Endogenites erosa*), *Erycaeen* (*Mantellia*); Flußconchylien: *Paludina*, *Cyrena*, *Cyelas*, *Unio*, *Potamides*, mit welchen in den obersten Schichten (1) auch Meerconchylien vorkommen, *Ostrea*, *Gorvillia*, ferner Knochen sehr großer und merkwürdiger Saurier und einiger anderen Reptilien, von welchen sich auszeichnen: *Plesiosaurus* (S. Zoologie Taf. 67.), mit einem langen schmalen Hals, dem Schwanenhals ähnlich, und einem Eidechsenkopf, reichlich 25 Fuß lang; *Megalosaurus*, über 70 Fuß lang, von der Form eines Monitors, von der Höhe des größten Elefanten, somit ein Saurier von der Größe des Wallfisches; *Iguanodon*, eine riesenhafte gehörnte Eidechse, drei bis viermal so groß als das größte Crocodil; *Pterodactylus*, ein fliegendes

Reptil (S. Zoologie Taf. 69.); Meer- und Süßwasser-Schilkröten: Tryonix, Emys, Chelonia. Es sind darinn weiter Knochen von Vögeln gefunden worden und Fische: Epidotus, Pholidophorus und Hybodus, welche auch in den meerischen Schichten des älteren Jura vorkommen. Endlich liegen in großer Menge Reste von Süßwasser-Crustaceen (Cypria faba) in manchen Schichten.

Die Pflanzenreste liegen häufig im verkohlten Zustande in den Schichten, es liegen Braunkohlen und selbst Steinkohlen-Flöße dazwischen (Helmstädt, Osterwald, Detter, Bückeburg), Eisensteine (Fuhregge bey Carlshütt, unsern Braunschweig), und dieß alles im Wechsel mit Schichten, die vorzüglich Süßwasserthiere, und nur einige wenige Thiere des Meeres einschließen. Eine außerordentliche Aehnlichkeit mit der Hauptsteinkohlenbildung.

Aufs Deutlichste treten alle diese Schichten als ein altes Flußgebilde auf; alles erscheint als Absatz in einem Delta. Die Reste der Thiere werden vereinzelt gefunden; selten sind ganze Thiere oder auch nur größere Stücke von Gerippen, Knochen, Zähne, Gräten, Schuppen liegen zerstreut in den Gesteinen. Die Beschaffenheit der mehrsten Reste beweisen, daß sie aus der Entfernung herbeigeführt worden sind. Gebeine und Thier-Sadaver wurden durch den Fluß heruntes in das Delta geführt und bis ins anstoßende Meer, und es scheint daß sie hier Fluth und Ebbe vor- und rückwärts geschwemmt, und die Knochen zertheilt und zerbrochen haben, ehe sie eingewickelt wurden.

Die Knochen sind häufig von Eisen durchdrungen, die Pflanzenstämme oft verlieselt. Dieß ist insbesondere bey den Stämmen der Fall, die man in der untersten Lage daselbst in großer Menge findet, und die den sogenannten versteinerten Wald von Portland bilden. Mantell gibt davon folgende Beschreibung: Auf dem obersten Meereskalk-Lager der Halbinsel, dem Portlandkalk, ist die Bildung des Purbeck-Kalks abgelagert. Es liegt auf dem Meereskalk zunächst ein Süßwasserkalkstein (S. Fig. 17), und darauf eine dunkle Schicht vegetabilischer Erde, mit Braunkohlenstücken und Geröll. In und über dieser

Lage finden sich versteinerte Stämme und Zweige von Coniferen und Cycadeen (Mantellien), und viele derselben befinden sich in aufrechter Stellung, als wie wenn sie im Leben an ursprünglicher Stelle versteinert worden wären. Die Wurzeln stecken im Boden, und Stämme und Zweige reichen bis in den überliegenden Kalkstein hinein. Die Stämme sind oft 3 bis 4 Fuß hoch, an den Enden gezackt, zersplittert, als wenn ein Sturm die Bäume abgerissen hätte. Ihr Durchmesser beträgt mitunter bis zu 2 Fuß.

Die unterste Lage der Wälderthon-Bildung ist namentlich auch auf der englischen Insel Purbeck entwickelt, die schon längst wegen ihren, in diesen Schichten liegenden, Steinbrüchen berühmt, und deren Namen zur Bezeichnung derselben gebraucht worden ist. Die dichten, polirfähigen Süßwasserkalksteine wurden ehemals für Kirchengebäude sehr gesucht und Purbeck-Marmor genannt. Es sind wenige ältere Kirchen in England, welche nicht mit Säulen, Platten, Grabmälern aus Purbeck-Marmor geziert waren. Dieser Stein ist voll kleiner Paludinen und Eyprie-Schalen.

„Wie interessant,“ sagt Mantell (*The Wonders of Geology*. 1838. V. I. 231.), „ist die Betrachtung, daß die schöne Säulengruppe der Cathedral von Chichester, ihre reichste Zierde, ganz aus den Gehäusen von Schnecken besteht, welche in dem Flusse einer Gegend gelebt haben, die von ungeheuren Reptilien bewohnt war!“

Das Wälderthon-Gebilde erreicht in England eine durchschnittliche Mächtigkeit von 2000 engl. Fuß, und nimmt eine Oberfläche von 400 engl. Quadratmeilen ein. In Deutschland ist die Bildung, nach den Beobachtungen von Hoffmann und Römer, in Hannover und im Braunschweigischen, in einer Stärke von 800 Fuß entwickelt, und nimmt einen Flächenraum von mehr als 20 Quadratmeilen ein. In ihr liegen, nach Hoffmann, die westphälischen Schwefelquellen Ellisen, Rensdorf u.s.w. In Frankreich sind hieher gehörige Schichten an der Küste des untern Boulonnais und in dem Thale von Bray bey Beauvais, und bey Carsau und Lagrasse, unserm Pont-St.-Esprit im Saône, beobachtet worden.

In den Alpen hat man diese Bildung im Simmenthal Oken's allg. Naturg. I.

beobachtet. Die Kohlen von Voltigen gehören ihr an. Auch die Kohlenbildung von Entrevernes, unweit Annecy in Savoyen, ist hieher zu rechnen.

Der Lagerung nach scheinen auch die, nach den Beobachtungen von Röggerath, Strombeck und Mähler, unter der Kreide liegenden Braunkohlen zu Brühl, Liblar, Aachen, Senkhof bey Amberg, und Wackersdorf bey Schwandorf hieher zu gehören.

2. Portlandbildung.

Syn. Portland Oolite und Kimmeridge-Clay.

Unmittelbar unter den Schichten des Wälden liegt eine Meeresbildung, die aus Schichten von Kalkstein, Mergel und Thon besteht, zuerst auf Portland und bey Kimmeridge, an der Küste von Purbeck, gefunden und genauer untersucht wurde. Die Kalkschichten herrschen auf Portland, die Thonmassen bey Kimmeridge, und daher die Namen Portland-Stein und Kimmeridge-Thon. Französische Geologen nennen das Gebilde Terrain des Calcaires et marnes à Gryphées virgules, weil beide Glieder einerley Stellung einnehmen, und durch Einschluß der Gryphaea (*Exogyra*) virgula charakterisirt sind.

Die Kalkschichten sind gewöhnlich von lichter Farbe und oft rogensteinartig, bisweilen auch sandig oder eisenhässig, und nicht selten schieferig. Die hellgefärbten Mergel sind dieß gewöhnlich. Oefters liegen Hornsteinlagen zwischen den kalkigen Schichten. Das thonige Glied, der Kimmeridge-Thon, ist nicht so allgemein entwickelt, und liegt, wo es mit dem Portlandkalk zusammen vorkommt, unter diesem. Es hat eine dunkle Farbe, und schließt bisweilen baumwürdige Lager von Braunkohle ein. Manchmal erscheint als untere Abtheilung dieser Formation eine Reihe Mergel- und mergeliger Kalkschichten, mit vielen *Exogyren* und von unreinen gelben und grünlichen Färbungen. Die charakteristischen und verbreitetsten Versteinerungen (*Leitmuscheln*) sind: *Exogyra angusta* (virgula), *Pterocera Oceani*, *Isocardia excentrica*, *Nerinea suprajurensis*, *Pholadomya donacina*, *Donacites Alduini*, *Terebratula*

reticulata, insignis, trigonella, substriata, Dicorcas arietina, Pinna granulata. In dieser Schichten-
gruppe wurden bey Solothurn auch die ausgezeichnet schönen
Schichtfossilien gefunden, die in dem Cabinette dieser Stadt auf-
bewahrt werden, Für den englischen und französischen Mineralog-
ischen Thon ist *Ostrea deltoidea* charakteristisch.

Die Portlandschichten sind in England, Frankreich, der
Schweiz, Deutschland an vielen Orten aufgefunden worden, und
bilden, wo der Kalkstein und Gips nicht entwickelt ist, die
oberste Lage der jurassischen Bildungen. In der Gipsmulde
in Hannover sieht man sie aber unmittelbar von jenen Bildungen
bedeckt, Fig. 18. In der Kette der westlichen Alpen hat Stuber
die Portlandschichten im Kalk der Stockhornstufe nachge-
wiesen; auch soll der über dem Veltliner Kohlengebirge liegende
Kalk der Gastlosen dazu gehören!

3. Corallenkalk.

Syn. Coralrag.

Ohne durch den Einschluss großer felsbauender Corallen
characterisirte Gruppe von Schichten, deren einzelne Glieder
öfters als wahre Corallenriffe auftreten, der Hauptmasse
nach Kalkstein und Mergel, und nach diesen Verhältnissen Co-
rallenkalk benannt, folgt unter dem Portlandstein.

Die Versteinerungen, welche diese Schichten characterisiren,
sind: Corallen mit Sternzellen, insbesondere das Geschlecht
Astraea mit vielen Gattungen, worunter die gewöhnlichsten
A. helianthoides, explorata, confluens, Meandrina *astroides, Lithodendrum* *trichotomum*, viele
Tabatiten, insbesondere *Cidarites coronatus*, mehrere
Nerineen, Arten, *Pectines*, namentlich *P. vimineus*
und *P. arcuatus, Ostrea gregaria, Lima rudis, Te-*
rebratula lacunosa; Ammoniten, vorzüglich aus der
Familie der Planulaten, *Ammonites polylocus, A.*
floeuosus, A. inflatus, A. plicatilis, A. biplex, A.
multiradiatus, A. bifurcatus, A. polygyratus.
Ferner treten häufig auf: *Scyphia, Tragos, Belemnites*
semisulcatus, Serpula grandis, Apicrinites

mospilliformis. Die Muscheln liegen häufig um die Corallen herum, die ganze Bänke erfüllen.

Man unterscheidet folgende Abtheilungen:

a. Astarten-Kalk. Calcaire de Blangy en Normandie; Weymouth-Bed. Dichter, gewöhnlich hellgefärbter Kalkstein mit muscheligem Bruch, hart und in dicke Bänke abgetheilt. Schließt außer *Astarte minima* sehr wenig andere Versteinerungen ein. Ofters ist dieser Kalk auch erdig, freibearzig, mergelig und mischter auch von dunkler Farbe.

b. Nerineen-Kalk. Hellfarbiger, dichter oder erdiger Kalkstein mit vielen Nerineen.

c. Corallen-Rogenstein. Grosse Oolite de Lisieux en Normandie. Grobkörniger Rogenstein von weißer, gelber und grauer Farbe, erfüllt mit größtentheils zerbrochenen Muschelschalen und Corallen, und von Kalkspathadern durchzogen. Dieser Rogenstein ist grobkörniger als irgend ein anderer, geht in dichten Kalkstein über und verläuft in die vorhergehende wie in die folgende Abtheilung.

d. Corallen-Kalkstein. Dichter und feinkörniger, mehr und weniger thonhaltiger Kalkstein, voll Corallenreste, mit Röhren und Adern von Kalkspath, dann und wann sandig, eisenküssig, öfters mit oolithischen Theilen. Die zahlreich darinn angehäuften Corallen sind theils verkiezelt, theils verkalkt. Die sie einschließende Gesteinsmasse ist weicher, verwittbarer, und es treten daher die Corallen recht deutlich bey der Verwitterung hervor. Sie lösen sich häufig davon ab, zumal wenn die Felsen zertheilt auf der Oberfläche umherliegen, wobei das Zerfallen des Gesteins schneller erfolgt.

Die drey Abtheilungen b. c. d. sind aufs innigste mit einander verbunden, nicht überall aber auf gleiche Weise entwickelt, oft nur die eine oder die andere; wenn sie aber alle drey entwickelt sind, dann folgen sie auf einander, wie angegeben worden.

e. Kieselneren-Kalk. Terrain à chailles, Calcareous grit. Die unterste Lage der Corallenkalk-Formation besteht aus Schichten eines mergeligen, oft sandigen Kalksteins, aus Mergeln und stellenweise aus Kalksandstein. Sie ist durch Knollen und Nieren von Quarz und Chalcidon, und Ruaren von

Kieseligen Mergel, die im Innern öfters hohl sind, so gut bezeichnet, daß sie daran leicht erkannt wird. In einigen Gegenden treten hier dunkelgefärbte Gesteine, sandige, eisenschüssige Kalksteine und dunkelgefärbte Kalksandsteine auf.

Diese Abtheilungen, die im Jura von Pruntrut in den gegliederten französischen und englischen Jurabildungen wohl unterschieden werden können, sind im deutschen Jura nicht also entwickelt. Die Kogensteinsschichten fehlen, dichte Kalksteine und Mergel von hellen Farben bilden eine große zusammenhängende Masse, welche die verschiedenen Abtheilungen repräsentiert, und nach den Versteinerungen, die sie einschließt, auch alle umfaßt.

Eine ganz merkwürdige Eigenthümlichkeit zeigt der fränkische Jura durch das Auftreten großer Dolomitmassen. Es erheben sich auf seinen Höhen wunderbar gestaltete Felsen von Dolomit. Dieses Gestein, den Jurabildungen aller andern Länder fremd, tritt in der Stellung des Corallenkalks auf und nimmt ziemlich den mittleren Theil des Gebirges ein. Wie im Corallenkalk des schweizerischen und schwäbischen Jura zahlreiche Höhlen liegen (Schillers-Höhle, Rebel-Höhle, Erpfinger-Höhle), wovon letztere Thierknochen enthält; so liegen in Franken die weltbekannten Knochenführenden Höhlen von Muggendorf und Gaylenreuth im Dolomit. Versteinerungen kommen darinn höchst selten vor; sie haben die Schale verloren, sind oft nur Kerne und bestehen aus einer weißen, zerreiblichen Kieselmasse.

In Norddeutschland unterscheidet man, nach Römer, drei Abtheilungen:

- a) Oberer Corallen-Kalk. Hellgefärbte, aber auch graue, braune und rothe Kalksteine; fein- und grobkörnige, hellgefärbte Kogensteine; feinkörnige, thonige Sandsteine von gelblicher Farbe. Damit ist nach unten eine Dolomit-Bildung verbunden.
- b) Mittlerer Corallen-Kalk. Hellgefärbter, dichter Kalkstein, voll Corallen.
- c) Unterer Corallen-Kalk. Kieselige, dunkelgefärbte, dichte Kalksteine; kalkige, weiche Sandsteine von braunen, graulichschwarzen Färbungen.

Solenhofer-Schiefer.

In den obersten Schichten des Corallen-Kalks gehört auch der Solenhofer-Schiefer, seit Sennefelders erfolgreicher Entdeckung als lithographischer Schiefer der Welt bekannt, und den Geologen insbesondere noch durch den Reichthum und die Mannfaltigkeit organischer Reste, die er einschließt. Nicht weniger als Hundert fossile Thiergattungen hat man bislang in seinen Schichten gefunden, welche Reptilien, Fischen, Weichthieren, Krebsen, Insecten, Radiarien und Zoophyten angehören. Ueberdies kommen Algen darinn vor.

Die wichtigsten dieser Reste sind diejenigen des *Aelodon priscus* (*Crocodylus priscus*), *Gnathosaurus subulatus*, *Geosaurus Soemmeringii* (*Lacerta gigantea*), *Rhachosaurus gracilis*, *Pleurosaurus Goldfussii* und des fliegenden Reptils *Pterodactylus*, in mehreren Gattungen, zumal *Pt. longirostris*, *Pt. crassirostris* und *Pt. Münsteri*. Von Fischen kommen viele Geschlechter und zahlreiche Gattungen vor. Von ersteren insbesondere *Pholidophorus*, *Caturus*, *Aspidorhynchus*, *Thrissops*, *Leptolepis*, *Microdon*, *Belonostomus*. Von Conchylien findet sich wenig; *Ammonites polyplocus* und *A. flexuosus*, *Aptychus latus* und *A. lamellosus*, *Belonites semisulcatus*. Mehrfältig werden auch Sepientknochen gefunden, von *Loligo* und *Onychoteuthis*; von Insecten Libellen, und zwar schöne, große. Von Crustaceen finden sich *Erion arctiformis*, *Mecochirus locusta*. Von den Meersternen *Ophiura* und *Comatula* in mehreren Gattungen. Die Pflanzenreste gehören den Geschlechtern *Codites*, *Caulerpites*, *Halymenites*, *Ballostichus* an, sämmtlich Algaen.

Das Gestein ist ein feinkörniger Kalkschiefer von großer Dichtigkeit, höchst gleichartig und rein in seiner Masse, und ganz regelmäßig geschichtet. Viele Platten sind mit Dendriten geziert.

Der Solenhofer-Schiefer liegt im Thale der Altmühl, bey Eichstätt, auf dem Dolomit des Corallen-Kalks. Fast man die Eigenthümlichkeiten desselben zusammen, so führen sie zu

dem Schlusse, daß er in einem fischreichen Meerwasser-Becken, in der Nähe eines festen Landes, ruhig abgesetzt worden ist. Man weiß, daß große Mengen von Fischen sich nur in der Nähe des Landes aufhalten, ebenso Saurier. Der fliegende *Pterodactylus* kann nur in der Nähe des Landes gelebt haben; der *Geosaurus*, eine Erd-Eidechse mit Füßen, nur auf demselben; Algen vegetiren an der Küste; Libellen leben am Ufer, ebenso Insecten, und die kleinen Wasser-Eidechsen konnten sich nicht weit davon entfernen. Reste von Hochsee-Thieren, von *Ammonites*, *Belemnites*, kommen selten vor.

Die vielbesprochenen Schiefer von *Stonesfield* in England werden mitunter auch hierher gestellt; sie dürften aber selbst zu noch jüngeren Schichten zu rechnen seyn. Sie geben das einzig dastehende Beispiel des Vorkommens von Säugethier-Resten in Schichten, die unter dem Tertiärgebirge liegen. Man hat darinn Unterkieferreste eines Thieres gefunden, das, nach der Bildung seiner Zähne, unverkennbar ein Säugethier ist. Agassiz ist der Meinung, es dürfte ein Wasserthier, von der Beschaffenheit der Insectivoren, den *Phoken* ähnlich, gewesen seyn. Die *Stonesfield*-Schichten bestehen nach oben aus plattenförmigem Kalkstein, der mit Thonlagen wechselt; nach unten aber treten Schichten von Kalksandstein, von Kogenstein, kalkigem Conglomerat, im Wechsel mit Sand, Thon und mürbem Sandsteinschiefer auf. Der Sandstein schließt viele Weermuscheln ein, insbesondere *Trigonia impressa*, viele Zähne von Fischen, Reptilien, Reste von *Pterodactylus*, Insecten, Crustaceen u.s.w., und hat, sowohl hinsichtlich seiner petrographischen, als paläontologischen Verhältnisse, eine große Aehnlichkeit mit den *Tilgat*-Schichten des Wälden, welche Mantell sehr schön nachgewiesen hat. Eine genauere Vergleichung der Versteinerungen, welche beide Gebilde einschließen, gewährt ein besonderes Interesse.

Tilgatschichten des Wälden. Stonesfield-Schiefer.

Epcadec.

Liliaceen.

Clathraria Lyallii.

Epcadec.

Liliaceen.

Dumortiera Barron.

Lilgatschichten des Walden.

Coniferen.
 Equiseten.
 Sphenopteris, Lonchopteris.
 Süßwasser-Muscheln und
 einzelne Meer-Muscheln
 des Jura.
 Keine Insecten.
 Fische der Geschlechter Hybodus,
 Ptychodus.
 Meer- und Süßwasser-Schild-
 kröten.
 Plesiosaurus.
 Pterodactylus.
 Crocodile.
 Megalosaurus.
 Ignanodon, Splanosaurus.
 Vögelreste. Ardea (Reiher).

Stonesfield-Schiefer.

Coniferen.
 Algen.
 Sphenopteris, Taeniopteris.
 Meer-Muscheln, jurassische.
 Insecten, Coleopteren.
 Ptychodus Hybodus und an-
 dere Fische.
 Meer-Schildkröten.
 Plesiosaurus.
 Pterodactylus.
 Crocodile.
 Megalosaurus.
 Andere Reptilien.
 Säugethierreste, Phoken
 ähnlich.

Diese Vergleichung der beiden Gebilde zeigt deutlich an, wie nahe ihre Flora und Fauna übereinstimmt. Die fossilen Muscheln geben dabei Aufschluß über die Umstände, unter welchen sie abgesetzt worden sind. Die Lilgatschichten wurden in einem Delta, an der Mündung eines Flusses ins Meer, abgelagert; die Stonesfield-Schichten setzten sich in einem tiefen Meeresbecken, unfern des Westlandes, ab. Beide Bildungen können möglicherweise gleichzeitig entstanden seyn, und wir begreifen, wie Schichten des süßen Wassers, und solche mit Meeresthierresten neben einander gebildet werden können, und wie somit die Entstehung von Gebirgsbildungen nach einander nicht die einzige und ausschließliche seyn kann.

Der Corallen-Kalk ist an der Oberfläche häufig stark zerklüftet, und im Innern von Spalten und Höhlen durchzogen, von welchen im Zuge des schwäbischen Jura allein über dreißig bekannt sind. Viele derselben stehen mit der Oberfläche durch Gänge in Verbindung, und häufig führen trichterförmige Vertiefungen zu ihnen hinab. Eine natürliche Folge dieser Verhältnisse ist der Wassermangel auf den Rücken und Plateaus des Corallenkalks. Die Wasser gehen auf den vielen Spalten

schnell in die Tiefe, und kommen gewöhnlich in einem tieferen Niveau, wo sie auf Thon- oder Lettenlagen fallen, heraus. Hier bricht dann häufig eine starke, gesammelte Wassermasse hervor, die mitunter alsobald mühlentreibende Bäche bildet, wie die Quelle von Baucuse, die Quelle bey Urspring im Thal von Blaubeyren u.s.w. Haben Bäche oder Flüsse ihren Rinnal im Corallenkalk, so treffen sie häufig auf klüftige Stellen, an welchen sich ein Theil des Wassers versenkt, und sogar bey kleinerem Wasserstande, zur Sommerszeit, öfters das ganze Wasser auf einmal verliert, indem es in den Spalten niedergeht. An einer entfernten tieferen Stelle tritt es manchmal wieder hervor. Einem solchen Verhältnisse verdankt die Aach im Hegau ihren wasserreichen Ursprung. Aus der Donau geht in der Gegend von Immendingen, unfern Donaueschingen, eine ansehnliche Wassermenge durch Spalten in die Tiefe nieder. Dieses Wasser fließt bey dem Städtchen Aach aus Spalten des Corallenkalks, in einem tiefen Felsenbecken, als kräftiger Bach wieder hervor, der sogleich Räder treibt.

Die corallensührende Masse des Gebildes zeigt oftmals un- deutliche Schichtung, und tritt in groben, plumpen Bänken auf, und gar nicht selten erscheint sie ohne Schichtung in mauersbr- migen Gestalten und mit ausgezeichnete Felsenbildung.

Bohnerze.

An sehr vielen Orten, wo Jura-Schichten entwickelt sind, namentlich in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz, ist, theils auf Portland- theils auf Corallen-Kalk, eine Bohnerz- Bildung abgelagert, deren reiche, gutartige Erze für den Hüttenmann ein Gegenstand von großem Interesse sind.

Das Gebilde besteht aus Lagen von verschiedenartig gefärbtem Sand und Thon, worinn die Erze, Bohnerze von schaliger Zusammensetzung, wasserhaltige Silicate von Eisenoxyd, in Begleitung von Faspis- und Feuerstein-Kugeln vorkommen. An verschiedenen Orten (Weisgau, Hauto-Saône, Franche-Comté) liegen Schichten des Tertiärgebirges darüber, welche sich der Molasse anschließen. Wo diese Bohnerzbildungen von besten Tertiärschichten bedeckt, oder sonst in ihrer Ursprungs-

lichen Lage sind, da steht man einzelne Erzbohnen öfters vest an den Kalkstein angewachsen, und sowohl an der Oberfläche, als im Innern der Jaspisse und Feuersteine, verfiesselte Petrefacten, und auch zerstreut im Erze, Versteinerungen, die mit Eisenmasse erfüllt und durch Brauneisenstein vererzt sind. Sie gehören zu den Geschlechtern *Cidaris*, *Nerinea*, *Terebratula*, *Ammonites* und zu Gattungen, welche dem Jura angehören. Daraus folgt, daß diese Bohnerzbildung kurz nach der Ablagerung der obersten Juraschichten, des Corallen- oder Portland-Kalks, abgesezt worden ist.

4. Oxford-Thon.

Syn. Oxford-clay, Argille de Dives.

Eine thonige oder mergelige Schichtenreihe (bisweilen veste, aber thonige Kalksteinbänke), die unmittelbar unter dem Corallen-Kalk folgt, in den Umgebungen von Oxford sehr stark entwickelt, dort frühzeitig studirt und nach jener Stadt benannt, ist durch ihre Petrefacten scharf als eine besondere Formation bezeichnet. Ueberall liegen darinn *Gryphaea dilatata*, *Ammonites sublaevis*, *A. Lamberti*, *A. hecticus*, *Bolemites gomihastatus*, *Trigonia clavellata*, *Trig. costata*.

Die unteren Lagen sind häufig veste und schließen Kalksteinbänke ein (Kelloway-Rock). Sie sind durch *Terebratula varians* bezeichnet, und umschließen überdieß viele kleine *Ammoniten*, *Ammonites hecticus*, *Amm. Callowiensis*, *Amm. Jason*, *Amm. Castor*, *Amm. Pollux* u. v. a.

In mehreren Gegenden (*Haute-Saône*, *Haute-Marne*, *Doubs*, *Porrentruy*) liegen in der Position des Kelloway-Rock feineoolitische Eiseuerze (*oolites ferrugineus*) welche *Bolemites ferruginosus* einschließen.

5. Hauptrogenstein.

Syn. Groat Oolite.

Unter dem Oxford-Thon liegt in Süd-England, West-Frankreich, in der Schweiz und im Badiſchen Breisgau, eine Reihe von Schichten, die sich durch den hervorragenden oolitischen Gesteins-Charakter auszeichnen. Ungebildete Klein- und fein-

Körnige Kalksteine treten in zusammenhängender Masse, und häufig in einer Mächtigkeit von mehr als 200 Fuß auf. Die Engländer haben diese Schichten in mehrere Abtheilungen gebracht, nach Beschaffenheit des Gesteins und der organischen Reste, die darinn liegen. An vielen Orten sind diese Abtheilungen aber nicht zu unterscheiden; die Kalksteinmasse bildet mitunter ein großes, sehr gleichartiges und innig zusammenhängendes Ganzes, ohne eine bestimmte Gliederung. In vielen Gegenden erscheinen statt der Kalksteine dichte, thonige und sandige, oft eisenhaltige Kalksteine und Sandsteine, und in anderen Gegenden endlich fehlt dieses Juraglied gänzlich.

Die charakteristischen Versteinerungen des Hauptkalksteines sind: *Ostrea acuminata*, *Nucleolites* *Patella*, *Avicula tegulata*, *Ostrea costata*, *Modiola imbricata*, *Astraea*, *Serpula socialis*, *Serp. quadrilatera* und viele Polypen.

Der Kalkstein ist in der Regel von lichter, weißer und gelblicher, seltener von grauer oder blauer Farbe, und in starke Bänke geschichtet. Kalkspath erscheint in Drusen, crystallisirt, und zerstreut in der Masse in Körnern und Adern. Selten liegen Hornsteinknauer, Flußspath und Zinkblende in der Masse.

Die Abtheilungen der Engländer, welche auch in Frankreich und in der Schweiz aufgefunden wurden, sind:

a. **Cornbrash**. (*Calcaire nacré*, Thurmman, *Calcaire de Ranville*, ou *Calcaire à Polypiers de Caen*.) Theils grober, theils feinerdiger Kalkstein, meistens dünn geschichtet, oftmals solitisch und gewöhnlich von heller Farbe, aber außen durch Verwitterung rostgelb. Mitunter voll zerbrochener Muscheln (*Calcaire humachelle*) oder voll Corallen, namentlich aus den Geschlechtern *Terebellaria*, *Spiropora*, *Millepora*, *Carophyllia*. Bey Caen hat man in dieser Lage Reste des *Teleosaurus* und des *Megalosaurus* gefunden. Von Muscheln kommt gewöhnlich *Avicula echinata* vor. Bis 30 Fuß mächtig.

b. **Forest Marble**. (*Calcaire roux sableux du Porrentruy*.) Dünn geschichteter oder schieferiger Kalkstein, oft sandig, oft solitisch; mit zahllosen Muschel- und Polypenfragmenten; von schmutzigen, grauen, braunen, gelben und rothen Farben.

Bisweilen in Muschellagerung mit Sand und Sandstein. Von Muscheln findet man gewöhnlich *Ostrea Marshii*, *Pecten lens*, und Polypen mit *Ceriodora* verwandt, weiter *Galerites depressus* und *Nucleolites scutatus*. Bis 30 Fuß mächtig.

c. Bradford-Thon. Blaue mergelige Thonlagen mit *Ostrea costata*, (England) helle, graue, kalkige Mergel und Kalksteine von mergeliger Beschaffenheit; nach unten zu dichte graue und braune Kalksteine, mit eolischen Eisenerzern, dem Eiseneolit des Oxford-Thons und des Doggers ähnlich. Nebst der angeführten Muschel sind *Modiola bipartita*, *M. pulchra*, *Terebratula varians*, *Belemnites canaliculatus*, *Serpula quadrilata* gewöhnliche Versteinerungen. Bis zu 50 Fuß mächtig.

d. Great Oolite, Hauptrogenstein. Dichter, fester Rogenstein von heller Farbe und deutlicher Schichtung. Nach unten ist das Gestein häufig eisenhaltig, dichter, mit den Rogensteinen fest verwachsen, so daß man diese oftmals überseht, wenn man nicht genau untersucht, oder Stücke vor sich hat, die an ihrer Oberfläche verwittern, und bei denen die Rogensteiner immer hervorstehen, da sie der Witterung weit mehr widerstehen, als die sie bindende, gewöhnlich mergelige Grundmasse. Die charakteristischen Versteinerungen sind: *Ostrea acuminata*, *Nucleolites Patella* und *N. scutatus*, *Avicula tegulata*, *Serpula socialis*, *Nerinea*, *Lima glabra* und *L. tumescens*, *Astroen*. Mehrere 100 Fuß mächtig.

e. Fullers earth, Walferde. Grauer und blauer Thon, ebenso gefärbter, oft auch gelber Mergel, mit einzelnen festeren Kalkbänken. Bis über 100 Fuß mächtig. Versteinerungen: *Ostrea carinata*, *Trigonia costata*, *Lima proboscidea*, *Avicula tegulata*.

Die Abtheilungen c, d, e lassen sich auch in manchen Gegenden in Deutschland unterscheiden, wie z. B. im Breisgauer Jura; c und d, in den Jurabildungen von Hannover, e im Jura der Gegend von Donaueschingen.

Im hohen Grade interessant ist die eigenthümliche Beschaffenheit der unteren Lagen dieser Gruppe in Dorsetshire und

im Brora-Thal in Schottland. An beiden Orten treten die unteren Schichten als eine Kohlenbildung auf.

Au der Küste, von Dorsetshire sieht man von der Gilep-Bay nach Whitby in absteigender Reihe: 1) Corallenkalk und Kalksandstein; 2) Schiefer mit den Petrefacten des Oxfordthons, und darunter den Kalkowayfels mit Sandsteinlagern; 3) Cornbrash; 4) Kalksandstein mit kohligen Theilen; 5) grobkörniger Sandstein mit Petrefacten des Hauptrogensteins; 6) Sandstein und Schiefer mit Pflanzenresten und Kohlen. Die Kohle ist Braunkohle, und tritt bis zu 16 Zoll mächtig auf; für jene Gegend von Bedeutung. Darunter folgen die Schichten des Doggers und Lias.

Eine ähnliche Schichtenfolge zeigt sich im Brora-Thal. Die Kohlen sind aber von besserer Beschaffenheit und ungleich mächtiger, indem sie Flöße bis zu 4 Fuß Mächtigkeit bilden. In einem Zeitraum von 12 Jahren wurden aus einem einzigen Schacht der Brora-Kohlenwerke an 70,000 Tonnen, also jährlich an 120,000 Centner Kohlen zu Tage gefördert. Die Pflanzenreste, welche mit diesen Kohlen vorkommen, gehören zu den Cycadeen, Equiseten und Farn. Nur einige wenige Meermuscheln sind in den kohlenführenden Schichten gefunden worden. Man sieht also hier in den unteren Schichten der jurassischen, meerischen Bildungen, wiederum eine Ablagerung von Gebilden, und aus Materialien zusammengesetzt, welche vom Lande hergeschwemmt worden sind.

6. Dogger.

Syn. Inferior Oolite, Oolite inférieur ou ferrugineux.

Der Hauptrogenstein ruht auf einer, sowohl durch Verhältnisse des Gesteins, als durch Petrefacten ausgezeichneten und scharfbegrenzten Gruppe von Schichten, für welche wir obigen Namen gebrauchen. Sie zerfällt in zwei Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Eisenrogenstein (Inferior Oolite.).

Rauhe und blaulichgraue, gelbe, braune Kalksteine und Mergel, häufig groberdig, sandig. Oefters treten braune und gelbe Sandsteinschichten auf. Dazwischen liegen Kalk- und Mergel-

Banken mit eingestreuten Eisenrothkörnern von der Größe eines Hirsenkornes, und selbst ganze Föbhe von sogenanntem Eisenerz, vollkörnigem Eisenerz, oder wie man es auch heist, von linsenförmig körnigem Thoneisenstein. Darauf wird namentlich zu Wasseralfingen und Aalen Bergbau getrieben, wo diese obere Abtheilung bis zu 3 1/2 Fuß mächtige Eisensföbhe einschließt.

Die Versteinerungen der Kalk- und Mergellagen sind vorzüglich durch große Dimensionen ausgezeichnet, es treten *Lima proboscidea*, *Ostrea Marshii*, *Belemnites gigantous* auf, ferner *Pholadomya Murchisoni*, *Lutraria grogaria*, *Donax Alduini*, *Modiola cuneata*, *Cidarites maximus*, *Trigonia costata*. Im Eisenerz und den Eisenkalken besonders *Pecten personatus*, *P. disciformis*, *Ammonites Murchisoni*, *A. Hervegyi*, *A. Parkinsonii*, *Belemnites Aalensis*, *B. compressus*.

b. Untere Abtheilung. Mergelsandstein (Marly sandstone).

Gelbe, braune und rothe Kalk- und Mergelsandsteine mit Zwischenlagen von sandigem Kalkstein und Mergel. Die wichtigsten Versteinerungen sind: *Pecten personatus*, *Lima proboscidea*, *Ostrea Marshii*.

Diese beiden Abtheilungen erreichen öfters eine Mächtigkeit von reichlich 300 Fuß. Sie schließen außer den angeführten Versteinerungen noch eine Menge anderer ein, worunter besonders die Geschlechter *Ammonites*, *Torobratula* und *Belemnites* in zahlreichen Gattungen auftreten.

7. Lias.

Die Unterlage sämmtlicher Jurabildungen. Durch die dunkeln, mit thierischem Del erfüllten Gesteine, so wie durch eine große Zahl eigenthümlicher Petrefacte ausgezeichnet. Man kann die schichtenreiche Liasbildung in zwei Abtheilungen trennen, wovon eine jede wieder weitere Unterabtheilungen einschließt.

Obere Abtheilung. Lias-Schiefer und Mergel.

a. Obere Belemniten- und Trigonen-Mergel.

Sundst unter dem Dogger liegen dunkelfarbige Mergel mit *Trigonia navis*, und dünner Mergelschiefer mit *Belemnites*

trisulcatus, *B. quadrisulcatus*, *B. breviformis*, *B. compressus*, *B. subclavatus*, *Ammonites radians* und *Ammonites serpentinus*, *Gervillia pernoidea*, *Nucula Hammeri*.

b. Posidonien-Schiefer. Ein dünnschieferiger oftmals papierdünner, mit thierischem Oel erfüllter Mergelschiefer, von dunkelgrauer oder schwarzer Farbe, mit Millionen Posidonien (*Posidonia Bronnii*), sehr vielen Inoceramen (*Inoceramus gryphoides*), *Ammonites limbriatus*, vielen Fisch- und Saurier-Resten, namentlich *Leptolepis Bronnii*, *Tetragonolepis semicinctus* und *Ichthyosaurus*. Diese Schiefer schließen oft Kalk-Sphäroiden und einzelne dünnste Kalkbänke ein.

c. Untere Belemniten-schiefer. Mit außerordentlich vielen Belemniten, worunter *Belemnites paxillosus* vorherrscht, zumal in den oberen, festeren und dickeren Gesteinslagen. Charakteristisch sind ferner: *Terebratula numismalis* und *rimosa*, *Plicatula spinosa*, *Pholadomya ambigua*, *Ammonites serpentinus*, *A. Amaltheus*, *A. Bechii*, *costatus*, *capricornus*, *Gryphaea cymbium*, *Pentacrinites subangularis*, *Briareus*. Auch kommen hier viele Reste von *Ichthyosaurus* und von dem seltsam gestalteten *Plesiosaurus* vor.

Untere Abtheilung. Kalkstein und Sandstein.

d. Gryphiten-Kalk. Dichter, dunkelgefärbter Kalkstein und Kalkschiefer, gewöhnlich thonig und von Thieröl durchdrungen. Umschließt Millionen der *Gryphaea arcuata*, die gewöhnlich der Schichtungsfläche parallel liegen, und ansehnliche Flächen ganz überdecken. Diese Schichten schließen ferner häufig ein: *Spirifer Walcoti*, *Lima gigantea*, *punctata*, *Avicula inaequalis*, *Unio concinna*, *Nautilus aratus*, *Pinna Hartmanni*, und insbesondere Ammoniten, und zwar die ganze Familie der Arieten, in großer Menge versammelt, mitunter einer am anderen, dicht gedrängt, als ein wahres Ammonitenpflaster. *Ammonites Bucklandi* oft groß wie Wagenräder, *A. Conybeari*, *A. Brookii*, *A. rotiformis*, zeichnen diese Schichten aus. In England

hat man darin eine ganze Schicht Excremente (Koprolite) gefunden, welche hauptsächlich von Saurieren herzuführen scheinen.

c. Lias-Sandstein. Gelber und brauner Sandstein mit *Gryphaea arcuata*, *Spirifer Walcoti*, *Lima gigantea*, *Unio concinna*. Wechelt mit Kalkstein- und Mergellagen, zumal nach Oben, in der Nähe des Gryphitenkalks. Er schließt bei Helmstädt baumwürdige Kohlenflöze ein und Thon Eisenstein.

Diese fünf Abtheilungen erreichen zusammen an vielen Stellen eine Mächtigkeit von 500 bis 600 Fuß. Sie kommen aber seltener alle in einer Gegend vollständig ausgebildet vor, und da erreicht dann ein und das andere Glied oftmals eine Mächtigkeit, die der angeführten der ganzen Formation gleichkommt.

Ausnahmsweise liegen in der Liasbildung Gyps Massen und Erze, Blei- und Eisenerze. Wie es scheint, fast nur an Orten, wo unter dem Lias durch Hebungs-Linien ungeschichtete Massen ziehen. Die Belemniten-schichten schließen bei Barjac im Aveyron-Departement baumwürdige Kohlenflöze ein.

Das Bitumen oder Thieröl, wovon die Lias-schichten durchdrungen, und oft so erfüllt sind, daß sie eine Zeit lang brennen, und man Oel aus ihnen durch Destillation gewinnen kann, ist wohl ein Product der Zersetzung der Thierkörper, deren Reste wir in so ungeheurer Menge darin antreffen.

Der Schwefelkies, welcher häufig in Schnüren und Knollen in den Schiefen und Mergeln liegt, und durch welchen viele Petrefacten, namentlich kleine Ammoniten, verkrüppelt sind, kann als Product der Reduction von schwefelsaurem Eisen vermittlest der thierischen Substanzen angesehen werden.

Die Schwefelquellen jedenfalls (Poll, Langenbrücken, Sebastiansweiler, Hedingen, Renndorf, Münden), die aus Lias-schiefen kommen, verdanken ihren Gehalt an Schwefelwasserstoff der reducirenden Eigenschaft, welche die thierischen, im Gestein eingeschlossenen Substanzen, auf schwefelsaure Verbindungen, Bittersalz, Gyps, Glaubersalz ausüben.

Die in Kürze beschriebenen Glieder setzen nun die große Gebirgsbildung zusammen, welche man die jurassische heißt.

In dem langen Gebirgszuge aber, der unter dem Namen Jura aus der Schweiz ohne alle Unterbrechung durch einen großen Theil von Deutschland, bis an die Grenzen von Sachsen (Erburg) fließt, hat man die obersten Glieder, den Hils und den Balth den nirgends aufgefunden. Diese, in Norddeutschland entwickelte, scheinen hier ganz zu fehlen. Auch ist im deutschen Jura der Hauptkalkstein nicht ausgebildet.

Der Lias bildet den schwarzen Fuß des Jura. Seine Schichten, sagt der große geologische Meister Leopold v. Buch *), erscheinen wie ein Teppich unter dem Gebirge, der sich noch weit auf den Seiten verbreitet. Sie setzen flache Hügel zusammen, kleine Vorberge vor dem höheren Wall. Mit dem Beginnen der Doggerschichten erhebt sich das Gebirge, bis es mit dem Auftreten der hellen Kalksteine, und namentlich des Corallenkalks, schnell und meistens steil in großen Felsen aufsteigt, die auffallend durch ihre Weiße hervorleuchten.

Der deutsche Jura hat die Eigenthümlichkeit, sagt Leopold von Buch weiter, daß er ganz schlagend den Irrthum der Geographen erweist, den Wassertheiler zugleich für den höchsten Gebirgsrücken zu halten. Er ist mehrmal in seiner ganzen Breite von Flüssen durchschnitten, welche ihre Quellen weit vom Gebirge entfernt in flachen Hügeln finden. Es ist ein sonderbarer, höchst auffallender Anblick, wenn man sich diesen Durchbrüchen nähert. Der Fluß läuft einer weißen Mauer zu, welche, ohne im Mindesten unterbrochen zu scheinen, sich seinem Fortlaufe entgegensetzt. Erst wenn man die Spalte selbst fast berührt, zertheilen sich die Felsen, und erlauben dem Wasser in solchen Spalten fort, bis zum jenseitigen Abhang zu fließen. (Die Werth bei Rörblingen, die Altmühl bei Pappenheim, die Pegnitz bei Baiereuth.) Ähnliche Spalten mit senkrechten Wänden, flachem Boden, Canälen gleich, und nicht weniger auffallend, durchziehen das Gebirge nach anderen Richtungen, und es wird dadurch vielfältig zerschnitten, erhält Buchten und Einsurthen von der wunderbarsten Form. Dieß ist nach Leopold v. Buch völlig der Bau und die Form eines Corallenriffs. Der

*) Ueber den Jura in Deutschland. Berlin, 1839. 4.

Jura, der zwischen älteren Gebirgen hin, in gewisser Entfernung aus der Dauphiné, bis an den oberen Main zieht, an den Alpen, am Schwarzwalde hin, und dem Böhmerwalde parallellaufend, ist ähnlich dem großen Corallenriff, welches den Continent Neu-Holland in seinem ganzen Erstreckung befreitet. Auch ist ein großer Theil dieses Gebirges in der That aus mannichfaltigen, aneinandergabhängenden Corallenmassen zusammengesetzt, die man auf seinem oberen Fläche kaum irgendwo vermissen wird.

Dem deutschen Jura steht ein französischer gegenüber, von gleicher Ausdehnung und Länge. Er zieht sich von den Ardennen, in der Richtung der Maas, südlich nach der Saône, und hin in die Gegend von Lyon. Bei Besoul verbindet er sich durch einen Arm mit dem schweizerischen Jura. Dadurch wird ein großer Kessel umschlossen, welcher in seinem Inneren die Thäler des Rheins, der Mosel, des Mains und der Saône enthält. Die Nordseite dieses Kessels wird von dem viel älteren Grauwacken- und Schiefergebirge, des Hundsrucks, Taunus und Westerwalsd hienähe völlig umschlossen. Die steilen Abfälle sind gegen das Innere des Kessels gerichtet; die sanften Abfälle gegen das Aeußere. Es treten daher die untersten Schichten, der Elas, nur gegen das Innere des Kessels hervor; gegen Außen bedecken die obersten Schichten den ganzen Abhang. In dem weiten Kessel selbst ist, bis auf einige Ausläufer, nichts davon eingebrungen. Diefes alles deutet an, daß das Juragebirge seine Corallenriff-Gestalt ursprünglich erhalten habe, und nicht der Rest seye, einer Bildung, die einmal auch das Innere des Kessels erfüllt hat.

Die jüngeren Schichten der Kreide erscheinen in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland nur an der äußeren Seite des Jura; sie haben dieses Gebirge von keiner Seite her überstiegen, und daher hat man noch nirgends in dem großen, vom Jura-Wall umschlossenen Kessel von Inner-Deutschland, in Schwaben, Franken, Hessen, etwas gefunden, was der Kreidebildung entspricht.

Die drei unmittelbar zusammenhängenden Theile, des Jura, der schweizerische, schwäbische und fränkische, unterscheiden sich auffallend durch äußere Gestalt, und auch durch die Zusammensetzung.

Im schweizerischen Jura liegen lange Bergketten von ziemlich gleicher Höhe mehrfach hinter einander als Parallellketten, und zwischen diesen hin, laufen die Thäler mit schwacher Neigung, als ausgezeichnete Längenthäler (Combos). Kurze Thäler, die quer das Gebirge durchschneiden, oft eng und felsigt, ausgezeichnete Querthäler (Clusos), verbinden die den Bergketten parallellaufenden Thäler mit einander, und drängen häufig bis zu den ältesten Schichten hinaus. Die einzelnen Berge erheben sich schief, wellartig, oder bilden scharfe Grate, zu welchen die Schichten nicht selten mit 30 — 40 Grad ansteigen. Corallen-Kalk und Haupttrögstein treten vorherrschend in auffallenden Felsen auf, mit der verschiedenartigsten Schichtenstellung, gekrümmt und gewölbt, und mit beträchtlichen Felsabstürzen, Fluren; daher die vielen mit diesem Worte endigenden Berg-Namen.

Die Schichten liegen hier niemals horizontal über einander, und deshalb ist auch nicht das Oberste unbedingt das Neueste, das Jüngste derselben; denn gar oft liegen bei der Aufrichtung und gewaltigen Zerrüttung, welche dieser Jura erlitten hat, ältere Schichten höher, als die jüngeren, und trifft man jene auf der Spitze der Berge an, während man diese am Fuße findet. S. Fig. 19. Dersel Schichtenstellungen können nur bei starken Verschiebungen und Rutschungen (saillons) der Massen, in Folge, heftig wirkender Stöße und Erhebungen (soulèvements) hervorgerufen worden seyn.

Diese gewaltigen Zerrüttungen und Zerreißungen des schweizerischen Jura, wobei sogar tief unter demselben liegende Schichten herabgehoben worden sind, s. Fig. 20, zeigen sich vornehmlich auf der den Alpen zugekehrten Seite und in der Nähe derselben; sie verlieren sich, einerseits gegen Besançon hin, und anderseits in der Annäherung gegen den Schwarzwald. Wir können den Grund daher nur in der Hebung der Alpen finden, die lange nach der Bildung des Jura und des Tertiärgebirges stattfand. Da nun die Alpen in zwei Richtungen erhoben wurden, die westlichen Alpen von N.N.W. nach S.S.O., die östlichen Alpen von W.N.W. nach gegen O.S.O., so müssen sich im schweizerischen Jura diese Erhebungsrichtungen

durchkreuzt, und so dabei die außerordentlichsten Störungen dieses Juratheils bewirkt haben.

Der schwäbische Jura erhebt sich diesseits des Rheins, zwar noch in seiner Zertheilung in Paralleletten, aber die Schichten liegen regelmäßig über einander. Jenseits der Donau hört diese Zertheilung auf. Das Gebirge erscheint als ein hoher, breiter Wall oder Damm; seine obere Fläche als ein breites, wenig zerschnittenes Plateau. Enge Thäler, die mitunter tief in die Masse des Gebirges eindringen, ziehen quer heraus gegen die beiderseitigen Abfälle. In geringer Entwicklung tritt im Thal von Blaubeuren Dolomit auf. Die Kogelsteine sind verschwunden.

Der fränkische Jura ist durch das mächtige Auftreten des Dolomits ausgezeichnet, und erscheint dadurch in veränderter Gestalt. Auf der Höhe des Gebirges und ziemlich in seiner Mitte; steigen Dolomittfelsen auf, in den wunderbarsten Formen. Alles ist schroff, zerspalten; man glaubt Ruinen alter Burgen, Thürme, freistehende Mauern, Obeliske zu sehen. Ein großer Theil solcher Felsen, selbst der kleineren, ist der Steilheit wegen unzugänglich. In diesen Dolomitmassen liegen die berühmten Knochenhöhlen des Wiesent-Thales.

Man erkennt in diesem Dolomit Reste der *Terebratula lacunosa* und des *Apiocrinites mospilliformis*, welche im schwäbischen Jura vorzüglich in denjenigen Schichten liegen, welche auf die corallenreichen folgen. Es erscheinen die Dolomite gerade da, wo das Gebirge seine bisherige Richtung verändert, und von nun an die des naheliegenden Böhmerwaldgebirges verfolgt. Die ruhige, ungestörte Schichtenlage hört bei dieser Wendung auf. Manchartig aufgerichtet, zeigen die unteren Schichten im Wiesent- und Pegnitz-Thal deutlich an, welche heftige Einwirkungen sie erlitten haben, und dabei drängt sich uns der Gedanke auf, daß dieß alles, Dolomit- und Schichtenstörungen, im Zusammenhange stehe, mit der Erhebung des Böhmerwaldes, und daß die Dolomite umgewandelte Kalksteine seyen.

Die allgemeinen, wie die besonderen Verhältnisse des Jura; hat Leopold v. Buch in seiner Schrift über den deutschen Jura, mit gewohnter Meisterschaft in großen Zügen geschildert.

Wir haben einen Auszug davon mitgetheilt, überzeugt, daß wir dadurch am besten im Stande seyn werden, zu zeigen, welche hohe geologische Wichtigkeit das Jura-Gebirge hat.

Die Art seiner Verbreitung gewährt noch ein besonderes Interesse. Die jurassischen Bildungen, welche noch in der Bese-gegend, um Krafau und nördlich bis Katsch, bei Popkani in Eurland und in Schonen vorkommen, gehen nicht über die Breite von Petersburg hinaus. Nirgends hat man sie nördlich über dem 60. Breitengrad aufgefunden. Sie fehlen in ganz Sibirien, Nordamerika, Scandinavien, und sind auch noch nirgends mit Bestimmtheit in Central- und Südamerika nachgewiesen worden. Dagegen hat man sie im Norden von Africa und in Sierra Leona, so wie im Inneren von Asien gefunden.

In den Alpen sind die jurassischen Bildungen sehr mächtig entwickelt. Sie zeigen hier aber mancherlei Verschiedenheiten des Gesteins, wenige Petrefacten und meistens unvollständige, schlecht erhaltene. Es ist daher immer eine schwierige Aufgabe, sie dort in allen Gliedern nachzuweisen. Den Lias kennt man in den westlichen und südlichen Alpen. Es liegt darinn die Salzlagers-tätte zu Ber. Bey Petit Cours in der Tarentaise hat Elie de Beaumont Farn darinn gefunden (*Neuropteris alpina*), welche mit denen des Steinkohlengebirges übereinstimmen. Er ist ferner im ganzen Zuge der Cottischen- und der See-Alpen entwickelt. Die darüber liegenden, dem mittleren Jura angehörigen Doggerschichten, sind am Glärnisch entwickelt. Die jüngeren jurassischen Schichten ziehen sich einerseits, auf der Südseite der Alpen, von Lago maggiore an, durch das italienische Tyrol, und die karnischen Alpen ostwärts fort, bis zur Drauz; auf der Südseite der Alpen setzen sie die inneren hohen Kalk-Reiten des Berner-Landes zusammen, treten mächtig in Tyrol und Salzburg auf, schließen die Steinsalzlagerstätten zu Hallein, Berchtesgaden, Ischel ein, und ziehen fort bis an die Donau. Jenseits derselben treten sie weiter östlich in Ungarn am Bakony-Wald auf, und an der Tatra.

Triasgebirge.

Unter dem Lias beginnt eine Reihe von Bildungen, in welchen viele organische Reste eingeschlossen sind, die von all dem abweichen, was die jurassischen Schichten enthalten. Die reichen Geschlechter *Ammonites* und *Belemnites* fehlen; *Terebratula* tritt nur in wenigen Gattungen auf. Die Farn, im Juragebirge sehr häufig, treten hier sehr zurück, dagegen finden sich häufig *Equiseten*, *Coniferen* und *Eycadeen*. Von den Muscheln sind die Geschlechter *Avicula*, *Trigonia*, *Lima*, *Pecten*, *Lingula* charakteristisch. Von den, früheren Formationen so häufigen, *Trinoiden* erscheint hier einzig das Geschlecht *Encrinurus*, und dieses nur in einer einzigen Gattung, *Encrinurus liliiformis*. Reptilien treten dagegen zahlreich und in sonderbaren Gestalten auf. Neben einigen bekannten Geschlechtern, erscheinen solche, welche diesen Gebirgsbildungen ganz eigenthümlich sind, wie *Phytosaurus*, wahrscheinlich ein Pflanzenfresser und Landbewohner, *Nothosaurus*, mit sehr verlängerten, vorderen Extremitäten, die in eine spitze Flosse auslaufen, ein Mittelglied zwischen *Crocodylus* und *Saurus*, *Dracops*, *Conchiosaurus* u. m. a.

Die Gesteine sind vorherrschend thonig und sandig, die Kalkmassen spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Mächtig entwickelt treten die Sandsteine auf, mit vorwaltender rother Färbung.

Gegenüber der jurassischen Formationenreihe, hat man diesen Theil des Fichtengebirges, dessen Glieder vorzugsweise in Thüringen entwickelt, und daselbst frühzeitig der Gegenwart eifriger geognostischer Untersuchungen gewesen sind, zur thüringischen Formationenreihe gezählt.

Diese große Reihe theilte man früher in zwei Abtheilungen, wovon die obere das Trias-Gebirge, die untere das Kupferschiefer-Gebirge umfaßt, welches sich dem tiefer liegenden Uebergangs-Gebirge anschließt.

Gruppen der Trias.

Die Trias zerfällt in vier Hauptgruppen. Diese sind von oben nach unten: 1) Keuper, 2) Lösskohle, 3) Muschelkalk, 4) Bunter Sandstein.

1. Keuper.

a. Bunte Mergel mit Sandstein. Unter dem Löss-Gebilde folgt zunächst eine buntfarbige Mergelbildung, welche den in Franken dafür gebrauchten Provinzialnamen trägt. Sie besteht aus einem Thonmergel von grauen, gelben, grünen, braunen und rothen Färbungen, die vielfach mit einander wechseln. Die rothe Farbe ist indeß immer die herrschende und hervorstechende. Bey einem konstanten Kalkgehalte besitzen die Mergel immer auch einen Gehalt an kohlensaurer Bittererde. Sie sind dünn geschichtet, nehmen häufig Sand auf, und gehen in einen feinsörnigen Sandstein über, welcher in großen Massen auftritt, unreine, bunte, aber immer schwache Färbungen, und häufig eine gelblichweiße oder gelblichgraue Farbe hat. Er schließt oftmals wohl erhaltene Abdrücke von Pflanzen ein, *Equisetum aronaceum*, *Calamites arenaceus*, *Filicites lanceolata* und *Stuttgartiensis*, *Pterophyllum Jaegeri*, und hat wegen der vielen Nester schiffartiger Pflanzen auch den Namen Schiffsandstein erhalten. Er liefert vortreffliche Bausteine. Man sehe nur das Schloß auf dem Rosenstein bei Stuttgart, das Landhaus bei Weil, den Tempel auf dem rothen Berg! Nicht uninteressant ist es auch, daß dieser Sandstein an vielen Orten goldhaltig befunden worden ist.

Nach oben wird er schieferig; er geht in Mergel über, der Sandsteinblöcke mit Nesten von *Equisetum aronaceum* umschließt. Ueber diesem Mergel liegt öfters ein dünn geschichteter, quarziger Sandstein, in Wechsel mit bunten, dolomitischen Mergeln, welcher bei Stuttgart und Tübingen auf den Schichtungsflächen die crySTALLÄHNLICHEN Erhabenheiten zeigt, um deren willen man ihm den unpassenden Namen crySTALLISIRTER Sandstein gegeben hat.

Ueber ihm kommen wieder Mergelschichten, und dann tritt ein plump geschichteter, grobkörniger, oft breccienartiger,

und mitunter der Nagelschale *Ähnlicher Sandstein*, von vorherrschend gelblichweißer Farbe auf, welcher Feldspathkörner, weißen kaolinartigen Thon, und in seiner breccienartigen Abänderung, auch Stücke von Kalkstein, Jaspis, Hornstein, Schwerspath, Edlestin umschließt. Er ist mitunter locker, so daß er sich zerreiben läßt. An einigen Orten hat man Reptilienreste und den *Calamites aronaceus* darinn gefunden.

Dieser obere, grobkörnige Keupersandstein fährt öfters Nester von Kohlen. Er ist der eigentliche Sitz der Keuperkohle, die sich in dieser Lage bey Löwenstein, Spiegelberg, Gaildorf, Tübingen u.s.w. findet. Häufig ist sie so stark mit Schwefelkies imprägniert, daß sie nur auf Bitriol benutzt werden kann. Das nur nesterweise Vorkommen der beynahe immer kieshaltigen, und oft auch von Bleiglanz begleiteten Kohle, welche die Beschaffenheit der Pechkohle hat, ist nicht geeignet, Nachforschungen nach derselben anzuregen.

v. Alverti hat unsern Tübingen in Württemberg über dem feinkörnigen Schilfsandstein eine Schicht von Kalksandstein gefunden, welche ganz erfüllt ist von Knochenresten und Schuppen von Schildkröten, viele große Zähne einer Art Süßwasser-Schildkröte (*Trionyx*) enthält, ferner Zähne der Fischgeschlechter *Psammodus* und *Hyodus*, die flache, stumpfe Zähne haben, deren Wurzeln nicht in Zahnhöhlen stecken, sondern nur durch Bänder mit dem knorpeligen Kiefer verbunden sind; Schuppen von *Gyrolepis*, einem Fisch, der zu den Eelschuppen gehört, und von Schalthieren die *Mya mactroides*, *Modiola minuta* und *Avicula socialis*.

Höchst merkwürdig sind die zu Heßberg bey Hildburghausen in einem zum Keuper gehörigen Sandstein gefundenen Fußspuren von Säugethieren. S, Fig. 21.

b. Bunte Mergel mit Gyps. Bunte Mergel in beträchtlicher Entwicklung, und von der Beschaffenheit der oberen, folgen abermals auf die beschriebene obere Schichtenreihe. Darinn liegt Gyps in Mandeln, Knollen, Nestern, in großen Eiböden eingelagert. Bisweilen ist der Gyps geschichtet, und oftmals durch Mergel in Bänke abgesondert; gewöhnlich aber kommt er in stockförmigen Massen und ziemlich in der Mitte der

Bildung vor. In der Nähe des Gypses und um denselben, sind die Schichten häufig gewunden, nicht mehr parallel, und es hört oft alle Schichtung auf. Der Gyps ist feinkörnig oder dicht, führt Schnüre von Faser gypsum, ist gar oft thonig und roth oder grau gefärbt; seltener reiner, weißer Alabaster.

Den Mergel, wie den Gyps durchziehen in der Regel dolomitische Gesteine von grauer Farbe, und nur durch Härte und Schwere von dichtem Kalkstein zu unterscheiden, in Knollen und Platten. Sie sind zuweilen sehr sandig, von Gyps durchdrungen, mit Kupferlasur und Kupfergrün überzogen, oder bleiglanzfährend, und enthalten Reste von *Mya* und *Trigonia*.

Unter dem Mergel und Gyps tritt sehr regelmäßig eine Dolomitbildung auf, welche bey ihrer starken Entwicklung sogleich ins Auge fällt, und daher sehr gut zur Orientierung als geognostischer Horizont dient. Das Gestein ist von schmutzigrangelber, ockergelber oder rauchgrauer Farbe, mehr oder weniger porös, schließt in den Poren Crystalle von Kalk- und Braunsparth ein, und in seiner Masse nicht selten Stücke von Hornstein und Körner von Schwefelkies. Es erreicht eine mittlere Mächtigkeit von 30—40 Fuß, und ist in plumpe, durch verticale Spalten mehrfältig zertheilte Blöcke abgesondert. Seine oberen Schichten sind mitunter voll *Trigonia* (*Trigonia vulgaris*, *curvirostris*, *laevigata*, *Goldfussii*), und enthalten überdies *Trochus Albertinus*, *Rostellaria scalata*, *Butcinum turbidulum*, *Natica pulla*, *Avicula socialis* in schönen großen Exemplaren, *Pecten levigatus*, *Lingula tenuissima*, und Reste von *Sauriern*. In der Nähe des Gypses, wo der Dolomit von Gypsmassen durchdrungen ist, führt er gewöhnlich dieselben Petrefacten, und auch Zähne von *Placodus*, *Psammodus* und *Hybodus*.

Eng verbunden mit dieser Dolomitlage, und unmittelbar zwischen ihr und dem Gypse, hat man an einigen Orten (v. Alberti bei Rottenmünster und bey Gilsdorf) Schichten von Mergel gefunden, die stellenweise so ganz erfüllt von Fisch- und Reptilienresten sind, daß sie eine wahre Drecche darstellen. In diesem Mergel finden sich Zähne von *Acrodus*, *Hybodus*, *Psammodus*, Schuppen von *Gyrolopis* und *Euproliten*,

alles bunt durcheinander, und damit kommen von Schalthieren vor: *Lima lineata* und *striata*, *Avicula socialis*, *Mya musculoides*, und die oben genannten *Trigonia*. Diese merkwürdige Reptilienbreccie ist im Durchschnitt 6 Fuß mächtig.

An vielen Orten erreichen die unter a und b aufgeführten Schichten eine Mächtigkeit von 400 Fuß.

2. Bettenkohle.

Auf die gypsführenden Mergel folgt eine Reihe von Schichten, die aus Kalkstein, Dolomiten, Gyps, Sandstein, Mergelschiefern, unreiner, thoniger Kohle (Bettenkohle) und Schieferthon besteht. Die Gesteine haben sämmtlich unreine, graue und gelbe Färbungen, und unterscheiden sich dadurch auf den ersten Anblick von den höheren, vorherrschend roth gefärbten, Schichten. Diese Gruppe ist durch *Posidonia minuta*, *Equisetum arenaceum* und *Taeniopteris vittata* charakterisirt, und durch ein eigenthümliches Kohlengebilde. Es liegt eine eigenthümliche Flora in diesen Schichten, durch welche sie als ein Sumpfgebilde bezeichnet werden.

Auf die Dolomitbildung der vorhergehenden Gruppe folgen gewöhnlich schieferige *Kalkmergel*, bisweilen Kester und Schnüre von Gyps einschließend. Diese Mergelschiefer werden öfters sandig und verlaufen in Sandsteinschiefer, oder gehen in ein dolomitisches Gestein über. Es liegen öfters Reste von *Equisetum arenaceum*, *Taeniopteris vittata* und *Pterophyllum longifolium* darin, nebst der *Posidonia minuta* und *Lingula tenuissima*. Bisweilen treten Kalksteinschichten von rauchgrauer Farbe auf, welche von Kalk- und Braunspath-Schnüren, mitunter auch von Blei in durchzogen sind, und die oben angeführten Petrefactengeschlechter *Mya*, *Trigonia* und *Avicula* in den bezeichneten Gattungen einschließen.

Etwas tiefer folgt eine graue Sandsteinbildung mit einer außerordentlichen Menge Pflanzenresten, die sehr wohl erhalten, und oft nur in braunen oder schwarzen Abdrücken vorhanden sind. Der gewöhnlich schmutzig-gelblichgrau gefärbte Sandstein, hat ein thoniges Bindemittel, ist feinkörnig und voll weißer Stümmel.

Blättchen. Er ist deutlich geschichtet in Bänke von mittlerer Mächtigkeit, und schließt gewöhnlich millionenweise *Calamites arenaceus* ein, überdies *Equisetum Meriani*, *Equisetum arenaceum*, *Taeniopteris vittata*, *Clathropteris meniscoides*, *Pterophyllum* und *Pecopteris Meriani*, Zähne und Knochen von Fischen und einer Schildkröte, welche mit *Trionix* Aehnlichkeit hat.

Unter diesem Sandstein, der häufig 16—40 Fuß mächtig ist, und ziemlich gute Haussteine liefert, liegt die Lettenkohle, in Begleitung von schieferigem Thon, Mergel und Maunschiefer. Sie ist eine unreine, thontige Kohle, die sich an der Luft aufblättert, und nach und nach in scheibenförmige Stücke zertheilt. Die Flöße sind schwach, oft auch sehr kieselig, und können daher nicht wohl anders als zur Vitriolbereitung benutzt werden. Bisweilen liegen einige schmale Flöße, durch Sandsteinschichten getrennt, übereinander. Als Dach ist öfters ein kieshaltiger Kalk, oder ein Schieferthon mit Pflanzenabdrücken vorhanden. In der blättrigen Kohle selbst liegen bisweilen Abdrücke von *Equisetum arenaceum*.

Unter der Lettenkohle liegen Thonmassen von aschgrauer oder schwärzlichgrauer Farbe mit vielen Pflanzenabdrücken. Der Thon ist oft schieferig-sandig, geht in Sandsteinschiefer, und in wirklichen Sandstein über. In diesen Schichten sind bei Gaisdorf die Reste des *Mastodonsaurus Jaegeri*, die *Posidonia minuta*, *Hybodus sublaevis* und *Gyrolepis tenuistriatus* aber im Printhal bey Rottweil gefunden worden.

Diese Gruppe zeigt eine sehr verschiedene Mächtigkeit von 20—100 Fuß.

In Botharingen liegt zu Bie unter dem Lettenkohlen-Sandstein eine Steinsalzbildung, die aus Thon, Mergel, Anhydrit und Steinsalz besteht. Diese hier sehr mächtig (die eigentliche Gyps- und Steinsalzmasse nahe zu 160 Fuß mächtig) entwickelte Salzformation ist in Deutschland nur angedeutet zu Murrhardt, im Bohrloch bei Mühlhausen, auch wurde sie zu Stotternheim bei Weimar beobachtet. In ihr befinden sich aber die reichen Salzquellen von Salz der Felden, Salzdetfurth, Heyerssen, Salzbadlan, Schöningen und Jallushall. Die Salinen Dionze, Lons le

Saunier u. a. ziehen ihr Salz aus der Lettenkohlengruppe; und wahrscheinlich werden viele englische Salinen ihr Salz aus dieser Gruppe ziehen. Dem zufolge ist die Lettenkohlengruppe durch Salzreichtum ausgezeichnet.

Gyps kommt in derselben an mehreren Orten in stärkeren Massen vor, und auffallend ist es dabey, daß dann auch wieder rothgefärbte Mergel auftreten.

2. Muschelkalk.

Eine mächtige Kalksteinbildung, in Deutschland und Frankreich vorzüglich entwickelt, liegt unmittelbar unter der Gruppe der Lettenkohle. Die mittleren und unteren Kalksteinbänke sind öfters so voll Schalthier-Versteinerungen, daß man der Gruppe obigen Namen glaubte geben zu müssen. Als charakteristische Versteinerungen treten auf: *Ceratites nodosus*, *Avicula socialis*, *Nautilus bidorsatus*, *Trigonia pes anseris*, *Mytilus eduliformis*, *Plagiostoma striatum* und *lineatum*, *Pecten laevigatus*, *Lingula tenuissima* und *Encrinurus liliiformis*; am allerhäufigsten aber, und als vorzügliche Leitmuschel, erscheint *Terebratula vulgaris*.

Die Muschelkalk-Gruppe theilt sich ganz natürlich in drey Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Kalkstein von Friedrichshall. Oberer rauchgrauer Kalkstein. Die Kalksteinlagen, welche die Lettenkohle unterteufen, bestehen aus einem dichten Kalkstein, der in Süd-Deutschland eine vorherrschende rauchgraue, auch asch- und schwärzlich-graue Farbe hat, dünn und sehr regelmäßig geschichtet ist. Nördlicher erscheint die Farbe lichter, so in Thüringen, zu Rüdersdorf bey Berlin und in Oberschlesien und Südpolen ist die Farbe gewöhnlich so hell, wie die der oberen jurassischen Kalle. Die Schichten messen selten über 1 Fuß. Der Bruch des Gesteins ist flachmuschelig, und geht ins Splitttrige über. Zwischen den Schichten liegen immer heller gefärbte Thonlagen. Parallelismus der Schichten und große Einformigkeit der Lagerung zeichnen diesen Kalkstein aus, den man so häufig in einer beinahe ganz horizontalen Lage

steht, daß ihn französische Geognosten auch *Calcaire horizontal* genannt haben.

Die obersten Schichten dieser Abtheilung sind oftmals in einer Mächtigkeit von 60 bis zu einigen hundert Fuß so petrefactenarm, daß man stundenweit in Thälern, die in dieselben eingeschnitten sind, wandern kann, ohne, selbst an ganz entblößten Stellen, auch nur ein einziges Petrefact zu finden. Immer sparsam liegen darinn *Avicula socialis*, *Trigonia vulgaris*, *Plagiostoma striatum*, *Terobratula vulgaris* und Glieder vom *Ellien-Eucrinit*.

Zuweilen sind diese Schichten von wahren Dolomiten überlagert, welche dieselben von der Lettenkohle scheiden, oder von porphyren, öfters etwas mergeligen dolomitischen Gesteinen. In diesen vorherrschend gelben Dolomiten kommen zerstreut Petrefacten vor, von welchen diejenigen der Schalthiere Steinerner sind, da fast jede Spur der Schalen verschwunden ist. Man findet Fischzähne und Schuppen, Stacheln von *Cidarites grandaeus*, *Trigonien*, *Terobratula vulgaris*, *Buccinum turbidum*, *Trochus Albertinus* u. e. a. Diese Dolomite sind dick geschichtet, oft massig, werden bey Rottweil Malzkleine genannt, auch, wenn sie prismatisch zerspalten sind, Ragelfelsen. Sie erreichen eine Mächtigkeit bis zu 110 Fuß.

Unter den dünngeschichteten, petrefactenarmen, grauen Kalksteinschichten liegt ein dünngeschichteter, wenige Fuß mächtiger, dunkelgrauer Kalkstein, welcher ganz voll *Pecten discites* oder *Plagiostoma striatum* ist, in Begleitung von Mäulern und *Eucriniten-Gliedern*.

Darunter folgt ein vollthierischer Kalkstein von lichter, graulichgelber Farbe mit *Mactra trigona*, *Venus nuda* und *Trigonien*, immer nur einige Fuß mächtig, und hierauf ein von *Eucriniten-Gliedern* ganz erfüllter Kalkstein von bräunlichgelber Farbe, der dick geschichtet und 7 bis 8 Fuß mächtig ist.

Auf diese Schichten folgt eine bis 20 Fuß starke Lage von grauem, dünngeschichtetem Kalkstein, in welchem keine Schalthier- und *Eucriniten-Reste* liegen, dagegen aber versteinerte Krebse:

Der *Pomphix (Palaeurus) Sueurii* ist in dieser Kalklage eingeschlossen, und findet sich am häufigsten in den Steinbrüchen zu Wapbach bey Bittlingen und zu Bruchsal in Baden. Das schönste Exemplar, 5 Zoll lang, wurde zu Kaiserzeit bey Basel gefunden, und liegt in der Straßburger Sammlung. Weitere Fundorte dieses schönen Krebses sind: Rottweil, Sulz, Hiesfeld, Jantfeld am Neckar. Es ist auffallend, daß in den die Krebsreste einschließenden Schichten auch nicht eine Spur von Eocriniten vorkommt, die sonst so häufig sind, und gleich darüber wieder erscheinen.

Auch unter diesem Kalklager treten abermals encrinitenreiche Schichten auf, welche man allenthalben als die unterste Lage des Kalksteins von Friedrichshall antrifft. In den Thonlagen zwischen den Kalkschichten findet man bisweilen schöne Kronen des *Eocrinites liliiiformis*, mit aufstehenden Stielen. Die Kalkmasse erscheint nicht selten durch die unzähligen Encriniten-Glieder, deren Masse Kalkspath ist, spärlich. Man hat diese encrinitenreiche Lage auch Trochiten- und Encrinitenkalk genannt.

In den dichten Kalksteinen dieser oberen Abtheilung finden sich öfters kieselige Schichten, und mitunter so stark von Kieselmasse imprägnierte, daß sie am Stahl Feuer geben. Dann liegen auch Knollen von Chalcodon, Feuerstein oder Hornstein darinn.

Die unteren Schichten enthalten, außer den bereits angeführten Petrefacten, noch viele andere, namentlich Reptilienreste (*Nothosaurus*, *Dracosaurus*), Fischreste, aus den Geschlechtern *Placodus*, *Gyrolopis*, *Psammodus*, *Acrodus*, *Hybodus*; von sepienartigen Thieren *Rhyncholithus hirundo*), sogenannte Sepienschnäbel; und viele Schalthiere, insbesondere Muscheln (*Ostrea Albertii*, *spondiloides*, *compta*, *complicata* u. d. a.), *Rostellaria scalata*, *Cerastites nodosus*, *Nautilus bidorsatus* u. s. w. Sie besitzen öfters die sonderbaren, stängelförmigen Absonderungen (*Styolithen*).

In technischer Beziehung zeichnet sich die obere Abtheilung vorzüglich durch beträchtliche Erzbildungen aus. In ihr liegen die Blei-, Galmei- und Eisenstein-Lagerstätten

in Obarschlesien und Sächsen, die Eisensteinbildung bey Wiesloch, unfern Heidelberg, die kleinen Eisenspathgänge am Braunsberge und Liegenberge in Westphalen u. s. a.

Die Quellwasser, welche daraus zu Tage kommen, sind vermöge ihres großen Kalkgehaltes, wie diejenigen aller Kalkbildungen, häufig incrustierend. An mehreren Orten treten Sauerlinge daraus hervor, wie zu Imnau, Niederruan, Garmstadt.

Zuweilen liegen Höhlen in dieser Abtheilung. Die Erdmannshöhle bey Hasel im südlichen Schwarzwald ist eine der ausgezeichnetsten, die man in dieser Bildung antrifft; sie ist durch Einsturz entstanden.

b. Mittlere Abtheilung. Salzführende Schichtenreihe oder Anhydritreihe.

Anhydrit, Thon, Gyps, Steinsalz, Kalkstein, Stinkstein, dolomitische Mergel sind die wesentlichen Glieder dieser Abtheilung, in welcher sich nicht eine Spur von Versteinerungen zeigt.

Auf den Guriniten-Kalk der vorhergehenden Abtheilung folgen dolomitische Mergel von vorherrschend gelber Farbe und erdigem oder körnigem Bruch, meistens porös und mit kleinen Drüsen von Quarz, Kalkspath und Braunspath. Hierauf kommen Schichten von grauem, dichtem Kalkstein, dem der vorhergehenden Abtheilung ähnlich, im Wechsel mit dunkelfarbigem Mergel. Mit Zunahme des Bitumengehaltes gehen Kalk und Mergel in Gesteine über, welche beim Zerreiben einen widrigen Geruch von sich geben, und deswegen Stinkstein und Stinkmergel genannt werden.

Die Dolomite, Mergel, Kalksteine, Stinksteine kommen in mannfachem Wechsel mit einander vor, sind zuweilen sehr kiefig, und führen sodann Nester und Knollen von Hornstein, der bisweilen in Chalcedon übergeht.

Im Wechsel mit diesen Gesteinen kommt, meistens ziemlich in der Mitte der Abtheilung, Anhydrit als vorherrschende Masse vor, begleitet von Gyps und Thon. Der Anhydrit ist dicht oder körnig, gewöhnlich grau, durch Bitumen öfters auch

schwarz gefärbt, selten weiß oder blan. Er ist häufig salzig oder von Salztrümmern durchzogen, und immer von dunkelgrünem Thon begleitet, der bald mehr, bald weniger salzig ist, daher auch Salzthon, Hallerde heißt, und mit Vortheil als Düngmittel verwendet wird.

Der Gyps ist immer untergeordnet, dicht, meist thonig. Fasergyps und späthiger Gyps durchsetzen sowohl den Thongyps als den Anhydrit und den Salzthon.

Das Steinsalz bildet, in verschiedenen Graden der Reinheit, Stöcke im unteren Theil dieser Abtheilung, ist von Anhydrit- und Salzthonlagen durchzogen, oder bildet Schnüre, Nester in diesem. Es erreicht in einzelnen Stöcken eine Mächtigkeit bis zu 170 Fuß. Im Anhydrit und Gyps kommt bisweilen Glaubersalz, Bittersalz, Schwefel, Schwefelkies vor.

Unter dem Steinsalz folgen wieder Lagen von Thon und Anhydrit, welche diese Abtheilung vom unterliegenden Kalkgebilde trennen.

Die Stärke der einzelnen Glieder ist außerordentlich verschieden, und bald herrscht Anhydrit, bald Thon, bald Steinsalz vor, oder wird eines vom anderen verdrängt. Bey dieser großen Unordnung in den Schichtungsverhältnissen der Abtheilung, die keinerley Regel in Folge oder Lage der Glieder wahrnehmen läßt, zeigt sich immer auch die Mächtigkeit sehr verschieden. Sie steigt von einigen Fuß bis auf 300 und 400 Fuß.

Aus dieser Muschelkalk-Abtheilung ziehen die Salinen am oberen und unteren Neckar ihr Salz, die zusammen immerhin gegen eine Million Centner Salz erzeugen; aus derselben schöpfen die Salinen zu Buxfleben und Stotternheim bey Gotha ihr Salz, und entspringen die Salzquellen von Halle, Schönebeck, Sulze, deren Production zusammen genommen, nicht wohl geringer als diejenigen der Neckarsalinen angeschlagen werden kann, so daß dem Muschelkalk in Deutschland alljährlich gegen 2 Millionen Centner Salz entnommen werden. Es wird in der Regel als Soole heraufgeführt vermittelst Bohrlöcher, welche in das Steinsalz niedergetrieben worden sind, und durch welche hinab die Wasser bringen, welche das Salz auflösen. Nur ausnahmsweise werden Schächte bis auf das Steinsalz abgeteuft, und dieses vermittelst der Sprengarbeit gewonnen.

Das Salzgebirge wird durch unterirdische Wasser an manchen Stellen ausgewaschen, da es sehr auflöslich ist; dadurch entstehen Ausweitungen unter dem dünngeschichteten grauen Kalkstein, welche Einbrüche zur Folge haben, die öfters bis an die Oberfläche reichen, und als Erdfälle erscheinen. Zweifelsohne sind auf diese Weise manche Höhlen in der oberen Abtheilung entstanden.

c. Untere Abtheilung. Wellenkalk.

Das salzführende Gebirge ruht auf einer Reihe von Kalk- und Mergelschichten, die denen der oberen Abtheilung ähnlich, aber dadurch sehr ausgezeichnet sind, daß sie eine sehr dünne Schichtung und durchaus wellenförmige Biegung haben. Man glaubt überall den Wellenschlag einer bewegten Flüssigkeit zu sehen. Die Schichtung geht bis in das Schieferige, und nur selten, und immer nur einzeln, im Mergel liegend, sieht man fußstarke Kalksteinbänke. Der graue Mergel wechselt häufig mit den Kalkschichten, und herrscht bisweilen vor. Es liegen öfters kleine Kalksteinplatten darinn, wodurch ihre Schieferung ebenfalls wellenförmig wird. Nur selten ist sie parallel, und dann erscheint der Mergel bisweilen in eben so papierdünnen Blättchen, wie der Posidonienschiefer des Bas. Die Oberfläche des schieferigen Kalkes ist immer uneben, höckerig, wulstig. Mitunter liegen dolomitische Schichten dazwischen.

Dieser Character des Wellenkalks ist nicht constant. In einzelnen Gegenden treten statt der Kalksteine Dolomite auf, und statt der gewöhnlichen Mergel dolomitische Mergel, welche nach unten zu gewöhnlich sandig, glimmerführend und mergeligen Sandsteinschiefern ähnlich sind. Nach oben treten graue Thonlagen auf.

Weichere dolomitische Mergel wechseln gewöhnlich mit Bänken von festem Dolomit, mit schieferigem Thon, auch mit bituminösen kalkigen Gesteinen. Die vorherrschende Gesteinsfarbe ist grau oder graulichgelb. Die Dolomite sind auch oftmals plattensförmig, und zeigen bisweilen einen Anflug von Kupferlasur oder von Kupfergrün. Mitunter erscheinen sie porös und löcherig.

Durch die ganze Abtheilung ist häufig Gyps verbreitet in kleinen Schnüren und Lagen, auch Steinsalz erscheint eingemengt, dann und wann in Körnern und Trümmern, und außerdem findet

sich in den Dolomiten auch Bleyslanz, Blende, Gengstein, Kalispath, Braunspath. Letzterer fällt, in Gemeinschaft mit Eisenspath, bisweilen kleine, gangartige Spalten aus. Am Silberberge bey Nach, unweit Freudenstadt am Schwarzwalde, setzen aus dem unterliegenden Sandstein, mit Schwespath und Brauneisenstein ausgefüllte Gänge, bis in die Dylomite dieser Abtheilung herauf.

Versteinerungen sieht man in diesen Schichten viel weniger, als in der oberen, und meistens zerstreut. Am gewöhnlichsten findet man *Plagiostoma lineatum*, *Turbipites dubius* und *Lingula tenuissima*, *Trigonia vulgaris* und *cardissoides*, *Avicula socialis* und *A. Bronnii*, *Mya mactroides*. Ueberdies kommen öfters *Nautilus bidorsatus*, Reptilienreste von dem Thiere, das Ähnlichkeit mit *Tryonix* hat, Fischzähne von *Hybodus* und Krebsreste von *Pemphix Albertii* vor. Die Wichtigkeit dieser Abtheilung wechselt außerordentlich. Sie steigt von einigen Plätzen bis auf 230 Fuß.

4. Bunter Sandstein.

Als Unterlage aller der verschiedenen Kalk-, Thon-, Salz- und Mergelbildungen der Trias, tritt ein mächtiges Sandsteingebilde auf, von vorherrschend rother Farbe, das jedoch stellenweise eine ausgezeichnete bunte Färbung besitzt, wovon es den Namen erhalten hat. Der Bunte Sandstein schließt dieselben Schalthier-Versteinerungen ein, welche wir als Leitmuscheln für den Muschelkalk kennen gelernt haben, und überdies sehr charakteristische Pflanzen-Versteinerungen, zumal von Farn und Coniferen. Er zerfällt in drey Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Plattenförmiger Sandstein und gypsführender Schieferletten.

Zu oberst, unmittelbar unter dem Wellenkalk, liegen schieferige, rothe und bunte Thonmergel, oder ein intensivrother Thon von schieferiger Beschaffenheit, den man Schieferletten heißt; oder aber rothe und bunte, thonige, glimmerreiche Sandsteinschiefer. In den tieferen Schichten liegen feste Sandsteine von ausgezeichnet plattenförmiger Beschaffenheit, und

auch Lager von mehr dichtgeschichteten Sandstein, welche nach abwärts in die große Masse der rothen, starken Sandsteineblöcke übergehen. Der Sandstein ist immer Thonsandstein, und enthält viele große Klemmerklättchen bezeichnet, welche öfters auf den Schichtungsflächen in großer Menge, und bey den schieferigen Sandsteinen dicht an einander liegen. Manchmal ist der Schieferletten vorherrschend, manchmal der schieferige und plattenschieferige Sandstein. Im erstern Falle stellen sich bisweilen Bänke von grobkörnigem Kalkstein ein, der graue, braune und rothe Färbungen zeigt (Umgebungen des Harzes) und öfters sandig ist, so wie Bänke von Dolomit, die mit sandigen Mergeln wechseln.

In vielen Orten kommt in dieser oberen Abtheilung Gyps vor, bald als reiner, bald als Thongyps, und zwar sowohl in Schüren und Nestern, als in großen stockförmigen Massen (am unteren Neckar, in Thüringen, an der Unstrut). Oefters auch ist der Schieferletten satzig (Eulz; Hammersheim am Neckar).

Versteinrungen findet man nur an einigen wenigen Punkten. In Eulzbach im Elsass liegen in einem feinkörnigen, thonigen Sandstein viele Schalthiergattungen des Muschelalters; die Schale ist, mit Ausnahme derjenigen der *Terebratula* und *Lingula*, immer verschwunden, und was man findet, sind die äußeren Abdrücke der Schalen und deren Ausfüllung. Pflanzen kommen hier keine vor. Die Schalthierreste sind: *Natica Gaillardoti*, *Plagiostoma striatum*, *lineatum*, *Avicula socialis*, *Terebratula vulgaris*, *Lingula tenuissima*, *Mya mactroides*, *Trigonia vulgaris*, *cardissoides*, *Modiola recta*, *Turritella extincta*, *Buccinum antiquum*, *obsoletum*, *turbidum*, *Rostellaria scalata* u. s. a., endlich Skelet von *Eocrinites liliformis*, *Saurier* und *Fische* etc. Die Schalthierreste erscheinen alle etwas zusammengebrückt, die Saurierknochen zertrümmert.

In Bubenhausen, unfern Zweibrücken, finden sich in einem thonigen, rothen und gelben, bindemittelreichen Sandstein dieser Abtheilung: *Natica Gaillardoti*, *Avicula socialis*, *Mytilus eduliformis*, *Trigonia vulgaris* und *curvirostris* in solcher Menge, daß sie das ganze

Gestein erfüllen. Ueberdies findet man hier Zähne von *Pseudomodus* und *Placodus*, und Reste von Farn, Calamiten und Coniferen. Diese Abtheilung erscheint bis 200 Fuß mächtig.

b. Mittlere Abtheilung. Sie umfaßt die festen und dichten Schichten des feinkörnigen, in diese Bänke abgetheilten Sandsteins, die allgemein als Bausteine benützt werden. Das thonige Bindemittel liegt häufig in plattgebrachten Knollen (Thongallen) oder in scheibenförmigen Lagen in dem festen Sandstein, der im Allgemeinen sehr gleichförmig und regelmäßig geschichtet, und durch verticale Klüfte in parallelepipedische Stücke von ansehnlicher Größe getheilt ist. Der Glimmer ist sparsam auf den Schichtungsflächen dieses Sandsteins, in noch geringerer Menge im Innern seiner Masse. Zwischen den Sandsteinbänken liegen, vorzüglich nach oben zu, schleferige Thone.

In dieser mittleren Abtheilung kommen nur selten Schalthierreste vor; dagegen findet man hier ausgezeichnet schöne Pflanzenreste einer tropischen Inselflora. Zu Sulzbad im Elsaß kommt darinn vor in den festen Sandsteinschichten: Coniferen, *Volzia* und *Albertia* in mehreren Gattungen; Farn, *Sphaenopteris*, *Anomopteris*, *Filicites*; *Equisetaceen*, *Calamites*, sehr häufig.

Das sind lauter Reste ausdauernder, starker Gewächse, die nach dem Absterben sich wohl bis zum (tropischen Ländern eigenenthümlichen) Winterregen erhalten konnten, und sodann fortgeschwemmt und in Sand begraben wurden. Darinn liegen auch Reste von *Odontosaurus*.

In den thonigen Zwischenschichten liegen einige Schalthierreste: *Mya ventricosa*, *Posidonia minuta*, *Pecten discites*, und Krebsreste, *Galathaea audax*. Die Pflanzenreste dieser thonigen Lage sind: Farn, *Neuropteris*, *Pecopteris*; *Monocotylebomen*, *Aethophyllum*, *Echinostachys*, *Palaeoxylon* und eine Pflanze mit gewinkelten Blättern, den *Potamogeten* ähnlich. Zu Durlach bey Karlsruhe kommen schöne Calamiten und ausgezeichnete Stücke von *Anomopteris Mougeoti* vor.

Diese Pflanzen gehören also zu den zarter gebauten einjährigen Farn, sind Coniferenzweige mit Blüthenköpfchen, und

wahl im Frühling und Sommer in die ruhiger abgeseigten, thönigen Lagen eingewickelt worden.

Die Mächtigkeit dieser mittleren Abtheilung beträgt im Durchschnitt einige Hundert Fuß.

c. Untere Abtheilung. Grobkörniger Sandstein und Conglomerate.

Die unterste Lage des bunten Sandsteins besteht aus Schichten, die mehr grobkörnig, gewöhnlich bindemittelarm, häufig kieselig und conglomeratisch, und in der Nähe des Grundgebirges meist wahre Kiesel-Conglomerate sind. Mitunter liegen Feldspathener und Glimmer zwischen groben Quarzkörnern, und das Gestein hat sodann die Beschaffenheit der Arkosen. Der grobkörnige Sandstein schließt öfters, namentlich am Schwarzwalde, nuß- und faustgroße Kugeln und Sphäroiden von Sandstein ein, die sich durch braune, dunklere Farbe von der Grundmasse unterscheiden. Sie bestehen aus einem durch Eisenoxyd oder Manganoxydhydrat cementierten Sand, stecken oft so lose in der Masse, daß sie sich hin und her bewegen lassen und herausfallen. Bänke mit solchen Einschlüssen gewähren einen sonderbaren Anblick. Man könnte von Ferne glauben, es stecken Kartätschen- oder Kanonenkugeln in der Sandsteinmasse. Bisweilen kommen auch Drusenträume vor, die mit schönen Quarzcrystallen ausgeschmückt sind (Waldshut, Loretto bey Freyburg).

Im nordwestlichen Deutschland treten in dieser untern Abtheilung abermals mächtige Massen von Schieferletten auf, in welchen viel Gyps liegt, und auch wieder Bänke von grobkörnigem Rogenstein vorkommen. Dort zeigen sich überhaupt die Abtheilungen nicht so regelmäßig, wie im südlichen Deutschland.

Die untere Abtheilung, in welcher keine Versteinerungen vorkommen, erreicht öfters eine größere Mächtigkeit, als die beiden andern Abtheilungen zusammen genommen, und in einigen Ländern ist das ganze Gebilde des bunten Sandsteins 1000 bis 1200 Fuß mächtig.

Auf eine ausgezeichnetere Weise, als in allen jüngeren Gebirgsbildungen, treten darinn Erzlagerräthen auf. Wahre weit fortsetzende Gänge, Spalten vorzüglich mit Blei- und Eisenerzen ausgefüllt, kommen in verschiedenen Ländern darinn

vor. Es setzen die Brauneisenstein-Gänge am Nordende des Schwarzwaldes, bey Neuenbürg, Liebenau u.s.w. darinn auf; die Eisengänge und Bleigänge bey Rappenthal, St. Amarin u.s.w. an den Vogesen; die Eisenspathgänge im Baigory-Thal in den Pyrenäen; die Kupfergänge zu Wolach und Schönegrund auf dem Schwarzwalde. Westlich von Saarbrücken kommen bey St. Avold Bleyerze, Bleysglanz und Weisbleyerz in Schnüren und eingesprengt (Knotenerze) in dem Sandstein vor, auf ähnliche Weise finden sich die Bleyerze am Freyberg, zwischen Wechernich und Rast (zwischen Bonn und Achen). Vielfältig trifft man Schnüre und Trümmer von Schwefelspath darinn, öfters von Brauneisenstein und Hartmanganerz begleitet. Alle bedeutenden Erzvorkommnisse sind auf die untere Abtheilung der Formation beschränkt.

Eine weitere hohe technische Bedeutung hat der bunte Sandstein durch seinen Salzgehalt. In seinem Gebiete liegen die Salinen Schönebeck, Darenberg, Straßfurt, Ascherleben, Allenborn, Riffingen. Aus dem unteren Schieferletten entspringen die Sodquellen von Salzungen und Schmalkalden; aus dem oberen die Salzquellen von Creuzburg und Sulz an der Im. Im Ganzen probuzieren die Salinen im nördlichen Deutschland, welche die Soole aus dem bunten Sandstein ziehen, jährlich wohl eine Million Centner Salz.

In seinem Gebiete liegen auch die Erhebungsthäler von Pyrmont und Driburg (S. 565 und 566), in deren Grund die ausgezeichneten eisenhaltigen Sauerlinge entspringen. Am südlichen Fuß des Romberges bey Pyrmont, liegt in diesen Sandsteinschichten auch die bekannte Dornschöhle, eine Ausbuchtung im Sandstein, die durch das kohlensaure Gas erfüllt ist, das aus Spalten des Gesteins ausströmt.

Vergleichen wir die Versteinerungen, welche in den 4 Gruppen vorkommen, die wir in der Elias zusammengefaßt haben, so sehen wir, daß die wichtigsten derselben allen Gruppen gemeinschaftlich sind. Berücksichtigen wir ferner, wie die Gesteine der Gruppen in einander übergehen, mit einander wechseln und mehrfältig immer wiederkehren, und finden wir endlich, daß Alles, was darunter liegt, auch in beiden Beziehungen völlig davon

verschieden ist, so gelangen wir zu dem Schlusse, daß die Bildung des Keupers, Muschelkalks und Bunten Sandsteins während einer und derselben Periode, und während der Existenz einer eigenthümlichen und scharf begränzten organischen Schöpfung stattgefunden hat. Die Trias ist daher scharf gesondert, sowohl von den über ihr liegenden Eas, als von dem unter ihr liegenden Kupferschiefergebirge.

Die Keuper-Formen sind sehr verschieden, je nach der Verschiedenheit der Gesteine. Die oberen conglomeratischen und grobkörnigen Sandsteine, mit den sie begleitenden Dolomitbänken, bilden häufig Felsen, die rauh und grotesk sind, und die Höhen der Wergelberge krönen, die in isolirten Kuppen auftreten. Auch der feinkörnige obere Sandstein zeichnet oft die Gipfel der Keuperberge aus durch steile, mauerförmige Felsen, und setzt für sich selbst länggezogene, steile Bergrücken zusammen (Schönbuch, Löwenstein, Ellwanger-Gebirge, Steigerwald. Die Thon- und Wergelmassen sehen niedrige, kuppenförmige, gerundete Hügel und Berge zusammen, mit flachen Thälern dazwischen. Die Wasser graben Furchen in die Gehänge ein und Risse, und deshalb erscheinen sie so häufig zerschnitten.

Die Lettenkohlengruppe setzt zusammenhängende Höhenzüge und kleine Plateaus zusammen, in welche flache Thäler eingeschnitten sind.

Der Muschelkalk bildet häufig ausgedehnte Höhenzüge, mit meist wellenförmiger, oftmals beynahe horizontaler Oberfläche; so wie auch höchst einsörmige Hochflächen. Mitunter tritt er in schmalen, langen Bergrücken auf, zwischen welchen sich flache Thäler hinziehen. Die einsörmige Plateaform ist aber weitaus vorherrschend, und gibt diesen Kalkgegenden einen monotonen Character. Sind Thäler in die zusammenhängende Kalkmasse eines Plateaus eingeschnitten, oder durch Spaltung darinn entstanden, so sind die Wände häufig ganz steil, felsig, mitunter lothrecht, und an solchen, gewöhnlich nackten, Felswänden sieht man alsdann recht schön, und oft auf große Erstreckung, die geordnete parallele Schichtung und die ermüdende Einsörmigkeit des Schichtenbaues.

Der Bunte Sandstein setzt in größerer Entwicklung

starke Bergketten und ansehnliche Gebirgszüge zusammen, die sich durch steile Abhänge und breite Rücken auszeichnen. Die damit parallel laufenden Thäler sind fast durchgängig tief und von steilen Wänden eingeschlossen, diese oft mit Trümmern bedeckt und mitunter felsig. Querthäler aber, die spaltenförmig in die Sandsteinmasse eindringen, gehören zu den malerischen, da sie immer eng, mannichfaltig gewunden und felsig sind. Die Abhänge sind, namentlich gegen den Ausgang der Thäler, oftmals mit nackten Felsen in mannichfaltigen, überraschenden Gestalten geschmückt; wie man dies so schön im Thale der Lauter, zwischen Dahn und Weissenburg, und im Anweiler Thal sieht. Wo der Bunte Sandstein, wie an der Ost- und Nordseite des Schwarzwaldes, den sanfteren Abfall eines hohen crystallinischen Grundgebirges überdeckt, und als breiter Saum umzieht, da bildet er große, breite, schwach geneigte Plateaus, deren Zusammenhang durch tief niedergehende Spaltenthäler unterbrochen ist. Hier steht man Berge nur in den Thälern, und vom Grunde dieser aus erscheinen uns die hohen Thälwände als solche. Hat man diese erstiegen, so steht man auf der einsörmigen, hohen Platte. Die vier Gruppen der Trias und die Glieder jeder einzelnen Gruppe sind vorzüglich in Deutschland und Frankreich entwickelt. In England fehlt der Muschelkalk ganz. Keuper und Lettenkohle fließen dort mit dem Buntem Sandstein in eine große Mergel- und Sandsteinbildung zusammen (Now red marl or Sandstone), worinn einige kalkige Zwischenlagen den mächtigen Kalkstein der Continental-Trias andeuten. In der oberen Abtheilung des englischen red marl liegt das Salzgebirge Englands, in Cheshire und Northwich, und daraus entspringt das berühmte Mineralwasser von Heltenham, dem deutschen Kissingen vergleichbar, dessen unübertreffliche Quellen aus Buntem Sandstein hervortreten.

Das Triasgebirge bedeckt einen großen Theil von Deutschland. Der Keuper mit der Lettenkohle bedeckt eine Fläche von reichlich 350 Quadratmeilen, wovon jedoch das nordwestliche Deutschland nur mit circa 76 Quadratmeilen Antheil nimmt. Im südwestlichen Deutschland ist er am östlichen Schwarz-

walde, in Schwaben und Franken, mächtig entwickelt. Bey der badischen Saline Darrheim, unsern Donaueschingen, erreicht er eine Höhe von 2400 Fuß.

Der Muschelschale ist wiederum hauptsächlich im südwestlichen Deutschland, und zwar in den vorhin genannten Ländern, verbreitet; im nordwestlichen Deutschland tritt er besonders in den sächsischen Herzogthümern, sodann in Thüringen, in den Wesergegenden, an der Leine, am Nordrande des Harzes auf, und endlich sieht man ihn nochmals, aber ganz isoliert, als eine wahre Insel bey Rüdersdorf, unsern Berlin, in der großen Diluvial-Niederung. Er bedeckt im Ganzen eine Oberfläche von 860 Quadratmeilen, und erreicht seine größte Höhe, 2300 Fuß, bey Dillingen am östlichen Schwarzwalde.

Der Bunte Sandstein ist das mächtigste und verbreitetste Eriasglieb. Er bedeckt in Deutschland eine Fläche von 500 Quadratmeilen, und erreicht im Schwarzwalde, auf den Hornisgründen, eine Höhe von 3600 Fuß. Nördlich vom Schwarzwalde, an dessen Ost- und Nordseite er ungewöhnlich mächtig entwickelt ist, tritt er in großer Ausdehnung im Odenwald und Spessart auf, breitet sich sodann zwischen dem Thüringerwald und dem Westerwald, in den Werra- und Fulda-Gegenen und im Norden des basaltischen Vogelsgebirges aus, constitutirt den Sollingerwald, umzieht den Harz, als breiter Saum den Södrand desselben bis gegen Halle hin, zieht sich über Merseburg an der Saale herab, den Muschelschale umsäumend über Jena an den Nordrand des Thüringerwaldes. Jenseits des Rheins sehen wir an der Saar und an der oberen Saar und Mosel Eriasbildungen. In Frankreich erscheint das Eriasgebirge an den Vogesen, zumal auf der Ostseite in Lothringen. Unter dem Jura treten Keuper und Muschelschale auch in Solothurn, Pruntrut, Basel, Argau hervor, und diese Bildungen haben an den Zerrüttungen und Aufrichtungen der Juraglieder Theil genommen. S. Fig. 20.

In Oberschlesien und Südpolen ist der Muschelschale um Larnowitz verbreitet, sodann bey Krakau und Kielce, und in den Umgebungen dieser drey Orte geht ein ganz beträchtlicher Bergbau auf Eisen, Zink und Bley um, die daselbst in diesen

Bildung Kogen, und die Metallausbeute ist sehr groß. Es werden jährlich allein an Zink im preussisch-schlesischen Oberbergamtsdistrict über 200,000 Centner produziert, und über 600,000 Centner Kobalt.

In der Kette der Alpen hat man die Trias mit Bestimmtheit noch nicht nachgewiesen. Der Kalk von St. Triphon in den westlichen, und von St. Cassian in den östlichen Alpen, dürfte nach seinen Petrefacten zum Muschelkalk gehören. Der dünne Sandstein ist vielleicht durch den rothen Sandstein der östlichen Alpen repräsentiert. In den Pyrenäen tritt dieser Sandstein mächtig auf, ebenso im Innern von Spanien, namentlich in den Hochebenen von Neu- und Alt-Castilien, und hier, wie es scheint, Keuper und bunter Sandstein mit einander vermischt, wie in England, ohne die Muschelkalk-Zwischenlage, grob- und feinsandig.

In England ist die Bildung des New red marl and Sandstone außerordentlich verbreitet. Nördlich von Bristol zieht sie sich über Birmingham, Nottingham, York bis zur Mündung des Tyne; nordwestlich überdeckt sie das Sand-zwischen Derby und Charnsbury, und bis Manchester and Liverpool.

In Nord-America scheint der New red Sandstone auf das Thal von Connecticut beschränkt zu seyn. Dasselbe hat man auf Sandsteinsplatten Spuren von Vogelfritten gefunden, die man Ornithichnites heisst. S. Pl. 22. Sie rühren von verschiedenen Vögeln her, die aber alle Sumpfvögel, langfüßig gewesen und schrittweise gegangen sind.

Im Norden tritt ein Glied der Trias in Schonen auf, und in mehreren Gegenden Russlands.

Wir haben gesehen, daß in der Trias an vielen Orten beträchtliche Steinsatzmassen oder Salzquellen vorkommen. Dieses Salzreichthums wegen faßt man die vier Gruppen auch unter dem Namen Salzgebirge zusammen.

Nach der altbäblichen Eintheilung zählt man zu dem Flözgebirge auch noch das Kupferschiefergebirge, und heißt es, mit Einschluß der Trias, älteres Flözgebirge.

Seine organischen Reste sind aber wesentlich verschieden von denen der Trias, so wie von den Petrefacten aller jüngeren

Bildungen, dagegen stimmen sie mit denselben überein, die man im Uebergangsgebirge findet, und welche die Glieder desselben charakterisiren. Unbezweifelt sind die Petrefacten daher historische Documente, welche die Perioden der Schöpfung bezeichnen. Im Kupferschiefergebirge finden wir aber ganz und gar die organischen Typen des Uebergangsgebirges, und es schließt sich diesem somit innig an, und gehört zu seiner Bildungsperiode.

Uebergangsgebirge.

Syn. Terrains intermédiaires.

Unter dem geschilderten Fldhgebirge folgt eine Reihe von Gebirgsbildungen, welche theils mechanischgebildete, petrefactenführende, theils durch chemische Action erzeugte, krystallinische, versteinungsleere Schichten umfaßt, ihre Stellung zwischen dem petrefactenreichen Fldhgebirge und dem petrefactenleeren Grundgebirge einnimmt, gleichsam die Verbindung, den Uebergang zwischen diesen vermittelt, und deshalb Uebergangsgebirge genannt wird. Dieser Name ist von Werner einer beschränkten Reihe, namentlich den untersten Gliedern, gegeben worden. Die zoologischen Charaktere derselben wurden später aber auch noch in andern Bildungen aufgefunden, die man nunmehr alle mit den tiefften unter demselben Namen zusammenfaßt.

Außer vielen Polypen und einigen Stilkastrien sind besonders charakteristisch für diese große Schichtreihe, die Mollusken- und Crustaceen-Reste. Von jenen die Geschlechter *Producta*, *Strophomena*, (*Leptaena*), *Calecola*, *Strygocephalus*, *Trigonotreta* (*Spirifer*, *Delthyris*), mit vielen Gattungen; *Euomphalus*, *Bellerophon*, *Orthoceras*, *Lituites*, *Goniatis*; von den Crustaceen die Trilobiten: *Calymene*, *Asaphus*.

Von Fischen hat man verhältnismäßig am meisten Reste gefunden, und zwar vorzüglich die Geschlechter *Palaeoniscus*, *Osteolepis*, *Platysomus*, *Amblypterus*, *Acanthodes*, *Cotopterus*, *Pygopterus*, *Acerolepis*, und auch noch in

Kalkbildung liegen, und die Metallausbeute ist sehr groß. I werden jährlich allein an Zink im preussisch-schlesischen Obbergamtsdistrikt über 200,000 Centner produziert, und an 600,000 Centner Kobalt.

In der Kette der Alpen hat man die Trias mit Bestimmtheit noch nicht nachgewiesen. Der Kalk von St. Triphon in den westlichen, und von St. Cassian in den östlichen Alpen dürfte nach seinen Petrefacten zum Muschelkalk gehören. Der Dunst Sandstein ist vielleicht durch den rothen Sandstein der Pyrenäen repräsentiert. An den Pyrenäen tritt die Sandstein mächtig auf, ebenso im Innern von Spanien, namentlich in den Hochebenen von Neu- und Alt-Castilien, wo hier, wie es scheint, Keuper und bunter Sandstein mit einander vereinigt, wie in England, ohne die Muschelkalk-Zwischenlage, und fast ohne.

In England ist die Bildung des New red marl und Sandstones außerordentlich verbreitet. Nördlich von Bristol liegt sie sich über Birmingham, Nottingham, York bis zur Bildung des Tees; nordwestlich überdeckt sie das Land zwischen Derby und Chesham, und bis Manchester und Liverpool.

In Nord-America scheint der New red Sandstone auf das Thal von Connecticut beschränkt zu seyn. Dasselbe hat man auf Sandsteinplatten Spuren von Vogelfritten gefunden, die man Ornithichnites heißt. S. Fig. 22. Sie röhren von verschiedenen Vögeln her, die aber alle Sumpfvögel, langhalsig gewesen und schrittweise gegangen sind.

Im Norden tritt ein Glied der Trias in Schwonen auf, und in mehreren Gegenden Russlands.

Wir haben gesehen, daß in der Trias an vielen Orten beträchtliche Steinsalzmassen oder Salzquellen vorkommen. Dieses Salzreichthums wegen faßt man die vier Gruppen an unter dem Namen Salzgebirge zusammen.

Nach der altäthlichen Eintheilung zählt man zu dem Salzgebirge auch noch das Kupferschiefergebirge, und heißt es, mit Einschluß der Trias, älteres Salzgebirge.

Seine organischen Reste sind aber wesentlich verschieden von denen der Trias, so wie von den Petrefacten aller jüngeren

Bildungen, dagegen stimmen sie mit denjenigen überein, die man im Uebergangsgebirge findet, und welche die Glieder desselben charakterisieren. Unbezweifelt sind die Petrefacten letzte historische Documente, welche die Perioden der Schöpfung bezeichnen. Im Kupferschiefergebirge finden wir aber ganz und gar die organischen Typen des Uebergangsgebirges, und es schließt sich diesem somit innig an, und gehört zu seiner Bildungs-Periode.

Uebergangsgebirge.

Syn. Terrains intermédiaires.

Unter dem geschichteten Glimmgebirge folgt eine Reihe von Gesteinsbildungen, welche theils mechanischgebildete, petrefactenführende, theils durch chemische Action erzeugte, crystallinische, versteinungsleere Schichten umfaßt, ihre Stellung zwischen dem petrefactenreichen Glimmgebirge und dem petrefactenleeren Grundgebirge einnimmt, gleichsam die Verbindung, den Uebergang zwischen diesen vermittelt, und deshalb Uebergangsgebirge genannt wird. Dieser Name ist von Werner einer beschränkten Reihe, namentlich den untersten Gliedern, gegeben worden. Die zoologischen Charactere derselben wurden später aber auch noch in anderen Bildungen aufgefunden, die man nunmehr alle mit dem tiefften unter demselben Namen zusammenfaßt.

Außer vielen Polypen und einigen Stilkastrien sind besonders charakteristisch für diese große Schichtenreihe, die Mollusken- und Crustaceen-Reste. Von jenen die Geschlechter *Producta*, *Strophomena*, (*Leptaena*), *Calceola*, *Strygocephalus*, *Trigonotreta* (*Spirifer*, *Dolthyris*), mit vielen Gattungen, *Euomphalus*, *Bellerophon*, *Orthoceratites*, *Lituites* *Goniatites*; von den Crustaceen die Trilobiten: *Calymene*, *Asaphus*.

Von Fischen hat man verhältnismäßig am meisten Reste gefunden, und zwar vorzüglich die Geschlechter *Palaeoniscus*, *Osteolepis*, *Platysomus*, *Amblypterus*, *Acanthodes*, *Cetopterus*, *Pygopterus*, *Acrolopis*, und auch noch in

tiefen Schichten das Geschlecht *Kophalaspis*, die alle mit-
schliessend dem Uebergangsgebirge angehören. Von Reptilien kommt
außer dem genauer bestimmten Geschlechte *Protorosaurus*
Weniges in undeutlichen Resten vor.

Die Vegetation sehen wir in den unteren Schichten diese
Reihe auf der ersten Stufe der Entwicklung. Es sind die ersten
Gewächse der Erde, welche auf den, aus den Gewässern auf-
gestiegenen, vereinzeltten Felsmassen wuchsen, riesenhafte *Farras*,
Equisetaceen und *Lycopodiaceen*, welche heutzutage nur
auf Inseln, an Küstengegenden und in feuchten Wäldern der
Tropenländer wachsen; Baumstämme, welche von Coniferen
herzustammen scheinen, einige Palmen und einige *Fucoiden*.

Die große und mächtige Schichtenreihe zerfällt in vier Grup-
pen, diese sind:

1) Das Kupferschiefergebirge; 2) das Steinkoh-
lengebirge; 3) das Silurische Gebirge; 4) das Cam-
brische Gebirge.

1. Kupferschiefer-Gebirge.

Syn. Sechsteingebirge, Torrain pédon.

In einem großen Theile von Deutschland liegt unter dem
bunten Sandstein eine Reihe kalkiger Schichten, und ein groß-
Sandstein- und Conglomerat-Bildung, zwischen welchen sich ein
kupfererzführender Mergelschiefer befindet, den der Bergmann
Kupferschiefer heißt, und dessen Namen auf die ganze Gruppe
übertragen worden ist. Eine Abänderung der hier vorkommenden
Kalksteine nennt der thüringische und sächsische Bergmann Zech-
stein, und davon rührt der Name Sechsteingebirge her,
welchen Manche dieser Gruppe geben.

a. Unmittelbar unter dem Bunten Sandstein, nur durch eine
Lettenschicht davon geschieden, liegt ein bräunlich-schwarzer oder
grauer Stinkkalk, den man Stinkstein heißt wenn er dicht,
Rauchstein wenn er löslig, Rauchwacke wenn er cavernös
ist. Dieser Stinkkalk, mit meist gebogenen und zerklüfteten
Schichten, mit einer variablen Mächtigkeit von einigen Fuß
bis über 80, erscheint bisweilen als Trümmergestein, oder

ist durch ein bituminöses Thonstb repräsentiert, in welchem schiefelförmige Stücke davon liegen.

Darunter folgen Lagen einer sandartigen Mergelerde, oder eines pulverartigen Stinkkalks (Mische), Massen von Gyps und Bänke von körnigem Dolomit, welche aber keine bestimmte Lagerungsfolge unter sich einhalten.

Die Mische, im Durchschnitt 6—20 Fuß mächtig, umschließt oft die Mergelerde der kalkigen Schichten, liegt gewöhnlich unter dem Stinkkalk und trennt diesen vom Raunkalk. Dieser, ein körniger Dolomit von heller, selten bräunlicher Farbe, ist häufig porös und bläsig, nach anzufühlen, und darauf bezieht sich der Name, den ihm Vergleute gegeben haben. Er ist bisweilen zerreiblich, sandig, manchmal aber auch sehr fest, und mitunter voll Blasen und kleiner Höhlungen (Höhlenkalk), aus welchen kohlensaures Gas ausströmt. Einzelne Lagen sind mit Eisenoxyd oder Eisenrost imprägniert und heißen Eisenkalk. Die Schichtung ist gewöhnlich unbedeutlich, und das Gestein von vielen, und zumal von starken vertikalen Klüften durchsetzt. Als charakteristische Verfeinerung tritt in diesen Bänken *Strophomena aculeata* auf (*Productus aculeatus*).

Der Gyps, von weißer oder grauer Farbe, ist meistens körnig und durch Höhlen ausgezeichnet, daher der Namen Höhlengyps, Schlotengyps. Diese Höhlen, die in großen Lagen weitenweit unter der Erde fortziehen (Wimmelburg bey Eisleben), zum Theil mit Wasser gefüllt sind, stehen öfters durch Spalten mit der Oberfläche in Verbindung, schließen häufig eine irrespirable, mit Kohlensäure gemengte Luft ein, und in ihrem Gefolge erscheinen zahlreiche Erdfälle.

Er bildet theils Stöcke, theils abartige Lagen, wechselt verschiedentlich mit den kalkigen Gesteinen, und ist in deren Nähe damit verunreiniget, oft zellig und bläsig.

Diesen Gyps begleitet öfters Anhydrit und bisweilen auch Steinsalz. Aus dieser Gypsbildung scheint die Salzquelle der Saline Dörrenberg zu kommen. In der neuesten Zeit hat man zu Artern, nahe bei der Saline, 936 Fuß tief unter der Oberfläche, 620 Fuß unter dem Mercurspiegel, nach einer Arbeit von 7 Jahren, glücklich Steinsalz angebohrt.

Witumter erscheint die Gypsablösung sehr mächtig, wie z. B. am Südwestrande des Harzes, wo sie als ein flacher, hoher Wall, dessen weiße, felsigen Abfälle dem Gebirge zugekehrt sind von Osterode bis nahe an Gangerhausen ununterbrochen fortzieht.

Unter dem gypsführenden Theile des Kupferschiefergebirges folgt nun das Gebilde des sogenannten Bechsteins und des Kupferschiefers. Der Bechstein, welcher zunächst unter dem Gyps liegt, ist ein grauer oder graulichgelber, denticul. und lam. geschichteter, meist thoniger Kalkstein, der in einigen Gegenden durch die oben genannte *Strophomena aculeata* charakterisirt ist, und überdies *Terebratula lacunosa* und *Crinomen* einschließt. Die Mächtigkeit variiert von einigen Klaftern bis p 100 Fuß. Dieser Kalk ist bisweilen bläulich und stängelig, und schließt Crystalle von Kalkspath, Gyps, Quarz ein, auch Eisen und Kupfererze.

Auf diesen Bechstein folgt nun der eigentliche Kupferschiefer, ein schwarzes und bituminöses, dünnschieferiges Mergelgebilde, mit eingesprengten Kupfererzen. Es sind jedoch nur wenige Schichten desselben metallführend; die zusammen kaum eine Mächtigkeit von 2—3 Fuß besitzen, aber so regelmäßig und gleichförmig auftreten, daß sie darin ihres Gleichen nicht haben. Die ganze Schieferbildung ist durchschnittlich 4—8 Fuß mächtig. Die metallführenden Schichten sind im Mansfeldischen der Gegenstand eines sehr wichtigen Bergbaues. Diese dunkle Mergelschiefer schließen zahlreiche Gesteine ein, welche im Geschlechte *Palaeoniscus* angehören, und darinn hat man auch die Reste des *Protorosaurus* gefunden.

Nach unten zu ist der Kupferschiefer in Mansfeld und an Vorharze mit einem grauen, kieselfgen Conglomerate verbunden, welches man Weißliegendes heißt, mit Bezug auf seine Farbe und auf seine Stellung unter den erzführenden Schichten. Dazwischen befinden sich mehrfältig mergelige, schieferige, sandige Straten mit Kupfererzen, den sogenannten Sandbergen.

Die obere Abtheilung, worinn der Raubkalk liegt, ist stellenweise durch reiche Eisenerz-Lagerstätten ausgezeichnet: Brauneisenstein in verschiedenen Abänderungen, oft mit

Spath-Eisenstein und Brauneisenerzen gemengt, auch mit Schwefelspath, bildet in den oberen Kalkschichten theils Nester, theils zusammenhängende Blöcke, oder die Erze sind innig mit der Kalkmasse vermischt, sehen damit ausgedehnte Blöcke zusammen. Hierher gehören die Eisenerze bei Wiber, Ennsfeld, Ramsdorf, die mächtigen Eisensteinablagerungen bei Schmalzsdamm die Lagerstätten des Stahlberges und der Mammel, und mehrere andere Eisenerzvorkommnisse am Thuringerwald. Bisweilen kommen auch Kupfererze mit den Eisensteinen vor.

Sehr oft durchsetzen Spalten (Rücken) diese Schichtenreihe, die im Mansfeldischen immer auch das weiße Conglomerat darunter durchschneiden, und sehr oft Verschiebungen, Thrustungen desjenigen Schichtentheils verursacht haben, der sich im Hangenden der Spalten befindet. Auch erzführende Gänge, auf denen Spath-Eisenstein, Bleiglanz, Kupfererze, Spiesglanz u. s. w. vorkommen, sowie Gänge, die von Schwefelspath und Quarz ausgefüllt sind, durchsetzen diese Schichten öfters (Wiber, Ramsdorf, Stadtbergen).

b. Auf die Reihe der kalkigen Schichten folgt eine große Conglomerat- und Sandsteinbildung von vorherrschend rother Farbe, die man deshalb, und weil sie unter den metallhaltigen Mergelschiefeln liegt, Rothliegendes heißt, auch Erdtiegendes nennt, da sie unmittelbar unter dem Kupferschiefel taub oder todt, das ist, ergloer ist. Wir haben oben schon angeführt, daß auf die dunkeln bituminösen Schiefer zunächst ein weißes Conglomerat folgt. An den dabey angeführten Orten gehört es noch dem Kupferschiefel an, da es seine Erze führt (Sandberge), und seine Rücken theilt. Das weiße und graue Conglomerat dagegen, was bey Riegelshorf, zu Wiber, unter dem Mergelschiefel liegt, gehört schon dem Rothliegenden an, und bildet dessen obere Lage. Es fehlt indessen an vielen Orten, namentlich wo die kalkigen Glieder nicht entwickelt sind.

Im Allgemeinen treten als herrschende Gesteine in der Bildung des Rothliegenden Eisenthon-Conglomerat, und theilweise hindemittelreicher, rother Thonsandstein, auf, zwischen welchen öfters rothe, mehr oder weniger sandige Thonslagen

vorkommen, die manchmal völlig mit dem Schieferletten und bunten Sandstein übereinstimmen.

Es ist eine Eigenthümlichkeit des Rothliegenden, daß es in der Regel nur an den Rändern crystallinischer Gebirge auftritt, oder in den Umgebungen von Porphyren, und daß es aus Trümmern dieser, überhaupt aus Bruchstücken in der Umgebung befindlicher älterer Gesteine zusammengesetzt ist.

In den Schichten dieser Bildung kommen häufig verkieselte Pfl. vor, Stämme, die theils Coniferen, theils Farn- und Calamiten angehören, den Geschlechtern *Pinites*, *Pouco*, *Tubicaulis*, *Psaronius*, *Porosus* (*Röhrenholz*, *Staarenholz*, *Porenholz*), *Modullosa*, *Calamites* und *Calamitos* (*Markholz*, *Kalamitenholz* und *Kalamit*). Auch findet sich in einem grauen Sandstein bey Frankenberg in Hessen ein Kupressit, Blätterzweige und Früchte einer Pflanze, die zu den Cypressen gehört. Die organische Substanz ist bei dieser Versteinerung durch Kupfererz (*Kupferglanz*) ersetzt. Man kennt dieselbe unter dem Namen Frankenger Kornähren. Die Petrefactologen nennen sie *Cupressites Ullmanni*.

An einigen Orten liegen Kalkstein- und Mergelsteine zwischen den Sandstein- und Conglomeratbänken (Saalkreis, Niederschlesien), und in solchen hat man bey Scharfeneck und Ruppertsdorf in Schlesien fossile Fische, den *Palaeoniscus vratislaviensis* gefunden. Mitunter erscheinen auch Bänke von Dolomit. In manchen Stellen treten in der ganzen Schichtenreihe des Rothliegenden auch verschiedene andere Trümmere auf, Granit- und Kieselconglomerate, Porphyrbänke u.s.w., die aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Mächtigkeit, dieser im Allgemeinen deutlich und regelmäßig geschichteten, Bildung geht von einigen hundert Fuß bis über 3000 Fuß (Harz).

In mehreren Gegenden (Böhmen, Niederschlesien, Wettin, Rauenbach, Oppersode) liegt eine Steinkohlenbildung im Rothliegenden. Sie besteht aus Schichten von grauem Sandstein und Conglomerat, aus Lagen von Schieferthon und aus Steinkohlenflözen, die eine

Nächtigkeit von einigen Follen, bis zu 3 Fächern besitzen, und Gegenstand eines höchst wichtigen Bergbaus sind. In dieser Kohlenbildung kommen ebenfalls verkieselte Hölzer vor, in den Schieferthonlagen derselben eine Menge fossiler Pflanzen, namentlich Farren, Equisetaceen, Coniferen, Lycopodiaceen, Palmen- und Lilienartige Gewächse, welche sich alle auch in der älteren Steinkohlenbildung finden.

Auch erzführende Gänge kommen mehrfältig im Todtliegenden vor. Namentlich sind Brauneisenstein, Spath Eisen, Brauneisen, Kupfer- und Kobalterze darinn an vielen Orten gefunden worden (Schwarzwald, Wasgau, Biber, Riegelsdorf).

Salzquellen treten daraus in Schlessen hervor und zu Siebichenstein bei Halle; Sauerquellen zu Charlottenbrunn, Salzbrunn und Altwasser in Schlessen.

Das Kupferschiefergebirge tritt in schöner Entwicklung mit seinen beiden Abtheilungen in Thüringen und im Mansfeldischen, als Typus der Bildung auf. Man sieht es ferner am südlichen Harzrand und in der Gegend von Halle, und am nördlichen Abfall des Riesengebirges unsern Liegnitz. Die obere kalkige Abtheilung kennt man namentlich bey Riegelsdorf in Hessen, Biber im Hanauischen, am Ost-Rande des rheinischen Schiefergebirges, am Abfall des voigtländischen Schiefergebirges zwischen der Elm und der Elster. Südlich vom Main hat man sie noch nirgends gefunden.

Am Schwarzwalde und in den Vogesen fehlt die kalkige Zwischenbildung zwischen dem Bunten Sandstein und dem Todtliegenden vollkommen, und beide Schichtenreihen fallen in eine einzige große Sandstein- und Conglomeratbildung zusammen. Das Gleiche scheint auch in Spanien der Fall zu seyn. In Frankreich sieht man die obere Abtheilung des Kupferschiefergebirges in geringer Entwicklung bei Autun.

In England dagegen ist die Gruppe unter dem Namen Magnesian limestone wohlbekannt. Sie besteht aus dolomitischem Kalkstein, Mergelschiefer, dichtem Kalkstein und buntfarbigem Mergel, Schichten, welche in Nottinghamshire, Derbyshire, Yorkshire, Durham und Northumberland verbreitet sind.

Schichten von rothem Conglomerat, Sandstein und Mergel darunter, sind bekannt unter dem Namen Exeter- und Haver Conglomerat, und an einigen Punkten (Wandip, Drift, Devon) durch kalkige Trümmergesteine repräsentirt. In den Mergelschiefern von Durham hat man schöne fossile Fische gefunden, welche den Geschlechtern *Sauropsis*, *Acrolepis*, *Nemtorix*, *Osteolepis*, *Platysomus* angehören. In Nordamerika hat man eine analoge Bildung am Lake superior beobachtet.

Das Rothliegende tritt in vielen Ländern ohne den sogenannten Zechstein und Kupferschiefer auf, wie z. B. in Schottland und Irland in den südlichen und östlichen Alpen, im Aequinoctial-America. Es tritt in größerer Entwicklung auf, da zeigt es häufig hohe Felsen, schroffe Gehänge und in den Queerthälern steht es in hohen, mauerförmigen Wänden, mitunter vielfach von vertikalen Spalten durchsetzt, und die Conglomerate dadurch in große, massige Massen zertheilt (Umgebungen von Eisenach, Bann, Schloßberg zu Baden).

2. Steinkohlengebirge.

Syn. Terrain houiller; carboniferous Group.

In tiefen und muldenförmigen Vertiefungen steht es an vielen Orten, zunächst unter dem Rothliegenden, als die Gruppe der älteren Bildungen, das mächtige Steinkohlengebirge, welches seiner vielen und reichen Kohlenflöze wegen Hauptsteinkohlengebirge, und zum Unterschiede von den jüngeren Steinkohlenbildungen, auch älteres Steinkohlengebirge genannt wird. Man kann darnach annehmen, daß es bei höherer Entwicklung aller Glieder des Uebergangsgebirges seine Stelle immer zwischen dem Rothliegenden und der jüngeren Gruppe einnimmt.

Das Steinkohlengebirge ist am vollkommensten und größten in England entwickelt. Es besteht dort aus mehreren Gliedern, die mit einander in einer bestimmten Lagerungsfolge vorkommen, und das große Gebirgsgebilde zusammensetzen, welches den ungeheueren Schatz von Steinkohlen und Eisen einschließt, der die feste Grundlage der Wohlfahrt und Macht jenes Reiches ist.

Zu oberst liegt ein grauer Sandstein mit Zwischenschichten von Schieferthon und Steinkohlen. Es sind die eigentlichen Kohlenführenden Schichten, welche die Engländer Coal measures nennen. Darauf folgt ein grobkörniger oft conglomerationartiger Sandstein ohne Steinkohlen, dem deutschen Bergmann als fließer Sandstein, dem englischen als Millstone grit bekannt. Unter diesem liegt eine mächtige Kalkbildung, der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, und zu unterst endlich liegt eine große Sandstein- und Conglomeratbildung, Old red sandstone, der alte rothe Sandstein.

a. Die oberste kohlenführende Lage besteht der Hauptmasse nach aus einem vorherrschend grau gefärbten Sandstein mit thonigem Bindemittel, der mitunter grobkörnig und conglomerationartig auftritt, und gewöhnlich Stimmerblättchen enthält. Zwischen den Sandsteinschichten liegt Schieferthon, der niemals fehlende Begleiter der Steinkohle, ein eigentlicher Kohlenschiefer, schwarz und grau durch kohlige und bituminöse Theile, und manchmal brennbar, Brandschiefer. Zwischen Lagen von Schieferthon liegt nun, immer zwischen zwei Sandsteinschichten, die Steinkohle. Sie hat den Schiefer zum Dach und zur Unterlage oder Sohle. Ofters ist von seiner Masse auch den Kohlen eingemengt, oder es liegen dünne Schiefer dazwischen.

Die Steinkohle kommt nun hier in den verschiedensten Abänderungen vor, und enthält außer Schieferthon gewöhnlich Schwefelkies in dünnen Häutchen und Blättchen, parallel den Blättern der Kohle, auch in Körnern, Knauern und bisweilen in kleinen Crystallen. Diese Einmischung ist die Ursache des schwefeligen Geruches, den manche Steinkohlen beim Brennen ausgeben, und des starken Angriffs ihrer Flamme auf Metalle. Eine kieselige Steinkohle muß daher gewöhnlich vercoakt, d. h. im Verschloffenen geglüht werden, wobey der Schwefelkies den größeren Theil seines Schwefels verliert, und beim späteren Verbrennen der Coaks die unangenehme und nachtheilige Wirkung nicht mehr in gleichem Grade äußern kann. Die Vercoakung der Steinkohlen, wobey die flüchtigen Theile derselben ausgetrieben werden, und der Schwefelkies eine Zersetzung erleidet, wird daher auch das Abschwefeln genannt.

Schichten von rothem Conglomerat, Sandstein und Mergel liegen darunter, sind bekannt unter dem Namen Exeter- und Haverhill Conglomerat, und an einigen Punkten (Mendip, Bristol, Avon) durch kalkige Trümmergesteine repräsentiert. In den Mergelschiefern von Durham hat man schöne fossile Fische gefunden, welche den Geschlechtern *Sauropsis*, *Acrolepis*, *Nemopterix*, *Osteolepis*, *Platysomus* angehören. In Nordamerika hat man eine analoge Bildung am Lake superior beobachtet.

Das Rothliegende tritt in vielen Ländern ohne den sogenannten Zechstein und Kupferschiefer auf, wie z. B. in Schottland und Irland, in den südlichen und östlichen Alpen, im Aequinoctial-America. Wo es in größerer Entwicklung auftritt, da zeigt es häufig schön Felsen, schroffe Gehänge und in den Queerthälern steht man hohe, mauerförmige Wände, mitunter vielfach von vertikalen Spalten durchsetzt, und die Conglomerate dadurch in große, massenartige Massen zertheilt (Umgebungen von Eisenach, Bamberg, Schloßberg zu Baden).

2. Steinkohlengebirge.

Syn. Terrain houillier; carboniferous Group.

In tiefen und muldenförmigen Vertiefungen steht man an vielen Orten, zunächst unter dem Rothliegenden, als die oberste Gruppe der älteren Bildungen, dies mächtige Steinkohlengebirge, welches seiner vielen und reichen Kohlenflöze wegen Hauptsteinkohlengebirge, und zum Unterschiede von den jüngeren Steinkohlenbildungen, auch älteres Steinkohlengebirge genannt wird. Man kann darnach annehmen, daß es bei vollkommener Entwicklung aller Glieder des Uebergangsgebirges seine Stelle immer zwischen dem Rothliegenden und der flävischen Gruppe einnimmt.

Das Steinkohlengebirge ist am vollkommensten und großartigsten in England entwickelt. Es besteht dort allenthalben aus vier Gliedern, die mit einander in einer bestimmten Lagerungsfolge vorkommen, und das große Gebirgs Ganze zusammensetzen, welches den ungeheuren Schatz von Steinkohlen und Eisen einschließt, der die feste Grundlage der Wohlfahrt und Macht jenes Reiches ist.

Zu oberst liegt ein grauer Sandstein mit Zwischenlagen von Schieferthon und Steinkohlen. Es sind die eigentlichen Kohlenführenden Schichten, welche die Engländer Coal measures nennen. Darauf folgt ein grobkörniger oft conglomeratischer Sandstein ohne Steinkohlen, dem deutschen Bergmann als flöherer Sandstein, dem englischen als Millstone grit bekannt. Unter diesem liegt eine mächtige Kalkbildung, der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, und zu unterst endlich liegt eine große Sandstein- und Conglomeratbildung, Old red sandstone, der alte rothe Sandstein.

a. Die oberste Kohlenführende Lage besteht der Hauptmasse nach aus einem vorherrschend grau gefärbten Sandstein mit honigtem Bindemittel, der mitunter grobkörnig und conglomeratisch auftritt, und gewöhnlich Stimmerblättchen enthält. Zwischen den Sandsteinschichten liegt Schieferthon, der niemals fehlende Begleiter der Steinkohle, ein eigentlicher Kohlenschiefer, schwarz und grau durch kohlige und bituminöse Theile, und manchmal brennbar, Brandschiefer. Zwischen Lagen von Schieferthon liegt nun, immer zwischen zwei Sandsteinschichten, die Steinkohle. Sie hat den Schiefer zum Dach und zur Unterlage oder Sohle. Oefters ist von seiner Masse auch den Kohlen eingemengt, oder es liegen dünne Schiefer dazwischen.

Die Steinkohle kommt nun hier in den verschiedensten Abänderungen vor, und enthält außer Schieferthon gewöhnlich Schwefelfies in dünnen Häutchen und Blättchen, parallel den Blättern der Kohle, auch in Körnern, Knauern und bisweilen in kleinen Crystallen. Diese Einmischung ist die Ursache des schwefeligen Geruches, den manche Steinkohlen beim Brennen ausgeben, und des starken Angriffs ihrer Flamme auf Metalle. Eine fleckige Steinkohle muß daher gewöhnlich vercoakt, d. h. im Verschloßten geglüht werden, wobey der Schwefelfies den größeren Theil seines Schwefels verliert, und beim späteren Verbrennen der Coaks die unangenehme und nachtheilige Wirkung nicht mehr in gleichem Grade äußern kann. Die Vercoaktung der Steinkohlen, wobey die flüchtigen Theile derselben ausgetrieben werden, und der Schwefelfies eine Zersetzung erleidet, wird daher auch das Abschwefeln genannt.

Der Schwefelkies ist ferner noch die Ursache eines in Steinkohlengruben bisweilen eintreffenden und sehr nachtheiligen Ereignisses, er ist die Ursache des Grubenbrandes, oder vielmehr der Selbstentzündung der Steinkohlen. Ist eine bekannte Thatsache, daß der in der Kohlenmasse und auch im Schiefer vorkommende Schwefelkies, sich zersetzt, wenn er mit Feuchtigkeit und Luft in Berührung kommt. Er verwandelt sich in Eisenvitriol (schwefelsaures Eisenoxydul), und entwickelt dabey viel Wärme. Geht diese Zersetzung in einem engen Raum in der die Wärme schlecht leitenden Kohle vor sich, so kann die Temperatur zu einer Höhe steigen, wobey Stoffe ins Glühende kommen, und die verbrennlichen bey Zutritt frischer Luft in wahren Brand gerathen. Dies ereignet sich gar nicht selten in großen Haufen bröckeliger, klein zertheilter Steinkohle, wenn sie im Freyen liegen, und namentlich bey Kohlenhalben, die auf Schieferstücken, Kohlenklein, Gesteintrümmern zusammengelagert sind. Häufig sieht man solche Halben dampfen, da sie sehr warm sind, und im Innern findet man sie nicht selten glühend und in vollem Brande.

In den Steinkohlengruben entsteht der Brand vorzüglich dann, wenn viel Kohlenklein darinn angehäuft liegt, Einkünfte alter Bauten erfolgt sind, wobey in der zerkleinerten Kohle- und Schiefermasse die Zersetzung des Kieses immer rasch eintritt und voranschreitet, und eine große Hitze erzeugt wird. Ist auf irgend eine Weise frische Luft hinzu, so entzünden sich die Kohlen und es kann auf diese Weise ein sehr verderblicher Brand entstehen.

Der sogenannte brennende Berg bey Duttweiler, unsern Saarbrücken, ist ein Beyspiel eines solchen Kohlenbrandes. Der brennende Berg befindet sich im Hangenden von Steinkohlenschichten, und besteht vorzüglich aus einem kiesreichen Schieferthon, der mit einzelnen Kohlentrümmern wechselt. Vor beyläufig 120 Jahren soll sich die freywillige Selbstentzündung eines Hügel unter diesem Berge ereignet haben. Bis auf den heutigen Tag dauert der Brand an verschiedenen Stellen im Innern des Berges fort. Es dringen heiße Dämpfe heraus, und Sublimata setzen sich in Klüften an.

Als weitere Einmengungen kommen in der Steinkohle auch **alkspath**, **Gyps**, **Schwerspath**, seltener **Bleyglanz** und **Blende** vor. Die **Thone**, welche die Kohlen begleiten, sind oft außerordentlich plastisch, sehr rein und mitunter feuerfest (**Stourvedge-Thon**). Sie scheinen identisch mit dem feinen **Binderthattel** des Sandsteins zu seyn.

Was nun die **Kohlenflöße** noch besonders auszeichnet, das sind die sie begleitenden, zahlreichen und schönen **fossilen Pflanzen**. Die **Schiefer** schließen sie in großer Menge ein. Es ist bewunderungswürdig, wie gut oft selbst die zartesten Theile erhalten sind. Die Pflanzen liegen theils in einem verkohlten Zustande in den Schiefern, theils sind sie nur in **Abdrücken** vorhanden. Alle diese Reste sind dunkel gefärbt, meist schwarz. Die organische Faser der Pflanze ist in einen der Beschaffenheit der Steinkohle ähnlichen Zustand übergegangen.

Es sind **Landpflanzen**, wie oben schon angeführt worden ist, **Salamiten**, **Coniferen**, **Farn**, **Lycopodiaceen**, **Palmen**- und **Monocotyledonen**-Reste aus unbekannten Familien. In überwiegender Menge von Geschlechtern und Gattungen sind die **Farn** vorhanden. **Farn-Strünke**, **Sigillaria**, allein in 44 Gattungen! **Farn-Webel** sind am häufigsten. Man unterscheidet: **Cycloptoris**, **Stachel-Webel**, **Odonoptoris**, **Sahn-Webel**; **Pecoptoris**, **Kamm-Webel**; **Neuroptoris**, **Nerven-Webel**; **Sphaenoptoris**, **Keulen-Webel**; **Glossoptoris**, **Zungen-Webel**; **Schizoptoris**, **Schiff-Webel** und **Lonchoptoris**, **Lanzen-Webel**.

Von **Lycopodiaceen** findet man vorzüglich: **Lepidodendron**, **Schuppenbaum**; **Stigmaria**, **Karben-Strunk**, **Stämme** mit **Blattnarben**. Sodann **Blätter** allein: **Lepidophyllum**, **Schuppenblatt**; **Fruchtheite**: **Lepidostrobus**, **Schuppen-Sapfen**. Von **Palmen** kommen **Stämme** vor: **Fasciculites**, **Büschelholz** und **Blätter**; **Zugophyllites**, **Noeggerathia**; von **Monocotyledonen** unbekannter Familien: **Stenbergia**, **Poacites**, **Trigonocarpum**, **Muscocarpum**. Zu unbekannten Classen gehören: **Annularia**, mit wurstförmigen Blättern, **Asterophyllites** mit gegenständigen, in einer Ebene stehenden, Resten: und

Volkmannia mit ährenförmigem Blütenstand. Die Pflanzentheile liegen in der Regel im Schiefer, parallel den Schiefer und, nur selten kommen damit thierische Reste vor, vornehmlich Schalthiere des süßen Wassers, die zu dem Geschlechte *Un* gehören, und bisweilen auch von *Cypria* begleitet sind. Wardie in Schottland liegen in den Schiefen auch Fische der Geschlechter *Amblypterus*, *Palaeoniscus*, *Eurytus*, *Acanthodus*, *Pygopterus* und *Coprolithus* Begleitung einer Auster.

In Nieren und Ruauern, zum Theil auch in plattenförmigen Lagen, kommt öfters thoniger *Sphärosiderit* in der Steinkohle vor (Schlesien, Saarbrücken, vorzüglich in Süd-Wales), und darinn liegen auch dieselben Pflanzen, welche im Schiefer vorkommen, und in Saarbrücken *Acanthodus* und *Amblypterus*, und zu Coalbrook *Landinsecten*, *Curculioides* und *Limulus*. Hierin erscheinen die Stämme der Pflanzen durch dieses reichhaltige, sehr nützliche Eisenerz ganz und gar vererzt, wie namentlich die mehrsten der im Gebirgsgestein aufrechtstehenden *Sigillarien*stämme, die man im Saarbrücker Revier, auf der Gasse Wellesweiler bey dem Dorfe Wellesweiler, im Palaeontologischen Stollen angetroffen hat. Die Bergleute nennen sie auch rechten Stellung wegen Eisenmänner. In England hat man ähnliche, mehrere Fuß starke und bis 40 Fuß lange, einfache Stämme gefunden. Dieß erinnert an den versteinerten Holz von Portland, dessen oben, S. 688., in der Beschreibung die Bildverbildung erwähnt worden ist.

Im Sandstein selbst kommen höchst selten Pflanzenreste vor, und in der Kohlenmasse noch viel seltener.

Aus allen Kohlenflößen entwickelt sich Kohlenwasserstoffgas, welches die Luft verdichtet, die Respiration erschwert, und sehr erstickende Wirkungen äußert. Man nennt die mit Kohlenwasserstoffgas gemengte Luft, böse oder erstickende Wetter. Der Kohlenbergmann fürchtet aber am meisten die schlagenden Wetter, welche durch einen flammenden Körper, durch die Dämpfe der Grubenlauge, entzündet werden, und mit einer Explosion verbrennen, welche die zerstörendsten Wirkungen ausübt.

Sie kommen vorzüglich beim Abbau magerer Kohlen vor. Diese Kohlen geben nämlich Kohlenwasserstoffgas aus, welches in seiner Zusammensetzung der Sumpfluft gleich ist, und seines Vorkommens wegen, auch Grubengas heißt. Häuft sich dieses Gas an, und vermengt es sich mit der atmosphärischen Luft in einem Bause, so wird diese dadurch entzündlich und explosiv. Die Wirkungen einer solchen Explosion sind gewöhnlich von den verheerendsten Folgen. Die Bergleute werden verbrannt, zerschmettert, die Baue zerstört, indem sie in Folge der außerordentlichen Erschütterung einstürzen, und oft leiden noch die Gebäude über Tage, die über dem Schacht stehen, in dessen Nähe sich die Explosion ereignet hat. Humphry Davy hat zum Schutz gegen solche furchtbare Zerstörungen, dem Bergmann die Sicherheits-Lampe in die Hand gegeben, welche, wenn nicht allen, doch immerhin den mehrsten Unglücksfällen dieser Art vorbeugt.

Die Kohlenflöze liegen gewöhnlich mehrfach unter einander, durch Sandsteinschichten getrennt. Im Saarbrücker Kohlengebirge kennt man schon etliche 20, in Süd-Wales 23, bey Mons 115 bauwürdige Flöze. Nur in seltenen Fällen übersteigt die Mächtigkeit 6 Fuß. Auch in Ober- und Niederschlesien, an der Ruhr, ist die Zahl der Flöze groß und kommen diese mächtig vor. Das Blücherflöz zu Düttweiler in Saarbrücken hat 15 Fuß, das Dombrowaflöz bey Bendzin in Polen eine Mächtigkeit von 6 Fächern zu 80 Zoll rheinländisch, und in Stafordshire in England sind Flöze von 30—45 engl. Fuß Mächtigkeit im Abbau.

Eine Reihe von Kohlenflözen, die in einer Gegend unter einander vorkommen, nennt man eine Kohlenniederlage, ein Kohlenfeld (Coal field). Ein jedes Kohlenfeld hat seine Eigenthümlichkeiten, und da seine Schichten in beckenförmigen Vertiefungen liegen, seine besonderen abgeschlossenen Flöze. Benachbarte Kohlenbecken zeigen gewöhnlich mancherley Abweichungen.

Die Schichten aller Kohlenniederlagen sind mehr oder weniger aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, aufgerichtet, gekrümmt und oft gebrochen, im Bückzack gebogen, s. Fig. 23 u. 24, und auf mannfaltige Weise verschoben. Zahlreiche Spalten,

die der deutsche Bergmann Rücken, der englische *faults and dykes* heißt, durchsetzen die Schichten. Sie scheinen die Folge heftiger Erschütterungen und Stöße zu seyn, die jene erlitten und ihrerseits viel zur Dislocation beygetragen zu haben. In solche Spalten durchsetzen, da sind die Schichten an einer Seite derselben immer verschoben, oft sehr bedeutend gesenkt. Es schneiden manchmal die Flöße geradezu ab. So schneidet ein Rücken im Wormrevier, der sogenannte Feldbiß, sämmtliche Flöße dieses interessanten Kohlenbeckens, gegen Osten glatt ab. Der abgeschnittene Theil scheint sich im Hangenden des Rückens in die Tiefe gesenkt zu haben. Vielleicht findet man ihn einst dort wieder auf. Die Niveau-Veränderungen, welche unter solchen Umständen eingetreten sind, übertreffen oft bey weitem unser Dasein. Ein Rücken, welcher die Eschweiler Kollenniederlage durchsetzt (das Sandgewand), hat die Schichten auf der Ostseite wenigstens um 100 Fächer in die Tiefe gedrückt. Conybeare gibt an, daß man im Kohlenbecken von Durham durch Rücken bewirkte Niveauveränderungen sehe, die nahe an Tausend Fuß betragen! Diese Spalten sind theils mit Thon, Letten oder einer anderen zersehten Gesteinsmasse, theils mit festem Gesteine, mit Grünslein, Basalt ausgefüllt.

Es durchsetzen auch Erzgänge diese obere Lage des Kohlengebirges. Bey Erettnich in Saarbrücken setzt ein reicher Braunsteingang darinn auf, an der Ruhr sind Bleyleitgänge mit Blende, Schwefelkies und Schwerspath darinn, und in Zweibrücken Gänge mit Quecksilbererzen. Die Wichtigkeit dieser Lage ist nicht genau ausgemittelt, aber immerhin sehr bedeutend.

b. Ein flößleerer Sandstein, mit Schiefer und Conglomerat (*Millstone grit and shale*) liegt unmittelbar unter dem eigentlichen Kohlengebilde. Das Gestein ist im Allgemeinen härter als der wahre Kohlen Sandstein, oft conglomeratisch und in vielfachem Wechsel mit Schieferthonlagen, die zumal nach unten häufig, und öfters vorherrschend, auftreten, wo man dann auch schwache Kohlenflöße von geringer Qualität dazwischen liegen sieht und einzelne Kalksteinlagen.

Die Schieferlagen enthalten die Pflanzenreste der obern

Lage (a): in den Sandsteinbänken kommen ebenfalls Stigmarien-Stämme in aufrechter Stellung vor, und bey Goldstream in Derbyshire hat man darinn eine große Zahl fossiler Coniferen-Stämme gefunden. Die Kalksteine schließen die Petrefacten der tieferen Kalklage ein.

Die Schichtung ist deutlich und hat dieselben Verrückungen erlitten, wie der kohlenführende Sandstein. Erzgänge, welche im tiefer liegenden Kalksteine vorkommen, sehen mehrfältig in den Millstone grit (Mühlensandstein) herauf. In England erreicht er eine Mächtigkeit von 600—700 Fuß.

c. Auf den flözleeren Sandstein folgt der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, ein dichter, deutlich, aber dickgeschichteter Kalkstein, von vorherrschend blaugrauer Farbe, der in England ansehnliche Bergzüge zusammensetzt, und deswegen auch Bergkalk, Mountain limestone heißt, auch Encrinal limestone, Encrinitenkalk, da er stellenweise eine außerordentliche Menge von Crinoideen-Resten einschließt. Mitunter ist er etwas körnig, und so hart und gleichförmig, daß er eine schöne Politur annimmt. In der dunkeln Grundmasse treten dann gar schön die eingeschlossenen Versteinerungen hervor, von Schalthieren, Crinoideen, Corallen, da sie gewöhnlich eine weiße Farbe haben und spärlich sind. Die unteren Lagen sind gewöhnlich schieferig, und ein etwas weicher, thoniger Kalkschiefer (sear limestone) hat meistens die Oberhand.

Diese Kalkbildung ist in England, im südwestlichen Schottland und in einem großen Theil von Irland verbreitet. Sie setzt namentlich die malcrischen Felsenparthien von Derbyshire zusammen, und erreicht eine Mächtigkeit von reichlich 1200 Fuß. Dieser Kalk ist auch durch seine organischen Reste ausgezeichnet. Von Wirbelthieren findet man vorzüglich Fische, aus den Geschlechtern Acanthodes, Amplypterus, Palaeoniscus, Euryotus u. e. a., sodann selbst Reptilienreste (Edinburg). Von Crustaceen erscheinen einige Trilobiten, Asaphus Dalmanni, welche im Kohlengebirge überhaupt zum erstenmal erscheinen, Cypris und Eurypterus, die im süßen Wasser lebten, sind in Kalkschichten unter dem Mid Lothian coal field (Edinburg, Kirkton) in

so daß man ihn zu Dachungen benützen kann (Tilostones). Die obere Lage enthält keine Petrefacten. In den mittleren Schichten kommt ein Fischgeschlecht vor, *Kophalaspis*, das, sonderbar genug, den Habitus der Trilobiten hat, welche in den ältern Gebirgschichten vor den Fischen auftreten. Die untere Lage schließt noch Reste von anderen Fischen ein, von *Diptorus* und *Gyrolopis*, und große Flossenstacheln (Ichthyodornulischen) von Fischen aus der Ordnung der Macroiden. Von Schakstern hat man einzelne Exemplare von *Avicula* und *Pileopsis* gefunden. Die drey Lagen haben zusammen genommen eine Mächtigkeit von mehreren Tausend Fuß, und erheben sich in gewaltigen Bergen bis zu 3000 Fuß über Meer.

Der Old red sandstone, so mächtig er in Südengland und Wales entwickelt ist, tritt in Nordengland, nördlich von der Tyne, und in Schottland, wie der Kohlenkalk an der Tyne sehr zurück, und fehlt öfters ganz, so daß das Kohlengebirge auf seiner Kohlenkalk-Unterlage unmittelbar auf den älteren Schichten des Uebergangsgebirges ruht.

Die vier Glieder des Kohlengebirges, welche in Südengland und Wales so vollständig und gut characterisirt erscheinen, sind also im Norden des Landes, so wie in Schottland, so regelmäßig nicht entwickelt, und wir sehen hier den Kohlenkalk sich mit den höhern, kohlenführenden Sandsteinschichten vereinigen, und bildet den Old red sandstone im Wechsel mit Schieferthon und eigenlichem Kohlen sandstein.

Auf dem Continente sind drey Glieder, der Kohlen sandstein mit den Steinkohlen, der silbhere Sandstein und der Kohlenkalk, an den mehrsten Orten entwickelt, wo das Kohlengebirge vorkommt. Der Old red Sandstone fehlt aber wohl durchgehends, wenn man dazu nicht etwa die Conglomerate rechnen will, welche in der Maas-Gegend unter dem Kohlenkalk liegen, und den rothen Sandstein von Litry im Salvados. In Oberschlesien ruhen die Kohlen sandsteinschichten unmittelbar auf Grauwacke, und es fehlt hier also der Kohlenkalk und der Old red.

Dieser tritt in England, nächst dem Kohlenkalk, in ansehnlichen Bergmassen auf, so daß diese beiden Glieder auch durch die äußeren Formen sich wesentlich von den kohlenführenden

Schichten unterscheiden, welche gemeinlich niedrige, gerundete Berge und Hügel zusammensetzen. Die Höhen des Kohlenkalks sind häufig unangebaut und mit Feldkraut bewachsen, während an den Abhängen Trümmerhalben liegen, und auch der Bergfuß gewöhnlich steinig und der Cultur ungünstig ist. Auf den hohen Rücken des Old red liegen häufig Torfmoore, und wo die sandigen und conglomeratischen Schichten vorherrschen, da ist der Boden mager und unfruchtbar.

Die Hauptkohlenniederlagen Englands befinden sich in Somersetshire, Gloucestershire, Nord- und Süd-Wales, Dublin, Shropshire, Leicestershire, Lancashire, Nottingham, Derbyshire, Yorkshire, Cumberland, Durham, Newcastle, und es sind ferner die Kohlenbecken von Forth und Clyde, und die im innern Irlands wichtig.

Das Becken von Süd-Wales enthält 23 baumwürdige Flöze, die zusammen eine Mächtigkeit von 95 Fuß haben, so daß auf einer Quadratmeile etwa 64 Millionen engl. Tonnen gewonnen werden können. Mit den Steinkohlen kommen hier zugleich beynahe unerschöpfliche Quantitäten vorzüglicher Eisensteine (thonige Sphärosiderite, clay-ironstones) vor, welche von etwa 114 Hochofen verschmolzen werden, die jährlich über 280,000 Tonnen *) Eisen erzeugen! Kein Wunder, daß die Hüttenbesitzer von Süd-Wales mit ihrem Product die Märkte am Oberrhein mit Vortheil versehen können.

Diesseits des Canals liegen weder so viele, noch so reichhaltige Kohlenniederlagen. Ein Hauptzug in langer Linie einzeln auf einander folgender Kohlenbecken geht von Boulagne am Meer über Valenciennes, Maas, Charleroi, Lüttich und Aachen. Abgetrennt davon liegen die Kohlenniederlagen an der Worm und bey Eschweiler, und im Innern von Frankreich die Becken im Arveyan, Saône und Loir, Gasc, Ardore u. c. a.

In Westphalen ist das Kohlengebirge mächtig und steinkohlenreich an der Ruhr entwickelt; im Süden des Hundsrückens, zw-

*) Eine englische Tonne hält 20 engl. Centner; 1 engl. Centner ist = 50,78246 Kilogrammen.

sehen der Rahr und der Saar, liegt das pfälzische und namentlich das wichtige und reiche Saarbrücker Kohlengebirge. Im Erzgebirge tritt es, vorzüglich bey Zwickau und im Plauenschen Grunde, mit guten Kohlenflöhen auf. Ferner ist es mächtig in Niederschlesien entwickelt, und in Polen. In Nordamerika befinden sich Steinkohlen-Niederlagen in Massachusetts, Pennsylvanien, Connecticut, und in neuerer Zeit fand man am Potomac, nahe bey Westernport, an einer verticalen Felsenwand, sechs bauwürdige Flöhe, worunter eines von 18 Fuß. Auch in Spanien, in China, in Bantienensland kennt man das Vorkommen des Steinkohlengebirges.

Bildung des Steinkohlengebirges und der Steinkohlen.

Wir sehen das Steinkohlengebirge allenthalben in Boh abgelagert, und viele derselben besitzen eine sehr große Tiefe. Russet gibt uns einen Begriff von einer solchen Tiefe. Er hat die Stärke des Kohlengebirges im Deanforst an der Seem in Süd-Wales, gemessen, und dort eine Gesamtmächtigkeit der ganzen Gruppe von 8700 Fuß gefunden. Davon gehören 3000 Fuß den kohlenführenden Schichten an, 700 dem Kohlenkalkstein, das übrige dem Old red.

Zuerst erfolge nun der Absatz dieses Sliebes, das aus vorherrschenden Sandsteinschichten besteht, und somit eine mechanische Entstehung aus zerriebenen Theilen älterer zerstreuter Gesteine hat, welche durch Wasser fortbewegt, und in ein Becken abgeseiht worden sind. Da nun Conglomerate in diesem untersten Theile des Kohlengebirges seltener vorkommen, so kann man annehmen, daß die fortzuschaffende Kraft des Wassers, oder seine Geschwindigkeit, in der Regel nicht so groß gewesen ist, daß größere Stücke, Gerölle beygeführt wurden. Nur die untere und mittlere Lage enthält bestimmbare Versteinerungen von Meerthieren. Nach oben liegen blageschichtete Sandsteine und Conglomerate, und das Wasser scheint, mit Sand und Geröllen beladen, sich in einer solchen Bewegung befunden zu haben, daß dabey die thierischen Reste sich nicht erhalten konnten. Lange muß dieser Absatz eingedauert haben, um so mächtige Lagen abzugeben. Auf die

andigen Schichten des Old red sandstone sehen wir eine kalte Bildung folgen. Alles muß da in der Beschaffenheit des Gewässers anders gewesen seyn. Nämlich reine Kalksteinschichten folgen nun, die eine große Menge von Meeresthieren einschließen, und so wohl erhalten, daß wir annehmen müssen, die Thiere haben an dem Orte gelebt, und seyen an der Stelle geborben, wo wir sie jetzt finden. Darunter sind aber auch Schichten, welche Süßwasserthiere und Landpflanzen einschließen, und daraus folgt, daß die Schichten sich am Ufer des Meeres, oder in der Nähe des Landes, gebildet haben. Immerhin erscheint aber der Kohlenkalk als eine mächtige Meeressbildung, die lange Zeit fortgedauert haben und in einem tiefen Meeresbecken vor sich gegangen seyn muß.

Auf die Periode seines Abfases folgt nun diejenige der oberen Sandsteine, Schieferthone und der Kohlenflöze. Übermal eine große Veränderung. Eine außerordentliche Masse von Landpflanzen wurde mit Sand und Schlamm in das Boden geführt, auf eine große Fläche verbreitet und in einzelnen starken Bagen aufgedrückt, welche sich in Kohle umwandelten. Pflanzenlagen, Schlamm, jetzt Schieferthon, Sand, jetzt Sandstein, haben sich in vielfacher Wiederholung abgesetzt. Die Kohlenflöze, wie die Zwischenschichten von Sandstein und Schiefer, sind von sehr verschiedener Mächtigkeit, und beweisen dadurch, wie verschieden und unregelmäßig die Kräfte gewirkt haben, welche sie hervorbrachten. Kohlenflöze von einigen Zollen bis zu 50 Fuß wurden durch Anhäufungen derselben Pflanzen gebildet. Welche Massen gehören dazu, um eine Kohlenlage von solcher Mächtigkeit zu erzeugen! Die Schwere darüber abgelagerter Sandsteine hat sie zusammengebrückt, und selbst ganz große Stämme wurden flach gedrückt. Man findet solche öfters im westphälischen Kohlengebirge.

Der Umstand, daß man die Steinkohlen jederzeit von Pflanzenresten begleitet, und solche selbst deutlich erkennbar in den Kohlenlagen findet, hat zu der Annahme geführt, daß sie aus Anhäufungen von Pflanzen entstanden sind. Dieß hat sich auch bestätigt, denn man hat bey microscopischen Untersuchungen der Steinkohlen die organische Structur der Pflanzen gesehen, und

Göppert meynt, daß es nur an der Unvollkommenheit der Vorbereitung der zu untersuchenden Stücker liege, wenn man die Structur nicht gewahr werde.

Die Reste von Meeresthieren (Fische und Schalthiere, welche man theils in den Kohlen selbst, theils in den darin liegenden Eisensteinen vielfältig antrifft, deuten unzweifelhaft an, daß die Kohlenschichten in einem von tiefem Meerwasser erfüllten Becken abgesetzt worden sind; andererseits beweisen die Schalthiere (Unio, Planorbis) und Cernuiceen (Cypria) daß sich süßes Wasser in das Becken ergossen hat, und die außerordentliche Menge von Landpflanzen, welche die Schiefer tragen, so wie endlich die Insecten, welche in der Kohlenbildung gefunden worden sind, zeigen unverkennbar die Nähe des Landes an. Aus all dem folgt nun, daß das Steinkohlengebirge in tiefe Buchten des Meeres abgelagert worden, und die Steinkohle aus Pflanzen entstanden sind, welche vom Lande her, durch den Fluß, sammt Sand- und Schlamm-Massen, in solche Buchten fuhr, und dort mit Gebirgsschutt überdeckt worden sind.

Aus einer Vergleichung der chemischen Constitution der Holzfaser und der Steinkohlensubstanz aber ergibt sich, daß die Faser, unter Wasser- und Kohlensäure-Bildung, in Steinkohle übergeht.

Die fossile Flora des Steinkohlengebirges zeigt eine solche Entwicklung und ein solches Vorwalten der Farrn, wie man es heut zu Tage nur auf Inseln der Tropenländer findet, die klein und weit entfernt von Continenten im Ocean liegen, wie am Ascension und St. Helena. Die isolierte Lage solcher Inseln, so wie ihre Fortliegen in einer Reihe, stimmt gut mit der Lage der Kohlenbecken überein, und so führen die pflanzengeographischen wie die zoologischen Betrachtungen zu demselben Resultat, nämlich zur Zeit der Bildung des Steinkohlengebirges nur einzelne Inseln oder einige Archipels solcher in dem umgebenen Ocean vorhanden gewesen, und die kohlenführenden Schichten am Fuße derselben, in Buchten am Meere, abgelagert worden sind.

Die vielen Kohlenschichten, die man über einander liegen sieht, beweisen die vielfache Wiederkehr einer Catastrophe, welche die Landpflanzen traf. Die heutigen Schwellungen des Meeres

5. 602 u. 603) können und einigermassen den Vorgang beschreiben, der dabei stattfand.

3. Silurisches Gebirge.

pn. Jüngeres Uebergangs-, Schiefer- oder Grauwackengebirge; Terrala anthraxifère, étage inférieur.

Das Steinkohlengebirge ruht, bey vollständiger Entwicklung der Theile der großen Reihe geschichteter Bildungen, auf dem Uebergangs-Schiefergebirge. In früherer Zeit faßte man die zahlreichen Schichten desselben in eine einzige große Gruppe zusammen, ohne die Anordnung seiner Glieder und die Verschiedenheiten der Petrefacten, welche sie einschließen, genauer ins Auge zu fassen. In neuester Zeit haben aber gründliche Untersuchungen sowohl die Aufeinanderfolge der Glieder, als die Verfeinerungen derselben besser kennen gelehrt, und man theilt demzufolge das, was nach der Werner'schen Schule Uebergangsgebirge hieß, die Schichten zwischen dem Kohlengebirge und dem schieferigen Grundgebirge, jetzt in zwey große Abtheilungen.

Die obere Abtheilung, welche wir zunächst betrachten, nennt Murchison Silurisches Gebirge, da er sie vorzüglich in dem Landstrich entwickelt fand, welches das alte Königreich der Siluren bildete, jenes wackeren Celtischen Stammes, der den Römischen Legionen unter den Kaisern Claudius und Nero so tapferen Widerstand leistete.

Die wichtigsten Gesteine sind dichte und schieferige Sandsteine, kieselige und kalkige Conglomerate, dichte und schieferige Kalksteine, Thonschiefer, Grauwacke und Quarzfels. Kiesel-schiefer, Wack-schiefer, Brandschiefer, Alaunschiefer, Dolomit, Zeichenschiefer, erscheinen untergeordnet. Die Schichtung ist durchaus deutlich, und die Schichtenstellung höchst verschieden. Aufgerichtete Schichten sind Regel, gebogene häufig, horizontale Seltenheit.

Die Flora des Silurischen Gebirges ist arm. Außer einigen Fucoiden und Calamiten kommen keine anderen erkennbaren Pflanzenreste vor. Die Schalthiere treten dagegen in großer Menge auf, und die Orthoceratiten und Trilobiten, so wie Goniatiten, meist mit ungetheiltem Dorsal, sind

Kalkbildung liegen, und die Metallausbeute ist sehr groß. Es werden jährlich allein an Zink im preussisch-schlesischen Oberbergamtsdistrikt über 200,000 Centner produziert, und über 800,000 Centner Roheisen.

In der Kette der Alpen hat man die Trias mit Bestimmtheit noch nicht nachgewiesen. Der Kalk von St. Triphon in den westlichen, und von St. Cassian in den östlichen Alpen, dürfte nach seinen Petrefacten zum Muschelkalk gehören. Der Bunte Sandstein ist vielleicht durch den rothen Sandstein der östlichen Alpen repräsentiert. In den Pyrenäen tritt dieser Sandstein mächtig auf, ebenso im Innern von Spanien, namentlich in den Hochebenen von Neu- und Alt-Castilien, und hier, wie es scheint, Keuper und bunter Sandstein mit einander vereinigt, wie in England, ohne die Muschelkalk-Zwischenlage, grob und fackelnd.

In England ist die Bildung des New red mark and Sandstone außerordentlich verbreitet. Nördlich von Bristol zieht sie sich über Birmingham, Nottingham, York bis zur Mündung des Aves; nordwestlich aberdeckt sie das Land zwischen Derby und Schrewsbury, und bis Manchester und Liverpool.

In Nord-America scheint der New red Sandstone das Thal von Connecticut beschränkt zu seyn. Dasselbe hat man auf Sandsteinplatten Spuren von Vogeltritten gefunden, die man Ornithichnites heißt. S. Fig. 22. Sie röhren von verschiedenen Vögeln her, die aber alle Sumpfvögel, langfüßig gewesen und schreitweise gegangen sind.

Im Norden tritt ein Glied der Trias in Schöonen auf, und in mehreren Gegenden Rußlands.

Wir haben gesehen, daß in der Trias an vielen Orten beträchtliche Steinsalzmassen oder Salzquellen vorkommen. Dieses Salzreichthums wegen faßt man die vier Gruppen auch unter dem Namen Salzgebirge zusammen.

Nach der altblichen Einteilung zählt man zu dem Salzgebirge auch noch das Kupferschiefergebirge, und heißt es, mit Einschluß der Trias, älteres Salzgebirge.

Seine organischen Reste sind aber wesentlich verschieden von denen der Trias, so wie von den Petrefacten aller jüngeren

Bildungen, dagegen stimmen sie mit denjenigen überein, die man im Uebergangsgebirge findet, und welche die Glieder desselben charakterisiren. Unbezweifelt sind die Petrefactionen wahre historische Documente, welche die Perioden der Schöpfung bezeichnen. Im Kupferschiefergebirge finden wir aber ganz und gar die organischen Typen des Uebergangsgebirges, und es schließt sich diesem somit innig an, und gehöret zu seiner Bildungs-Periode.

Uebergangsgebirge:

Syn. *Terrains intermédiaires.*

Unter dem geschichteten Flözgebirge folgt eine Reihe von Gesteinsbildungen, welche theils mechanischgebildete, petrefactionsführende, theils durch chemische Action erzeugte, crystallinische, versteinungsleere Schichten umfaßt, ihre Stellung zwischen dem petrefactionreichen Flözgebirge und dem petrefactionleeren Grundgebirge einnimmt, gleichsam die Verbindung, den Uebergang zwischen diesen vermittelt, und deshalb Uebergangsgebirge genannt wird. Dieser Name ist von Werner einer beschränkten Reihe, namentlich den untersten Gliedern, gegeben worden. Die zoologischen Charactere derselben wurden später aber auch noch in andern Bildungen aufgefunden, die man nunmehr alle mit den tiefften unter demselben Namen zusammenfaßt.

Außer vielen Polypen und einigen Stilkastrien sind besonders charakteristisch für diese große Schichtenreihe, die Mollusken- und Crustaceen-Reste. Von jenen die Geschlechter *Producta*, *Strophomena*, (*Leptaena*), *Caleoola*, *Strygocephalus*, *Trigonotreta* (*Spirifer*, *Deltthyris*), mit vielen Gattungen, *Euomphalus*, *Bellerophon*, *Orthoceras*, *Lituites* *Goniatis*; von den Crustaceen die Trilobiten: *Calymene*, *Asaphus*.

Von Fischen hat man verhältnismäßig am meisten Reste gefunden, und zwar vorzüglich die Geschlechter *Palaeoniscus*, *Osteolepis*, *Platysomus*, *Amblypterus*, *Acanthodes*, *Cotopterus*, *Pygopterus*, *Acrolepis*, und auch noch in

tiefen Schichten das Geschlecht *Kophalaspis*, die alle anschließend dem Uebergangsgebirge angehören. Von Reptilien kommt außer dem genauer bestimmten Geschlechte *Protosaurus* Weniges in undeutlichen Resten vor.

Die Vegetation sehen wir in den unteren Schichten dieser Reihe auf der ersten Stufe der Entwicklung. Es sind die ersten Gewächse der Erde, welche auf den, aus den Gewässern aufgestiegenen, vereinzeltten Felsmassen wuchsen, riesenhafte *Farrn*, *Equisetaceen* und *Lycopodiaceen*, welche heutzutage nur auf Inseln, an Küstengegenden und in feuchten Wäldern der Tropenländer wachsen; Baumstämme, welche von Coniferen herzustammen scheinen, einige Palmen und einige *Fucoiden*.

Die große und mächtige Schichtenreihe zerfällt in vier Gruppen, diese sind:

1) Das Kupferschiefergebirge; 2) das Steinkohlengebirge; 3) das Silurische Gebirge; 4) das Cambrische Gebirge.

1. Kupferschiefer-Gebirge.

Syn. Bocksteingebirge, Terrain pécnon.

In einem großen Theile von Deutschland liegt unter dem bunten Sandstein eine Reihe kalkiger Schichten, und eine große Sandstein- und Conglomerat-Bildung, zwischen welchen sich ein kupfererzführender Mergelschiefer befindet, den der Bergmann Kupferschiefer heißt, und dessen Namen auf die ganze Gruppe übertragen worden ist. Eine Abänderung der hier vorkommenden Kalksteine nennt der thüringische und sächsische Bergmann Bockstein, und davon rührt der Name Bocksteingebirge her, welchen Manche dieser Gruppe geben.

a. Unmittelbar unter dem Bunten Sandstein, nur durch eine Lettenschicht davon geschieden, liegt ein bräunlich-schwarzer oder grauer Stinkkalk, den man Stinkstein heißt wenn er dicht, Raupstein wenn er lödlig, Rauchwacke wenn er cavernös ist. Dieser Stinkkalk, mit meist gebogenen und zerklüfteten Schichten, mit einer variablen Mächtigkeit von einigen Fuß bis über 90, erscheint bisweilen als Trümmergestein, oder

ist durch ein bituminöses Thonlag repräsentiert, in welchem scheitersförmige Stücke davon liegen.

Darunter folgen Lagen einer sandartigen Mergelerde, oder eines pulverartigen Strasskalks (Mische), Massen von Gyps und Bänke von körnigem Dolomit, welche aber keine bestimmte Lagerungsfolge unter sich einhalten.

Die Mische, im Durchschnitt 6—20 Fuß mächtig, umschließt meistens Druckstücke der kalkigen Schichten, liegt gewöhnlich unter dem Strasskalk und trennt diesen vom Raupkalk. Dieser, ein körniger Dolomit von heller, selten bräunlicher Farbe, ist häufig porös und blasig, rauh anzufühlen, und darauf bezieht sich der Name, den ihm Bergleute gegeben haben. Er ist bisweilen zerreiblich, sandig, manchmal aber auch sehr fest, und mitunter voll Blasen und kleiner Höhlungen (Höhlenkalk), aus welchen kohlensaures Gas ausströmt. Einzelne Lagen sind mit Eisenoryd oder Eisenrost imprägniert und heißen Eisenkalk. Die Schichtung ist gewöhnlich unendlich, und das Gestein von vielen, und zumal von starken vertikalen Klüften durchsetzt. Als charakteristische Verfeinerung tritt in diesen Bänken *Strophomena aculeata* auf (*Productus aculeatus*).

Der Gyps, von weißer oder grauer Farbe, ist meistens körnig und durch Höhlen ausgezeichnet, daher der Namen Höhlengyps, Schlotengyps. Diese Höhlen, die in großen Höhlen weitenweit unter der Erde fortziehen (Wimmelburg bei Giesleben), zum Theil mit Wasser gefüllt sind, stehen öfters durch Spalten mit der Oberfläche in Verbindung, schließen häufig eine irrespirable, mit Kohlensäure gemengte Luft ein, und in ihrem Gefolge erscheinen zahlreiche Erdfälle.

Er bildet theils Stücke, theils stöckartige Lagen, wechselt verschiedentlich mit den kalkigen Gesteinen, und ist in deren Nähe damit verunreinigt, oft zellig und blasig.

Diesen Gyps begleitet öfters Anhydrit und bisweilen auch Steinsalz. Aus dieser Gypsbildung scheint die Salzquelle der Saline Dürrenberg zu kommen. In der neuesten Zeit hat man zu Artern, nahe bei der Saline, 986 Fuß tief unter der Oberfläche, 620 Fuß unter dem Meerespiegel, nach einer Arbeit von 7 Jahren, glücklich Steinsalz angebohrt.

Unter erscheint die Gypsablagerung sehr mächtig, nördl. B. am Südwestrande des Harzes, wo sie als ein starkes, hohes Wall, dessen weißer, feisiger Abfall dem Gebirge zugekehrt sind, von West- über bis nahe an Gangerhäusern ununterbrochen fortgeht.

Unter dem gypsführenden Theile des Kupferschiefergebirges folgt dann das Gebilde des sogenannten Bechsteins und des Kupferschiefers. Der Bechstein, welcher zunächst unter dem Gypse liegt, ist ein grauer oder grünlichgelber, duntel- und dünn- geschichteter, meist thoniger Kalkstein, der in einigen Gegenden durch die oben genannte *Strophomena aculeata* charakterisirt ist, und überdies *Terebratula lacunosus* und *Orthis* enthält. Die Mächtigkeit variiert von einigen Klüften bis zu 100 Fuß. Dieser Kalk ist bisweilen blasig, mit stängelig, und schließt Crystalle von Kalkspath, Gyps, Quarz ein, auch Eisen- oder Kupfererze.

Auf diesen Bechstein folgt nun der eigentliche Kupferschiefer, ein schwammig und bituminöses, dünnschieferiges Mergelgebilde, mit eingesprengten Kupfererzen. Es sind jedoch nur wenige Schichten desselben metallführend; die zusammen kaum eine Mächtigkeit von 2—3 Fuß besitzen, aber so regelmäßig und gleichförmig auftreten, daß sie darin ihres Gleichen nicht haben. Die ganze Schieferbildung ist durchschnittlich 4—8 Fuß mächtig. Die metallführenden Schichten sind im Mansfeldischen der Gegenstand eines sehr wichtigen Bergbaus. Diese dunkeln Mergelschiefer schließen zahlreiche Gänge ein, welche dem Geschlechte *Palaeoniscus* angehören, und darin hat man auch die Reste des *Protorosaurus* gefunden.

Nach unten zu ist der Kupferschiefer in Mansfeld und am Vorharze mit einem grauen, kiesigen Conglomerate verbunden, welches man Weißliegendes heißt, mit Bezug auf seine Farbe und auf seine Stellung unter den erzführenden Schichten. Dazwischen befinden sich mehrfältig mergelige, schieferige, sandige Straten mit Kupfererzen, den sogenannten Ganderzen.

Die obere Abtheilung, worin der Raupkalk liegt, ist stellenweise durch reiche Eisenerz-Lagerstätten ausgezeichnet. Brauneisenstein in verschiedenen Abänderungen, oft mit

Eisenspath und Brauneisenerze gemengt, auch mit Schwefelspath, bildet in den oberen Kalkschichten theils Rester, theils zusammenhängende Blöcke, oder die Mase sind hiesig mit der Kalkmasse vermischt, sehen damit ausgeblühte Blöcke aus. Sicher gehören die Eisenerze bei Wiber, Analfelsb, Ramsdorf, die mächtigen Eisensteinablagerungen bei Schmalzthal, die Lagerstätten des Stahlberges und der Wammel, und mehrere andere Eisenvorkommnisse am Thuringerwald. Bisweilen kommen auch Kupfererze mit den Eisenspathen vor.

Sehr oft durchsehen Spalten (Rücken) diese Schichtenreihe, die im Mansfeldischen immer auch das weisse Conglomerat darunter durchschneiden, und sehr oft Verschiebungen, Abweichungen desjenigen Schichtentheils verursacht haben, der sich im Hangenden der Spalten befindet. Auch erzführende Gänge, auf denen Eisenspath, Bleiglanz, Kupfererze, Spiesglaskobalt u. d. gl. vorkommen, sowie Gänge, die von Schwefelspath und Quarz ausgefüllt sind, durchsehen diese Schichten öfters (Wibau, Ramsdorf, Stadtbergen).

b. Auf die Reihe der kalkigen Schichten folgt eine große Conglomerat- und Sandsteinbildung von vorherrschend rother Farbe, die man deshalb, und weil sie unter den metallhaltigen Mergelschiefen liegt, Rothliegendes heißt, auch Thonliegendes nennt, da sie unmittelbar unter dem Kupferschiefer taub oder todt, das ist, erzeer ist. Wir haben oben schon angeführt, daß auf die dunkeln bituminösen Schiefer zunächst ein weisses Conglomerat folgt. An den dabey angeführten Orten gehört es noch dem Kupferschiefer an, da es seine Erze führt (Sandarze), und seine Rücken theilt. Das weisse und graue Conglomerat dagegen, was bey Riegelshorf, zu Wiber, unter dem Mergelschiefer liegt, gehört schon dem Rothliegenden an, und bildet dessen oberste Lage. Es fehlt indessen an vielen Orten, namentlich wo die kalkigen Glieder nicht entwickelt sind.

Im Allgemeinen treten als herrschende Gesteine in der Bildung des Rothliegenden Thonsandstein-Conglomerat, und das gewöhnlich hindemittelreicher, rasser Thonsandstein, auf, zwischen welchen öfters rothe, mehr oder weniger sandige Thonsanden

vorkommen, die manchmal völlig mit dem Schieferletten des Bunten Sandsteins übereinstimmen.

Es ist eine Eigenthümlichkeit des Rothliegenden, daß es in der Regel nur an den Rändern crystallinischer Gebirge auftritt, oder in den Umgebungen von Porphyren, und daß es meist aus Trümmern dieser, überhaupt aus Bruchstücken in der Nähe befindlicher älterer Gesteine zusammengesetzt ist.

In den Schichten dieser Bildung kommen häufig verkieselte Hölzer vor, Stämme, die theils Coniferen, theils Farn und Calamiten angehören, den Geschlechtern *Pinites*, *Pouco*, *Tubicaulis*, *Psaronius*, *Porosus* (Röhrenholz, Staavenholz, Porenholz), *Modullosa*, *Calamites* und *Calamitos* (Markholz, Calamitenholz und Calamit). Auch findet sich in einem grauen Sandstein bey Frankenberg in Hessen ein Kupressit, Blätterzweige und Früchte einer Pflanze, die zu den Cypressen gehört. Die organische Substanz ist bei dieser Versteinerung durch Kupfererz (Kupferglanz) ersetzt. Man kennt dieselbe unter dem Namen Frankenger Korndhren. Die Petrefactologen nennen sie *Cupressites Ullmanni*.

An einigen Orten liegen Kalkstein- und Mergelschöte zwischen den Sandstein- und Conglomeratbänken (Saalkreis, Niederschlesien), und in solchen hat man bey Scharfenack und Ruppersdorf in Schlesien fossile Fische, den *Palaeoniscus vratislaviensis* gefunden. Mitunter erscheinen auch Bänke von Dolomit. An manchen Stellen treten in der großen Schichtenreihe des Rothliegenden auch verschiedene andere Trümmergesteine auf, Granit- und Kieselconglomerate, Porphyr-Brecien u.s.w., die aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Mächtigkeit, dieser im Allgemeinen deutlich und regelmäßig geschichteten, Bildung geht von einigen hundert Fuß bis über 3000 Fuß (Harz).

In mehreren Gegenden (Böhmen, Niederschlesien, Wettin, Ranebach, Opparode) liegt eine Steinkohlenbildung im Rothliegenden. Sie besteht aus Schichten von grauem Sandstein und Conglomerat, aus Lagen von Schieferthon und aus Steinkohlenflöhen, die eine

Wichtigkeit von einigen Bollen, bis zu 3 Lachtern besitzen, und Gegenstand eines höchst wichtigen Bergbaus sind. In dieser Kohlenbildung kommen ebenfalls verkieselte Hölzer vor, in den Schieferthonlagen derselben eine Menge fossiler Pflanzen, namentlich Farren, Equisetaceen, Coniferen, Lycopodiaceen, palmen- und lilienartige Gewächse, welche sich alle auch in der älteren Steinkohlenbildung finden.

Auch erzführende Gänge kommen mehrfältig im Todtliegenden vor. Namentlich sind Brauneisenstein, Spatheisen, Brauneisenstein, Kupfer- und Kobalterze darin an vielen Orten gefunden worden (Schwarzwald, Wasgau, Biber, Riegelsdorf).

Salzquellen treten daraus in Schlessien hervor und zu Giebichenstein bei Halle; Sauerquellen zu Charlottenbrunn, Salzbrunn und Altwasser in Schlessien.

Das Kupferschiefergebirge tritt in schöner Entwicklung mit seinen beiden Abtheilungen in Thüringen und im Mansfeldischen, als Typus der Bildung auf. Man sieht es ferner am südlichen Harzrand und in der Gegend von Halle, und am nördlichen Abfall des Riesengebirges unfern Rognitz. Die obere kalkige Abtheilung kennt man namentlich bey Riegelsdorf in Hessen, Biber im Hanauischen, am Ost-Rande des rheinischen Schiefergebirges, am Abfall des voigtländischen Schiefergebirges zwischen der Elbe und der Elster. Südlich vom Main hat man sie noch nirgends gefunden.

Am Schwarzwalde und in den Vogesen fehlt die kalkige Zwischenbildung zwischen dem Bunten Sandstein und dem Todtliegenden vollkommen, und beide Schichtenreihen fallen in eine einzige große Sandstein- und Conglomeratbildung zusammen. Das Gleiche scheint auch in Spanien der Fall zu seyn. In Frankreich sieht man die obere Abtheilung des Kupferschiefergebirges in geringer Entwicklung bei Autun.

In England dagegen ist die Gruppe unter dem Namen Magnesian limestone wohlbekannt. Sie besteht aus dolomitischem Kalkstein, Mergelschiefer, dichtem Kalkstein und buntfarbigem Mergel, Schichten, welche in Nottinghamshire, Derbyshire, Dorsetshire, Durham und Northumberland verbreitet sind.

Schichten von rothem Conglomerat, Sandstein und Mergel liegen darunter, sind bekannt unter dem Namen Exeter- und Hoavitrö-Conglomerat, und an einigen Punkten (Mendip, Bristol, Avon) durch kalkige Trümmergesteine repräsentirt. In den Mergelschiefen von Durham hat man schöne fossile Fische gefunden, welche den Geschlechtern *Sauropsis*, *Acrolepis*, *Nemopterix*, *Osteolepis*, *Platysomus* angehören. In Nordamerika hat man eine analoge Bildung am Lake superior beobachtet.

Das Rothliegende tritt in vielen Ländern ohne den sogenannten Zechstein und Kupferschiefer auf, wie z. B. in Schottland und Irland, in den südlichen und östlichen Alpen, im Aequinoctial-America. Wo es in größerer Entwicklung auftritt, da zeigt es häufig schöne Felsen, schroffe Gehänge und in den Querrithälern sieht man hohe, mauerförmige Wände, mitunter vielfach von vertikalen Spalten durchseht, und die Conglomerate dadurch in große, prismatische Massen zertheilt (Umgebungen von Eisenach, Wartburg, Schloßberg zu Baden).

2. Steinkohlengebirge.

Syn. Terrain houillier; carboniferous Group.

In tiefen, und muldenförmigen Vertiefungen sieht man an vielen Orten, zunächst unter dem Rothliegenden, als die oberste Gruppe der älteren Bildungen, dies mächtige Steinkohlengebirge, welches seiner vielen und reichen Kohlenflöße wegen Hauptsteinkohlengebirge, und zum Unterschiede von den jüngeren Steinkohlenbildungen, auch älteres Steinkohlengebirge genannt wird. Man kann darnach annehmen, daß es bey vollkommener Entwicklung aller Glieder des Uebergangsgebirges, seine Stelle immer zwischen dem Rothliegenden und der silurischen Gruppe einnimmt.

Das Steinkohlengebirge ist am vollkommensten und großartigsten in England entwickelt. Es besteht dort allenthalben aus vier Gliedern, die mit einander in einer bestimmten Lagerungsfolge vorkommen, und das große Gebirgs Ganze zusammensetzen, welches den ungeheueren Schatz von Steinkohlen und Eisen einschließt, der die feste Grundlage der Wohlfahrt und Macht jenes Königsreiches ist.

Zu oberst liegt ein grauer Sandstein mit Zwischenlagen von Schieferthon und Steinkohlen. Es sind die eigentlichen kohlenführenden Schichten, welche die Engländer Coal measures nennen. Darauf folgt ein grobkörniger oft conglomerationischer Sandstein ohne Steinkohlen, dem deutschen Bergmann als flbhtleerer Sandstein, dem englischen als Millstone grit bekannt. Unter diesem liegt eine mächtige Kalkbildung, der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, und zu unterst endlich liegt eine große Sandstein- und Conglomeratbildung, Old red sandstone, der alte rothe Sandstein.

a. Die oberste kohlenführende Lage besteht der Hauptmasse nach aus einem vorherrschend grau gefärbten Sandstein mit thönigem Bindemittel, der mitunter grobkörnig und conglomeratförmig auftritt, und gewöhnlich Stimmerblättchen enthält. Zwischen den Sandsteinschichten liegt Schieferthon, der niemals fehlende Begleiter der Steinkohle, ein eigentlicher Kohlenschiefer, schwarz und grau durch kohlige und bituminöse Theile, und manchmal brennbar, Brandschiefer. Zwischen Lagen von Schieferthon liegt nun, immer zwischen zwei Sandsteinschichten, die Steinkohle. Sie hat den Schiefer zum Dach und zur Unterlage oder Sohle. Oefters ist von seiner Masse auch den Kohlen eingenengt, oder es liegen dünne Schiefer dazwischen.

Die Steinkohle kommt nun hier in den verschiedensten Abänderungen vor, und enthält außer Schieferthon gewöhnlich Schwefelkies in dünnen Häutchen und Blättchen, parallel den Blättern der Kohle, auch in Körnern, Knauern und bisweilen in kleinen Crystallen. Diese Einmischung ist die Ursache des schwefeligen Geruches, den manche Steinkohlen beim Brennen ausgeben, und des starken Angriffs ihrer Flamme auf Metalle. Eine keßige Steinkohle muß daher gewöhnlich vercoakt, d. h. im Verschloffenen geglüht werden, wobey der Schwefelkies den größeren Theil seines Schwefels verliert, und beim späteren Verbrennen der Coaks die unangenehme und nachtheilige Wirkung nicht mehr in gleichem Grade äußern kann. Die Vercoaktung der Steinkohlen, wobey die flüchtigen Theile derselben ausgetrieben werden, und der Schwefelkies eine Zersetzung erleidet, wird daher auch das Abschwefeln genannt.

Der Schwefelkies ist ferner noch die Ursache eines in Steinkohlengruben bisweilen eintreffenden und sehr nachtheiligen Ereignisses, er ist die Ursache des Grubenbrandes, oder vielmehr der Selbstentzündung der Steinkohlen. Es ist eine bekannte Thatsache, daß der in der Kohlenmasse und auch im Schiefer vorkommende Schwefelkies, sich zersetzt, wenn er mit Feuchtigkeit und Luft in Berührung kommt. Er verwandelt sich in Eisenvitriol (schwefelsaures Eisenoxydul), und entwickelt dabey viel Wärme. Geht diese Zersetzung in einem engen Raume, in der die Wärme schlecht leitenden Kohle vor sich, so kann die Temperatur zu einer Höhe steigen, wobey Stoffe ins Glähen kommen, und die verbrennlichen bey Zutritt frischer Luft in wahren Brand gerathen. Dieß ereignet sich gar nicht selten bey großen Haufen bröckeliger, klein zerkleilter Steinkohle, wenn sie im Freyen liegen, und namentlich bey Kohlenhalben, die aus Schieferstücken, Kohlenklein, Gesteintrümmern zusammengehäuft sind. Häufig sieht man solche Halben dampfen, da sie sehr warm sind, und im Innern findet man sie nicht selten glühend und in vollem Brande.

In den Steinkohlengruben entsteht der Brand vorzüglich dann, wenn viel Kohlenklein darinn angehäuft liegt, Einbrüche alter Bauten erfolgt sind, wobey in der zerkleinerten Kohle- und Schiefermasse die Zersetzung des Kieses immer rasch eintritt und voranschreitet, und eine große Hitze erzeugt wird. Tritt auf irgend eine Weise frische Luft hinzu, so entzündet sich die Kohlen und es kann auf diese Weise ein sehr verderblicher Brand entstehen.

Der sogenannte brennende Berg bey Duttweiler, unsern Saarbrücken, ist ein Beyspiel eines solchen Kohlenbrandes. Der brennende Berg befindet sich im Hangenden von Steinkohlenschieben, und besteht vorzüglich aus einem kiesreichen Schieferthon, der mit einzelnen Kohlentrümmern wechselt. Vor beyläufig 120 Jahren soll sich die freywillige Selbstentzündung eines Flözes unter diesem Berge ereignet haben. Bis auf den heutigen Tag dauert der Brand an verschiedenen Stellen im Innern des Berges fort. Es dringen heiße Dämpfe heraus, und Sublimata setzen sich in Klüften an.

Als weitere Einmengungen kommen in der Steinkohle auch Kalkspath, Gyps, Schwerspath, seltener Bleeglanz und Blende vor. Die Thone, welche die Kohlen begleiten, sind oft außerordentlich plastisch, sehr rein und mitunter feuerfest (Stourbridge-Thon). Sie scheinen identisch mit dem feinen Bindemittel des Sandsteins zu seyn.

Was nun die Kohlenflöße noch besonders auszeichnet, das sind die sie begleitenden, zahlreichen und schönen fossilen Pflanzen. Die Schiefer schließen sie in großer Menge ein. Es ist bewunderungswürdig, wie gut oft selbst die zartesten Theile erhalten sind. Die Pflanzen liegen theils in einem verkohlten Zustande in den Schiefen, theils sind sie nur in Abdrücken vorhanden. Alle diese Reste sind dunkel gefärbt, meist schwarz. Die organische Faser der Pflanze ist in einen der Beschaffenheit der Steinkohle ähnlichen Zustand übergegangen.

Es sind Landpflanzen, wie oben schon angeführt worden ist, Calamiten, Coniferen, Farrn, Eycopodiaceen, Palmen- und Monocotyledonen-Reste aus unbekannten Familien. In überwiegender Menge von Geschlechtern und Gattungen sind die Farrn vorhanden. Farrn-Stränke, Sigillaria, allein in 44 Gattungen! Farrn-Webel sind am häufigsten. Man unterscheidet: Cycloptoris, Zirkel-Webel, Odontopteris, Zahn-Webel; Pecopteris, Kamm-Webel; Neuropteris, Nerven-Webel; Sphaenopteris, Keulen-Webel; Glossopteris, Zungen-Webel; Schizopteris, Schliß-Webel und Lonchopteris, Lanzen-Webel.

Von Eycopodiaceen findet man vorzüglich: Lepidodendron, Schuppenbaum; Stigmaria, Narben-Streun, Stämme mit Blattnarben. Eodanar Blätter allein: Lepidophyllum, Schuppenblatt; Fruchttheile: Lepidostrobos, Schuppen-Papfen. Von Palmen kommen Stämme von Fasciculites, Büschelholz und Blätter; Zeugophyllites, Noeggerathia; von Monocotyledonen unbekannter Familien: Sternbergia, Poacites, Trigonicarpum, Musocarpum. Zu unbekannten Classen gehören: Annularia, mit kreisförmigen Blättern, Asterophyllites mit gegenständigen, in einer Ebene stehenden, Ästen und

Volkmannia mit ährenförmigem Blüthenstand. Diese Pflanzenreste liegen in der Regel im Schiefer, parallel den Schichten, und, nur selten kommen damit thierische Reste vor, versteinerte Schalthiere des süßen Wassers, die zu dem Geschlechte *Unio* gehören, und bisweilen auch von *Cypria* begleitet sind. In Wardie in Schottland liegen in den Schiefern auch Fischreste der Geschlechter *Amblypterus*, *Palaeoniscus*, *Eurynotus*, *Acanthodes*, *Pygopterus* und *Coprolithon* in Begleitung einer Muschel.

In Nieren und Knauern, zum Theil auch in plattensförmigen Lagen, kommt öfters thoniger Sphärosiderit mit der Steinsohle vor (Schlesien, Saarbrücken, vorzüglich aber Süd-Wales), und darin liegen auch dieselben Pflanzenreste, welche im Schiefer vorkommen, und in Saarbrücken *Fishes*, *Acanthodes* und *Amblypterus*, und zu Coalbrook Dale Landinsecten, *Curculioides* und *Limulus*. Bisweilen erscheinen die Stämme der Pflanzen durch dieses reichhaltige und sehr nützliche Eisenerz ganz und gar vererzt, wie namentlich die meisten der im Gebirgsgestein aufrecht stehenden Sigillarienstämme, die man im Saarbrücker Revier, auf der Grube Wellesweiler bey dem Dorfe Wellesweiler, im Palmbaum-Gollen angetroffen hat. Die Bergleute nennen sie ihrer aufrechten Stellung wegen Eisenmännchen. In England hat man ähnliche, mehrere Fuß starke und bis 40 Fuß lange, aufrechte Stämme gefunden. Dieß erinnert an den versteinerten Wald von Portland, dessen oben, S. 688., in der Beschreibung der Bilderbildung erwähnt worden ist.

Zur Sandstein selbst kommen höchst selten Pflanzenreste vor, und in der Kohlenmasse noch viel seltener.

Aus allen Kohlenflözen entwickelt sich kohlensaures Gas, welches die Luft verdrängt, die Respiration erschwert, und selbst erstickende Wirkungen äußert. Man nennt die mit kohlensaurem Gas gemengte Luft, böse oder erstickende Wetter. Der Kohlenbergmann fürchtet aber am meisten die schlagenden Wetter, welche durch einen flammenden Körper, durch das Licht der Gensendämpfe, entzündet werden, und mit einer Explosion verstreuen, welche die zerstörendsten Wirkungen ausübt.

Die Kohlen vorzüglich beim Abbau magerer Kohlen vor. Diese Kohlen geben nämlich Kohlenwasserstoffgas aus, welches in seiner Zusammensetzung der Sumpfluft gleich ist, und seines Vorkommens wegen, auch Grubengas heißt. Häuft sich dieses Gas an, und vermengt es sich mit der atmosphärischen Luft in einem Bause, so wird diese dadurch entzündlich und explosiv. Die Wirkungen einer solchen Explosion sind gewöhnlich von den traurigsten Folgen. Die Bergleute werden verbrannt, zerschmettert, die Bane zerflöbt, indem sie in Folge der außerordentlichen Erschütterung einwärts, und oft leiden noch die Gebäude über Tage, die über dem Schacht stehen, in dessen Nähe sich die Explosion ereignet hat. Humphry Davy hat zum Schutz gegen solche furchtbare Zerflöbungen, dem Bergmann die Sicherheits-Lampe in die Hand gegeben, welche, wenn nicht allen, doch immerhin den mehrsten Unglücksfällen dieser Art vorbeugt.

Die Kohlenflöze liegen gewöhnlich mehrfach unter einander, durch Sandsteinschichten getrennt. Im Saarbrücker Kohlengebirge kennt man schon etliche 20, in Süd-Wales 23, bey Mons 115 bauwürdige Flöze. Nur in seltenen Fällen übersteigt die Mächtigkeit 6 Fuß. Auch in Ober- und Niederschlesien, an der Ruhr, ist die Zahl der Flöze groß und kommen diese mächtig vor. Das Blächerflöz zu Düttweiler in Saarbrücken hat 15 Fuß, das Dombrowaflöz bey Bendzin in Polen eine Mächtigkeit von 6 Lachtern zu 80 Zoll rheinländisch, und in Staf-fordshire in England sind Flöze von 30—45 engl. Fuß Mächtigkeit im Abbau.

Eine Reihe von Kohlenflözen, die in einer Gegend unter einander vorkommen, nennt man eine Kohlenniederlage, ein Kohlenfeld (Coal field). Ein jedes Kohlenfeld hat seine Eigenthümlichkeiten, und da seine Schichten in beckenförmigen Vertiefungen liegen, seine besonderen abgeschlossenen Flöze. Benachbarte Kohlenbecken zeigen gewöhnlich mancherley Abweichungen.

Die Schichten aller Kohlenniederlagen sind mehr oder weniger aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, aufgerichtet, gekrümmt und oft gebrochen, im Zickzack gebogen, s. Fig. 23 u. 24, und auf mannfaltige Weise verschoben. Zahlreiche Spalten,

die der deutsche Bergmann Rücken, der englische faults auch dykes heißt, durchsetzen die Schichten. Sie scheinen die Folge heftiger Erschütterungen und Stöße zu seyn, die jene erlitten, und ihrerseits viel zur Dislocation beygetragen zu haben. Wo solche Spalten durchsetzen, da sind die Schichten an einer Seite derselben immer verschoben, oft sehr bedeutend gesenkt. Sie schneiden manchmal die Flöhe geradezu ab. So schneidet ein Rücken im Wormrevier, der sogenannte Feldbiß, sämtliche Flöhe dieses interessanten Kohlenbeckens, gegen Osten glatt ab. Der abgeschnittene Theil scheint sich im Hangenden des Rückens in die Tiefe gesenkt zu haben. Vielleicht findet man ihn einstens dort wieder auf. Die Niveau-Veränderungen, welche unter solchen Umständen eingetreten sind, übertreffen oft bey weitem unser Dafürhalten. Ein Rücken, welcher die Eschweiler Kohleniederlage durchseht (das Sandgewand), hat die Schichten auf der Ostseite wenigstens um 100 Lachter in die Tiefe gesenkt. Conybeare gibt an, daß man im Kohlenbecken von Durham durch Rücken bewirkte Niveauveränderungen sehe, die nahe an Tausend Fuß betragen! Diese Spalten sind theils mit Thon, Letten oder einer anderen zersehten Gesteinsmasse, theils mit bestem Gesteine, mit Grünstein, Basalt ausgefüllt.

Es durchsetzen auch Erzgänge diese obere Lage des Kohlengebirges. Bey Erettnich in Saarbrücken seht ein reicher Braunsteingang darin auf, an der Ruhr sind Bleysglanzgänge mit Blende, Schwefelkies und Schwerspath darinn, und in Zweibrücken Gänge mit Quecksilbererzen. Die Mächtigkeit dieser Lage ist nicht genau ausgemittelt, aber immerhin sehr bedeutend.

b. Ein flöthleerer Sandstein, mit Schiefer und Conglomerat (Millstone grit and shale) liegt unmittelbar unter dem eigentlichen Kohlengebilde. Das Gestein ist im Allgemeinen härter als der wahre Kohlen sandstein, oft conglomeratisch und in vielfachem Wechsel mit Schieferthonlagen, die zumal nach unten häufig, und öfters vorherrschend, auftreten, wo man dann auch schwache Kohlenflöhe von geringer Qualität dazwischen liegen sieht und einzelne Kalksteinlagen.

Die Schieferlagen enthalten die Pflanzenreste der oberen

Laga (a); in den Sandsteinbänken kommen ebenfalls *Edgillia*-Räume in aufrechter Stellung vor, und bey Goldstream in Derbyshire hat man darinn eine große Zahl fossiler Coniferen-Stämme gefunden. Die Kalksteine schließen die Petrefacten der tieferen Kalklage ein.

Die Schichtung ist deutlich und hat dieselben Verrückungen erlitten, wie der kohlenführende Sandstein. Erzgänge, welche im tiefer liegenden Kalksteine vorkommen, setzen mehrfältig in den Millstone grit (Mühlensandstein) heraus. In England erreicht er eine Mächtigkeit von 600—700 Fuß.

c. Auf den flöthleeren Sandstein folgt der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, ein dichter, deutlich, aber nicht geschichteter Kalkstein, von vorherrschend blaugrauer Farbe, der in England ansehnliche Bergzüge zusammensetzt, und deswegen auch Bergkalk, Mountain limestone heißt, auch Encrinural limestone, Encrinitenkalk, da er stellenweise eine außerordentliche Menge von Crinoiden-Rößen einschließt. Mitunter ist er etwas körnig, und so hart und gleichförmig, daß er eine schöne Politur annimmt. In der dunkeln Grundmasse treten dann gar schön die eingeschlossenen Versteinerungen hervor, von Schalthieren, Crinoiden, Corallen, da sie gewöhnlich eine weiße Farbe haben und spärlich sind. Die unteren Lagen sind gewöhnlich schieferig, und ein etwas weicher, thoniger Kalkschiefer (near limestone) hat meistens die Oberhand.

Diese Kalkbildung ist in England, im südwestlichen Schottland und in einem großen Theil von Irland verbreitet. Sie setzt namentlich die malcrischen Felsenparthien von Derbyshire zusammen, und erreicht eine Mächtigkeit von reichlich 1200 Fuß. Dieser Kalk ist auch durch seine organischen Reste ausgezeichnet. Von Wirbelthieren findet man vorzüglich Fische, aus den Geschlechtern *Acanthodes*, *Amplipterus*, *Palaeoniscus*, *Eurynotus* u. e. a., sodann selbst Reptilienreste (Edinburg). Von Crustaceen erscheinen einige *Trilobiten*, *Asaphus Dalmanni*, welche im Kohlengebirge überhaupt zum erstenmal erscheinen. *Cypria* und *Euryp-terus*, die im süßen Wasser lebten, sind in Kalkschichten unter dem Mid Lothian coal field (Edinburg, Kirkton) in

Gefäßhaft der oben genannten Fische und einigen Farnkräutern gefunden worden. Schalthierreste erscheinen in überwiegender Anzahl, und unter diesen am zahlreichsten die Producten (*Ectoprocten*) und Eptiriferen, glatte Lerebraten, Goniatiten mit spitzen Loben und getheiltem Dorsal Goniatiten, *carbonarius*, *sphaericus*, Rantilen, viele Erbsenideen, insbesondere *Pentatromites*, *Platycrinites*, *Actinocrinites*, *Poteriocrinites*, und der Kalkstein davon bisweilen ganz erfüllt (*Enerinkal* marble of Derbyshire); Corallen, namentlich *Cyathophyllum*, *Calamopora* und *Gorgonia*. Hier treten auch die ersten Orthoceratiten auf. Die zwischen den Kalkschichten liegenden Schiefer führen bisweilen Pflanzenreste, welche mit den oben angeführten Aborescenzstümmen.

Spalten und Höhlen sind im Kohlenkalk beynahe so häufig als im Corallenkalk des Jura, und namentlich sieht man viele Spalten, welche die Schichten beynahe senkrecht durchsetzen und in große Tiefe niedergehen. Bäche und Flüsse verschwinden darinn öfters, und treten manchmal erst meilenweit von dem Schlunde wieder hervor. Die Höhle von Sundwig in Westphalen liegt in diesem Kalkstein. Dalwell gibt an, daß in den Umgebungen von Craven in Yorkshire flache Hochebenen durch den Kohlenkalk zusammengefaßt werden, die von Vegetation begleitet und von vielen tief niedergehenden Spalten durchschnitten sind. Er meynt, diese durch Graswuchs verborgenen Spalten müßten in früherer Zeit natürliche Fassen für die Thiere gewesen seyn. Gewiß waren sie dieß. Recht gut wird diese Meynung dadurch bestätigt, daß man vor Kurzem bey Chollier, unsern Lüttich, in einer Spalte des dortigen Kohlenkalks viele Knochen von Bären, Hyänen, Löwen, Rhinoceroten, Hippopotamen gefunden hat.

Im hohen Grade ausgezeichnet ist der Kohlenkalk noch durch seine Metallsführung. Es sehen, zumal in England, zahlreiche Bleigänge darinn auf, besonders in Somersetshire, Derbyshire, York, Durham und Northumberland, und überdies kommen in seinem Gebiete auch Wagnan-, Kupfer-, Zink- und Eisenerze vor. Die Engländer nennen diesen Kalk daher

auch metalliferous limestone. Die schönen Kupferspath- von Derbyshire stammen von solchen Gängen ab, auf welchen überdies Kalkspath und Schwefspath eintreten.

Dem Kohlenkalk gehören auch die Blei-, Eisen- und Eismeng-Lagerstätten Belgiens und des Niederrheins an, welche bey Andeleur, Limbourg, Dinant, Namur, Aachen, Brilon, Gundersbach u.s.w. abgebaut werden.

In England wird derselbe auch häufig von basaltischen Massen durchsetzt, dort unter dem Namen Toadstone, Wahn sind den Bergleuten bekannt, welche die Gänge bis in diese vulcanischen Massen hinein verfolgen.

Die Wichtigkeit ist in der Regel beträchtlich, wie wir oben angezeigt haben. Indessen ist diese Kalkbildung, welche in den meisten Kohlenbecken regelmäßig, stark entwickelt und als ein selbstständiges Ganges unter den kohlenführenden und stohleeren Sandsteinen liegt, in einigen Gegenden, namentlich in Nordengland, kaum entwickelt. Dort wechselt der Kohlenkalk in einzelnen Lagen mehrfältig mit Schiefer- und Sandstein-Schichten, zwischen welchen gute Kohlenflöße liegen, und er tritt in Northumberland bis hinauf zur Tweed immer mehr zurück, so daß er endlich beynähe ganz verschwindet, und keine Scheidelinie mehr zwischen ihm und den Sandsteinschichten gezogen werden kann.

d. Auf den Kohlenkalk folgt im südwestlichen England eine mächtige Sandstein- und Conglomeratbildung von vorherrschend rother Farbe, welche den Namen Old red sandstone trägt. Sie ist insbesondere in Herefordshire, Monmouthshire und am Ostostrand der Crampian-Berge mächtig entwickelt, und bildet das unterste Glied des Steinkohlengebirges, die Unterlage aller Schichten desselben.

Dieses Gebilde besteht mehrentheils aus drey Lagen; aus Sandsteinen und Conglomeraten (Quartzose conglomerate overlying thick bedded sandstones); aus rothem und grünlichem, conglomeratischem Kalkstein, mit Zwischenlagen von buntfarbigem Thonmergel und Bänken von Sandstein (Cornstone and argillaceous marl) und aus rothem und grünem, schieferigem Sandstein, der theils weich und glimmerreich, theils sehr hart und fest ist,

so daß man ihn zu Dachungen benützen kann (Tils stones). Die obere Lage enthält keine Petrefacten. In den mittleren Schichten kommt ein Fischgeschlecht vor, *Kophalaspis*, das, sonderbar genug, den Habitus der Trilobiten hat, welche in den älteren Gebirgsschichten vor den Fischen auftreten. Die untere Lage schließt noch Reste von anderen Fischen ein, von *Dipterus* und *Gyrolopis*, und große Flossenstacheln (Githyodorulithen) von Fischen aus der Ordnung der Macroiden. Von Schalthieren hat man einzelne Exemplare von *Avicula* und *Pileopsis* gefunden. Die drei Lagen haben zusammen genommen eine Mächtigkeit von mehreren Tausend Fuß, und erheben sich in gewaltigen Bergen bis zu 3000 Fuß über Meer.

Der Old red sandstone, so mächtig er in Südengland und Wales entwickelt ist, tritt in Nordengland, nördlich von der Tyne, und in Schottland, wie der Kohlenkalf an der Tyne, sehr zurück, und fehlt öfters ganz, so daß das Kohlengebirge mit seiner Kohlenkalf-Unterlage unmittelbar auf den älteren Schieferen des Uebergangsgebirges ruht.

Die vier Glieder des Kohlengebirges, welche in Südengland und Wales so vollständig und gut characterisirt erscheinen, sind also im Norden des Landes, so wie in Schottland, so regelmäßig nicht entwickelt, und wir sehen hier den Kohlenkalf sich mit den höheren, kohlenführenden Sandsteinschichten vereinigen, und selbst den Old red sandstone im Wechsel mit Schieferthon und eigentlichem Kohlen sandstein.

Auf dem Continente sind drei Glieder, der Kohlen sandstein mit den Steinkohlen, der flüßlere Sandstein und der Kohlenkalf, an den mehrsten Orten entwickelt, wo das Kohlengebirge vorkommt. Der Old red Sandstone fehlt aber wohl durchgehends, wenn man dazu nicht etwa die Conglomerate rechnen will, welche in der Maas-Gegend unter dem Kohlenkalf liegen, und den rothen Sandstein von Litry im Salvados. In Oberschlesien ruhen die Kohlen sandsteinschichten unmittelbar auf Grauwacke, und es fehlt hier also der Kohlenkalf und der Old red.

Dieser tritt in England, nächst dem Kohlenkalf, in ansehnlichen Bergmassen auf, so daß diese beiden Glieder auch durch die äußeren Formen sich wesentlich von den kohlenführenden

Schichten unterscheiden, welche gemeinlich niedrige, gerundete Berge und Hügel zusammensetzen. Die Höhen des Kohlenkalks sind häufig unangebaut und mit Heidekraut bewachsen, während an den Abhängen Trümmerhaufen liegen, und auch der Bergfuß gewöhnlich steinig und der Cultur ungünstig ist. Auf den hohen Rücken des Old red liegen häufig Torfmoore, und wo die sandigen und conglomeratischen Schichten vorherrschen, da ist der Boden mager und unfruchtbar.

Die Hauptkohlenniederlagen Englands befinden sich in Somersetshire, Gloucestershire, Nord- und Süd-Wales, Dublin, Schropshire, Leicestershire, Lancashire, Nottingham, Derbyshire, Yorkshire, Cumberland, Durham, Newcastle, und es sind ferner die Kohlenbecken von Forth und Clyde, und die im innern Irlands wichtig.

Das Becken von Süd-Wales enthält 23 baumartige Blöcke, die zusammen eine Mächtigkeit von 95 Fuß haben, so daß auf einer Quadratmeile etwa 64 Millionen engl. Tonnen gewonnen werden können. Mit den Steinkohlen kommen hier zugleich beynahe unerschöpfliche Quantitäten vorzüglicher Eisensteine (thonige Sphärosterite, clay-ironstones) vor, welche von etwa 114 Hochofen verschmolzen werden, die jährlich über 280,000 Tonnen *) Eisen erzeugen! Kein Wunder, daß die Hüttenbesitzer von Süd-Wales mit ihrem Product die Märkte am Oberrhein mit Vortheil versehen können.

Diesseits des Canals liegen weder so viele, noch so reichhaltige Kohlenniederlagen. Ein Hauptzug in langer Linie einzeln auf einander folgender Kohlenbecken geht von Boulagne am Meer über Valenciennes, Maas, Charleroi, Lüttich und Aachen. Abgetrennt davon liegen die Kohlenniederlagen an der Worm und bey Eschweiler, und im Innern von Frankreich die Becken im Aveyron, Saône und Loire, Gasc, Ardre u. c. a.

In Westphalen ist das Kohlengebirge mächtig und steinkohlenreich an der Ruhr entwickelt; im Süden des Hunderhäfens, zw-

*) Eine englische Tonne hält 20 engl. Centner; 1 engl. Centner ist = 50,70446 Kilogrammen.

sehen der Rahr und der Saar, liegt das pfälzische und namentlich das wichtige und reiche Saarbrücker Kohlengebirge. Mit Erzgebirge tritt es, vorzüglich bey Wittau und im Plauenischen Grunde, mit guten Kohlenflözen auf. Ferner ist es mächtig in Niederschlesien entwickelt, und in Polen. In Nordamerika befinden sich Steinkohlen-Riebelagen in Massachusetts, Pennsylvanien, Connecticut, und in neuerer Zeit fand man am Potomac, nahe bey Westernport, an einer verticalen Felsenwand, sehr bauwürdige Flöze, worunter eines von 18 Fuß. Auch in Spanien, in China, in Bantienensland kennt man das Vorkommen des Steinkohlengebirges.

Bildung des Steinkohlengebirges und der Steinkohlen.

Wie sehen das Steinkohlengebirge allenthalben in Becken abgelagert, und viele derselben besitzen eine sehr große Tiefe. Russet gibt uns einen Begriff von einer solchen Tiefe. Er hat die Südküste des Kohlengebirges im Deanfort an der Severn in Süd-Wales, gemessen, und dort eine Gesamtmächtigkeit der ganzen Gruppe von 8700 Fuß gefunden. Davon gehören 3000 Fuß den kohlenführenden Schichten an, 700 dem Kohlenkalkstein, das übrige dem Old red.

Zuerst erfolgte nun der Absatz dieses Gliedes, das aus vorherrschenden Sandsteinschichten besteht, und somit eine mechanische Entstehung aus zerriebenen Theilen älterer zerstreuter Gesteine hat, welche durch Wasser fortbewegt, und in ein Becken abgesetzt worden sind. Da nun Conglomerate in diesem untersten Gliede des Kohlengebirges seltener vorkommen, so kann man annehmen, daß die fortschaffende Kraft des Wassers, oder seine Geschwindigkeit, in der Regel nicht so groß gewesen ist, daß größere Stücke, Gerölle beygeführt wurden. Nur die untere und mittlere Lage enthält bestimmbare Versteinerungen von Meeresthieren. Nach oben liegen bläugelichte Sandsteine und Conglomerate, und das Wasser scheint, mit Sand und Geröllen beladen, sich in einer solchen Bewegung befunden zu haben, daß dabey die thierischen Reste sich nicht erhalten konnten. Lange muß dieser Absatz gedauert haben, um so mächtige Lagen abzusetzen. Auf die

sandigen Schichten des Old red sandstone sehen wir eine kalkige Bildung folgen. Alles muß da in der Beschaffenheit des Gewässers anders gewesen seyn. Nämlich reine Kalksteinschichten folgen nun, die eine große Menge von Meeresthieren einschließen, und so wohl erhalten, daß wir annehmen müssen, die Thiere haben an dem Orte gelebt, und seyen an der Stelle gestorben, wo wir sie jetzt finden. Darunter sind aber auch Schichten, welche Süßwasserthiere und Landpflanzen einschließen, und daraus folgt, daß die Schichten sich am Ufer des Meeres, oder in der Nähe des Landes, gebildet haben. Immerhin erscheint aber der Kohlenkalk als eine mächtige Meerestildung, die lange Zeit fortgedauert haben und in einem tiefen Meeresbecken vor sich gegangen seyn muß.

Auf die Periode seines Abzuges folgt nun diejenige der oberen Sandsteine, Schieferthone und der Kohlenflöße. Abermal eine große Veränderung. Eine außerordentliche Masse von Landpflanzen wurde mit Sand und Schlamm in das Becken geführt, auf eine große Fläche verbreitet und in einzelnen starken Bagen aufgehäuft, welche sich in Kohle umwandelten. Pflanzenlagen, Schlamm, jetzt Schieferthon, Sand, jetzt Sandstein, haben sich in vielfacher Wiederholung abgesetzt. Die Kohlenflöße, wie die Zwischenschichten von Sandstein und Schiefer, sind von sehr verschiedener Mächtigkeit, und beweisen dadurch, wie verschieden und unregelmäßig die Kräfte gewirkt haben, welche sie hervorbrachten. Kohlenflöße von einigen Follen bis zu 50 Fuß wurden durch Anhäufungen derselben Pflanzen gebildet. Welche Massen gehören dazu, um eine Kohlenlage von solcher Mächtigkeit zu erzeugen! Die Schwere darüber abgelagerter Sandsteine hat sie zusammengedrückt, und selbst ganz große Stämme wurden flach gedrückt. Man findet solche öfters im westphälischen Kohlengebirge.

Der Umstand, daß man die Steinkohlen jederzeit von Pflanzenresten begleitet, und solche selbst deutlich erkennbar in den Kohlenlagen findet, hat zu der Annahme geführt, daß sie aus Anhäufungen von Pflanzen entstanden sind. Dieß hat sich auch bestätigt, denn man hat bey microscopischen Untersuchungen der Steinkohlen die organische Structur der Pflanzen gesehen, und

Schypert meynt, daß es nur an der Unvollkommenheit der Zubereitung der zu untersuchenden Stücken liege, wenn man die Structur nicht gewahr werde.

Die Reste von Meeresthieren (Fische und Schalthiere), welche man theils in den Kohlen selbst, theils in den darinn liegenden Eisensteinen vielfältig antrifft, deuten unzweifelhaft an, daß die Kohlenschichten in einem von tiefem Meerwasser erfüllten Becken abgesetzt worden sind; andererseits beweisen die Säuwasser-Schalthiere (Uolo, Planorbis) und Ernstarten (Cypris), daß sich süßes Wasser in das Becken ergossen hat; und die außerordentliche Menge von Landpflanzen, welche die Schiefer bergen, so wie endlich die Insecten, welche in der Kohlenbildung gefunden worden sind, zeigen unverkennbar die Nähe des Landes an. Aus all dem folgt nun, daß das Steinkohlengebirge in tiefen Buchten des Meeres abgelagert worden, und die Steinkohlen aus Pflanzen entstanden sind, welche vom Lande her, durch einen Fluß, sammt Sand- und Schlamm-Massen, in solche Buchten geführt, und dort mit Gebirgsschutt überdeckt worden sind.

Aus einer Vergleichung der chemischen Constitution der Holzfaser und der Steinkohlensubstanz aber ergibt sich, daß die Faser, unter Wasser- und Kohlensäure-Bildung, in Steinkohle übergeht.

Die fossile Flora des Steinkohlengebirges zeigt eine solche Entwicklung und ein solches Vorwalten der Farrn, wie man es heut zu Tage nur auf Inseln der Tropenländer sieht, die klein und weit entfernt von Continenten im Ocean liegen, wie etwa Ascension und St. Helena. Die isolierte Lage solcher Inseln, so wie ihre Fortliegen in einer Reihe, stimmt gut mit der Lage der Kohlenbecken überein, und so führen die pflanzengeographischen wie die zoologischen Betrachtungen zu demselben Resultat, daß nämlich zur Zeit der Bildung des Steinkohlengebirges nur einzelne Inseln oder einige Archipels solcher in dem ungeheuren Ocean vorhanden gewesen, und die kohlenführenden Schichten am Fuße derselben, in Buchten am Meere, abgelagert worden sind.

Die vielen Kohlenschichten, die man über einander liegen sieht, beweisen die vielfache Wiederkehr einer Catastrophe, welche die Landpflanzen traf. Die heftigen Schwellungen des Mississippi

(S. 602 u. 603) können uns einigermaßen den Vorgang bezeichnen, der dabei stattfand.

3. Silurisches Gebirge.

Syn. Jüngeres Uebergangs-, Schiefer- oder Grauwackengebirge; Terrain anthracifère, étage inférieur.

Das Steinkohlengebirge ruht, bey vollständiger Entwicklung aller Theile der großen Reihe geschichteter Bildungen, auf dem Uebergangs-Schiefergebirge. In früherer Zeit faßte man die zahlreichen Schichten desselben in eine einzige große Gruppe zusammen, ohne die Anordnung seiner Glieder und die Verschiedenheiten der Petrefacten, welche sie einschließen, genauer ins Auge zu fassen. In neuester Zeit haben aber gründliche Untersuchungen sowohl die Aufeinanderfolge der Glieder, als die Versteinerungen derselben besser kennen gelehrt, und man theilt demzufolge das, was nach der Werner'schen Schule Uebergangsgebirge hieß, die Schichten zwischen dem Kohlengebirge und dem schieferigen Grundgebirge, jetzt in zwey große Abtheilungen.

Die obere Abtheilung, welche wir zunächst betrachten, nennt Murchison Silurisches Gebirge, da er sie vorzüglich in dem Landstrich entwickelt fand, welches das alte Königreich der Siluren bildete, jenes wackeren Celtischen Stammes, der den Römischen Legionen unter den Kaisern Claudius und Nero so tapferen Widerstand leistete.

Die wichtigsten Gesteine sind dichte und schieferige Sandsteine, kieselige und kalkige Conglomerate, dichte und schieferige Kalksteine, Thonschiefer, Grauwacke und Quarzfels. Kiesel-schiefer, Bohrschiefer, Brandschiefer, Alaynschiefer, Dolomit, Zeichenschiefer, erscheinen untergeordnet. Die Schichtung ist durchaus deutlich, und die Schichtenstellung höchst verschieden. Aufgerichtete Schichten sind Regel, gebogene häufig, horizontale Seltenheit.

Die Flora des Silurischen Gebirges ist arm. Außer einigen Fucoiden und Calamiten kommen keine anderen erkennbaren Pflanzenreste vor. Die Schalthiere treten dagegen in großer Menge auf, und die Orthoceratiten und Trilobiten, so wie Goniatiten, meist mit ungetheiltem Dorsal, sind

characteristisch. Von Fischen trifft man in dieser Schichtenreihe nur selten einige Reste, und es sind wohl die ältesten Fische der Erde, welche hier gefunden werden, da in tiefern Schichten, von Fischen, überhaupt von Wirbelthieren, bisher noch keine Spur gefunden worden ist. Häufig kommen Erinoideen und Corallen vor.

Die Kalksteine sind, wie in allen Formationen, so auch hier, von besonderem Interesse, da sie die meisten thierischen Reste in einem wohlerhaltenen Zustande einschließen. Die Silurischen Kalksteine sind häufig dicht, manchmal von etwas crystallinischem Korn, und haben im Allgemeinen eine dunkle Farbe. Bisweilen erscheinen auch rothe, braune, gelbe u.s.w. Farben von ziemlicher Reinheit, und wenn das Gestein dabey dicht und gleichförmig ist, so wird es als Marmor verarbeitet (Massau, Belgien). Ofters ist der Kalk auch thonig, schieferig und mitunter conglomeratisch. Die Grauwacke tritt häufig in der schieferigen Abänderung auf.

Der Thonschiefer ist in der Regel ziemlich weich und verwitterbar, manchmal sandig oder kalkig, und der Sandstein ist häufig schieferig, glimmerführend. Einige Abänderungen von conglomeratischer Beschaffenheit ähneln der Grauwacke, werden fälschlich auch mit diesem Namen belegt, und wenn sie schieferig sind; eben so unrichtig Grauwackenschiefer genannt. Der Quarzfels ist bald körnig und dicht, bald schieferig und glimmerführend. Es durchsetzen ihn, so wie den Thonschiefer, öfters Trümmer und Schnüre von weißem Quarz.

Sämmtliche Schichten theilen sich in den belgischen, in den deutschen und rheinischen Gebirgen in drey Gruppen.

Die obere Gruppe besteht vorzüglich aus Thonschiefer, Grauwacke und Sandstein, die mehrfältig mit einander wechseln. Im Thonschiefer liegen öfters Kalkbänke. Die verbreitetsten Petrefacten dieser Gruppe sind: *Posidonia Becheri*, eine Leitmuschel für diese Schichten, *Pecten grandaevus*, *Avicula lepida*, *Orthoceratites striolatus*. In Kalksteinbänken kommen *Goniatiten* mit getheiltem Dorsal-Lobus und gefalteter Schale vor (Erdbach, unsern Hernborn in Massau).

Diese Schichten entsprechen dem Systeme *quarzo-schisteux*

supérieur, Damont, das in den Ardennen auftritt, und dem Goniatiten-Kalk Erdbachs entspricht der Kalkstein zwischen Huy und Choquier bey Lüttich, und der Kalk zu Stadt Berge in Waldeck, worinn sich mit *Goniatites rostratus* auch der gewöhnliche *Enerinit* des Grauwackengebirges (*Enerinites opythomus*) findet.

In Nassau tritt in dieser Gruppe die merkwürdige Schalesteinbildung auf, welche das Ansehen hat, als sey sie in langgezogenen Keilen in den Schichtenverband eingeschoben worden. Sie ist aus mannichfaltigen Schalesteinabänderungen, chloritischen Schiefern und aus Kalkmassen zusammengesetzt, und steht in vielfacher Verbindung mit Grünslein und Eisenerzen. Sie trägt alle Kennzeichen einer durch plutonische Wirkungen veränderten Ablagerung.

In dieser oberen Gruppe kommen wenige *Erinoiden* und *Corallen* vor, von welchen die tieferen Schichten so viele enthalten. Bisweilen schließt auch der Schalestein *Petrefacten* ein.

Mittlere Gruppe. Sie besteht aus kalkigen Gesteinen. Ein dichter, grauer, öfters sehr dunkler Kalkstein bildet die Hauptmasse. Seltener treten schieferige und mergelige Abänderungen auf. Manche Schichten dieses Kalksteins werden als Marmor verarbeitet. Aus dieser Gruppe kommt der schwarze Marmor von Golzinne, nördlich von Ramür, und werden zwischen der Sambre und der Maas mehrere graue Marmore gewonnen. Die oberen Lagen sind manchemal thonig oder sandig, und zerbröckeln an der Luft.

In den Rheingegenden tritt der Eifeler-Kalk, so bekannt durch seine Versteinerungen, als Repräsentant dieser Gruppe auf.

Man kann zwey Lagen unterscheiden; die obere durch zahlreiche Exemplare von *Strygocophalus Burtini* bezeichnet, und die untere durch *Corallenreste*, namentlich durch *Ecthyophyllen* (*Corniten*), ausgezeichnete Lage. Man heist erstere *Strygocephalen-Kalk*, letztere *Corniten-Kalk*.

Der *Strygocephalen-Kalk* ist zwischen Bensberg und Heumar, unfern Eöln, auf der Luftheide zwischen Bensberg und jener Stadt, bey Refrath, Gronau, Passrath zu beobachten, sodann auf dem rechten Rheinufer, oberhalb Bill-

mar an der Lahn. Außer den *Strygocephalen* kommen darinn noch gewöhnlich vor: *Gypidium gryphoides*, *Megalodon cucullatum*, *Cardita carinata*, *Conocardium elongatum*, *Tarritella bilineata* und *coronata*, *Buccinum arcuatum*, *Euophalus delphinuloides*, *Bellerophon lineatus*, einige Corallen und *Erinoideen*, dagegen fehlen *Terebratula* und *Spirifer* beynahe ganz, und die Geschlechter *Orthis*, *Producta*, *Orthoceratites* sind darinn noch gar nicht gefunden worden.

Der Cornitenkalk ist in der Eifel mächtig entwickelt, sodann in Nassau bey Langenaubach, Limburg, Bilsmar u. a. m. a. D. zu beobachten, und es gehören ihm auch die Kalkschichten von Sivet, diejenigen zwischen der Maas und der Sambre, mehrere des Hundsrückens, des Westerwaldes und des westphälischen Schiefergebirges, des Fichtelgebirges und des Harzes an.

Die Corallen, worunter *Cyathophyllum* am häufigsten erscheint, begleitet von *Calamopora*, *Anthophyllum*, *Stomatopora*, *Heliopora*, *Halysites*, *Harmodytes* u. c. a. erfüllen ganze Lagen, bilden wahre Corallenbänke, und ihre Verästelungen, bisweilen wohl noch in ihrer ursprünglichen Stellung, durchziehen öfters mehrere Schichten, ja selbst abwechselnde Lagen von Kalk und Mergel.

Die *Erinoideen*, *Melocrinites*, *Platycrinites*, *Actinocrinites*, *Eucalyptocrinites*, *Eugeniaerinites* erscheinen häufig. Von Schalthieren kommen vorzüglich vor: *Terebratula prisca*, *Calceola sandalina*, *Trigonetreta aperturata*, *Strophomena rugosa*, *Megalodon*, *Cardium*, *Euomphalus*, *Bellerophon*, *Cyrtocera*, *Spirula*, einige *Orthoceratiten*, *Goniatiten* mit meistens ungetheiltem Dorsal und ungefalteter Schale, viele *Spiriferen*, wenige *Producten* und *Orthis*, und einige *Trilobiten*, besonders aus dem Geschlechte *Asaphus*.

Dieser Kalk, weniger mächtig entwickelt, als der Kohlenkalk, tritt doch immerhin in bedeutenden Massen auf, und bildet öfters malerische Felsen (Maas-Thal). In der Eifel erscheint in seinem Gebiet auch Dolomit.

Die untere Gruppe besteht wiederum, vorzüglich aus Grauwacke, Thonschiefer, Sandstein und Kalkstein. Zu ihr gehört der große Zug der älteren versteinungsreichen, rheinischen Grauwacken- und Thonschieferbildung, die unter dem Cornitenkalk liegenden Schichten in der Eifel, den Ardennen, in den Mosasgegenden und wahrscheinlich auch ein Theil des hartzischen, sächsel- und erzgebirgischen, böhmischen und mährischen Uebergangs-Schieferegebirges.

Man findet in diesen Schichten fast alle Versteinerungen des Cornitenkalks, zudem noch viele Orthoceratiten, Trilobiten, insbesondere, nebst *Asaphus*, die Geschlechter *Ogygia*, *Calymene*, *Trimerus*, *Dipleurra*, *Paradoxides*, *Conoccephalus*, *Agnostus*. Die Schiefer-, und vorzüglich die Kalkschichten sind öfters so reich an Orthoceratiten oder Trilobiten, daß sie darnach benannt werden.

Die in der Grauwacke und im Sandstein vorkommenden Trilobiten- und Schalthier-Versteinerungen, sind gewöhnlich nur als Steinkerne vorhanden, wie z. B. *Encrinurus opithomius*, der vorherrschende Encrinur dieser Gruppe, dessen Steinkerne unter dem Namen Schraubenstein bekannt sind, Spiriferen, welche häufig in diesen Schichten liegen, und deren Steinkerne *Hysteroolithen* heißen. Mitunter sind die Versteinerungen auch verkießt, wie im Thonschiefer von Bissenbach bei Dillingen in Nassau, dessen goldgelbe *Goniolithen* in so viele Sammlungen übergegangen sind. Der Kalkstein dieser Gruppe ist einer der ältesten petrefactenführenden Kasse, und ihm müssen wohl die Uebergangs-Kalksteine von Elberdreuth im Fichtelgebirge, von Prag und St. Petersburg, die Orthoceratitenkalksteine Schwedens, Norwegens, Nordamerikas und mehrerer anderer Gegenden beigezählt werden.

In Schweden liegen in der untern Gruppe des Silurischen Gebirges starke Lagen von Alaunschiefer und Brandschiefer, gemengt mit Bänken von Stinkstein. Im Thonschiefer kommen die sonderbaren Graptolithen vor, die von der Seite betrachtet, das Ansehen einer hakenförmig gezahnten Säge haben; wahrscheinlich ein Polypenstock. Im Kalkstein liegen ungewöhnlich große Orthoceratiten und Trilobiten. Das Kalk-

steinlager auf Kinnelulle in Westergöthland beherbergt die größten; *Orthoceratiten* bis zu 6 Fuß und *Trilobiten* von 1 Fuß Länge.

In England ist das Silurische Gebirge durch Murchison am genauesten untersucht worden. Es zeigt sich dort vorzüglich an der Grenze zwischen England und Wales entwickelt, und ist auch in Süd-Wales, zwischen dem Kohlengebirge und den älteren Schiefermassen verbreitet. Murchison theilt es in folgende 4 Abtheilungen:

1. Ludlow-rocks. Unmittelbar unter dem Old red Sandstone folgt ein dünngeschichteter, grauer Sandstein mit wenig Stämme. Er schließt ein: *Avicula retroflexa*, *Lopataena lata*, *Homonolotus Knightii*, *Orthoceras ludlensis*, mehrere Gattungen *Orthis*, *Orbicula*, *Pleurotomaria*, *Serpulites longissima*. Dieses Sandsteinlager (upper Ludlow-rock) ist in den Umgebungen des Schlosses Ludlow in Shropshire entwickelt, sodann beim Schloß Croft in Herefordshire, es bildet den Westabfall der Malvern- und Abberley-Hügel in Worcestershire, die westliche Abdachung der Hügel bei May und dem Schlosse Pain, in Radnorshire und die Treverne-Hügel.

Unter diesem Sandstein liegt ein Kalksteinlager (Ludlow or Aymestry limestone) von grauer und bläulicher Farbe, thoniger Beschaffenheit, und etwas krySTALLINISCHEM Korn. Es ist durch *Pentamerus Knightii*, *Pileopsis vetusta*, *Terebratula Wilsoni*, *Bellerophon aymestriensis*, *Lingula Lewisii*, *Euomphalus carinatus* und *Calamopora fibrosa* charakterisirt. Man beobachtet es vorzüglich um Aymestry in Herefordshire, in einigen Gegenden von Shropshire und zu Sedgley in Staffordshire.

Zu unterst liegen Schichten von schieferigem Sandstein und Schiefer von dunkler Farbe, mit Kanern von erdigem Kalk (Lower Ludlow-rock). Sie enthalten: *Phragmoceras arenatum* und *compressum*, *Asaphus caudatus*, *Lituites corticosus*, *giganteus* und *articulatus*, mehrere *Orthoceratiten*, namentlich *Orth. pyriformis*, *Orthis dimidiatum* und *gregarium*, *Atrypa obovata* u. c. a.

Diese Schichten beobachtet man an den Felsabstürzen von Rocktree und Brindgwood Chase, so wie im Woothop-Thal in Herefordshire, an den Felsabstürzen von Montgomery und an mehreren Orten in Shropshire. In diesen untersten Schichten, vornehmlich aber in den obersten, hat man in neuester Zeit Fischreste gefunden. Ichthyosporuliten und Schuppen von Lepidoiden. Die Abtheilung besitzt eine Mächtigkeit von 2000 Fuß.

b. Dudley and Wenlock rocks. Wenlock-Kalk. Schichten von dichtem, bläulichem, crystallinischem Kalk, und von grauem groberdigem Kalkstein, bilden die obere Lage. Sie sind durch eine außerordentliche Menge von Corallen und Crinoiden ausgezeichnet, und schließen weiter ein: *Calymene Blumenbachii*, *Asaphus caudatus*, nebst mehreren anderen Trilobiten, wie *Homalonotus delphynocephalus*, *Paradoxydes bimacronatus* und *quadrimumacronatus*, *Cryptonymus Rosenbergii*, sodann mehrere *Orthoceras*-Gattungen, *Bellerophon tenuifascia*, *Euomphalus rugosus* und *discors*, *Conularia quadrirulcata*, *Terebratula cuneata* u. m. a. In diesen Schichten liegen die Steinbrüche von Dudley, aus welchen in zahlreiche Sammlungen ausgezeichnete Trilobiten-Exemplare übergegangen sind. Man sieht diese Ablagerung besonders in den Umgebungen von Wenlock in Shropshire, in Shermarshenshire und zu Dudley. Unter diesem Kalkstein liegen Schichten von dunkelgrauem, thonigem Schiefer, der wenig Stämme führt und gewöhnlich Knauer von erdigem Kalkstein einschließt, worinn *Asaphus caudatus*, *Calymene Blumenbachii*, *Orthoceras excentricum*, *nummularium*, *fimbriatum*, *canaliculatum*, *Bellerophon apertus*, *Modiola antiqua*, *Terebratula sphaerica*, *Orthis hybrida* und *filosa*, *Lepaena transversalis* u. e. a. vorkommen. Diese Schiefer sind ebenfalls an den oben bezeichneten Orten, an der Westseite der Malvernhügel, in Montgomery u.s.w. zu beobachten.

Die ganze Ablagerung der Wenlock rocks hat 1800 Fuß Mächtigkeit.

c. Caradoc-sandstone. Mit diesem Namen bezeichnet Murchison die Schichten von Forderley und der May-Hügel.

Die obere Lage besteht aus thonigem, dünngeschichtetem Kalkstein und aus schieferigem und dünnblättrigem, grauem Sandstein. Darinn liegen: *Pentamerus laevis* und *oblongus*, *Leptaena sericea*, *Bellerophon acutus* und *bilobatus*, *Asaphus Powisii*, *Trinucleus caractaci* und *simbricatus*, *Tentaculites scalaris* und *annulatus*, *Atrypa orbicularis*, *Orthis flabellatum*, *callactis*, *alternata* und *bilobata*, das Geschlecht *Cryptolithus*, zahlreiche *Trinobiden* und einige wenige Corallen.

Die untere Lage besteht aus dickgeschichtetem, rothem und grünem Sandstein und erdigem Kalkstein. Darinn liegen: *Trinucleus caractaci*, *Calymene punctata*, *Nucula Eastnori*, *Orthis testudinaria*, *expansa*, *pecten*, *alternata*, *canalis*, *aperturata* u. m. a.

Diese über 2000 Fuß mächtige Abtheilung hat den Namen *Caradoc*, nach einer höchst malerischen Gegend in Shropshire erhalten, in welcher der berühmte Anführer der Siluren, *Caractacus*, den Römern den letzten Widerstand leistete. Sie ist auch in Worcestershire, Gloucestershire, Caermarthenshire und Montgomeryshire entwickelt.

d. *Llandeilo flags and limestone*. Die unterste Abtheilung. Sie besteht aus Sandstein, der häufig als Quaderstein benutzt wird, aus dunklem, thonigem Schiefer, Kalkschiefer und kieseligen Conglomeratbänken. Diese Schichten schließen viele *Trilobiten* ein, namentlich *Asaphus Buchii*. Ihre Mächtigkeit geht bis zu 1200 Fuß. Sie sind zu Llandeilo in Caermarthenshire, bey Builth in Radnorshire, bey Shelve in Shropshire entwickelt.

Diese von Wurchison aufgestellten Abtheilungen lassen sich mehr oder weniger mit den Abtheilungen des deutschen Grauwacken- und Schiefergebirges parallelisiren. Eine genaue Vergleichung der betreffenden Continentschichten mit den Bildungen Englands, wird auch hier wieder neues Licht verbreiten. Buckland glaubt die drey oberen Abtheilungen des englischen, Silurischen Gebirges sowohl am Südrande der Ardennen, und in der Eifel, als auch in Nassau erkannt zu haben.

Terrain anthracifère, Anthracit-Gebirge, nennt

man die beschriebene Gruppe des Uebergangsgebirges wohl mit gutem Grund, da sie viele Anthracit-Lagerstätten einschließt. Zum Silurischen Gebirge werden wir doch wohl zählen müssen, die Anthracit- und Kohlenflöße zu Bally Fragaray im Loire Depart., zu Montrelais, Mouzell, Nort, Languin in der Bretagne, diejenigen bey Killarney, die der Grafschaften Cork und Limerick in Irland, die in Massachusetts, Pennsylvanien und Virginien in Nordamerika, und im nördlichen Devonshire in England.

Pflanzenreste kommen damit sparsam vor. Es sind Reste von Equiseten, Calamiten, Fucoiden. In den pennsylvanischen Anthracit-Revieren sollen auch Farn verkommen, und die Pflanzenreste bisweilen in mehreren Fuß starken Schieferlagen in großer Menge liegen.

Diese Kohlenablagerungen sind in der That recht interessant. Sie zeigen an, daß in einer früheren Zeit der Bildung unseres Planeten, in welcher so viele mächtige Meeresbildungen abgesetzt wurden, auch schon festes Land vorhanden und von Pflanzen bekleidet war. So geht denn dem ersten thierischen Leben in den Meeren der Erde, auch schon ein pflanzliches auf dem Land zur Seite. Europa und Nordamerika scheinen in jener entfernten Zeit denselben Entwicklungsgesetzen gefolgt zu seyn.

Im hohen Grade ausgezeichnet ist das Silurische Gebirge durch seine Erzführung, durch Mannichfaltigkeit und Reichthum seiner Erzlagerstätten. Mehrere wohlbekannte Erzgebirge, d. h. erzführende Gebirge; sind aus seinen Schichten zusammengesetzt. Eisen-, Blei-, Kupfer-, Zink-, Spießglanz-, Kobalt-, Braunkstein-, Quecksilber-, Silber-, Gold-Erze kommen darinn vor, auf Gängen und in lagerartigen Massen. Die vielen Eisenerzlagerstätten des Harzes, des Siegener Landes, Nassaus, des Fichtelgebirges und Voigtlandes, Böhmens u.s.w. liegen darinn, ferner ein großer Theil der Bleierzlagerstätten Böhmens, des Harzes, des westphälischen, siegenschen und rheinischen Gebirges, die Kobaltgänge des Siegenschen, mehrere Kupfererzlagerstätten Ungarns, des Harzes, des Siegenschen und Dillenburgischen, das Rammelsberger Erzlager, die Spießglanz-Vorkommnisse an der Ahr, am Harze, in Böhmen, Ungarn,

in Frankreich, die Manganerze von Devonshire, die Quecksilbererze von Almaden, und von Salathya in Ungarn, die Silber- und Golderze zu Zacatecas und im Norden von Simapan, in der Kette der Nevadas der columbischen Anden u.s.w.

Das Silurische Gebirge des Rheinlandes ist auch reich an Thermen (warmen Quellen), und an Säuerlingen. Aachen, Burscheid, Ems, Wiesbaden, Schlangenbad, diese bekannten Thermen, entspringen den Schiefer- und Grauwackeschichten, und ebenso die Sauerquellen von Selters, Fachingen, Gellnau und Schwalbach. An vielen Stellen der Wetterau und zwischen der Lahn und dem Main fließen starke Sauerquellen unbeachtet ab. Auch die Salzquellen der Saline Nauheim kommen aus dem Grauwackengebirge, und im Eifeler-Schiefergebirge tritt an vielen Stellen gasförmige Kohlensäure in die Luft aus. Es sind zahlreiche, wahre Kohlensäure-Quellen in der Eifel, und in den Umgebungen des Laacher-Sees bekannt. Darunter ist eine, Birresborn gegenüber, unter dem Namen Brudeldreis bekannt, was so viel bedeutet, als aufstochendes Wasser, und eine andere liegt bey Hesperath unfern Trier, und heißt Wellarborn, d. i. aufwallender Brunn. An beiden Orten strömt Kohlensäure in einer beckenförmigen Vertiefung aus Spalten des Gesteins hervor. Wenn sich nun Regenwasser in den Becken angesammelt hat, so streicht die Kohlensäure unter Blasenwerfen und Sprudeln durch das Wasser. Beym Brudeldreis hört man das dadurch verursachte Rösen schon in einiger Entfernung. Ist das Wasser ausgetrocknet, so tritt die Kohlensäure frey in die Luft aus. Kleine Thiere, Feldmäuse, Vögel, welche sich in die beckenförmige Vertiefung wagen, finden darinn ihren Tod, da sie in der Kohlensäure-Atmosphäre ersticken.

Alle diese Quellen treten theils in Gegenden auf, wo sich unverkennbare Spuren ehemaliger vulkanischer Thätigkeit vorfinden, theils in der Nähe plutonischer Massen.

Die allgemeine Aufrichtung der Schichten des Silurischen Gebirges, die mannfaltigen Perversionen, die sie erlitten haben, können wohl, so wie das Auftreten von Thermen und Säuerlingen, in dem Heraufsteigen der vulcanischen und plutonischen

Massen, in ihrem Einbringen in die Schichten, oder in ihrem Durchbruch ihren Grund haben.

Vielfältig steht man Gränstein, Granit, Porphyr, Syenit, Basalt u.s.w. in den Schichtenverband eingeschoben, und dadurch den Zusammenhang derselben unterbrochen.

Die Formen des Silurischen Gebirges sind je nach Mächtigkeit, Schichtenstellung und Erhebung sehr verschieden, und im Wesentlichen dieselben, wie bey der tieferen Gruppe, weshalb bey Beschreibung dieser, das Weitere hievon.

Die Verbreitung ist sehr groß und oben schon vielfach speziell angedeutet. Zwischen der Maas und dem Rhein tritt das Silurische Gebirge mächtig auf an den Ardennen, an der Hohen Beem, in der Eifel und in den Moselgegenden bis zum Hundsrück; jenseits des Rheins im westphälischen und siegenschen Gebirge, am Westerwald, in der Wetterau und am Taunus, sodann am Fichtelgebirge, im Voigtlande und am Harz.

In Böhmen erfällt es das Land zwischen den westlichen Zuflüssen zur unteren Moldau, es ist ferner in Mähren, an den Karpathen, in Süd-Polen, in Süd-Schweden, in Norwegen, im Westen und Süden von England, im Süden von Schottland entwickelt, in Irland, in der Bretagne, in den Umgebungen von Carcassonne, an den Pyrenäen, in den östlichen Norischen Alpen und in West-Ungarn. In Rußland kennt man es am Ural und in der Gegend von Petersburg. In großer Verbreitung erscheint es ferner in Nordamerika, in Mexico, Peru und Brasilien. In Afrika hat man analoge Bildungen am Cap, im Süden der nubischen Wüste und im Berberland beobachtet.

4. Cambrisches Gebirge.

Syn. Terrain de Transition inférieure, Terrain ardoisier; Altes Uebergangsschiefergebirge.

Als Unterlage des Silurischen Gebirges erscheint an vielen Orten eine beynahe versteinungsleere Reihe von Schichten, welche in neuester Zeit Sedgwick genauer untersucht und Cambrisches System genannt hat, da er sie in England, vorzüglich in denjenigen

Gegenden studierte, welche die Cambrian Mountains einnehmen. Sedgwick unterscheidet drey Abtheilungen.

a. Plynlimon-rocks. Grauwacke und Thonschiefer mit Bänken von Kieselconglomerat. Der hier auftretende Thonschiefer ist dunkel gefärbt, hart, dünnschieferig und hat gewöhnlich eine solche Beschaffenheit, daß er in Platten zu verschiedenen Zwecken, und namentlich zu Dachungen benützt werden kann. Er schließt bisweilen einige Corallen und Trilobiten ein. Die Grauwacke ist sehr fest, vorherrschend grobkörnig, mitunter schieferig und schließt Fragmente von Thonschiefer ein. Diese Lage ist mehrere tausend Fuß mächtig.

b. Bala limestone. Bala-Kalk. Dunkler, dichter Kalkstein und Kalkschiefer. Enthält einige Corallen und Trilobiten. Von geringer Mächtigkeit.

c. Snowdon-rocks. Verschiedenfarbige Thonschiefer, von feinem Korn und ausgezeichneter Schieferung, mit Grauwacke und Kieselconglomerat. Schließt einige Corallen (Cyathophylla) und Trilobiten ein. Die Mächtigkeit beträgt einige tausend Fuß.

Diese Schichten sind über einem großen Theil von Cumberland, Westmoreland und Lancashire verbreitet, setzen malerische Gebirgsgegenden von Nord-Wales zusammen, erscheinen am Abfall des Grampiangebirges im Westen von Schottland, umsäumen das Grundgebirge Irlands, treten mächtig in Cornwall auf, auf Anglesea und der Insel Man.

Eine scharfe Trennung derselben von den untersten Schichten des Silurischen Gebirges findet nicht statt. Ebenso wenig möchte die Trennung vom crystallinisch-schieferigen Grundgebirge mit Schärfe geschehen können, da die Thonschiefer gar oft in Talc- und Chloritschiefer, selbst in wahren Glimmerschiefer übergehen, und den petrefactenleeren, crystallinischen Schiefen enge verbunden sind. Viele dieser Schichten haben nach ihrem Absätze offenbar eine Veränderung erlitten, bey welcher sie aus dem Zustande mechanischer Absätze, vermöge einer chemischen Action, in einen crystallinischen Zustand übergegangen sind, und bey welchem sich wahre Crystalle gebildet haben. Das zeigen die Crystalle von Chalkolith, Granat, Glimmer, Chlorit, Magnetkies, Talc und die Uebergänge des Thon-

schiefers in Chloritschiefer, Talkschiefer, Glimmerschiefer doch wohl deutlich an: Der durchaus festere Zustand des cambrischen Thonschiefers, seine häufig zu beobachtende Sprödigkeit und ungewöhnliche Härte, verbunden mit einer Spaltbarkeit nach Richtungen, welche diejenigen der Schichtungsflächen unter großen Winkeln schneiden, läßt vermuthen, daß dieser Schiefer nach seinem Absatze aus den Gewässern gehärtet worden ist. Nehmen wir an, daß diese Härtung durch eine hohe Temperatur bewirkt worden seye, so stimmt es mit allen Erfahrungen gegenwärtiger Zeit und mit den bekannten physikalischen und chemischen Thatfachen gut überein. Wir vermögen auch einzusehen, wie crystallisirte Silicate, diejenigen des Granats, Glimmers u.s.w., sich bey einer höheren Temperatur bilden, und müssen zugeben, daß Crystalle von Magnet Eisen dabey entstehen können, da wir sie so häufig in geschmolzenen Gesteinen, Lavas, Basalten antreffen.

Die Masse des ältesten Thonschiefers, die häufig mit Grauwacke wechselt, ist offenbar eine Sedimentbildung. Das Verhalten zur Grauwacke, diesem aus Bruchstücken zerförter älterer Gesteine gebildeten Conglomerate, worinn wir so allgemein verbreitet Feldspathkörner finden, zeigt dieß unzweydeutig an. Die Uebergänge dieses Schiefers in die ganz crystallinischen Bildungen des Chlorit-, Talk- und Glimmerschiefers sind vielfach und von ausgezeichneten Geologen nachgewiesen worden, und können von Jedem selbst leicht beobachtet werden.

Die Metamorphose der cambrischen Gesteine tritt an den Pyrenäen, in der Bretagne, in den Alpen, an den Eubeten, am Harz, im Fichtelgebirge u.s.w. so deutlich hervor, daß sie der Beobachtung nicht entgehen kann.

In Deutschland bestehen die ältesten Schichten des Uebergangsgebirges in der Regel aus harten und spröden Thonschiefer-Abänderungen, welche man in der Nähe des schieferigen oder plutonischen Grundgebirges manchfaltig modificiert, in Hornfels (Harz), in Gneis (Fichtelgebirge) in Glimmerschiefer (Eubeten) übergehen sieht. Fr. Höffmann sagt in seiner „Uebersicht der orographischen und geognostischen Verhältnisse vom nordwestlichen Deutschland,“ 2te Abtheilung: Kaum würde man ahnen können, was hier (an den Quellen der Saale im Fichtelgebirge)

vorgeht, belehrten uns nicht die Erscheinungen, sobald wir uns den Granitkuppen nähern, daß hier von einer wirklichen, tausendfach modificierten Umwandlung der Thonschiefer in eine unzweydeutige Gneissmasse die Rede sey. Grauwacke und feste quarzige Sandsteine oder Quarzfelsarten kommen gewöhnlich mit dem Thonschiefer engverbunden vor. Dachschiefer, Wehlschiefer, Kiesel-schiefer, einzelne Kalklagen erscheinen untergeordnet.

Die Schichten des Cambrischen Gebirges sind stark aufgerichtet, wie diejenigen des Silurischen Gebirges, und haben, wie diese, mannfaltige Berrüttungen erlitten. Die Aufrichtungen und öfters so gewaltigen Zerrüttungen dieser beiden großen Gebirgsbildungen haben im Allgemeinen vor der Ablagerung des Hauptsteinkohlengebirges stattgefunden, denn man sieht in den mehrsten Gebirgen die Steinkohlenbildung ungleichförmig auf das aufgerichtete Schiefergebirge abgelagert.

Zahlreiche Granit-, Spenit-, Porphyr-, Grünstein-Massen haben dasselbe gehoben, aufgerichtet, sind zwischen seine Lagen eingedrungen, oder haben dieselben durchbrochen und die Schichten zersprengt. Als eine Folge derartiger Zerrüttungen erscheinen manche enge, felsige Querthäler in diesen Schiefergebirgen.

Die zahlreichen Sprünge und Spalten, welche dabey entstehen mußten, sind zum großen Theil mit Erzen ausgefüllt; und man findet daher auch im ältesten Uebergangsgebirge viele Erzlagerrstätten. Eisensteinvorkommnisse im Fichtelgebirge, in den Ardennen u.s.w. gehören hieher, die Zinn- und Kupferlagerrstätten von Cornwall, der reiche Silbergang zu Guanajuato, die reichen Silbergänge zu Tasco und Tehuilotepic in Mexico, die Spath-eisenlagerrstätten zu Bordenberg und Eisenerz in Steyermark u.s.w.

Die Formen des Silurischen und Cambrischen Gebirges sind sich im Ganzen sehr ähnlich. Letzteres erscheint häufig in einem höheren Niveau, da es, angelehnt an crystallinische und plutonische Massen, mit diesen höher gehoben worden ist, als die entfernteren silurischen Schichten.

Bey mächtiger Entwicklung und starker Aufrichtung der Schichten sieht man tiefe, enge und felsige Thäler, mit steilen und trümmerbeladenen Gehängen, und diese öfters durch treppen-

artige Abfälle der Schichtenköpfe des Schiefers ausgezeichnet (Rheinthal zwischen Bingen und Coblenz, Moselthal, Ahrthal). Sind die Kalkmassen vorwaltend, so bilden sie meistens ausgezeichnete Felsen, in den verschiedenartigsten, rauhesten und wildesten Gestalten, nicht selten unersteigliche, mächtige Felswände, Hörner und Zacken (Hybichenstein am Harz, oberes Salzathal in den östlichen Alpen, Shropshire und Montgomery in England).

Erreichen die Massen keine bedeutendere Höhe, und sind die Schichten, wenn auch in aufgerichteter, doch auf größere Strecken in gleichförmiger Stellung, so zeigt das Grauwacken- und Rhonschiefergebirge breite, kuppige und flachgewölbte Berge oder langezogene Rücken, und ermädet durch Einförmigkeit seiner Formen (Ardennen).

Am mächtigsten tritt das Rhonschiefer- und Grauwackengebirge in den Anden auf. Es setzt dort die ganze große Masse der östlichen Cordillieren, im Norden der Parallele von 17° S. zusammen, und constituirte den Nevado von Sorata und den Illimani, die Colossen der neuen Welt. Es ist von vielen goldführenden Quarzgängen durchzogen, welche die alten Peruaner in einer Höhe von 16,000 engl. Fuß, lange vor dem Einfall der Europäer, abgebaut haben.

Die Verbreitung des Cambrischen Gebirges ist ziemlich derjenigen des Silurischen Gebirges gleich. In Brasilien, so wie am Ural, scheint es die ursprüngliche Lagerstätte des Demants zu seyn.

Die verschiedenen Gebirgsbildungen, welche wir in ihrer regelmäßigen Aufeinanderfolge angeführt und beschrieben haben, finden sich auf diese Weise entwickelt, kaum irgendwo alle zusammen in unmittelbarer Verbindung, von den obersten bis zur untersten. Bald fehlt in einer Gegend diese oder jene Bildung. Jüngere Schichten liegen häufig nicht unmittelbar auf den nächstfolgenden ältern, sondern häufig, wenn diese fehlen, auf viel tieferen, die bey vollkommener Entwicklung aller Schichten durch eine große Zwischenreihe davon geschieden sind. So steht man im nördlichen Frankreich die Kreidebildung unmittelbar auf dem Hauptsteinkohlegebirge liegen, am Schwarzwalde den

Bunten Sandstein unmittelbar auf dem Todtliegenden ruhen, und dieses an vielen Stellen auf dem Grundgebirge. Bey Lepliz liegt der sächsische Quadersandstein auf Gneis, bey Karlsbad das Braunkohlengebirge auf Granit, bey Wiesbaden das Tertiärgebirge auf dem Grauwackengebirge, bey Baden-Baden das Rothliegende auf Thonschiefer u.s.w.

Die Reihenfolge der beschriebenen Gebirgsbildungen ist ein Resultat aller bisherigen Beobachtungen in den verschiedensten Theilen der Erde. Das beobachtete Vorkommen der gleichartigen Bildungen an den entferntesten Orten und in allen Zonen beweist, daß die Verhältnisse, unter welchen in den verschiedenen Perioden der Bildung der Erdrinde Schichten sich abschieden, ganz allgemein verbreitet waren. Locale Umstände haben dabey vorzüglich auf die Beschaffenheit der Gesteine eingewirkt, und Verschiedenheiten hervorgerufen, wie sie die geognostischen Äquivalente zeigen.

Grundgebirge.

Syn. Unteres schieferiges und versteinungsloses Gebirge; Urgebirge; Terrains primitifs; Primary rocks.

Unter dem Cambrischen Gebirge liegt eine mächtige Masse petrefactenleerer, crystallinischer Gesteine. Sie besitzen eine ausgezeichnete blätterige oder schieferige Structur, zeigen aber keine deutlich ausgesprochene Schichtung. Da sie die tiefste, also die älteste Lage ausmachen, so hat man sie nicht unpassend mit dem Namen Grundgebirge belegt.

Nach oben, ist das schieferige Grundgebirge häufig durch die allmähligsten Uebergänge mit den Thonschiefern des cambrischen Gebirges verbunden. Was unter demselben liegt, ist theils unbekannt, theils sehen wir plutonische Massen darunter, aber niemals ohne dessen Verrückung aus der horizontalen Lage, so daß wir diese massigen Gesteine als spätere Bildungen ansehen müssen.

Beym Eintritt in das Grundgebirge treten uns lauter crystallinische Bildungen entgegen. Nichts mehr, was an Sedimentbildungen erinnert; keine conglomeratischen Gesteine.

Glänzende Crystalle erfüllen die Gesteine oder crystallinische Gestealten, und ziehen den Mineralogen und Mineraliensammler an. Drüsenräume geben ihnen reiche Ausbeute der schönsten und verschiedenartigsten Mineralindividuen. Hier ist alles Product chemischer Action.

Als Hauptmassen treten im crystallinisch-schieferigen Grundgebirge Gneis und Glimmerschiefer auf; Chlorit-, Talk- und Hornblende-Gesteine erscheinen in kleineren Parthien; untergeordnet körniger Kalk, der feldspathige Weißstein, Quarzfels und der granatreiche Eklogit.

Der Gneis tritt in der größten Verbreitung und Ausdehnung auf. Er bedeckt ununterbrochen in einigen Ländern Tausende von Quadratmeilen, und erscheint in den mannichfaltigsten Abänderungen; einerseits in Annäherungen zum Weißstein und Granit, andererseits zum Glimmerschiefer. In untergeordneten Massen, Stock- oder lagerartig, erscheinen darinn körniger Kalk, Quarzfels, Eklogit (Fichtelgebirge), Weißstein (Naviest in Polen, Penig in Sachsen), Hornblendegesteine, und durch Uebergänge sieht man ihn verlaufen in Chloritschiefer und Talkschiefer. Durch Ueberhandnehmen von Feldspath wird er dickblättrig, granitisch. Abänderungen dieser Art spalten sich in der Regel leicht in einer Richtung, welche die Glimmerlage ziemlich lothrecht schneidet. Die Schieferung ist niemals auf große Entfernungen gleichförmig, dagegen häufig gebogen, verschiedenartig gekrümmt und gewunden. Was man auch von wahrer Schichtung des Gneisses sagen mag, so kann es doch nur nothdürftig für einzelne kleine Stellen als Annäherung dazu gelten, da die Gneisblätter niemals auf größere Strecken und unter sich in Parallelismus fortliegen, wohl aber nach Fallen und Streichen auf ganz kurze Distanzen so sehr variiren, daß eine Regel dafür anzugeben kaum möglich ist. Die Uebergänge in Granit zeigen auch deutlich an, daß man kein Sediment-Gestein vor sich hat, und die unbefangene Betrachtung der Structur des Gneisses muß ihre Vergleichung mit der Schichtung, und jeden Gedanken daran, sogleich verdrängen.

In den Alpen wird der Glimmer des Gneisses öfters durch Talk oder Chlorit ersetzt. Solche Abänderungen hat man Protogyn

genannt, in der irrthümlichen Meynung, daß dieses Gestein das älteste der Alpen seye. Man sieht es in den Umgebungen des Mont-Blanc in den westlichen, am Splügen und Bernina in den östlichen Alpen. Dieser Protogyn ist gewöhnlich dickblättrig, granitisch.

Der Glimmerschiefer steht in mehreren Gebirgen, namentlich in den Alpen und in den Subeten, nach oben, in einer nahen Verbindung mit Thonschiefer, welcher, so viel man bis jezt weiß, petrefactenleer ist. Man hat ihn deshalb auch mehrfältig zum Grundgebirge gewählt, und auch Urthonschiefer genannt, obgleich seine Sedimentnatur unverkennbar, und er darnach zum Sedimentgebirge zu rechnen ist.

Im Innern der Glimmerschiefer-Masse steht man die zahlreichen Wänderungen des Gesteins, seine Verknüpfung mit Gneis, Chlorit- und Talkschiefer, Hornblendeschiefer, seinen Uebergang in schieferigen Quarzfels, durch Ueberhandnehmen und Zusammenfließen der Quarzkörner. In Brasilien geht aus einer ähnlichen Veränderung des Talkschiefers der Itacolumit hervor, der sogenannte Gelenkquarz oder biegsamer Sandstein, ein quarziger Talkschiefer (S. 497). Er hat große Verbreitung im brasilischen Gebirge, und steht mit einer anderen interessanten Schiefermasse, dem Eisenglimmerschiefer, in Verbindung.

Mehrfältig liegen Massen von körnigem Kalk im Glimmerschiefer, theils in unregelmäßigen, stockförmigen, massigen Parthien, theils lagerartig und in regelmäßige Bänke abgetheilt, und mit Glimmer oder Talkblättern auf den Schichtungsflächen. Auf solche Weise kommen die schönen Marmore zu Saas und Schlanders in Tyrol vor, die vielen körnigen Kalkmassen in den Salzburger Alpen, im Schleßischen Gebirge u.s.w. Auch Dolomite liegen mehrfältig im Glimmerschiefer.

Ganz ausgezeichnet ist der Glimmerschiefer und die ihn begleitenden Chlorit- und Talkschiefer durch Einschluss zahlreicher und schön crystallisierter Mineralien. Vor allen erscheint der Granit in großer Menge, sodann Cyanit, Staurolith, Hornblende, Bitterspath, Pistazit, Magnetisen, Titanit, Rutil, Andalusit, Smaragd u. s. w. Eine interessante Fundstätte von Mineralien

ist die in Glimmerschiefer eingeschlossene Dolomitmasse bey Campo-Longo am Gotthardt, allwo namentlich auch die schönen, grünen Turmaline und die blauen Cornude gefunden werden.

Die Blätterlagen des Glimmerschiefers sind gewöhnlich dünn, häufig wellenförmig gekrümmt und verschiedenartig, bisweilen selbst im Biazad, gebogen. Die kleineren Quarz- und Kalklager machen gewöhnlich alle Biegungen mit.

Der Quarzfels ist oft sehr rein und crystallinisch, in Bänke abgesondert und bisweilen dergestalt körnig, daß er sandsteinartig ausseht.

Diese verschiedenen Gesteine des Grundgebirges beobachten durchaus keine als Regel geltende Aufeinanderfolge. Sie wechseln häufig auf verschiedene Weise mit einander ab, verlaufen in einander und gehen selbst in massige crystallinische Bildungen über. Die Lagerungsfolge: Thonschiefer, Glimmerschiefer, Gneis, ist zwar in manchen Gebirgen beobachtet worden, aber in weit mehr Fällen hat man Ausnahmen davon, und den angeführten verschiedenartigen und mehrfachen Wechsel dieser Bildungen gesehen.

In der Regel liegen nun Glimmerschiefer, Gneis u. s. w. immer unter den petrefactenführenden Schichten, als deren Grundlage. Das Darausfliegen jener, so wie die Bruchstücke, welche sie von den crystallinisch-schieferigen Gesteinen einschließen, zeigen deutlich an, daß sie jünger sind. An mehreren Puncten sieht man indessen diese crystallinischen Gesteine auf den neptunischen Schichten liegen, oder in einer solchen Verbindung mit petrefactenführenden Lagern, daß sie nur durch späteres Einbringen in die schon vorhandenen Sediment-Schichten in dieselbe gekommen seyn können, und demzufolge auch erst später, nachdem die aus Wasser abgesetzten Schichten schon gebildet waren, ihre gegenwärtige Stellung eingenommen haben.

Der ausgezeichnetste Punct dieser Art ist in den Berner Alpen, im Urbach-Thal. Im Urbach-Sattel, zwischen diesem Thal und dem Rosenlavi-Gletscher, steht man in einem Profile von nahezu 5000 Fuß Höhe, von dem Rosenhorn her (Fig. 25) ganz deutlich vier bis fünf Gneis-Reile in den Kalkstein des Stellihorns hineinschauen. Der Kalkstein ist

zwischen den Keilen körnig, zum Theil bunt gefärbt und von Kalkblättchen durchzogen, zum Theil von der Beschaffenheit der Rauhwacke. Der Gneis hat die Beschaffenheit des Protogyns. Dieses merkwürdige Verhältniß, auf welches zuerst Hugi in seinen „Alpenreisen“ im V. Abschnitt aufmerksam gemacht, und sodann Stuber später genau beschrieben hat, findet seine Erklärung in der Annahme, daß der Gneis von unten in das aufgesprengte Kalkgebirge eingebracht ist. Er müßte sich dabei in einem weichen Zustande befunden haben, sonst hätte er nicht die Spalten des Sedimentgebirges ausfüllen können. Der Kalkstein des Ostalihorns und des Engelsstocks gehört zum Juragebirge, und der Gneis ist an dieser Stelle, also erst nach der Bildung der Jura-Schichten, in seine jetzige Stellung gekommen.

Solche und ähnliche Lagerungsverhältnisse zwischen den crystallinisch-schieferigen Gesteinen und den petrefactenführenden Formationen, hat man am Schwarzwalde, im Fichtelgebirge, im Erzgebirge, in Schottland und in mehreren anderen Gebirgen beobachtet, so daß sie nicht zu den sehr seltenen Erscheinungen gehören. Sie schließen sich denjenigen an, welche wir zwischen Sediment-Schichten und plutonischen Gesteinen häufig wahrnehmen, in welche sich auch die crystallinischen Schiefer verlaufen.

Von ganz besondere Bedeutung ist die Erzführung des crystallinischen Schiefergebirges, und insbesondere des Gneises. In ihm liegen die vielen und weichen Gänge des sächsischen und böhmischen Erzgebirges, ein großer Theil der Gänge des Schwarzwaldes, die vielen Gänge in den Salzburger Alpen u. s. w., auf welchen Gold-, Silber-, Kobalt-, Kupfer-, Blei-, Eisen-, Spießglanz-, Zink-, Arsenik-Erze vorkommen.

Namentlich ist auch das nordische Gneisgebirge metallreich. Im Gneisgebirge Scandinaviens liegen die meisten Erzlager von Eisen, Kupfer und silberhaltigem Bleisilber. Diese Erzlager sind meistens stockförmig und bisweilen von ungeheurem Umfang. Hierhin gehört das Erzlager von Fahlun, von Sala, die Dannemora-Eisenerzlagersstätte und die gigantischen Eisenstein-Lager von Lappmarken, von welchen der Gollivareberg, 22 Meilen von der Stadt Luleå entfernt,

sich beynahe bis zur Alpenhöhe erhebt, 8000 Ellen Länge und 3 bis 5000 Ellen Breite hat, und seiner ganzen Masse nach aus magnetischem Eisenerz besteht.

Diese nordischen Eisenlager widerstehen der Witterung länger als der sie umgebende Gneis, bleiben stehen während jener zerfällt und seine Massen niedriger werden, und stehen dann als wahre Eisenberge da.

Der Glimmerschiefer ist ebenfalls metallführend, doch im Allgemeinen nicht so metallreich als der Gneis. In ihm liegen viele Gänge, die Bleeglanz-Blende und Eisenspath führen, in den Salzburger Alpen, auch sehen die gold- und silberführenden Gänge aus dem Gneis dieser Alpengegend in Glimmerschiefer über, verlieren aber bald den Gold- und Silbergehalt. Es liegen darinn die edeln Silbergänge von Rangsberg, die Goldgänge von Andelfors, die Gänge von Kupferberg und Sieren in Schlessen, mehrere Kupfergänge in Ungarn, die Kupfererze von Røraas in Norwegen, mehrere Eisenstein- und Bleeglanz-lager des schlesischen Gebirges, die Kobaltlagerstätten von Lynaberg und Skuttwud in Scandinavien. Bey Goldenstein in Mähren, bey Hafuerzell, unsern Passau, am Pic du Midi en Bigorre liegt Graphit im Gneis und Glimmerschiefer.

Die Mächtigkeit der crystallinischen Schiefer ist außerordentlich groß. Man sieht sie häufig mehrere Tausend Fuß mächtig, und in allen Höhen vom Meerespiegel an (die Scheeren längs des scandinavischen Westlandes) bis zu Höhen von mehr als 12,000 Fuß (Alpen). Sie ragen gewöhnlich über die Sedimentbildungen hervor; öfters aber steht man sie auch nur am Fuße eines vorzüglich aus petrefactenführenden Schichten zusammengesetzten Gebirges, oder erst im Hintergrunde der Thäler.

Die Formen sind mannichfaltig. Bey geringer Höhe der Massen sind die Umrisse der Berge sanft, gerundet, und die Thäler mulden- und wannenförmig. Große zusammenhängende und niedrige Gneis- und Glimmerschiefermassen setzen wellenförmige Bergebenen und Plateaus zusammen. Erreichen sie aber eine bedeutende Höhe, und liegen viele untergeordnete Massen von Quarzfels und Kalkstein darinn, dann treten auffallendere

Formen auf. Hohe, langgezogene Rücken, mit steilem Abfall und oft felsigen oder, zumal im Gneisgebirge, ganz steilen, manerartigen Gehängen, schließen tiefe Thäler ein. Die Gipfel sind ausgezackt und zerrissen, wenn Quarz- und Kalkmassen, oder quarzige Gneise, dieselben bilden. Auf dem Kamm erheben sich einzelne domförmig oder parabolisch gewölbt, wenn ihn die Schiefer allein zusammensetzen. Die Quertbäler sind gewöhnlich eng, mitunter tiefe, von steilen und hohen Felsenmauern eingeschlossene Spalten (Schwarzwald, Hübenthal).

Im Alpengebirge sehen sie colossale Berge zusammen. Die Formen überraschen hier durch Größe, und häufig auch durch Reinheit und Wildheit. Mächtig hohe Ketten, mit scharfen Gipfeln und steilen Abfällen, steigen über einander auf und umschließen lange und tief eingerissene Thäler. Die härteren Gesteine bilden an diesen öfters wilde Felsen und schauerliche, gigantische Felsentreppe (Tauern). Die stark verwitternden Stimmerschiefergehänge sieht man häufig, zumal wenn sie unbedeckt oder durch kalten Abtrieb nackt gemacht, allen Angriffen der Witterung preisgegeben sind, tief eingefurcht; in lange, von der Höhe gegen den Fuß herabziehende, und gegen diesen immer weiter und tiefer werdende Schränke graben sich die Wasser ein und führen unermessliche Schuttmassen durch diesen herab in das Thal und über fruchtbare Gefilde. Der sonst so wohlthätige Regen eines Gewitters zerstört hier oftmals die Erndte einer ganzen Gemeinde (Vinschgau in Tyrol).

Der Gneis zeigt immer rauhere Formen als der Stimmerschiefer, da er härter ist, und wenn er viel Quarz und Feldspath führt, langsam verwittert. Er bildet im Hochgebirge daher nicht selten scharfe Hörner, wie z. B. das Trifanhorn über dem Urbachthal (Fig. 26, nach Hugi, welche zugleich die Ansicht einer zwischen Protogyn eingetheilten Kalkmasse gibt). Die Gehänge zeigen gewöhnlich viele treppenartigen Vorsprünge der über einander liegenden Gneisplatten, und sind dadurch erstiglich. In der Regel zeigt sich etwas Graswuchs auf solchen Stellen, den die Gaisen (Ziegen) aufsuchen. Der Aelpser nennt den Gneis deshalb in einigen Gegenden der Schweiz Gaisberg.

Die Quellen des Grundgebirges zeichnen sich im All-

gemeinen durch eine große Reinheit aus, und ihr Wasser ist zu vielen Zwecken wie destillirtes Wasser zu gebrauchen, da es gewöhnlich, außer Spuren von Kochsalz und etwas Kohlensäure, keine anderen fremden Substanzen enthält.

Mehrfältig entfließen aber auch Mineralquellen seinen Lagen, und zwar Thermen und Säuerlinge. In den Alpen erscheinen unter solchen Verhältnissen die warmen Quellen von Raters, Leuk, Bagnes, Chamouny, St. Ger-
vais, Aix les Bains, Montiers, Veiba, Petersthal, Bagnu bi St. Martino, Gastein u.s.w. Auch aus dem schlesischen Gneisgebirge (Landeck), aus dem Grundschiefergebirge Neu-Andalusiens, Venezuelas und der Insel Trinidad kommen heiße Quellen. Die Quellen von Baden-Baden treten aus Conglomeratschichten hervor, die auf Gneis ruhen.

Säuerlinge kommen in großer Zahl aus dem Gneisgebirge des Schwarzwaldes hervor. Die Quellen von Rippolsan, Griesbach, Petersthal, Autogast, sind bekannt. Auch im Fichtelgebirge, in Böhmen quellen viele Säuerlinge aus den crystallinischen Schieferen hervor.

Ihre Verbreitung ist ganz allgemein. Sie bilden die Hauptmasse der Centralkette der Alpen, treten in den Pyrenäen, an den Cevennen, in Limousin, an den Vogesen, am Schwarzwalde, Odenwalde, Spessart, im Fichtelgebirge, am Thüringerwalde, im Erzgebirge stark entwickelt auf, am Harz aber nur sehr untergeordnet. Im Norden setzen sie die Hauptmasse des scandinavischen Gebirges zusammen, und überdecken in außerordentlicher Ausdehnung Schweden und Norwegen. Sie erscheinen auf Grönland, in Schottland, am Ural, in Nordamerika, im Aequinoctial-America, in Brasilien, auf den griechischen Inseln, am Himalaya u.s.w.

II. Classe.

Massige Gebirgsbildungen.

Syn. Ungeschichtete Gebirgsarten; abnorme Felsmassen,

Auf den ersten Anblick unterscheidet man diese Gebirgsbildungen von den geschichteten und crySTALLINISCH-schieferigen durch den gänzlichen Mangel dieser Structur-Verhältnisse und ein unregelmäßiges, häufig isolirtes Auftreten. Das vorwaltende Gefüge der Gesteine ist körnig, und an der Stelle der plattenförmigen Absonderung erscheinen eigenthümliche, durch den crySTALLINISCHEN Character der Massen bedingte Structurverhältnisse.

Der Glimmer und die damit gewöhnlich vorkommenden blätterigen Mineralien, Talk und Chlorit, treten in diesen Gesteinen sehr zurück, wogegen Feldspathe, Hornblende und Augit vorherrschend und als Hauptbestandtheile der Gebirgsarten dieser Classe vorkommen. Auch der Quarz, so verbreitet und vorwaltend in den geschichteten Bildungen, und selbst noch in den crySTALLINISCHEN Schiefern, tritt mehr zurück, und fehlt sogar bey einer großen Zahl hierher gehörender Gesteine, namentlich bey den augitischen, vollkommen. Dagegen sind viele derselben von schwarzen Körnern des magnetischen Eisenerzes erfüllt, und enthalten öfters auch Titaneisen und Chromeisen.

Viele massigen Gesteine haben ganz dieselben Bestandtheile, aus denen die crySTALLINISCH-schieferigen zusammengesetzt sind, so z. B. hat Granit dieselben Bestandtheile wie der Gneis. Der Unterschied liegt einzig in der Structur. Wir haben auch gesehen, daß sie vielfältig ineinander verlaufen, und haben ferner den Uebergang von Sedimentbildungen, z. B. des Thonschiefers, in crySTALLINISCH Gesteine kennen gelernt, und dabey in Betrachtung gezogen, daß solche Umwandlungen nur durch eingetretene chemische Action erfolgt seyn können, welche zunächst durch Erhöhung der Massen rege gemacht wurde.

Die massigen Gesteine haben theils den Character völlig geschmolzener Massen, theils solcher, deren Bildung unter Einfluß einer hohen Temperatur erfolgt ist. Jene schmelzen heute noch in den Vulkanen, und heißen deßhalb auch ganz passend vulcanische Gesteine; die letzteren zeigen durch ihr Vorkommen unzweydeutig an, daß sie von unten herauf, daß sie aus dem Erdinnern emporgestiegen sind, und heißen plutonische Gesteine, da ihre Bildung im Reiche des Pluto, des griechischen Gottes der Unterwelt, stattgefunden hat.

I. Ordnung. Vulcanisches Gebirge.

Syn. *Terrains volcaniques; volcanic rocks.*

Das vulcanische Gebirge ist aus Gesteinen zusammengesetzt, die theils im geschmolzenen und durch Hitze erweichten, theils im festen Zustande, durchgeglüht, mehr oder weniger zerstoßen und zerrieben aus dem Erdinnern an die Oberfläche gehoben, darüber ergossen, oder durch Auswurf verbreitet worden sind.

Wenn man im gewöhnlichen Leben von Vulkanen spricht, so versteht man darunter alle Berge, aus welchen unterirdisches Feuer und geschmolzene Materien ausbrechen, und unter vulcanischen Erscheinungen begreift man auch alle Rauch-, Dampf- und Gasausströmungen, alle Wasser-, Schlamm- und Bitumen-Ergüsse, die aus dem Innern der Erde hervortreten. Die Eingebornen des ehemaligen spanischen Americas und der Philippinen unterscheiden nach v. Humboldt sogar förmlich zwischen Wasser- und Feuer-Vulkanen. Sie nennen Wasservulkane die Berge, aus welchen bey heftigen Erdstößen von Zeit zu Zeit unterirdische Wasser mit dumpfem Krachen ausbrechen.

Dieser Sprachgebrauch vereinigt Phänomene, die unzweydeutig zusammenhängen, wenn sie mit Vulcanismus, im weitesten Sinne des Wortes, alle Erscheinungen bezeichnen, die von der Reaction des inneren, flüssig gebliebenen Theils unseres Planeten, gegen seine oxydierte, erdige und erhärtete Oberfläche, herrühren. Die große Mannfaltigkeit der dazu gehörigen Massen und die verschiedenartigen Erscheinungen lassen sich, unter gewisse Abtheilungen gebracht, leicht auffassen.

Vulcane.

Vulcane, im geognostischen Sinn des Wortes, sind einzelnstehende, steil emporsteigende Kegelberge oder Dome, welche durch einen offenen Schlund (Crater), und eine von diesem aus in die Tiefe gehende Spalte, eine fortwährende Verbindung zwischen dem Erdbinnern, dem Herde ihrer eigenthümlichen Thätigkeit und der Atmosphäre unterhalten, und aus welchen von Zeit zu Zeit Feuer, Steine und geschmolzene Materien hervorbrechen. Es gibt jedoch auch Vulcane, welche nicht kegelförmig sind, sondern die Gestalt langgezogener Rücken haben (Pichincha).

Die Gesteine, welche sie zusammensetzen, und sich schon durch ihr sporadisches Auftreten bemerklich machen, sind bald eigentliche Trachyte, welche der Feldspath characterisirt (Pit von Teneriffa);

bald Andesite, aus Albit und Hornblende bestehend, wie an den Vulkanen von Chili, am mexicanischen Vulcan von Toluca und am Vulcan von Puracé;

bald Melaphyre, von dolomitartiger Zusammensetzung, wie am Aetna, Stromboli, Chimborazo und Pichincha;

bald endlich sind es Leucitophyre, Gemenge von Leucit und Augit, wie an der Somma, der alten Wand des vesuvischen Craters.

Durch diese Massen, die oft zu hohen Domen und geschlossenen Glocken emporgehoben sind, haben sich die vulcanischen Mächte eine permanente Verbindung mit dem Luftkreis geöffnet.

Auf dem Gipfel solcher Berge, deren Höhe und Umfang sehr verschieden sind, indem sie von niedrigen Hügeln bis 17,000 Fuß ansteigen, und an Umfang zur Höhe sich z. B. beim Pit von Teneriffa wie 28 zu 1, beim Aetna wie 24 zu 1 und beim Vesuv wie 35 zu 1 verhält, befindet sich jederzeit eine kesseltichter- oder beckenförmige Vertiefung, der Crater (Fig. 27). Dieser verläuft sich nach unten in einen Schlot, der in die Tiefe niedergeht, und den Sitz der feurigen Werkstätte mit dem Dampfkreise in fortwährender Verbindung erhält.

Diese Vertiefung hat gewöhnlich einen zugänglichen Rand, von dem aus man in das Innere des Craters sieht (Vesuv, Aetna,

Pichincha). Bisweilen ist der Crater, wie bey dem Cotopaxi, von einer steil aufsteigenden Felsenmauer umgeben, die den Zugang unmöglich macht.

Das Innere der Vulcane ist, so viel man aus der Beschaffenheit des Craters schließen kann, zerrissen und zerklüftet. Die Craterwände sind mit Sublimaten überkleidet, und auf seinem Grunde steht einer oder mehrere Regel, durch Auswurf von Schlacken und kleinen aufgehäuften porösen Steinen (Rapi'lli) gebildet, welche den Craterrand öfters überragen (Fig. 28). Solche, auf dem Craterboden entstandene Auswurfsregel, verändern sich bey jeder Eruption und stürzen öfters völlig zusammen, so daß die Spitze der Vulcane dadurch ein sehr wechselndes Ansehen bekommt.

Die Größe des Craters zeigt mancherley Verschiedenheit, und steht nicht immer im Verhältnisse mit der Höhe und dem Umfange der Vulcane. Die gewaltigen Feuerberge der Anden haben nach v. Humboldt verhältnißmäßig kleine Crater. Nur der Pichincha und der Cotopaxi machen davon eine Ausnahme. Ersterer hat bey einer Höhe von 14,988 Fuß einen Crater, dessen Umfang eine französische Meile beträgt. Die Tiefe der Crater ist bey thätigen Vulcanen sehr unbeständig. Außerordentlich ist nach v. Humboldt die Cratertiefe des Pichincha. Sie beträgt 300 Toisen.

Nicht immerwährend und ununterbrochen sind die Vulcane thätig. Sie haben Ruhezeiten und lange, oft während mehrerer Jahrhunderte, bleiben sie vollkommen ruhig. Das zeigt der vielbeobachtete Vesuv, der seit Jahrhunderten und bis zu der großen Eruption im Jahr 79, welche den Städten Herculaneum und Pompeji den Untergang brachte, so ganz unthätig gewesen war, daß nur dunkle Traditionen etwas von früheren Ausbrüchen aufbewahrt hatten. Der Berg war von Vegetation bekleidet, und bis zum Gipfel mit starken Bäumen bewachsen.

Auch der Aetna war also beschaffen bis zum Jahr 40. Die großen americanischen Vulcane haben in einem Jahrhundert selten mehr als einen Ausbruch. Der Cosagüina in Guatimala mag als Beyspiel gelten. Man kennt einen Ausbruch desselben 1709, einen zweyten 1809, und von da an blieb er wieder

ruhig bis zum 20. Jänner 1835, an welchem Tage wieder ein entseßlicher Ausbruch erfolgte.

So sind alle Feuerberge längere oder kürzere Zeit in Ruhe. Plötzlich tritt ein Zustand der größten Bewegung ein. Der Boden erbebt, aus dem Innern erheben sich Rauch, Flammen, Steine und werden mit furchtbarem Getöse zu außerordentlichen Höhen hinangetrieben, und glühende Ströme geschmolzener Gesteinmassen brechen hervor. Die Erscheinungen nehmen an Intensität nach und nach ab, und nach einiger Zeit tritt wiederum Ruhe ein. Dieses periodisch wiederkehrende Phänomen nennt man einen Ausbruch, eine Eruption.

Die Ausbrucherscheinungen sind unendlich mannfaltig, durch Ortsverhältnisse und andere Umstände aufs verschiedenartigste modificiert. Eine gewisse Anzahl von Erscheinungen zeigt sich jedoch bey allen Vulkanen in bestimmter Aufeinanderfolge, und die Ausbrüche aller Feuerberge sind dadurch bezeichnet. Leopold v. Buch hat sie genau beschrieben, und in vier Hauptperioden eingetheilt.

Erste Periode. Vorboten. Als solche zeigen sich Erdbeben. Die Erde wird erschüttert, schwankt oder erbebt, und dabey wird ein unterirdisches Getöse hörbar. Die Grade dieser schreckenden Vorboten wechseln von leichten Stößen oder Schwankungen bis zu zerstörenden Erschütterungen wellenförmiger Bewegungen des Bodens, der hochgehenden See vergleichbar, sie wirken gewöhnlich am zerstörendsten. Sie zeigen sich, wie überhaupt die Erdbeben, am stärksten in der Nähe des Vulcans, und hier werden oft Dörfer und Städte durch sie umgeworfen. Die Erschütterungen des Bodens sind aber oft auch in bedeutender Entfernung vom Feuerberge noch fühlbar, und zwar gleichzeitig nach den entlegensten Puncten der Erde. Als am 1. November 1755 ein furchtbares Erdbeben Lissabon zerstörte, fühlte man Erschütterungen des Bodens durch ganz Europa, und selbst in West-Indien. Steht der Vulcan am Meere oder in seiner Nähe, und wirken die Erschütterungen bis in dasselbe fort, so geräth es in eine schwingende Bewegung, und überfluthet von einer Stelle die Küsten, während es an der andern zurücktritt. Es schwankt wie das Wasser in einer bewegten Schüssel. Quellen werden

dabey mancfaltig verändert; oft wird ihr Lauf zerftört, oder fie verftiegen. Auch hat man Beyfpiele, daß fie an Stärke zunehmen, daß fich neue, bisher unbekannte öffnen, und die vorhandenen Beymifchungen erhalten, träge oder falzig laufen. Die Höhlen, welche am Abhange, oder am Fuße von Vulcanen liegen; und, wie in den Andesketten bisweilen unterirdifche Seen einfchließen, die mit Bächen in Verbindung ftehen, giefen bey folchen Erfchütterungen öfters große Maffen Waſſer aus, und damit Schlamm und bisweilen fogar Fiſche. Die Brennabilla des Bewohners von Hochquito (*Pimelodes Cyclopus* von Humb.). Die Waſſerergüſſe find öfters gewaltig, zerftörend und verbreiten zumal, wenn fie ſchlammig find, oder damit Fiſche ausgeworfen werden, die bald faulen, böſe Fieber weit umher. Gar oft werden durch Erdbeben Hebungen und Senkungen des Bodens, und häufig Spalten erzeugt. So entftanden durch das Erdbeben, welches im Jänner 1838 die Walachei und Moldau erfchütterte, zahlreiche Spalten und theilweiſe Senkungen des Bodens, welche der großherzogl. ſächſiſche Bergrath Schneller beſchrieben hat *). Fig. 29 zeigt eine Erdſpalte bey dem walachiſchen Dorfe Babert bey dem Städtchen Slam-Kimnit, in Folge welcher eine Senkung des Bodens und die Zerreiſung einer darüberſtehenden Hütte erfolgt iſt. Die ausgezeichnetſte Veränderung der Erdoberfläche hat in neuerer Zeit das Erdbeben in Chili, 1822, hervorgebracht. Die Erfchütterung, welche ſich der Küſte entlang, auf mehr als 200 Meilen erſtreckte, hob auf mehr als 20 Meilen die Küſte 2—4 Fuß über das Meer, das während deſſen mehrereremal ſank und ſieg.

Was iſt aber wohl die Urſache der Erdbeben? Geſpannte Gaſe und Dämpfe in Höhlen und weitfortziehenden Spalten des Erdinnern eingeſchloſſen, ſind wahrſcheinlich die Urſache. Das Erdbeben, welches am 16. November 1827 Reugranada Abends 6 Uhr betraf, und ſo furchtbar verwüſtete, deutet dieſes unverkennbar an. Dieſes Erdbeben hielt 5 Minuten lang an, ihm

*) Bericht an das k. ſächſiſch walachiſche Miniſterium des Innern über die Erdſpaltungen und ſonſtige Wirkungen des Erdbebens vom Jänner 1838. Buchareſt, 1838.

folgten mit wunderbarer Regelmäßigkeit von 20 zu 20 Secunden heftige Detonationen, welche im ganzen Cancathale gehört wurden. An mehreren Orten bekam die Erde Risse, aus welchen mit Heftigkeit Gase hervorströmten. Da und dort fand man Ratten und Schlangen im Zustande der Asphyxie, und der Magdenen: wie der Cancathal führten mehrere Stunden lang schlammige Massen ab, die einen unerträglichen Geruch nach Schwefelwasserstoff ausstießen. Das sind doch wohl Erscheinungen, welche darauf hinweisen, daß Gase die Ursache des furchtbaren Ereignisses gewesen sind.

Zweite Periode. Lavenausbruch. Während der gewaltigen Erschütterungen, welche der Berg während der Periode der Erdbeben erleidet, werden die in seinem Innern geschmolzenen Massen, auf der von unten heraufgehenden Spalte, in die Höhe gehoben. Das Gewicht der geschmolzenen Masse wirkt den hebenden Gasen und Dämpfen entgegen. Gewöhnlich können sie dasselbe nicht durchbrechen, oder es über den Rand des Craters heben. Die Risse dauern fort bis der Berg zerreißt und eine Spalte entsteht, aus welcher die geschmolzenen Massen anfließen. In der Regel thut sich eine Spalte am Abhang oder Fuß des Kegels auf; immer in der Richtung vom Gipfel gegen den Fuß, niemals nach der Breite des Berges.

Jetzt bricht die Lava als ein glühender Strom aus der Spalte hervor. Ueber dem Crater steigen Flammen auf, und bilden eine öfters unermessliche Feuersäule, in welcher glühende Steine, Sand, Staubtheile, sogenannte Asche, mit unermesslicher Kraft, 2000—3000 Fuß senkrecht in die Höhe getrieben werden. Kein Sturmwind beugt sie.

Nach dem Lavenausbruch hören die Erdbeben gewöhnlich auf, da nun die Gase und Dämpfe frey ausströmen.

Der Lavastrom ist gewöhnlich in dunkle Wolken gehüllt. Von seiner lodenden Oberfläche erhebt sich gewöhnlich ein weißer Rauch, Wasserdampf, welchem mitunter schwefelige Säure und Salzsäure beigemischt sind. Manchmal entsteigen auch dem Crater nach furchtbaren Donnerschlägen Feuerwolken, aus denen ein Regen von glühendem Sand und Steinen herabfällt.

Widweilen wird die Lava ganz bis zur Höhe des Crater-

raudes emporgehoben, und fließt über denselben am stillen Regel herab; während sie im Crater geschmolzen liegt, brechen Dämpfe dann und wann durch, und werfen Stücke davon in die Höhe, die sich im Fluge abkühlen und die verschiedensten Formen annehmen.

Die geschilderten Erscheinungen dauern unter fortwährendem Loben des Berges, wobey er von unaufhörlichem unterirdischem Krachen erbebt, längere oder kürzere Zeit an. Sie nehmen bald allmählig, bald schnell ab. Endlich stockt die Lava.

Dritte Periode. Aschenausbruch. Eine majestätische Rauchsäule erhebt sich nun aus dem Feuerberge, bald nachdem er anscheinend beruhigt ist, Flammen und Rauch sich vermindert haben, bald unter erneuerten Schlägen und Debungen. Ihre Gestalt, wie sie schon Linneus schilderte, ist die hohe, schlanke einer Pinie, deren Aeste sich am Gipfel horizontal ausbreiten. In unermesslicher Menge steigen Wasserdämpfe in der Rauchsäule empor, die sich in der Höhe zum schwarzen Dach ausbreitet, und ein dunkles Gewölz bildet, aus welchem Steintrümmer, die Kapilli, auf den Abhang des Berges, die graue, leichte Asche dagegen weit umher über die Landschaft herabfällt. Der Aschenauswurf dauert bey großen Eruptionen oft mehrere Tage an. Bey dem großen Ausbruch des Vesuv, 1822, erhob sich die Aschensäule zu einer Höhe von 9000 Fuß, und der Aschenauswurf dauerte 12 Tage ununterbrochen fort, war jedoch in den ersten 4 Tagen am stärksten. „Die Atmosphäre,“ sagt v. Humboldt, „war dermaßen mit Asche erfüllt, daß die ganze Gegend um den Vulkan in der Mitte des Tages mehrere Stunden lang in das tiefste Dunkel gehüllt blieb. Man ging mit Laternen in den Straßen, wie es oft in Quito, bey den Ausbrüchen des Pichincha geschieht.“

Der Aschenausbruch, welcher bey den gewöhnlichen periodischen Eruptionen der Vulcane am Ende derselben auftritt, hat sich bey plötzlicher Wiederbelebung, durch lange Jahre ruhig gebliebener Feuerberge, auch schon als Anfang des Paroxysmus gezeigt. So gerade bey dem Ausbruch des Vesuv im Jahr 79, wie es der jüngere Plinius in dem bekannten Briefe an Tacitus beschreibt, worinn er diesem den Tod seines Oheims anzeigt.

Die Asche wird öfters mehrere hundert Meilen weit fortgetragen; während des großen Ausbruchs des Coségüina im Jänner 1835 fiel auf Jamaica, welches 700 engl. Meilen von jenem Feuerberge entfernt ist, 2 Tage lang Schaum von feiner Asche nieder. Die unermessliche Menge Wasserdampf, welche mit der Asche aufsteigt, bildet beym Erkalten ein dickes Gewölk um den Ke gel, und in Folge der dabey entstehenden starken, electrischen Spannung durchzuckten häufige Blitze die Wolken.

Durch Verdichtung der Wasserdünste, welche sie bilden, entstehen bald heftige Regen um den Vulcan, oftmals Wollenbrüchen ähnlich, in starken Strömen stürzen die Wasser am jähem Abhang des Berges herab, und bilden mitunter verheerende Schlam mströme, durch Vermischung mit der Asche. Solche haben einst Herculaneum und Pompeji begraben.

Die vulcanischen Regen characterisiren aberall das Ende einer Eruption. In der Andeskette, wo die Gipfel der Vulcane größtentheils über die Schneelinie emporragen, bewirken diese Regen das Schmelzen der Schneemassen, wodurch mächtig große Wassermengen gebildet werden, welche gefürchtete Ueberschwemmungen von außerordentlicher Ausdehnung verursachen.

Vierte Periode. Allen bedeutenden Eruptionen folgt ein Ausströmen von kohlen saurem Gas. Der Neapolitaner bezeichnet diese Erscheinung mit dem Namen Mofetti, Mofetten. Das im vulcanischen Herde vorhandene kohlen saure Gas dringt durch Klüfte nach allen Seiten herans, senkt sich nach seinem specifischen Gewichte zwischen den schichtweise über einander liegenden Lavamassen herab an den Fuß des Berges, und strömt hier auf Feldern, in Gärten, Weinbergen in feindlichen Quellen aus, welche die Luft verderben und selbst irrespirabel machen.

Solches sind nun die Hauptperioden einer Eruption, welche bey den Paroxysmen der Vulcane mehr oder weniger bestimmt unterschieden werden können.

Man hat im Allgemeinen die Bemerkung gemacht, daß die Häufigkeit der Ausbrüche im umgekehrten Verhältnisse zur Höhe der Vulcane steht. Die hohen Feuerberge der Anden ruhen oft ein Jahrhundert; der niederigere zugängliche Vesuv ist oft empört,

und der kleine Kegel von Stromboli, den die Seefahrer den Leuchtturm des Mitteländischen Meeres heißen, stößt ununterbrochen heiße Dämpfe aus.

Vulcanische Producte.

Mit diesem Namen bezeichnen wir alle jene Substanzen, welche von einem thätigen Vulcane im festen, flüssigen oder gasförmigen Zustande ausgestoßen werden.

Vor allen zeichnet sich die Lava aus. Alles ist Lava, was im feurigen, flüssigen Zustand aus dem Feuerberge ausfließt. Sie hat immer das Gepräge einer im Fluß erstarrten Masse. Farbe, Dichtigkeit, specifisches Gewicht zeigen sich bey verschiedenen Laven außerordentlich abweichend, so, daß keine Beschreibung auf alle paßt. Begreiflich, Lava ist immer eine zusammenge setzte Masse, niemals ein einfaches Mineral. Feldspath, Labrador, Augit, Hornblende, Magnet Eisen, Leucit setzen dieselben in mannichfaltigen Verhältnissen zusammen. Gar oft weichen die Laven benachbarter Feuerberge ganz von einander ab, wie z. B. die Laven der Somma und des Vesuvus, jene sind crystallinisch-förmig, wie Granit, und bestehen hauptsächlich aus Leucit; diese, die Laven des Vesuvus, sind viel dichter und feinkörniger und enthalten nur zufällig Leucit. Die Laven des Aetnas bestehen aus Labrador, Augit, Chrysolit und Titaneisen.

Man hat die aus den Feuerbergen abfließenden, geschmolzenen Massen mit Strömen verglichen, und nennt sie Lavaströme. Sie sind im Verhältniß zur Länge gewöhnlich schmal, und immer schmaler am Orte, wo sie herausdringen. Sie erweitern sich bey dem Weiterfließen, und verzweyeln sich auch öfters. Ihre Stärke ist sehr verschieden, doch nur selten erreichen sie eine Höhe von 30 Fuß und darüber. Ihre Ausdehnung in Länge und Breite ist aber bisweilen außerordentlich. Man gibt an, daß der Lavaström, welcher 1783 sich aus einem Vulcan auf Island ergoß, eine Länge von 20, und eine Breite von 8 Meilen erreicht habe.

Alle großen Lavaströme erreichen den schwach geneigten Boden am Fuße der Vulcane, ehe sie erstarren. Auf solchem fast ebenem Boden, oder am Meeresufer, stockt ihre Bewegung, und Ofen's allg. Naturg. I.

keiner läßt auf einer Fläche, die mehr als 7—8° Neigung hat eine beträchtliche Masse liegen. Haben große Lavaströme ihre Bewegung auf steilen Abhängen von 18—40° begonnen, so zeigen sie nach Elie de Beaumont drey auf einander folgende, verschiedene Verhältnisse.

Die erste Strecke durchfließt die Lava, bey beträchtlicher Neigung des Bodens, wie ein Gießbach. Die auf ihrer Oberfläche erkalteten Theile bilden unregelmäßige Stücke, welche nach dem Abfluß der Lava in Gestalt einer fast unzusammenhängenden Schichtenlage zurückbleiben.

Weiter unten kommt der Strom auf weniger steile Gehänge, und dabey nimmt seine Geschwindigkeit ab. Er umgibt sich nun in Folge der Erkältung mit einer festen Rinde, während das Innere sich noch in dem zähen, dehnbaren Zustand befindet, in welchen Laven übergehen, ehe sie vollkommen erstarrt. Die theils feste, theils noch etwas dehnbare Rinde setzt nun der Bewegung der Lava ein Hinderniß entgegen, und bildet selbst ihrerseits eine Art eines großen Sacks, welchen die Lava zerreißt oder in die Länge ziehen muß, um weiter vorzudringen zu können. Nun beginnt ein Kampf zwischen der flüssigen Lava, welche abzufließen strebt, und zwischen der erhärteten Rinde, welche sie zurückzuhalten und gleichsam zu festeln versucht. Die Rinde wird zerbrochen, in Stücke gesprengt, die sich mit weit hörbarem Geräusch übereinander und durcheinander schieben. Dadurch entstehen nun die Windungen, welche zusammenhängende Lavaströme auf etwas stärker geneigten Abhängen zeigen, und das rauhe und zerrissene Aussehen der Lava über stärker abfallendem Boden. Am zerrissensten und am schwierigsten zu überschreiten sind immer Lavaströme, die auf einem Boden von 3—5° Neigung liegen, wahrscheinlich weil dabey die Rinde schon stark genug werden konnte, ohne daß die Lava zu viel an Geschwindigkeit verloren hatte, dergestalt, daß der Kampf zwischen beyden den höchsten Grad von Heftigkeit erreichte.

Die obere Rinde eines Lavastroms, von der unteren Rinde und dem Boden durch eine Lage flüssiger oder teigartiger Lava geschieden, befindet sich also in einem Zustande, welcher demjenigen eines Gletschers vergleichbar ist, der, indem er wegen

beständigem Abschmelzen seiner tiefsten Lage, dem unterliegenden Gestein nicht anhängen kann, abwärts gleitet. Die größten Alpengletscher bringen auf einem Boden von 3—4° Neigung meistens abwärts.

Fließt ein Lavaström auf einem Abhange von weniger als 3°, so nimmt seine Geschwindigkeit sehr ab, die Rinde wird dicker, ihr Widerstand größer, und die Oberfläche der Lavamasse ist weniger zerrissen und gewunden.

Wenn jedoch der Widerstand der Rinde obliegt, so stockt die Lava, sie erkalte ohne sich weiter zu bewegen, und nimmt dabey eine basaltische Beschaffenheit an. Eine Bodenneigung von 2° bringt den Lavaström gewöhnlich zum Stehen. Man hat jedoch auf Island Laven sich schnell, und auf weite Strecken über noch schwächer geneigten Boden sich bewegen gesehen.

Kann es wohl befremden, daß Lava sich auf einem weniger als 2° geneigten Boden fortbewegt, wenn man sieht, wie unsere Flüsse bey $\frac{1}{4}$ ° Fall wie Gießbäche dahinstoßen? Wenn ein Lavaström auf einem Abhange von 1° Neigung stillsteht, so erkennen wir dabey den großen Antheil, welche die Zähigkeit der Lava und die Hindernisse ihrer Bewegung, die feste Rinde und die umgebenden Schlacken, daran haben.

Große Lavaströme bleiben im Innern viele Tage lang weich, und sehr hohe durch mehrere Wochen. Es liegen öfters crystallisirte Mineralien darin, außer denjenigen, welche sie gewöhnlich zusammensetzen, und namentlich Glimmer, Saupn, Olivin, Eisenglanz, Schwefel u. e. a., und bisweilen findet man Stücke von Kalkstein, Trachyt, selbst Granit in sie eingeschlossen.

Aus dem Vorgetragenen ergibt sich mit aller Klarheit, daß die äußeren Verhältnisse der Laven von der Neigung des Bodens abhängen, über welchen sie ergossen werden.

Wenn die Grundmasse eines Vulkans trachytisch ist, so erzeugt er bey Ausbrüchen gewöhnlich Obsidian und Bimsstein. Der Obsidian bricht als ein geschmolzenes Glas nach Art der Laven hervor; seine Oberfläche ist häufig mit Bimsstein überzogen, so daß dieser auf Obsidian deutet, wie dieses Mineral auf Trachyt. Man hat am Pic von Teneriffa, auf Lipari, auf Island Obsidianströme beobachtet. Er fehlt auch

keiner läßt auf einer Fläche, die mehr als 7—8° Neigung hat, eine beträchtliche Masse liegen. Haben große Lavaströme ihre Bewegung auf steilen Abhängen von 18—40° begonnen, so zeigen sie nach Elie de Beaumont drey auf einander folgende, verschiedene Verhältnisse.

Die erste Strecke durchfließt die Lava, bey beträchtlicher Neigung des Bodens, wie ein Gießbach. Die auf ihrer Oberfläche erkalteten Theile bilden unregelmäßige Stücke, welche nach dem Abfluß der Lava in Gestalt einer fast unzusammenhängenden Schlackenlage zurückbleiben.

Weiter unten kommt der Strom auf weniger steile Gehänge, und dabey nimmt seine Geschwindigkeit ab. Er umgibt sich nun in Folge der Erköhlung mit einer festen Rinde, während das Innere sich noch in dem zähen, dehnbaren Zustand befindet, in welchen Laven übergehen, ehe sie vollkommen erstarrten. Die theils feste, theils noch etwas dehnbare Rinde setzt nun der Bewegung der Lava ein Hinderniß entgegen, und bildet selbst hiers eine Art eines großen Sacks, welchen die Lava zerreißen oder in die Länge ziehen muß, um weiter vordringen zu können. Nun beginnt ein Kampf zwischen der flüssigen Lava, welche abzufließen strebt, und zwischen der erhärteten Rinde, welche sie zurückzuhalten und gleichsam zu fesseln versucht. Die Rinde wird zerbrochen, in Stücke gesprengt, die sich mit weit hörbarem Geräusch übereinander und durcheinander schieben. Dadurch entstehen nun die Windungen, welche zusammenhängende Lavaströme auf etwas stärker geneigten Abhängen zeigen, und das rauhe und zerrissene Aussehen der Lava über stärker abfallendem Boden. Am zerrissensten und am schwierigsten zu überschreiten sind immer Lavaströme, die auf einem Boden von 3—5° Neigung liegen, wahrscheinlich weil dabey die Rinde schon stark genug werden konnte, ohne daß die Lava zu viel an Geschwindigkeit verloren hatte, dergestalt, daß der Kampf zwischen beyden den höchsten Grad von Heftigkeit erreichte.

Die obere Rinde eines Lavastroms, von der unteren Rinde und dem Boden durch eine Lage flüssiger oder teigartiger Lava geschieden, befindet sich also in einem Zustande, welcher demjenigen eines Gletschers vergleichbar ist, der, indem er wegen

beständigem Abschmelzen seiner tiefsten Lage, dem unterliegenden Gestein nicht anhängen kann, abwärts gleitet. Die größten Alpengletscher bringen auf einem Boden von 3—4° Neigung meilenweit abwärts.

Fließt ein Lavaström auf einem Abhange von weniger als 3°, so nimmt seine Geschwindigkeit sehr ab, die Rinde wird dicker, ihr Widerstand größer, und die Oberfläche der Lavamasse ist weniger zerrissen und gewunden.

Wenn jedoch der Widerstand der Rinde obliegt, so stockt die Lava, sie erkaltet ohne sich weiter zu bewegen, und nimmt dabey eine basaltische Beschaffenheit an. Eine Bodenneigung von 2° brüzt den Lavaström gewöhnlich zum Stehen. Man hat jedoch auf Island Laven sich schnell, und auf weite Strecken über noch schwächer geneigten Boden sich bewegen gesehen.

Kann es wohl befremden, daß Lava sich auf einem weniger als 2° geneigten Boden fortbewegt, wenn man sieht, wie unsere Flüsse bey ¼° Fall wie Gießbäche dahinstreifen? Wenn ein Lavaström auf einem Abhange von 1° Neigung stillsteht, so erkennen wir dabey den großen Antheil, welche die Zähigkeit der Lava und die Hindernisse ihrer Bewegung, die feste Rinde und die umgebenden Schlacken, daran haben.

Große Lavaströme bleiben im Innern viele Tage lang weich, und sehr hohe durch mehrere Wochen. Es liegen öfters crystallisirte Mineralien darin, außer denjenigen, welche sie gewöhnlich zusammensetzen, und namentlich Glimmer, Horn, Olivin, Eisenglanz, Schwefel u. e. a., und bisweilen findet man Stücke von Kalkstein, Trachyt, selbst Granit in sie eingeschlossen.

Aus dem Vorgetragenen ergibt sich mit aller Klarheit, daß die äußeren Verhältnisse der Laven von der Neigung des Bodens abhängen, über welchen sie ergossen werden.

Wenn die Grundmasse eines Vulcans trachytisch ist, so erzeugt er bey Ausbrüchen gewöhnlich Obsidian und Bimsstein. Der Obsidian bricht als ein geschmolzenes Glas nach Art der Laven hervor; seine Oberfläche ist häufig mit Bimsstein überzogen, so daß dieser auf Obsidian deutet, wie dieses Mineral auf Trachyt. Man hat am Pic von Teneriffa, auf Lipari, auf Island Obsidianströme beobachtet. Er fehlt auch

wahrscheinlich allen jenen Feuerbergen nicht, welche Bimsstein auswerfen, wie z. B. dem großen Vulcan von Sumbeva, der 1815 das Meer bis Macassar mit Bimsstein bedeckte, so wie dem Vulcan Cosaguina in Nicaragua, dessen Bimssteinauswurf sich 1100 englische Meilen weit auf dem Meer verbreitete *).

Die Kapilli, die ausgeschleuderten zackigen Steintrümmer, sind wohl nur zerstückelte Lava. Die Asche, ein wahrer Sand, oft mit schlackigen und porösen Kapillis untermengt, scheint

*) Der Ausbruch dieses Vulcans, der am 20. Jänner 1835 begann und mehrere Tage dauerte, ist einer der fürchterlichsten der neueren Zeit. Er war von einem Erdbeben begleitet, das man auf dem ganzen Isthmus verspürte, und wobey solche ungeheure, heftige Explosionen stattfanden, daß man sie noch auf Jamaica und zu Santa Fe de Bogota, also in einer Entfernung von 200 deutschen Meilen hörte. Besonders fürchtbar war der Vulcan für seine nähere Umgebung, durch den entsetzlichen Aschenauswurf, welcher die Hafenstadt Univa, an der Westküste der Bay von Conchagua, mit dem Schicksal von Herculannum und Pompeji bedrohte. Eine Aschenwolke, welche am 20. Jänner Morgens 8 Uhr bey ganz heiterem Wetter aufstieg, breitete sich um 11 Uhr unter Blitz und Donner über das ganze Firmament aus, und versetzte die Stadt auf 43 Stunden in die dickste Finsterniß, während ein ununterbrochener Aschenregen niederfiel. Nach dieser Zeit erst fieng es an zu dämmern, daß man einander erkennen und den Gräuel der Verwüstung sehen konnte. Selbst am 27. Jänner fiel noch etwas Asche. Das Schicksal der Einwohner war wahrhaft entsetzlich. Von drey Seiten her drohte ihnen der Tod. Zu ersticken im Aschenregen, oder bey dem furchtbaren Erdbeben unter den Trümmern ihrer Häuser begraben zu werden, oder aber den wilden Thieren anheimzufallen, die, angeblich Tiger, theilweis aus ihren Schlupfwinkeln aufgeschreckt, selbst bis in die Straßen der Stadt eingedrungen waren. Die Furcht vor dem Erdbeben überwog indeffen die drohende Gefahr vor den wilden Bestien, und am 23. wanderte mehr als die Hälfte der Einwohner zu Fuß aus der Stadt nach den Anhöhen. Mancher, der sich dadurch rettete, fand später seinen Tod an Brustleiden, in Folge der eingeathmeten Asche. Das Erdbeben war auch an anderen Orten so fürchtbar, daß die Einwohner von Manho glaubten, es brähe der jüngste Tag herein. Die moralische Wirkung, bey derartigen Erdbeben schon oftmals beobachtet, war in jener Stadt so groß, daß dreihundert Einwohner, die bis dahin im Concubinat gelebt hatten, sich schnell ehelich verbinden ließen.

ebenfalls aus einer geschmolzenen Masse zu entstehen. Der scharfsinnige Chemiker Guchs hat die interessante Beobachtung gemacht, daß die Theile geschmolzener Mergel, oder Gemenge von Thon, Kalk und etwas Magneteisenstein, wenn sie in starkem Feuer in eine schlackenartige Masse verwandelt werden, nach dem Erstarren, und wenn sie beynahe ganz abgekühlt sind, in eine innere Bewegung gerathen, wobey die Masse in wenigen Augenblicken zu einem aschgrauen Pulver zerfällt. Sollte die vulcanische Asche nicht auf ähnliche Weise entstehen können?

Der vulcanische Luff besteht aus verschiedenen Producten der Feuerberge (s. S. 524), die durch Wasser zusammengeschwemmt worden sind, und ebenso der *Peperino* (s. S. 526). Diese Gesteine liegen am Fuß der Vulcane oder in den Niederungen um dieselben.

Diese Trümmergesteine sind immer regelmäßig geschichtet. Der Luff in der Gegend von Neapel schließt mehrfältig Muscheln ein, welche mit denen des nahen Meeres übereinstimmen, nur meistens etwas größer sind, als die heute lebenden. Man hat sowohl bey Neapel, als zu Rom auch Thierknochen darian gefunden, welche den Knochen entsprechen, die man in so großer Menge in der Subapenninenbildung antrifft. Häufig steht man die Luffschichten aufgerichtet, und nicht selten gewunden wie Schichten des charakteristischen Sediment-Gebirges. Was das Alter der Luffmassen in Süd-Italien (Rom, Neapel, Ischia, phlegäische Felder) betrifft, so scheint es, als seyen sie nach der Diluvialperiode gebildet worden, etwa gleichzeitig mit den Ablagerungen der Muschelmassen, die wir zu Uddevalla, bey Rizza u.s.w. über dem gegenwärtigen Meerespiegel angehäuft sehen.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß in dieser Periode der Vesuv, der Aetna und die übrigen vulcanischen Gebilde Italiens entstanden sind. Man sieht wenigstens an jenen Vulcanen keine Spuren der zerstörenden Einwirkung von Diluvialströmen, und in den Luffen, die sie umgeben, liegen vorzugsweise Reste von Thieren der gegenwärtigen Schöpfung.

Die *Moya*, wie die Indianer in Quito eine erdige und breyartige Masse nennen, welche mehrere Vulcane des Landes ausfüllten, und die mit Wasser und Fischen aus dem Innern

hervorstärkt, scheint aus einem zerriebenen Trachyt zu bestehen, der viele kohlige Theile enthält. Sie brennt manchmal wie Kohlen, und die Indianer gebrauchen sie zum Kochen.

Die Pozzuolana, ein Luff, nach seinem Hauptfundorte Pozzuolo, unfern Neapel, benannt, hat die Eigenschaft, mit Kalk einen unter Wasser erhärtenden Mörtel zu bilden, von welchem man in Italien bey Wasserbauten allgemeine Anwendung macht. Er verhält sich also wie gebrannter Mergel. Der Trass ist eine analoge Bildung, durch bläuliche Dinsteinstücke ausgezeichnet. Auswürflinge heist man die Steintrümmer, Blöcke, Lavastücke, welche der Vulcan durch den Krater auswirft. Ihre Beschaffenheit ist natürlich von großer Mannichfaltigkeit. Am Vesuv findet man als Auswürflinge vorzugsweise Lavastücke, namentlich die sogenannten vulcanischen Bomben, welche aus Lavamasse bestehen, die flüssig in die Höhe geschleudert wurden, und beym Fall eine rundliche Gestalt angenommen haben. Sie sind im Innern öfters hohl. Sowohl diese Bomben, als die anderen großen ausgeschleuderten Lavamassen, welche man am Vesuv bis zu einem Gewichte von 1600 Centner findet, haben ein glasiges, crySTALLINISCHES Ansehen, und enthalten zahlreiche, kleine Augitcrystalle. Die Blöcke von Kalk, Dolomit und anderen crySTALLINISCHEN Gesteinen, welche man unter den Auswürflingen des Vesuvs aufgedacht findet, können durchaus nicht zu denselben gerechnet werden. Sie liegen nicht am Fegel des Vesuvs, sondern in den Luffschichten des Monte Somma eingeschlossen. Die vielen crySTALLISIRTEN Mineralien, welche die Blöcke von Kalk und Dolomit in Spalten und Höhlungen enthalten, deuten Mineralbildungen an, welche in Folge der Auseinanderwirkung kalkiger und kieseliger Gesteine unter dem Einflusse einer höheren Temperatur vor sich gegangen sind. Die Serpulen, welche man auf vielen Kalkblöcken des Monte Luffes antrifft, und die vollkommen mit den Serpulen übereinstimmen, welche im nahen Meere leben, beweisen, daß die Blöcke im Meere gelegen haben, ehe sie in den Luff eingeschlossen worden sind. Aus ihrem vollkommen frischen Ansehen könnte man folgern, daß sie nicht am Ufer gerollt, sondern unter dem Meerespiegel in die Schichten des Luffs eingewickelt worden sind, der sich in

tieferem Wasser absehe. Sehen wir ihn nun heut zu Tage in einer ansehnlichen Höhe über dem Meere, so spricht dies entschieden dafür, daß er nach seiner Bildung durch später wirkende vulcanische Kräfte emporgehoben worden ist.

Sublimata überkleiden die Wände des Kraters, die Ränderungen der Auswurfseegel, und erscheinen auch in Spalten und auf der Oberfläche der Lavastrome. Sie bilden verschiedenfarbige Auflagen, Rinden, Krusten, und bestehen vorzugswelse aus salzigen Verbindungen, aus Salzniaß, Rochsalz, Alaun, Chlorcalcium, Chlor-Eisen, Chlor-Kupfer, Chlor-Mangan. Auch Schwefel-Kupfer, Schwefel, Borax-Säure finden sich unter den Sublimaten.

Die Dämpfe und Gase, welche die Vulcane ausblasen, bestehen vorzüglich aus Wasserdampf, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Salzsäure, schwefeliger Säure (diese heynahe immer durch Verberennen von sublimirtem Schwefel entstanden), und mitunter hauchen sie auch Schwefeldampf aus. Die americanischen Vulcane blasen keine Salzsäure aus.

Die schwefelige Säure wird in den Umgebungen des Vulcans von kleinen Wasseransammlungen aufgenommen, und verwandelt sich allmählich in Schwefelsäure. Es stoßen auch einige Vulcane Bäche aus, die durch Schwefelsäure oder schwefelsaure Verbindungen gesäuert sind. So beschreibt v. Humboldt einen Bach, welcher an einer unzugänglichen Stelle auf dem Vulcan Paracé entspringt. Dieser Bach, Rio-Passam-bio, ist ganz sauer, und die Einwohner nennen ihn daher Rio vinagre (Essigbach). Er bildet bey den Chorrera de San Antonio einen prächtigen Wasserfall von mehr als 300' Höhe in einem Amphitheater von Trachyt. Man kann sich hier demselben nähern. Der Staubregen des sauren Wassers greift aber die Augen untrüglich an. Er enthält schwefelsaure Thonerde, Gyps, Rochsalz, Kieferde und etwas freye Salzsäure. Auch einige Vulcane auf Java, von welchen der Vulcan T a f e m sich durch einen See auszeichnet, dessen Wasser durch Schwefelsäure gesäuert ist, stoßen saure Bäche aus.

Heiße Quellen kommen vielfältig in der Nähe, oder selbst am Fuße der Vulcane vor, und werden öfters durch den

Druck gepreßter Dämpfe in mächtigem Strahl stoßweise hervor-
getrieben, wie z. B. die heißen Wasser des Strocks und des
Geyfers auf Island. Häufig treten auch kalte Quellen bey
Vulcanen hervor. In beyden findet man dieselben Gase, welche
aus den Cratern der Vulcane austreten. Stewellen enthalten
solche Wasser beträchtlich viel Gas, namentlich kohlensaures Gas
und Schwefelwasserstoffgas, und mehr oder weniger Salze. Einige
Quellen in der Nähe americanischer Vulcane setzen eine so be-
trächtliche Menge Kalk ab, daß darauf hin Kalköfen betrieben
werden können. Solches ist der Fall bey dem Wasser von Pan-
diaco, in der Nähe des Vulcans Pastro, und bey der Quelle
der Meierey Epico bey dem Vulcan Antisana.

Erhebungs-Cratern.

Werden feste Schichten von einer hebenden vulcanischen Ur-
sache emporgetrieben, und in der Mitte durchbrochen, so sieht
man vom Umkreise bis zum höchsten Punkte, und von allen
Seiten gegen die Mitte herauf sich Lagen übereinander erheben,
die eine kesselförmige Vertiefung einschließen, an deren innerem,
jähem Abflurz die Köpfe der übereinander aufsteigenden Schich-
ten hervortreten (s. Fig. 30). Der Kessel erscheint als wahrer
Crater, ist eine Wirkung der Erhebung und Durchbrechung fester
Schichten, und hat von Leopold v. Buch den bezeichnenden
Namen Erhebungs-Crater (*cratere do soulèvement*) er-
halten, um ihn zu unterscheiden von Ausbruchs-Cratern, durch
welche die wahren Vulcane, der geognostischen Bedeutung des
Wortes, mit der Atmosphäre in Verbindung stehen. Wir ver-
danken die höchst naturgemäße Charakteristik dieser merkwürdigen
Bildungen dem Genie Leopold v. Buch's.

Die Erhebungs-Cratern bestehen aus basaltischen, dolomitischen
Gesteinen, Conglomeraten und Tuffen. Crachyt erscheint nur
in ihrer Mitte im Innern des Kessels. Ein spaltenförmiges
Thal führt gewöhnlich von einer Seite her zu seinem Innern.
Ofters sind aber auch in dem äußeren, sanfteren Abhang tiefe,
schluchtige Thäler eingeschnitten. So muß es sich wohl gestalten,
wenn feste Schichten emporgehoben werden; sie müssen am Um-
fange zerreißen, und alsdann Spalten zuhelfen.

Von den Erhebungs-*Cratern*, welche die Reste einer großen *Kraftäußerung* aus dem Innern sind, welche ganze *Quadratmeilen* große Inseln erhoben hat (*Erhebungsinselfn*), gehen keine *Eruptionsercheinungen* aus. Der *Erhebungs-crater* ist durch keinen *Canal* mit dem Innern in Verbindung. Nur selten findet man in der *Nachbarschaft* oder im *Kessel* selbst Spuren von noch wirkender, *vulkanischer Thätigkeit*. Bei der Entstehung eines *Erhebungs-craters* zeigt sich oft eine vorübergehende Verbindung des *Erdinnern* mit der *Atmosphäre*. In tiefen Fäßen bleibt der *Crater* nach unten geschlossen, oder es steht im demselben ein *vefter Kern* von *Trachyt*. Einer der lehrreichsten *Erhebungs-Cratern* ist der durch *Fig. 30* dargestellte *Crater* von *Astrani* in den *phlegäischen* *Iseln*. Durch die weißen Schichten von *Bimsstein-Luff*, welche von der *Ätze* der *Erhebung* sich ringum nach *Außen* neigen, ist ein *vefter Kern* von *Trachyt* heraufgestiegen, der geschlossen blieb, ein *Modell* der großen, so vielfältig über die *Erde* verbreiteten, *trachytischen*, nicht *geffurten* *Dome*. Dicht aber der *Trachyt* auf, und bleib die *Verbindung* zwischen dem *Dunkelkreise* and dem Innern, so ist ein *dauernder Vulkan* gebildet, der nun seine *Eruptionsercheinungen* in einem *weiten Kreise* umher verbreitet. Das trifft am *Pic* von *Teneriffa*, und selbst am *Besuv*, *ausgezeichnet* hervor. Der *Monte Somma*, aus *Lagen* vom *Leucitophyr* *zusammengesetzt*, hat die *Luffschichten* in die *Höhe* gehoben und durchbrochen. Sie senken sich mit *starker Neigung* von ihm ab nach *Außen*, und ziehen sich bis zu einem bestimmten *Niveau* rund um den *Berg* herum (s. *Fig. 31*). Die *Schichten* des *Leucitophyrs* erheben sich darüber mit *stärkerer Neigung*, und bilden die *Gemma-Wände*, welche noch 1800' *unbedeckt* über den *Luff* aufsteigen. Also war der *Berg* bis zum großen *Ausbruch* im Jahr 79 *befchaffen*. Bei diesem erst schien sich in der *Mitte* des *Erhebungs-craters* der *Somma* der *Regel* des *heutigen Besuv* erhoben zu haben. Dabei hat er auf der *Seite* gegen das *Weed* den *Rand* des *Gemma-craters* *eingegriffen*, und noch einen *ansehnlichen Theil* der *obern Luffschichten* zerstört (s. *Fig. 32*).

Ausgezeichnet sind die *Verhältnisse* der *Erhebungs-cratern*.

nach Leopold v. Buch, auf den canarischen Inseln ent-
wickelt, und ganz besonders auf Palma (s. S. 32). Ein
tiefes, spaltenförmiges Thal, Barranco de las Angustias,
führt zu dem Innern des tiefen, von mächtig hohen, gerissenen
Felsen umschlossenen Kessels, in dessen Grund Trachyt hervor-
bricht. Die Tiefe des Erhebungskegels, den die Einwohner la
Caldera nennen, beträgt über 4800 Fuß. Auch St. Helena,
die Insel Amsterdam, die Märte in den Galapagos,
Manroo, eine der Sandwichsinseln, Deception-Inland und
viele andere, sind Erhebungsinseln, wohl bezeichnete Er-
hebungskegel. So haben wir denn Beispiele von Er-
hebungskegeln, welche auf dem festen Lande entstanden
sind, und zu diesen gehören auch der Laacher-See am Rhein,
der Kaiserstuhl im Breisgau, der Cantal und der
Mont Dor, und von solchen, welche als Inseln aus dem
Meere aufgestiegen sind; und somit als wahre Erhebungs-
inseln erscheinen. Die Erhebung solcher Inseln ist eine ganz
allgemeine Aeußerung vulcanischer Thätigkeit, welche noch heutzun-
tage fortwirkt. Die Geschichte hat viele Fälle aufgezeichnet,
welche das Heraufsteigen großer Inseln aus dem Grunde des
Meeres beweisen. Man erinnere sich nur an die von Plinius
erzählte Entstehung der Insel Hierax; an die von Plinius
aufgeführte Bildung der Insel Echin; an die von diesem
und von Philostratus beschriebene Erhebung einer Insel in der
Nähe von Creta. Man weiß ferner, daß 1873 die kleine
Kaiment bey Santorin heraufgestiegen ist. Im May 1796
stieg eine Insel bey Unnaal herauf; im Jahr 1811 erhob sich
eine Insel bey St. Miguel in den Azoren; 1814 entstieg
dem Meere eine große Insel bey Unallafaba; und 1828
beobachtete der amerikanische Capitain L'Haye in der Gegend
eine rauchende Insel in der Breite von 22° 14' und 178° 18'
östlicher Länge von Greenwich. Die Insel ragte nur wenige Fuß
über die Oberfläche hervor, und hatte in der Mitte einen Crater
von 300 Schüsseln im Durchmesser. Sie war noch ganz heiß.
Die Matrosen, welche das Boot über die Umfänge hängten
wollten, und beschwenen aus dem Schiff ins Wasser gesprungen
waren, sprangen eiligst und erschrocken in das Boot zurück,

weil das heiße Wasser ihre Fäße verbrannt hatte. Die Temperatur des Meeres war in einer Entfernung von 4 engl. Meilen noch um 10—15° Fahr. höher, als sie sonst in diesen Breiten zu seyn pflegt. Diese von Hrn. Pöppig mitgetheilte Beobachtung ist höchst interessant. Sie beweist, was man nach den Schilderungen der Südsee-Inseln, die wir v. Chamisso verdanken, und nach den Reiseberichten des Capitain Beechey vermuthet hatte, daß immer noch einzelne kleine Inseln in der Südsee aufsteigen, auf welchen sich sodann bald Corallen ansiedeln und die Vegetation Wurzel faßt. Dadurch erhalten sie den Character der Coralleninseln, welche oben (S. 608) beschrieben worden sind.

Nach dieser merkwürdigen Beobachtung, und der weiteren, welche Birlet mittheilt, daß sich in dem untermeerischen Erhebungs-erater Santurin ein trachytischer Dom heraushebt, der nur noch wenige Ellen unter dem Wasserspiegel liegt, und also wohl bald aber denselben hervorstellt, kann man überzeugt seyn, daß sich immerfort Inseln aus der Tiefe erheben. Die Entdeckungen im großen Ocean werden daher niemals aufhören. Steigen die festen Massen nicht ganz an die Oberfläche hervor, und wird die Hervorragung nur durch lockere, bey der vorübergehenden vulcanischen Thätigkeit ausgeworfene Schlacken gebildet, welche sich um die Eruptionsdachse zu einem kleinen Kegel aufhäufen, so reißen die Wellen denselben bald zusammen, und die Insel verschwindet wieder. So geschah es mit Sabina bey St. Miguel in den Azoren, und das war das Schicksal des ephemeren Insel Ferdinandeia, welche im Jahre 1881 bey Sizilien aufgestiegen war.

Aber auch auf dem festen Lande hat sich vor unserm Auge ein ausgezeichneter Erhebungs-erater gebildet, der Mons. Nuovo bey Pozzuol, unfern Neapel. Es besteht aus Schichten von Luff, mit einem Crater in der Mitte und Trachtyblöcken im Grunde.

Aus dem Grunde der Erhebungs-Gräben brechen öfters Eruptionskegel hervor, durch welche die gespannten Dämpfe mit Gase des Innern sich vorübergehend einen Ausweg bahnen. Es erfolgen Ausbrüche mit Lavaerguß, den Eruptionen der Vulsane ähnlich. Selten dauern sie länger an. Eine merkwürdige Aus-

nahme hievon gibt die Geschichte eines solchen Ausbruchs auf der Insel Lanzarote, welche der Pfarrer Eurbeto als Augenzeuge niedergeschrieben hat. Die Eruptionseugel wütheten vom 1. September 1730 bis zum 16. April 1736, somit durch volle 6 Jahre, ununterbrochen fort, und richteten schreckliche Verwüstungen an.

Alle Vulcane der Erdoberfläche theilen sich, nach Leop. v. Buch, in zwey wesentlich von einander verschiedene Classen: in Central- und in Reihen-Vulcane.

Die Centralvulcane erheben sich immer aus der Mitte basaltischer Schichten, gewöhnlich mit einem trachytischen Kegele, und bilden den Mittelpunkt einer großen Menge um sie her, fast gleichförmig nach allen Seiten hin, wirkender Ausbrüche.

Die Reihenvulcane liegen als Essen auf einer großen Spalte in einer Reihe hinter einander. Sie erheben sich entweder als einzelne Kegeleinseln aus dem Grunde der See, oder am Fuße großer Gebirgsketten, und dann läuft ihnen zur Seite gewöhnlich ein crystallinisches Gebirge, völlig in derselben Richtung hin; oder aber sie erheben sich auf den höchsten Rücken des Gebirges, und erscheinen als dessen Gipfel.

Die vulcanischen Kräfte finden nemlich entweder auf der Hauptspalte, auf welcher das crystallinische Gebirge heraufgestiegen ist, wenigsten Widerstand gegen ihr Streben, bis an die Oberfläche durchzubrechen, und in diesem Fall erheben sich die Massen auf der Höhe des Gebirges selbst, gestalten sich zum Kegele und brechen sich eine fortdauernde Communication des Innern mit dem Querschnitt; oder die Gebirgsmasse setzt dem Herausdringen der vulcanischen Gesteine ein allzugroßes Hinderniß entgegen, und sie brechen jetzt am Rande des crystallinischen Gebirges hervor. In der Nähe von Meeresbecken ist der Widerstand natürlich am geringsten, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Vulcane am Saume der Continente, in der Meeresnähe, auferstehen. Doch steht man auch mitten in den Continenten, da wo Erporhebungen crystallinischer Gebirgsketten die Gebirge zersprengt haben, Feuerberge hervortreten. So konnten in Centralasien, am Fuße des Himalayagebirges, von

jedem großen Meere 3—400 geographische Meilen entfernt, die Vulcane Peshan und Hotschen zum Durchbruch gelangen.

Wenn sich aber den vulcanischen Kräften ein allzugroßes Hinderniß entgegenstellt, keine Spalte den Durchbruch erleichtert, so wächst die Kraft unter der geschlossenen Erdrinde ins Unendliche an, bis sie die darüberliegenden Gebirgsmassen zu sprengen vermag. Die bewerkstelligte Verbindung mit der Atmosphäre bleibt permanent offen, wenn die vulcanische Kraft stark genug ist. In einem solchen Falle entstehen Centralvulcane.

Zu den Centralvulcanen gehören:

1) Die liparischen Inseln, 2) der Aetna, 3) die phlegreischen Felder mit dem Vesuv, 4) die Vulcane Islands, 5) der Azoren, 6) der canarischen-, 7) der cap-verdischen-, 8) der Solapagos-, 9) der Sandwichs-, 10) der Marquesas-, 11) der Societäts-, 12) der Freundschafts-Inseln, 13) die Vulcane der Insel Bourbon, 14) die Vulcane Asiens und Africas.

Zu den Reihenvulcanen gehören:

1) Die Vulcane der griechischen Inseln, 2) Westaustraliens, 3) der Sundainseln, 4) der Moluden und Philippinen, 5) der japanischen, curilischen Inseln und von Kamtschatka, 6) der Aleuten, 7) der Marianen, 8) die Vulcane von America, nemlich: die Vulcane von Chili, Quito, den Antillen, von Guatimala und von Mexico.

Solfataren.

Wenn ein Vulcan in längerer Zeit keine wahren Ausbrüche hat, so beschränkt sich seine Thätigkeit häufig auf das Ausstoßen von Rauch, Dämpfen und Gasen. Es wird gewöhnlich viel Wasserdampf, und damit meistens auch Schwefeldampf ausgeblasen. Letzterer sct in Ritzen und Spalten im Innern des Kraters festen Schwefel ab, der häufig auch die Wände überkleidet. In diesem Falle gibt man dem Krater den Namen Solfatara, Soufridre; auch ist es Sprachgebrauch, alle vulcanischen Orte, welche Gase, Wasser- und Schwefeldampf ausstoßen, „Solfataren“ zu nennen, was sich auf die

Ansammlungen vulcanischen Schwefels bezieht. Solche Solfataren haben sich in den Kratern der schlummernden Vulcane Boliano, Morillo, Nuen-Pichincha u.s.w. gebildet. Die Quantitäten Schwefel, welche sich an solchen Orten sublimiren, sind mitunter außerordentlich groß, und unterhalten eine lohnende Schwefelgewinnung. Ofters sublimirt sich Schwefel nicht allein im Crater, sondern er erkält auch, wie am Vulkan Azufra!, die nach allen Richtungen laufenden Spalten am Umfang des Berges, und bildet so wahre, unermeßlichreiche Schwefelgänge. Verdichten sich die Wasserdämpfe, die mit dem Schwefel ausströmen, zu flüssigem Wasser, so fließt dieses auf dem Grunde des Craters zusammen, und bildet, mit dem Schwefel vermengt, einen wahren Schwefel-Pfuhl. Ein fortwährend aufstochender Pfuhl solcher Art befindet sich, nach A. v. Humboldt, in einem der Crater des Azufra! in Quito, und einen ähnlichen hat Chemisso im großen Crater des Thaal auf den Philippinen gesehen. Wenn Schwefeldämpfe so heiß in die Luft austreten, daß sie sich entzünden, so entsteht bey ihrer Verbrennung schwefeligsaures Gas, welches die Gesteine angreift, mürbe macht, ausbleicht und von den nahen Wassern aufgenommen wird, die sich dadurch säuern.

Wieweil liegen Solfataren in der Nähe eines thätigen Vulcans, wie z. B. die Solfatara bey Pozzuol unfern Neapel, und in diesem Falle ist gewöhnlich die Verbindung mit dem Feuerberge leicht nachzuweisen. So oft der Besuch in Thätigkeit ist, ruht jene Solfatara, deren Fumarollen aus Trachyt hervortreten (s. Fig. 84), und man bemerkt selbst, daß die äußere Luft durch sie ins Innere zieht. Ruht dagegen der Besuch, so haucht die Solfatara Rauch und Dämpfe aus. Eine Ofters auch von Solfataren ausgestoßene Substanz ist Salmiak. Dieser findet sich in der Solfatara des Peshan am Himalayagebirge in solcher Menge, daß die Landeseinwohner ihren Tribut an den Kaiser von China Ofters in Salmiak entrichten. Im Osten von diesem Feuerberg befindet sich auch die große Solfatara von Urumchi, mit einem Umfang von 5 geograph. Meilen.

Salsen.

Diesen Namen gibt man kleinen Ausbruchkegeln, welche Schlamm, Ascharten, Wasser, Steinabl ausblasen, und die zuweilen selbst fortdauernde Generäusbrüche haben und Steine auswerfen. Die Italiener, in deren Lande sie, namentlich um Parma, Reggio, Modena, Bologna und bey Sirgenti in Sicilien anstreiten, heißen sie *Gorgogli*, *Politork*. Sie werden wohl auch, je nach den Substanzen, die sie hervortreiben, *Gas*, *Roth*, *Schlamm*, *Staphtha-Vulcan* genannt. Sie haben ihren Sitz durchaus in vulcanischen Gegenden, oder in solchen, die an vulcanischen Bewegungen Theil genommen haben, und ihre Beziehung zu den eigentlichen Vulkanen ist unverkennbar, wenn gleich das Gestein, aus dem sie hervortreten, öfters durchaus kein vulcanisches, sondern ein rein sedimentäres, Kalkstein, Mergel, Thon, ist.

Die eigenenthümlichen Erscheinungen der Salsen sind schon seit den ältesten Zeiten bekannt. Plato gedenkt ihrer bereits im *Phädon*, und deutet dabey auf die merkwürdigen *Phänomene*, die von Zeit zu Zeit bey *Macaluba*, unfern Sirgenti, beobachtet werden. Die Gegend besteht aus Kreidemergel, und der Ort, wo die *Phänomene* sich zeigen, ist eine in der Mitte etwas vertiefte Fläche von einer halben ital. Meile im Umkreise. Nahkumende Regen weichen den lockern Mergel auf, es entspringt ein schlammiger See, aus welchem Lufft aufsteigt, welche Wasser und Schlamm auswirft. Ist der Boden eingetrocknet, so heben die sich entwickelnden Gase denselben in die Höhe, und treiben denselben, namentlich in der Mitte, 2—3 Fuß hoch auf. Die Erdblase gerspringt endlich, und es brechen runde Löcher ein, aus denen die Gasströme schlammigen Kreidemergel hervorsprizen, und bisweilen wird eine Menge kleiner Schlammkegel gebildet. Am 29. September 1777 zeigte sich dieses *Phänomen* in zuvor nicht gesehener Stärke. Es war mit Erschütterungen des Bodens und einem dumpfen Brüllen begleitet, und aus einem in der Mitte der Fläche aufgesprungenen Schlunde wurde eine beynahe 100' hohe, mächtige Schlammssäule hervorgestoßen; die Erscheinung dauerte etwa eine halbe Stunde. Nach einigen Minuten stieg sie wieder empor, und dieß wiederholte sich des Tages mehrere male.

Im höchsten Grade ausgezeichnet durch Rothvulcane, Gas-
ausströmungen, Naphthaquellen und Salzseen ist der Isthmus
zwischen dem schwarzen und dem caspischen Meere, und
die Halbinsel Abſcheron, und insbesondere ist die Gegend um
Baku durch ihre zahlreichen und ergiebigen Naphtha-Vorkomm-
nisse bekannt. Das herrschende Gestein ist ein jüngerer, ter-
tiärer, petrefactenführender Kalkstein. Die Naphthagruben lie-
fern jährlich über 300,000 Pud schwarzes unreineres und weißes
Naphtha. Nordwärts, etwa 12 Werste von Baku, befindet sich
auf der Abſcheron'schen Halbinsel das ewige Feuer, das
fromme Indier anbeten. Sie heißen den Ort, wo das angege-
dete Gas brennt, „Atoxh-gah,“ d. i. Feuer-Ort, zu welchem
die Indier wallfahrten, um dort ihr Gebet zu verrichten. Es
befindet sich hier ein Klostergebäude, in dessen Zellen und Hof-
so wie endlich außer demselben, das ewige Feuer brennt. Es
soll schon über 900 Jahre bekannt seyn. Das Gas, welches die
Flamme bildet, ist Kohlenwasserstoffgas, stimmt mit der Sumpf-
luft überein, strömt an vielen Punkten mit Heftigkeit aus Spal-
ten des Kalkbodens hervor, und wird von den Indiern mit bren-
nenden Leinwandlappen angezündet. Die Mönche des Klosters
werden von Seereisenden und Kaufleuten unterstützt, und unter-
halten daher auch des Nachts eine große Flamme, indem sie das
Gas vermittelt einer Thouröhre über den Boden in die Höhe
führen. Diese Flamme dient den Seefahrern als Leuchthurm.

An der Westküste liegt vor dem Golf von Baku eine kleine
Insel, welche die Baku'schen Perser „Sanki Wugan“ nennen.
Sie ist ganz, und gar mit Schlammvulcanen bedeckt, es entstehen
auf derselben eine Menge Schlammhügel, die bald plagen und
zusammenfallen, so daß die Oberfläche wie von Schweinen aus-
gegraben aussieht, weshalb die Russen dieselbe „Schweins-Insel“
(Sawinoi) nennen. Sobald ein Schlammhügel zusammengefallen
ist, tritt Naphtha hervor. Noch an vielen andern Stellen zeigen
sich in dieser Gegend ähnliche Erscheinungen, in welcher Erdbeben
und Ausbrüche von Rauch, Naphtha, Schlamm nichts Ungewöhn-
liches sind, und zuweilen ereignen sich auch Feuerausbrüche.

Diese Salzen liegen am äußersten Ende der hohen Kette
des Caucasus, und gerade am entgegengesetzten Endpunkte dieses

Gebirges befinden sich auch die Schlammvulkane und Naphthaquellen der Halbinsel Kertsch und der Insel Taman. Eng verbunden mit den Naphthaquellen sind die vielen Salz-Seen der Halbinsel Abſcheron, der Maſſafir, der Kale, der See Sich, Mahomedi, Balachani u.s.w. Diese Salz-Seen, aus welchen sich das Salz im Sommer in Krusten abseht, geben in einem guten Jahre eine Salzausbeute von 500,000 Pud.

Einsenkungen und Einstürze des Bodens.

Da bey den vulcanischen Ausbrüchen oftmals unermessliche Quantitäten fester und flüssiger Massen aus dem Innern der Erde herausgetrieben werden, so entstehen daselbst natürlich dadurch mitunter große Höhlen und Ausweitungen. Läßt die Spannkraft der Dämpfe nach, so brechen die überliegenden Schichten durch ihr Gewicht in die Weltungen ein, wenn ihr Gewölbe die Last nicht zu tragen vermag, oder keine hinreichenden Unterstüßungspunkte hat, und es entstehen Einsenkungen und Einstürze des Bodens. Die ältere wie die neuere Geschichte führt zahlreiche Beispiele davon an, und bezeichnet die vulcanischen Erscheinungen, und namentlich die Erdbeben, als gewöhnliche Vorgänger. So erzählt Strabo, wie in Lydien und Jonken zu verschiedenen Zeiten, bey großen Erdbeben sich Einsenkungen des Erdreichs ereignet haben, und Plinius gibt an, daß in Kleinasien der Berg „Ephorus“ mit dem Orte Kyffis versunken sey. Auf der japanischen Halbinsel versank während eines heftigen Erdbebens 1662 ein ganzer Berg so vollkommen, daß keine Spur davon übrig blieb. Auf Jamaica stürzte 1662 während eines Erdbebens der höchste Berg der Insel zusammen; im Jahr 1783 versank unter ähnlichen Verhältnissen der Molo bei Messina, und bey dem Erdbeben, das Caracas zerstörte, versanken die Casernen in dem „Castel de St. Carlo“ bey nahe ganz.

Solche Einsenkungen, von denen wir leicht noch viele Beispiele anführen könnten, füllen sich öfters mit Wasser. Eine der merkwürdigsten Erscheinungen dieser Art ist wohl die gewaltige, kesselförmige Erbeinsenkung im Westen von Asien, welche Herr v. Humboldt beschrieben hat. Sie besteht an

10,000 □ Meilen Umfang. Ihre tiefften Punkte nehmen das Caspi-Meer und den Ural-See ein. Sie liegt durchaus tief, an einigen Stellen bis 50 Faden unter dem Spiegel des Ozeans, und ist von Tertiärschichten erfüllt, aus welchen vulcanische Gesteine hervorragen, welche die Ursache des großen Phänomens andeuten.

Erloschene Vulcane.

Wir haben oben angeführt, daß viele Feuerberge Zeiträume langer Ruhe haben, und wie sie Jahrhunderte lang unthätig bleiben. Wenn nun ein Berg, dessen Constitution denselben als ein vulcanisches Gebilde bezeichnet, während sehr langer Zeit vollkommen ruhig ist, so daß keine Tradition sichere Nachricht von seiner früheren Thätigkeit gibt, so sagt man, er sey erloschen. Das Erloschenseyn der Vulcane ist aber nichts Absolutes, und von keinem Feuerberge kann man sagen, daß er für immer erloschen sey. Die Geschichte dieser Berge beweist unabweislich, daß sie oft plötzlich wieder in Aufregung gerathen, geschmolzene Steine, Asche und Flammen austossen. So weiß man, daß der trachytische Opmec auf Ischia, jetzt „Ricola“ genannt, im Jahr 91 v. Chr. und im Jahr 1302 Ausbrüche hatte, und seitdem, somit seit 5 Jahrhunderten, ruht er vollkommen. Auch ist schon angeführt worden, daß der Vesuv Jahrhunderte lang in vollkommener Ruhe verharrte. Der schneebedeckte Pic von Tolina war seit undenklichen Zeiten so gänzlich ohne alle Regung, daß Herr v. Humboldt, als er ihn 1801 maß und zeichnete, nicht ahnen konnte, daß er sich sobald wieder belebe. Aber schon im Jahr 1826 war er wieder thätig geworden. Damals sah ihn Boussingault von Santana aus alle Tage rauchen.

Eruptionstege, welche ihre Entstehung den Seitenausbrüchen eines Hauptvulcans verdanken, schließen sich gewöhnlich völlig wieder, und meist für immer, wenn der Ausbruch beendet ist. Noch vorübergehender ist die vulcanische Action der Erhebungs-erater oder Erhebungsfelsen. Sie hört in der Regel mit Vollendung ihrer Bildung auf; sie sind gewöhnlich ohne Ausbruchöffnungen.

Verharren die vulcanischen Berge in vollkommener Ruhe, so fängt die Witterung an verändernd auf ihre Gestalt und Masse einzuwirken. Die schroffern Formen verschwinden mehr oder weniger, indem die Gesteine an der Oberfläche verwittern. Es erzeugt sich ein dem Wachsthum günstiger Boden, frisches Grün überzieht nach und nach die Seiten, und Waldungen bedecken endlich den Abhang. Gar oft widersteht aber auch die harte Gesteinsmasse den Einwirkungen der Atmosphäre, und die Berge erhalten die rauhe Gestalt öfters Jahrhunderte lang so frisch, daß man glauben könnte, ihre Aktion habe seit langer Zeit erst aufgehört. Wir haben oben schon unter den Erhebungsinseln des Kaiserstuhls im Breisgau erwähnt. Er ist ein wahres Modell eines Erhebungscenters; das ausgezeichnetste Beispiel eines solchen in Deutschland. Er ist aus doleritischen Gesteinen zusammengesetzt, deren Lagen allmählich von Außen gegen die Mitte in die Höhe steigen und, schnell nach Innen abfallend, einen tiefen Kessel bilden; zu welchem von der Westseite her das Hauptthal des Gebirges führt. Seine Wände erheben sich bis zu 1700 Fuß. In den äußern sanften Abhang sind viele kleine Thäler eingeschnitten, Spalten, die bey der Erhebung durch das Zerreißen der Schichten am Umfang entstehen mußten. Trachyt dringt in Gängen von unten in die augitischen Gesteine ein. Im Grunde des Kessels liegen, gleich fremdartig durch Farbe wie durch chemischen Bestand, Hügel von grobkörnigem Kalk, in welche die augitischen Gesteine vielfältig in Schnüren und Gängen von unten herauf eingreifen. Man ist berechtigt, diese Kalkmasse für die veränderten Schichten der jurassischen Kasse zu halten, welche an der Außenseite und am Fuße des Gebirges an einigen Stellen auftreten. Glimmer, Granat, Spinell, Scapolit, Magneteisen und einige andere Mineralien, welche in kleinen Crystallen in diesen körnigen Kalken liegen, scheinen anzudeuten, daß derselbe seine jetzige Beschaffenheit unter Einwirkung der Erhebungsurachen erhalten hat. Weiter deuten größere Stücke von veränderten Mergeln, die zum Theil in eine jaspisähnliche Masse übergegangen sind, und die man an der Außenseite des Gebirges in die doleritischen Gesteine eingeschlossen sieht, die Umwandlung derjenigen Schichten des Sedimentgebirges

an, welche von der vulcanischen Action erreicht worden sind: An einigen Stellen sind eckige Gneisstücke von dem vulcanischen Gestein umwickelt.

In den äußern Schichten treten Mandelsteine auf mit saßigen und zeolithischen Infiltrationen, welche an der Außenseite der Erhebungsfelsen fast niemals fehlen. Wahrer Basalt tritt nur am äußersten nördlichen Ende auf. Am Rande der doleritischen Massen erscheinen an der Westseite gegen den Rhein hin Trümmergesteine, Breccien, Conglomerate, Tuffe, Reibungsproducte an den Rändern gebildet.

Mächtige Löss-Ablagerungen überdecken das Gebirge weit hinauf, und sind in den Erhebungs crater eingebrungen. Die Westseite, welche in früherer Zeit beynahe ihrer ganzen Länge nach von den Wassern des Rheins bespült worden war, zeigt auf große Strecken unbedeckt anstehende Felsen, die meistens oben angeführten Erhebungsfelsen sind erloschen, und bleiben es für immer, wenn sie sich nicht durch Hervorbrechung eines Eruptionsskegels aus ihrem Grunde, wie es beim Erhebungs crater der Somma oder des Pies von Teneriffa geschehen ist, zu einem wahren Vulcan umgestalten.

Die Auvergne zeigt eine große Anzahl seit langer Zeit erloschener Ausbruchskegel. Es sind die durch Montlozieres in v. Buchs Beschreibungen berühmt gewordenen Puy, in deren Reihe sich der geschlossene trachytische Puy de Dome erhebt, so wie der zur Blase aufgetriebene, trachytische Puy de Carcany. Ueber 60 dörre und bde schwarze Kegel steigen in langer Reihe hinter einander, auf zwey Meilen Erstreckung über der granitischen Hochfläche, auf. Cratere, Lavaströme, Schlacken, Asche, alles ist dort noch beynahe frisch, und wie von einem seit Kurzem erfolgten Ausbruch herrührend. Vor allem ist ausgezeichnet der Puy de Parion mit einem außerordentlich großen, trichterförmigen Crater; vielleicht der schbste aller erloschenen Vulcane.

Diesen Puy der Auvergne sind, hinsichtlich der Erhaltungen des frischen Aussehens, mehrere vulcanische Kegelberge in den Umgebungen von Olot in Catalonien vergleichbar. Der Mont Sacopa erinnert an den Puy de Parion.

Am Rhein und in der Elffel. liegt wieder eine große Anzahl erloschener Ausbruchkegel. Sie haben große Lavaströme ausgestoßen, von welchen die bedeutendsten diejenigen bey Nieder-Wendig und zwischen Mayen und Kottenheim sind, welche die weitbekannten „rheinischen Mählsteine“ liefern. Große Massen von Asche, Tuff und Auswürflingen beweisen die frühere große Thätigkeit dieser längst erloschenen Feuerberge. Einige derselben haben große Mengen Bimsstein ausgeworfen, und den erdigen Traß der das Brohl-Thal erfüllt. Bimsstein-Conglomerate ziehen sich vom Raacher-See bis auf die rechte Rheinseite herüber, sind im Busen von Neuwied verbreitet, steigen hoch am Friedrichsberg bey Seyn hinauf, und treten in mächtigen, deutlich geschichteten Ablagerungen zwischen Seyn und Bendorf auf. Im Allgemeinen erscheinen die rheinischen Feuerberge mehr verändert, und nicht mehr so rauh und schroff, wie die erloschenen Feuerberge der Auvergne.

Basalte.

Die basaltischen Gebilde, deren Hauptmasse aus eigentlichem Basalt und aus Dolerit besteht, mit welchen bisweilen auch Klingstein vorkommt, und die von Tuffen und Conglomeraten begleitet sind, unterscheiden sich ganz wesentlich von Vulcanen, Eruptionskegeln und Erhebungsinseln. Man sieht bey ihnen weder Lavaströme noch Cratere. Sie sind im feurigen Flusse auf Spalten aus der Tiefe heraufgestiegen, und haben den Weg entweder durch schon geöffnete Spalten genommen, oder die festen Lagen der verschiedensten Formationen durchbrochen, und sich dadurch den Weg an die Oberfläche gebahnt.

Sie sind gewöhnlich ganz über die Oberfläche hervorgetreten, und überragen geschichtete und massige Gebirgsbildungen, oder haben sich über dieselben im Flusse verbreitet darüber ausgegossen, und liegen in Platten, Ruppen u.f.w. darauf.

Die basaltischen Berge treten in der Regel vereinzelt auf, häufig inselartig, und wenn sich auch mehrere derselben nahe liegen, so bemerkt man doch gewöhnlich keinen unmittelbaren äußeren Zusammenhang. Das reihenweise Fortliegen

derselben, oder, ihre Gruppierung um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt, deutet jedoch unverkennbar den unterirdischen Zusammenhang der an der Erdoberfläche isoliert erscheinenden Berge an.

Ueberall, wo man basaltische Massen aufgeschlossen steht, wo man sie durch bergmännische Arbeiten, hinsichtlich ihres Verhältnisses zu dem umgebenden Gesteine, untersucht, stellt sich ganz augenfällig heraus, daß sie aus Spalten aus der Tiefe heraufgestiegen sind. Sie verzweigen sich öfters gegen die Oberfläche hin, oder kellen sich aus. An ihren Rändern liegt in der Regel eine Tuff- und Conglomeratmasse, welche Bruchstücke des Nebengesteins und Trümmer von tieferliegenden Gesteinen einschließt. Der feste basaltische Kern enthält selbst bisweilen Bruchstücke der Gebirgsarten, durch welche er in geschmolzenem Zustand heraufgestiegen ist, und die er durch Hitze bald mehr, bald weniger verändert hat.

Die Conglomerathülle ist gewöhnlich aus Trümmern des basaltischen Gesteins zusammengesetzt, aus mechanisch zerriebenen, thonigen Theilen, und aus Stücken der Gesteine, durch welche der Basalt sich den Weg gebahnt hat. Sie können als Product der Reibung des aufsteigenden Basaltes gegen die Wandungen der Spalte betrachtet werden.

Trümmer tiefer liegender Gesteine, welche in den Conglomeraten liegen, und das öfters zu beobachtende Vorkommen von Petrefacten sowohl in denselben, als auch, obwohl ungleich seltener, im festen Basalt, liefern den schlagenden Beweis des Herausbringens aus der Tiefe, des Durchbruchs von unten herauf, und der Losreißung von Stücken derjenigen Schichten, durch welche der Weg der aufsteigenden Masse gegangen ist.

Setzen die Gebirgsschichten dem aufsteigenden Basalte ein großes Hinderniß entgegen, so wurden sie mehr oder weniger gehoben, bis sie barsten und der Basalt auf der Spalte hervortreten konnte. Man sieht daher nicht selten isolirte Ruppen des Sedimentgebirges, in welchen eine Basaltmasse eingebrungen ist, sich über das allgemeine Niveau der analogen Bildungen der Gegend erheben.

Ein sehr schönes Beispiel eines Basaltvorkommnisses, welches

alle die angeführten Erscheinungen zeigt, gibt der Wartenberg unsern Donaueschingen. Er erhebt sich über dem Städtchen Geislingen, mitten im Donauthal, als eine isolirte Kuppe. Sein Gipfel liegt nahezu 540' über dem Städtchen, und wird, so wie die Seiten, aus versteinungsreichen Schichten des Doggers gebildet. An seinem Fuß, unten an der Donau, treten Lias-Schiefer hervor. An drey Stellen ragen Basaltfelsen heraus, Theile einer größern Basaltmasse, welche durch die jurassischen Schichten heraufgestiegen ist, sie zur isolirten Kuppe erhoben hat. Das geht ganz klar daraus hervor, daß dem Wartenberg gegenüber, in gleicher Höhe mit seinem Gipfel, an beiden Thalgängen schon die höhern jurassischen Glieder, der Orfordithon und der Corallenkalk, gelagert sind. Die Doggerschichten liegen tief darunter am Fuß der Gehänge. An der Ostseite, gegen Geislingen herab, bricht ein starker basaltischer Kamm hervor, der durch Steinbrucharbeiten aufgeschlossen ist. An seinen Rändern liegen Conglomerat- und Luffmassen, mit zahlreichen Stücken von Kalkstein und Schiefer, in welchen einzelne, ziemlich erhaltene Terebrateln liegen, und Fragmente vieler andern, der Zerstümmerung wegen unkenntlichen Meeremuscheln. Der in der Mitte heraufsteigende, olivinreiche Basalt umschließt viele Knauer von gebranntem Mergel, in welchem zuerst Hr. v. Buch 1831 die unverkennbare *Polidomia Bronnii* des Lias auffand. Ueberdies findet man darinn Bruchstücke von Ammoniten und Pectiniten. Diese Mergelstücke gehören offenbar den tiefer unter dem Dogger liegenden Liaschichten an; sie geben einen ebenso offenkundigen als leichten Beweis des Durchbruchs der Wartenberger Basaltmasse.

Einer der interessantesten Basaltdurchbrüche ist auch derjenige der Blauen-Kuppe bey Eschwege in Hessen (s. Fig. 35). Eine mächtige Basaltmasse hat dort die wagrechten Schichten des Bunten Sandsteins durchbrochen, ohne sie zu verrücken. Sie schließt Sandsteinstücke ein, die sich verschiedentlich verändert zeigen, auch die durchsetzte Sandsteinmasse ist längst der Basaltgränze auffallend verändert. Das Gestein von der gewöhnlichen rothen Farbe ist in der Nähe des Basalts ausgebleicht oder grau, und die veränderte Färbung bis auf mehr als 12' vom

Basaltstrande erkennbar. Es zeigt sich weicher, beynahe dicht und wie gestrichet: Einzelne thonige Zwischenlagen haben eine jaspisartige Beschaffenheit. Alle diese Veränderungen erklären sich durch Einwirkung von Hitze, die vom Basalte ausströmt ist.

Kalksteine hat man in Berührung mit Basalten in einem theils gebrannten, theils in einem crystallinisch-körnigen Zustand gefunden; Steinkohlen ihres Bitumens beraubt, Thone, Sandsteine, prismatisch abgesondert, wie sie es in der hohen Hitze der Schmelzöfen werden u.s.w. Lauter directe Beweise von Erhitzung der Gesteinsmassen, die mit dem aufsteigenden Basalte in unmittelbarer Berührung standen.

Die vielen Zeolithe, Kalk- und Kieselminerallen, welche in basaltischen Gesteinen vorkommen, namentlich deren Blasenräume ausfüllen oder erfüllen, scheinen Infiltrationen zu seyn. Da man bey gar vielen Blasenräumen deutlich den Infiltrationspunkt wahrnimmt, und sieht, wie sich von diesem aus die Mineralien stalactitisch bildeten, andere Mineralien aber, welche wir in den Basalten antreffen, wie Glimmer, Birkon, Saphir, können wohl nur durch Schmelzung entstanden seyn, andere, wie Eisenglanz, können sich auch durch Sublimation gebildet haben. Die in den basaltischen Conglomeraten und Tuffen fast niemals fehlenden Opale scheinen unter Einfluß von Wasser entstanden zu seyn, welches wahrscheinlich in Dampffgestalt an den Rändern des hervordringenden Basaltes ausströmte. Beste Basalte und feinkörnige, dichte Dolerite zeigen sich nicht selten in Säulen zerpalten. Diese oft sehr ausgezeichnet entwickelte Säulenstruktur des Basalts sieht man vortreflich am Battenberg und am Mendenberg bey Linz am Rhein, bey Fauerbach, unserm Friedberg in der Wetterau, am Riesenweg (Gion's Canoway) in Irland, auf Staffa *), wo die berühmte Fingals-Höhle, und auf mehreren andern Inseln der Hebriden. Die Säulen erreichen am Mendenberg bey Linz, bey einem Durchmesser von wenigen Follen, eine Höhe von 50' und darüber; am Riesenweg zeigen sie bey einer Höhe von mehr als 100' einen Durchmesser von 5'; auf Staffa sieht man schöne Gruppen

*) Staffa, gebildet von Staff oder Säule.

gebogener Schalen. Nicht selten sind sie durch Querspalten in kleinere Stücke abgetheilt, gegliedert (s. Fig. 2). Meistens steht man sie senkrecht auf der Unterlage stehen, oder wenn sie Spalten ausfüllen, rechtwinklig gegen die Begrenzungsflächen. Die Ursache dieser prismatischen Zertheilung können wir nur in einer besondern Abkühlung der Basaltmasse finden. Wenn sie nehmlich im schmelzenden Zustande an den Rändern stärker abgekühlt wurde, als in der Mitte, so entstanden Sprünge senkrecht von der abkühlenden Fläche gegen das Innere. Dadurch mußte das erkaltende Gestein sich in prismatische Stücke zertheilen.

Manchmal ist der Basalt plattensförmig. Diese Absonderung scheint derjenigen zu entsprechen, welche die Schalen in Glieder abtheilt. Verwittern prismatische Stücke von Basalt, so gibt sich ein weiteres Structurverhältniß, das „schalige,“ zu erkennen. Es löst sich von den polyedrischen Stücken Schale um Schale ab; ihre Gestalt wird dadurch kugelig. Auf diesem Wege werden die sogenannten Kugelbasalte gebildet, also gewöhnlich bey der Verwitterung, welche die Masse auflöst. Man sieht die Schalenstructur indessen auch öfters am frischen Gesteine. Ein schönes Beispiel davon gibt die von Röggerath beschriebene, gewaltige Klippside des Reickensberges bey Ober-Cassel am Rheine. Manchmal sieht man basaltische Massen gleichsam lagenartig zwischen geschichteten oder plattensförmigen Gebirgsbildungen, und damit, dem Anscheine nach, in mehrfachem Wechsel. Aber alle genauen Untersuchungen solcher Vorkommnisse haben übereinstimmend dargethan, daß hier von einer wahrhaften Einlagerung oder Wechselagerung gar nicht die Rede seyn kann, indem diese Massen immer mit von unten aufsteigenden Basaltgebilden in Verbindung stehen. Da diese oft leichter zwischen getrennten Schichten eindringen, als dieselben zerbrechen konnten, so nahmen sie den Weg in der Richtung des geringsten Widerstandes, und drangen auf diese Weise zwischen den Schichten ein. Aber auch solche Basaltmassen versteinen sich öfters wieder nach aufwärts, und beweisen dadurch, daß sie die höher liegenden Schichten durchbrechen, ganz augenscheinlich ihr Heraufsteigen und Eindringen von unten.

Auch auf Erzgängen sind an mehreren Orten Basalte auf-

ner-See bis zum Gailal, vom Eisch-Thal bis zum Trau-Thal. Der Melaphyr bildet darunter einen unermesslichen Gang, welcher längs der Kette der Alpen an ihrem Südrande hervorgebrochen ist.

Man sieht ihn am Rande vieler Gebirge und in Deutschland, namentlich am Fuße des Hundsrückens, am Thäringewald, am Harze, in Schlesien. Mehrfältig kommen in seiner Nähe Erze vor, und insbesondere sieht man am Harze und am Thäringewald in ihm selbst Braunsiegingänge.

Trachyte und Andesite.

Sie erscheinen unter denselben Verhältnissen, wie die Basalte, und steigen gewöhnlich isolirt in hohen Kegeln oder Domen auf, wo sie in zusammenhängenden und ganz großen Massen erscheinen, wie in den Anden und am Caucasus. Da sehen sie hohe Ketten mit thurmformigen Gipfeln zusammen, und zeigen die Zerspaltungen, Pyramiden und Spitzen des alpinischen Gebirgslandes. Man sieht die Trachyte öfters in Berührung mit Basalten, und dann liegen sie in der Regel unter dem augitischen Gesteine. So tritt Trachyt nur im Innern der Erhebungsinfeln in der Spalte, die zum Erhebungs crater fährt, oder in diesem selbst, aus den basaltischen Massen hervor, und vielfältig sehen hier Trachytgänge von unten herauf in die basaltischen Gesteine über. Die wahren Basalte greifen jedoch auch manchmal in Gängen und Schnüren in die trachytischen Gebilde ein, und solche Massen sind evident erst nach der Bildung des Trachyts heraufgestiegen.

Trachytberge haben gewöhnlich eine Hülle von Luff und Conglomerat. Der Feldspath, der in dem festen Gestein vorwaltet, und dasselbe charakterisirt, ist mitunter noch ziemlich frisch, auch in den Conglomeraten zu erkennen, weit häufiger jedoch sieht man ihn darinn zersezt, erdig, in eine thonige Substanz umgewandelt. Bruchstücke des Nebengesteins und tiefer liegenden Schichten zeigen sich ebenso darinn, wie in den basaltischen Conglomeraten. Man sieht sie öfters geschichtet, also unter Einfluß des Wassers abgesezt. Doch häufig zeigen sich Conglomerate und Luffe ohne alle Schichtung, und ganz in der Beschaffenheit von Reibungsproducten. Sehr oft sieht man

Opale darinn, wie in den basaltischen Tuffen, namentlich in Ungarn, und dort sind sie die Heimath der schönen farbenspielenden Opale.

Mehrfältig ist der Trachyt prismatisch zerfallen, wie in den Anden, im Siebengebirge. Doch ist die Säulenstructur bey weitem seltener, als bey dem Basalt. Dagegen besitzen viele Trachyte Americas, namentlich diejenigen des Chimborasso und des Assuay, eine sehr bestimmte und regelmäßige, plattenförmige Abtheilung.

Als untergeordnete Gebilde erscheinen im Trachytgebiete Klingsteine, Perlsteine, Pechsteine, Obsidiane; Trachyte und Andesite sind öfters von Klingstein begleitet, vorzüglich in der Andenkette. Die Pechstein- und Perlstein-Ablagerungen der Engausen, Ungarns, Mexicos, die Obsidian-Vorkommnisse in jenem Lande, so wie am Puraze und Polara, so wie in Ungarn, gehören ihnen an. Von großem Interesse ist das Vorkommen von Erzen, in Trachyt- und Andesitbildungen. Es scheinen darinn die gold- und silberreichen Erzlagerrstätten Mexicos zu liegen, welche von einem feldspathigen Porphyr umschlossen sind. Der reiche, goldführende Gang von Villalpando bey Guanajuato liegt in einem trachytischen Klingsteinsporphyr. Der Pechsteinsporphyr von St. Juan de la Chica schließt Zinnobergänge ein, und in dem Trachyt des Guanajuato-Gebirges kommen Bismutze vor. In einem Trachyt-Conglomerate liegen die goldführenden Erümmer zu Königsberg in Ungarn, und sowohl in demselben als in reinem Trachyt kommen zu Telenhanya in Siebenbürgen goldhaltige Silbererze vor.

Die Bruchstücke von Trachyt, welche man nur in den jüngsten tertiären Conglomeraten oder im Schuttlande des Diluviums findet, setzen es außer Zweifel, daß die Trachyte zu den neuesten Bildungen gehören. Man sieht sie auch in Steyermark unmittelbar aus Geröllen aufsteigen (Gleichenberge). Am Caucasus sind die Tertiär-Schichten des caspischen Litorals dadurch aufgerichtet.

In Mächtigkeit und Höhe übertreffen die Trachyt- und Andesitmassen die Basalte und Melaphyre bey weitem. Sie erreichen,

namentlich am Caucasus und in den Anden, eine ungewöhnliche Mächtigkeit, und steigen zu den größten Höhen hinauf. Dort bilden sie den Elborus und hier viele der schneebedeckten Nevados, welche eine Höhe von mehr als 20,000 Fuß erreichen.

Was die Verbreitung betrifft, so erscheint diese sehr allgemein, wenn man sich erinnert, wie viele Vulcane daraus bestehen, in wie vielen Erhebungs-erateren dieselbe hervorgebrochen ist, wie er im Siebengebirge, an den Engawren, in der Navergne, in Ungarn, Siebenbürgen, Griechenland, Nordafrika, am Caucasus, in den Anden u.s.w. vorkommt.

Ursache der vulcanischen Erscheinungen.

In allen Zeiten haben die vulcanischen Erscheinungen, welche den Geist und die Sinne gleich mächtig ansprechen, die Frage hervorgerufen: „Was ist es, was die Thätigkeit der unterirdischen Mächte erregt, welche Hügel, Berge, ja ganze Landstriche emporhebt, die Erbrinde zersprengt und unermessliche Quantitäten festet und flüssiger Substanzen herauszuschleudert? Was ist es, was in den Vulcanen brennt und die Hitze erzeugt, bey welcher Erden und Steine schmelzen?“

Die älteren Physiker leiteten alle vulcanischen Erscheinungen von einem Erdfeuer ab, dessen Sitz sie in den Mittelpunct der Erde verlegten. Spätere Beobachtungen, welche schon Athanasius Kircher in seiner „Mundus subterraneus“ 1664 mittheilt, gaben dieser Annahme einige Wahrscheinlichkeit, indem sie darauf führten, daß die Temperatur nach dem Innern der Erde zunehme, und alle spätern Beobachtungen, namentlich aber die in den letzten Decennien in großer Anzahl und mit vieler Genauigkeit angestellten, beweisen dieses unwiderleglich. Die Erde besitzt eine innere Wärme, welche ihr eigenthümlich ist, nicht von den Sonnenstrahlen herrührt, und schnell mit der Tiefe zunimmt. Wassermassen, die in verlassenen Gruben in großer Tiefe liegen, zeigen eine Temperatur, welche immer weit höher ist, als die mittlere Temperatur an der Oberfläche. Sie kann augenscheinlich keinen andern Grund haben, als die eigenthümliche Wärme der steinigen Wände, welche das Wasser einschließen, und die Temperatur dieser Wände läßt sich von keiner andern

Ursache ableiten, als von der eigenthümlichen höheren Temperatur des Erdbörpers in gewissen Tiefen. Die genauesten und unter den günstigsten Verhältnissen angestellten Beobachtungen haben das Resultat geliefert, daß die Temperatur mit jedem 115 bis 116 Fuß (par. F.) Tiefe um einen Grad R. zunimmt.

Man hat vielfältig beobachtet, daß die schmelzende und vollkommen flüssige Lava eine Hitze hat, bey welcher Kupfermünzen ungeschmolzen bleiben, Silbermünzen aber schmelzen. Da wir nun wissen, daß das Silber bey 975° R., das Kupfer dagegen bey 1118° R. schmilzt, so können wir als Mittel der Schmelzhitze der Lava 1000° R. annehmen. Vorausgesetzt, daß die Wärme nach derselben Progression, die wir bis jetzt bey deren Beobachtung in den zugänglichen Tiefen der Gruben gefunden haben, gegen das Innere der Erde fortwährend zunimmt, so kann schmelzende Lava in ihrem Innern in einer Tiefe von 115,000 Fuß vorhanden seyn. Die vulcanischen Erscheinungen geben sich alsdann als eine Folge der ununterbrochenen Wechselwirkung zwischen den geschmolzenen Massen des Innern der Erde und der Atmosphäre zu erkennen.

Welche Kraft hebt aber die Lava aus dieser großen Tiefe hervor, und schleudert Steine bis auf Tausende von Fuß in die Höhe?

Erinnern wir uns, daß alle Eruptionen von Strömen von Wasserdampf begleitet sind, daß viele Eruptionskegel denselben in großer Menge ausblasen, daß er sich aus Fumarolen und Spalten der Lava entwickelt, daß vulcanische Gesteine oft Wasser enthalten und sehr viele wasserhaltige Mineralien einschließen, so finden wir im Wasserdampf die gesuchte Kraft.

Der Wasserdampf erreicht seine größte Spannkraft bey einer Temperatur von 1224° R. Bey dieser kann der Dampf eine Lava-Säule von 88,747 Fuß tragen; die Temperatur, bey welcher der Dampf seine größtmögliche Expansivkraft erreicht, liegt in einer Tiefe von 139,840 Fuß, also etwa 6 geograph. Meilen unter der Erdoberfläche.

Eine zusammenhängende Lava-Säule von der ganzen Höhe, vom vulcanischen Sitze an bis zur Erdoberfläche, kann demzufolge den Wasserdampf selbst bey'm Maximum seiner Tension nicht

emporheben. Erwdgt man aber, daß eine Aufblase, welche man in den Barometer eintreten läßt, das Quecksilber weit über den Barometerstand in die Höhe hebt, so können wir uns auch vorstellen, daß Wasserdampf, welcher in die Lavafäule eingedrungen ist und ihre Continuität unterbrochen hat, eine seiner Spannkraft entsprechende Lavamasse in den Canälen in die Höhe heben kann, welche zum Crater führen. So kann es also geschehen, daß Wasserdämpfe, welche noch lange nicht das Maximum der Expansivkraft erreicht haben, Lavafäulen von einer ihrer Spannkraft entsprechenden Höhe aus großer Tiefe bis an die Erdoberfläche heben können *). Wenn dies in der That der Fall ist, so müssen Lavafäulen und Dampfäulen in den vulcanischen Canälen mit einander wechseln, und abwechselnd Lavamassen ausgeschleudert und Dampfströme ausgeblasen werden, und gerade diese Erscheinungen beobachtet man vielfältig bey Eruptionen. Es bleibt aber noch darzulegen übrig, unter welchen Umständen die Wasser tief ins Innere niedergehen und bis zum vulcanischen Herd bringen können.

Daß Spalten von der Oberfläche bis zu diesem niedergehen, bedarf keines Beweises, es könnten ja sonst die geschmolzenen Massen nicht vom vulcanischen Eise bis in den Dunstkreis herausgeschleudert werden. Haben nun die Wasser durch solche Spalten freyen Zutritt zum vulcanischen Herde, so liegt der Punkt, wo die Spannkraft der Dämpfe dem hydrostatischen Druck der Wasserfäule das Gleichgewicht hält, in einer Tiefe von 33,044 Fuß unter der Meeresfläche, und es können somit, da die Lava dreymal so schwer ist als Wasser, Lavafäulen von 29,000 Fuß durch die Kraft der Wasserdämpfe aus Tiefen von 33,000 Fuß unter der Meeresfläche emporgehoben werden. Dies erfolgt während einer ununterbrochenen Wassereommunication zwischen dem Meere und dem vulcanischen Herde.

Geht das Wasser auf engen Zulassungscanälen in eine noch größere Tiefe nieder, so findet eine Rückwirkung von Seiten der Dämpfe auf die Wasserfäule statt, und es wird aus ihrer oberen Mündung heißes Wasser ausströmen, und selbst Dampfströme

*) S. G. Wilschofs Wärmelehre J. 1837. S. 271.

heissen Wassers unter der Meeresfläche, in der Nähe von Vulkanen, und Aufsteigen von Rauch aus dem Meere während der Eruptionen benachbarter Feuerberge, sind eine oft beobachtete Erscheinung. Die Kraft der vulcanischen Action kann dadurch zwar etwas vermindert werden, doch nicht leicht in einem größern Maasse, als die Gewalt des explodirenden Schießpulvers durch Ausströmen von Gas aus dem Zündloch einer Geschützröhre sich vermindert.

So lange nun das Wasser freyen Zutritt zum vulcanischen Heerde hat, so kann der Feuerberg in ununterbrochener Thätigkeit bleiben, und wenn die Lavamasse an einer Stelle ganz erschöpft ist, wenigstens fortwährend Wasserdämpfe ausblasen, bis etwa von einer entfernteren Stelle neue Lava zugeflossen ist. Werden die Wasserzuführungs-Gänge geschlossen, was durch Lava geschehen kann, oder indem die heißen Wasserdämpfe selbst einen Verschlusß dadurch bewirken, daß sie das Gestein der Spalten an ihrem unteren Ende erweichen, in Brei verwandeln und mit diesem die Spalte verstopfen, so kommt der Vulcan zur Ruhe.

Die im vulcanischen Heerde eingeschlossene Wassermenge wird daselbst wie in einem Dampfkessel erhitzt, und die Wasserdämpfe werden das Maximum ihrer Expansionskraft erreichen. Sie werden mit unermesslicher Gewalt Scheidewände sprengen, welche unterirdische Spalten und Höhlungen von einander trennen, in die Räume eindringen und Erschütterungen und Stöße bewirken. Man sieht ein, daß sie Hauptursache der Erdbeben seyn können: Dringt eine sehr große Wassermenge bis zum vulcanischen Heerd, so wirkt sie abkühlend auf die Lava, und auch die außerordentliche Dampfbildung, welche auf Kosten ihrer Hitze geschieht, hat eine große Erniedrigung der Temperatur zur Folge. Die Lava kann dadurch zum Erstarren gebracht werden. Dann bedarf sie einer längern Zeit zu ihrer Wiederschmelzung, da sie bekanntlich ein sehr schlechter Wärmeleiter ist. Erschütterungen, wie sie bey Erdbeben vorkommen, werden häufig die verschlossenen Gänge wieder öffnen, der freye Wasserzufluß kann dadurch wieder hergestellt und der Vulcan aufs Neue in Thätigkeit versetzt werden.

Die außerordentliche Menge von kohlensaurem Gas, welche sowohl in der Nähe thätiger als erloschener Feuerberge an die

Oberfläche tritt, und namentlich die *Rosetten* bildet, kann dadurch erzeugt werden, daß Laven, durch Zusammenschmelzen von kieseligen Gesteinen mit kohlensaurem Kalk, entstehen. Die Kohlensäure wird dabei ausgeschieden. Alle Basalte und Laven enthalten 10 und mehr Procente Kalkerde, und war diese zuvor mit Kohlensäure verbunden, so läßt sich einsehen, welche außerordentliche Menge von kohlensaurem Gas erzeugt wird, wenn sich Laven oder Basalte durch Zusammenschmelzen kieselerdehaltiger Gesteine mit kohlensaurem Kalk bilden. Das Schwefelwasserstoffgas, welches in kleinerer Menge nicht selten aus Vulcanen und Solfataren ausgeblasen wird, scheint dadurch gebildet zu werden, daß Wasserdämpfe und Kohlensäure auf Sulfurete der leichten Metalle (Schwefel-Kalium, Schwefel-Natrium, Schwefel-Calcium) einwirken. Die nicht unbeträchtliche Menge schwefelsaurer Salze, welche in vulcanischen Producten vorkommt, kann leicht durch bituminöse Dämpfe in Schwefel-Verbindungen umgewandelt werden, welche das Material zur Bildung von Schwefelwasserstoff darbieten. Aus diesem Gase scheidet sich auch Schwefel ab, wenn es durch Einfluß der atmosphärischen Luft zerseht wird, oder sehr langsam verbrennt. Das schwefeligsaure Gas bildet sich, wie oben schon angedeutet worden ist, durch Verbrennen des Schwefels an der Luft. Der Schwefel selbst, den viele Vulcane in Dampfgestalt ausblasen, kann im Innern der Erde theils an schwere Metalle gebunden, theils in freyem Zustand vorkommen, indem uns solcherley Vorkommnisse auf Gängen und im crystallinischen Grundgebirge bekannt sind.

Da bey der Einwirkung von salzigem Wasser auf schmelzende Lava Salzsäure entbunden werden kann, und diese mit oxydirten Metallen, namentlich mit dem in allen vulcanischen Producten vorkommenden Eisenorydul in Berührung tritt; so entstehen Chlormetalle, welche sublimirt werden, und unter denen bekanntlich das Chlor-Eisen am häufigsten auftritt. Wirken Wasserdämpfe auf heißes Chlor-Eisen ein, so verwandelt es sich nach und nach in crystallisiertes Eisenoryd, welches wir so häufig in den vulcanischen Gesteinen antreffen.

Wir haben in Vorstehendem versucht, die vulcanischen Erscheinungen dadurch zu erklären, daß wir angenommen haben, die

Temperatur der Erde steigere sich nach dem Innern bis zur Schmelzhitze. Diese Hypothese erklärt, nach dem gegenwärtigen Standpunct der Wissenschaft, alle vulcanischen Erscheinungen auf eine ziemlich genügende Weise. Alle andern Hypothesen, nicht ausgenommen diejenige, welche die Ursache der vulcanischen Erscheinungen in intensiven chemischen Wirkungen sucht, in Oxydation der Erden und Alcalien, in Zersetzung von Chlor-Metallen durch Wasser, erweisen sich unhaltbar.

A n h a n g .

Erdbbrände.

Stein- und Braunkohlen, welche Schwefelkies führen, entzündeten sich öfters in Folge einer Zersetzung des Kieses, und brennen dann lange fort. Dabey bemerkt man eine Reihe von Erscheinungen, die man, wenn sie bis an die Oberfläche reichen, mit dem Namen eines Erdbbrandes belegt. Gewöhnlich erfolgt eine solche freiwillige Entzündung erst in Folge von Bergbauarbeiten, die auf Lagerstätten mineralischer Brennmaterialien getrieben werden, da sie, durch Ausschauen von Räumen, der Luft den Zutritt in dieselben gestatten, unter deren Einwirkung die Zersetzung der Kiese und die Erhitzung erfolgt, welche den Ausbruch des Feuers herbeiführt.

Wird die Oberfläche von solchen Bränden stärker afficiert, so sind ihre Producte gebrannte Erden und Steine, Erbschlacken, rothgebrannte Schieferthone und durch Frittung jaspisähnlich gewordene Thonmassen. Wir haben die Grubenbrände schon oben, bey der Beschreibung des Steinkohlengebirges, S. 740, angeführt. Die mannichfaltigsten Producte eines Steinkohlenbrandes, der stark verändernd auf die Oberfläche eingewirkt hat, sieht man zu Planitz bey Zwickau in Sachsen.

Erdbbrände, in Folge von Selbstentzündungen von Braunkohlenflöhen, kann man zu Eptenrode, unfern Cassel, auf dem Westerwalde und in Böhmen bey Bilin und Töplitz beobachten.

Auch kiesreiche Mergel und Schiefer, welche einen Bitumen-Gehalt besitzen, entzündeten sich bisweilen von selbst. So hat sich

Flaschiefer, unsern Hildesheim in Hannover, entzündet, und zweifelsohne hat auch der Flaschidistrict bey Boll in Württemberg, dessen Oberfläche ganz roth ist, in früherer Zeit gebrannt. Auch in England hat man mehrfältig Brände in Flaschichten wahrgenommen. Werden kiesreiche Blöcke von Flaschiefer am Meeresufer vom salzigen Wasser getränkt, so entzündeten sie sich nachher fast jedesmal.

Bey allen solchen Bränden werden niemals Laven gebildet überhaupt keine wahren vulcanischen Producte. Man steht daher leicht, wie ganz unhaltbar die Hypothese ist, welche den Ursprung der vulcanischen Thätigkeit in brennende Braun- oder Steinkohlenslager verlegt.

II. Ordnung. Plutonisches Gebirge.

Syn. Massiges Grundgebirge (Terrain plutonique).

Die plutonischen Gebilde zeigen sich wie vulcanische in Schnüren, Trümmern, Gängen, in den verschiedensten geschichteten Formationen, bringen in Keulen, Stöcken und Regeln in dieselben herauf und haben den Schichtenverband und die Gesteinsbeschaffenheit der mit ihnen in Berührung stehenden Ablagerungen mannichfaltig verändert. Sie haben, wie die vulcanischen Gebilde, die Schichten des Sedimentgebirges zu verschiedenen Zeiten aufgerichtet, emporgehoben, durchbrochen und sich durch dasselbe den Weg an die Oberfläche gebahnt. Ihre Gesteine sind durch vorwaltenden Feldspath und Quarz characterisirt, womit gewöhnlich Glimmer oder Hornblende vorkommen. Der Augit, in den vulcanischen Gesteinen allverbreitet, erscheint selten. Ein Theil der plutonischen Gesteine, durch Hornblende und verwandte Geschlechter characterisirt, zeigt eine große Verwandtschaft mit Basalten und Doleriten.

Die crystallinische Structur tritt hier abermals in großer Auszeichnung auf. Crystalle der verschiedensten Mineralien erscheinen in vollendeter Ausbildung. Alles trägt den Typus chemischer Action. Die Art, wie die plutonischen Gesteine zwischen andere geschichtete Bildungen eingebracht sind, wie sie

Zwischenräume ausgefüllt, die Schichten beim Durchbrechen an den Rändern zerrieben und Bruchstücke eingewickelt, wie sie sich endlich über die Oberfläche derselben ausgebreitet haben: das alles zeigt wohl deutlich an, daß sie in einem erweichten Zustand aus dem Erdbinnern heraufgestiegen sind, und sich zähflüssig über einzelne geschichtete Bildungen hingelegt haben. Die Veränderungen, welche damit in Berührung (Contact) gestandene Gesteine des Fißgebirges erlitten haben, die crystallisierten Mineralien, welche man so oft auf den Contact-Flächen findet, und die vorzugsweise aus wasserfreyen Silicaten bestehen, deuten uns den chemischen Vorgang an, der an solchen Stellen, um derartige Producte zu bilden, unter Einfluß einer höhern Temperatur muß vor sich gegangen seyn.

Granit.

Das wichtigste Gebilde des plutonischen Gebirges ist der Granit. Er ist über den ganzen Erdball verbreitet, setzt colossale Massen zusammen, und erhebt sich bis zu den größten Höhen. Kaum dürfte er in irgend einem Gebirge fehlen, worinn crystallinische Gesteine vorkommen. Er tritt in den mehrsten Gebirgen als der innere massige Kern auf, der bald isoliert und inselartig aus den Schiefen und Straten des Grund-, Uebergangs- und Fißgebirges hervorragt, bald in längeren Zügen und weiter erstreckten Ketten als ihre Centralachse erscheint, als der Grundpfeller, an welchen die geschichteten Bildungen angelehnt sind, oder auf welchem sie ruhen. Nicht selten hebt er sich auch am Rande von Ketten heraus, und erscheint so als das Gestein, welches die geschichteten Bildungen gehoben und aufgerichtet hat. Seine mineralogische Beschaffenheit ist mannfaltig, und oben in der Gesteinslehre näher beschrieben worden. Von besonderem Interesse ist die enge Verbindung, in welcher Granit zum schieferigen Gneis steht. An vielen Stellen, wo die beiden Gesteine einander unmittelbar berühren, steht man sie in einander übergehen, und die Uebergänge durch Mittelgesteine vermittelt. Daraus läßt sich denn wohl ableiten, daß Granit und Gneis, durch dieselben Mineralien constituirt, und nur durch die Art der Anordnung derselben verschieden, unter ziemlich gleichen Verhältnissen,

gebildet worden sind. Erinnern wir uns dabey, daß man Gneissteile in geschichtete Bildungen eingetrieben sieht, und Schichtenaufrichtungen durch denselben hervorgebracht, so wird die nahe Verwandtschaft beider Gesteine noch augenscheinlicher.

Sehr oft sieht man den Granit in den crySTALLINISCHEN Schieferen, so wie im Uebergangs-Schiefergebirge, in einzelnen Stöcken, die zwischen den Blättern oder den Schieferlagern von unten eingebracht sind. Das Gestein, das sie umschließt, zeigt sich öfters verändert. Die anstoßenden Gesteine sind oft rissig, oder sehr hart, spröde. Die Schichtung ist nicht selten undeutlich oder verworren. Kalksteine sind längs der Berührungsfächen mit dem Granit, und bis auf eine gewisse Entfernung von diesem, gewöhnlich körnig, und Kalksteinmassen, die im Granit eingeschlossen sind, sieht man kaum anders, als mehr oder weniger crySTALLINISCH. An der Gränze beiderley Gesteine ist oftmals eine Zone zu bemerken, in welcher sie wie in einander geflossen erscheinen, und an solchen Stellen fehlen niemals schön crySTALLISIRTE Mineralien, Granat, Glimmer, Schörl, Distacit, Hornblende u.s.w.

Die Granit-Inseln des Harzes, welche im Thonschiefer- und Grauwackengebirge stehen, haben in ihrer Nähe ein unter dem Namen „Hornfels“ bekanntes Gestein, welches ohne Zweifel nichts anderes ist, als ein durch Granit veränderter Thonschiefer. Man sieht sogar manchmal noch unverkehrte Schieferstücke in den Hornfelsmassen, welche den Granit wie eine Schale umgeben. Rußegger berichtet, daß er am oberen Nil, nordwärts Chardum, am Gebbel el Meluhat, einem isolirten Regelberge von etwa 500 Fuß Höhe, der aus Gneis und Granit zusammengesetzt ist, den darauf gelagerten Sandstein (Keuper-Sandstein) ganz und gar verändert gefunden habe. Seine Körner sind zusammengebacken, zusammengefrittet, und die ganze Sandsteinmasse ist stellenweise zu einem dichten, theils weißen, theils buntfarbigen, Glase geschmolzen; man beobachtet hier die allmähligsten Uebergänge vom unveränderten Sandstein bis zum völlig verglasten. Dabey sind seine Schichten ganz aus einander gerissen, das Gestein ist in allen Richtungen zertrümmert, und bildet sonderbare, höchst groteske Felsen. Diese Stelle, bemerkt Rußegger,

zeigt mit überraschender Klarheit, sowohl die Emporhebung des Sandsteins durch den aus der Tiefe emporgestiegenen Granit, so wie dessen merkwürdige Veränderung, die derjenigen vergleichbar ist, welche Sandsteine in einem Eisenschmelzofen erleiden. Am Irtysh hat Herr v. Humboldt einen Durchbruch von Granit durch Thonschiefer beobachtet, der ein außerordentliches Interesse gewährt. Er sah nemlich, etwa 6 Werste von Buchtarminsk, auf dem rechten Ufer des Flusses, Granit in Gängen und stockförmigen Massen durch Thonschiefer herausbringen, dessen Schichten steil aufgerichtet, und in der Nähe des Granits voll Glimmerblättchen sind. Der massige Granit steht öfters senkrecht neben dem Thonschiefer, und zuweilen hängt er förmlich über ihn hin, wie es Fig. 37 zeigt. Der Granit ist in plattensförmige Parallelepipedien abgetheilt.

Weiterhin sieht man den Granit auf einer großen Strecke den Thonschiefer bedecken, und sich darüber hinziehen (Fig. 38).

„Auf dem Irtysh entlang fahrend, konnten wir,“ heißt es in dem Bericht über die Reise nach dem Ural, dem Altai und dem caspischen Meere *), „diese interessante Erscheinung mit völliger Ruhe, und während einer langen Zeit, betrachten; überall war die Gränze des Thonschiefers und des Granites, die durch die Farbe schon so verschieden waren, scharf und deutlich zu sehen, der Thonschiefer hatte unter dem Granite eine wellige Oberfläche, erhob sich bald wohl zu 50' über den Wasserspiegel, bald senkte er sich bis auf einige Fuß zum Wasser herab, und würde bey einem etwas höheren Stande des Wasserspiegels gar nicht mehr zu sehen seyn.“

Es fehlt auch in Deutschland nicht an merkwürdigen Beyspielen der Ueberlagerung von Secundärschichten durch Granit, welcher aus dem Innern hervorgestiegen ist, und sich im weichen Zustande über das Sedimentgebirge hingelegt hat. Mehrere höchst interessante Punkte dieser Art liegen in den Umgebungen des Städtchens Hohenstein in Sachsen. Bey Oberau (Fig. 39), unfern des Tunnels der Leipzig-Dresdner Eisenbahn,

*) Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem caspischen Meer, von Gustav Rose. Erster Band. Berlin 1837.

steht man in einer kleinen Schlucht den Granit, auf eine Erstreckung von wenigstens 20 Fuß, deutlich über den Pläner-Kalk hinweggelagert, dessen Schichten sich mit 20—30° Neigung gegen den Granit einfallen (s. Fig. 39). Südöstlich von Hohenstein steht man den Granit ebenfalls auf Kreideschichten liegen (s. F. 40)*).

In Gängen durchsetzt der Granit andere Gesteine außerordentlich oft, und man sieht ihn gangartig in allen Gebirgsbildungen bis herauf zum Kreidegebirge. Sein Vorkommen in großen, auf Spalten heraufgestiegenen, Massen, in den westlichen und südlichen Alpen, wober man die ältesten Lagen des Diluviums daran aufgerichtet sieht, beweist, daß er selbst noch in späterer Zeit aus dem Erdinnern heraufgestiegen ist. Gar oft sieht man Granitgänge in Gneis, wie dieß insbesondere im Schwarzwalde, in Schottland, in Schweden u. s. w. beobachtet werden kann. Gangartig ist namentlich das Vorkommen des Granits im scandinavischen Gneisgebirge, und es sind insbesondere die Granitgänge der Landschaft „Dalarne“ merkwürdig durch die Mineralien, welche Gahn und Berzelius darin in den Umgebungen von Fahlun entdeckt haben. Man erinnere sich, daß in den Graniten von Finbo und Brodabo die seltensten Mineralien, Gadolinit, Tantalit, Orthit, Ytroczerit, und viele andere aufgefunden worden sind.

In Sachsen sind besonders die Umgebungen des Städtchens „Penig“ durch Granitgänge ausgezeichnet, die theils den Gneis, theils den Weißstein durchsetzen, und viele interessante Mineralien, Lithon-Glimmer, Amblygonit, Schörl u. s. w. einschließen.

Besonders zahlreich kommen Granitgänge im Schiefergebirge von Cornwallis vor. Sie laufen von großen Granitmassen aus, die unter den Schiefen liegen, bringen in verschiedener Stärke und mannichfaltiger Verzweigung in dieselben hinein, und fällen sich zuletzt in feinen Aern aus. Der Thonschiefer wird von den Bergleuten daselbst „Killas“ genannt. In den Granitgängen findet man öfters Bruchstücke davon, und er ist an der Gränze

*) S. die Lagerungsverhältnisse von der Gränze zwischen Granit und Quadersandstein bey Hohenstein u. s. w., von B. Gotta. 1838.

in der Regel sehr hart, dunkel gefärbt und häufig dem Hornfels des Harzes ähnlich. Fig. 41 stellt das Vorkommen eines Granitganges im Kiffas des Cap Cornwall dar. Der Granitgang ist sechs Zoll mächtig, und hat sowohl die Kiffas-Schichten, als einen Quarzgang verworfen. Senkrecht auf seinen Begrenzungsflächen stehen gegen seine Mitte lange Schörl-Nadeln. Kleine Schörl-Nadeln liegen auch in der Mitte des Ganges, der aus feinkörnigem Granit besteht. Von großblättrigem Feldspath umgeben, liegen Schieferbrocken in dem Gange. In seinem Liegenden laufen Feldspathtrümmer von der Gangmasse ab, und zwischen die Kiffas-Schichten hinein.

Mehrfältig sieht man auch Gänge von Granit in Granit. Es durchsetzen nemlich nicht selten Gänge von feinkörnigem Granit eine grobkörnige Granitmasse; und umgekehrt. Meistens ist mit der Verschiedenheit des Kornes auch die Färbung verschieden, und die Gänge sind daher in der Regel leicht zu unterscheiden. Schöne Beispiele solcher Vorkommnisse bietet die Gegend von Heidelberg, von Carlsbad und Marienbad dar, das Granitgebiet des Schwarzwaldes und die Granitbildungen des Fassathals, in den Umgebungen von Predazzo. Am Schwarzwalde unterscheidet man selbst größere Stücke von Granit, die in einer durch Masse vorwaltenden Granitbildung von anderen mineralogischen Characteren eingeschlossen sind, und man sieht den stockförmigen jüngeren Granit in Fackeln in seine granitische Umgebung eingreifen (Schiltach im Kinzig-Thal).

Nicht selten führen die Granitgänge, zumal wenn sie grob- oder grobkörnig sind, schön auscrystallisierte Mineralien, wie schon oben bey den schwedischen und sächsischen Granitgängen angegeben worden ist. Es zeichnen sich dadurch namentlich auch Gänge von grobkörnigem Granit in der Nähe des Ilmensees aus, in N.O. von Miasa, woselbst in Menge schöne, braune Blexone, Glimmerfäulen von einem Fuß Durchmesser, ferner Spinell, Granat, Apatit, brauner Demantspath, grüner Feldspath, unter dem Namen „Amazonenstein“ bekannt, u.m.a. vorkommen. Auch scheinen die Edelsteinbrüche von Mursinsk in Granitgängen zu liegen, welche Berg-Erystalle bis zu 6 Zoll Durchmesser, Feldspath-Erystalle von Fußgröße, ferner Albit,

Glimmer, Schmel, Granat, Topas, Beryll u. s. a. einschließen. Sehr oft sehen im Granite Quarzgänge auf, die bisweilen schön crystallisirte Bergcrystalle, Amethyste, in Höhlungen enthalten. Die sogenannten Crystall-Keller sind nichts anderes, als größere Drusen auf solchen Gängen, und bekanntlich findet man in ihnen oft reiche Ausbente an Berg-Crystallen. Auch die Amethystbrüche unfern Mursinsk werden auf solchen Quarzgängen betrieben. Man ersieht aus den angeführten Thatfachen, daß Granit zu verschiedenen Zeiten, und in verschiedenen Gebirgsbildungen, ja selbst innerhalb eines schon vorhandenen Granitgebirges, heraufgestiegen ist.

Nicht selten sieht man auch fremde Gesteine, theils in Gängen, theils stockförmig im Granit liegen, oder denselben davon durchbrochen. Hieher gehören namentlich die in Granitbildungen öfters vorkommenden Porphyre, Grünschiefer, Serpentine, Basalte, Pechsteine.

Von ganz besonderem Interesse endlich sind die im Granit vorkommenden Erzgänge. Im Schwarzwalde liegen darinn die reichen Kobalt- und Silbergänge bey Wittichen und Schiltach, viele Bleiglanzgänge, Eisen- und Braunschiefergänge im südlichen Schwarzwald. In Cornwall liegen die Zinnerzlagerstätten darinn, ebenso in Sachsen und Böhmen. Wechsfältig treten auch an den Gränzen des Granites Erzlagerstätten auf, wie zu Badenweiler, im südlichen Schwarzwald, im Thal von Vicdessos, in den Pyrenäen, im Thale von Champoléon und Beauvoisin, im Département des Hautes Alpes. An allen diesen Orten scheint die Absehung von Erzen gleichzeitig mit der Erhebung des Granites und seinem Aufsteigen aus dem Innern erfolgt zu seyn.

Die Structur des Granits ist gewöhnlich parallelepipedisch. Die Blöcke sind oft zu imposanten Felsen vereinigt, die man in malerischen, mauerförmigen und pyramidalen Gestalten in jedem Granitgebirge sieht. Isolirte Granitfelsen zeigen sich manchmal magnetisch, und geben bisweilen eine starke, magnetische Polarität zu erkennen. In dieser Beziehung sind die Schnarher Klippen bey Schierke am Harz von besonderem Interesse. Sie stehen isolirt in dem Walde an der rechten Thalseite, wenig

über Schieferle, und sind des Besuches, sowohl wegen ihres aus regelmäßigen Granitstücken zusammengesetzten Baues, als wegen der ausgezeichneten, magnetischen Beschaffenheit, vor vielen andern werth.

Die Formen des Granits zeigen sich sehr verschieden, je nachdem er in kleinern Dimensionen und in niedrigeren Massen, oder aber in großer Entwicklung auftritt und hohe Gebirge zusammensetzt. Im ersteren Falle zeichnet er sich durch sanft verschächte, gerundete und kuppelförmige Berge aus. Die Abhänge sind gewöhnlich bauchig, und fallen gleichförmig gerundet ab. Einzelne kleinere Hügel sehen aus wie Wollfäcke. Die Thäler des niedrigen Granitgebirges sind flach. Im höhern Gebirge aber, wo der Granit in großen zusammenhängenden Massen erscheint, da steigt er häufig in hochgewölbten Domen auf, und zwischen jähren Abhängen ziehen sich tiefe Thäler hin, deren schmaler Grund oft gänzlich von dem rauschenden Bergwasser eingenommen ist. Häufig bildet er auch zerspaltene, nackte Felsstöcke und wilde Schluchten, die zwischen hohen Felsabstürzen hinziehen. Die Thäler tragen nicht selten das Gepräge einer aufgebrochenen Spalte. Das zeigen unverkennbar die alpinische Kluft der Rosttrappe am Harze und die wildromantischen Thäler des Schwarzwaldes.

Erreicht der Granit die Höhe des Alpengebirges, dann bildet er jene zerrissenen zackigen Felsgestalten, deren wunderbare Bildung den Blick des Reisenden so unwiderstehlich fesselt, jene spitzen Hörner, Thürme und Pyramiden, die uns in den Umgebungen des Montblanc als himmelanragende Colosse entgegen treten.

Eine ganz merkwürdige Erscheinung, die uns in vielen Granitgebieten überrascht, sind Anhäufungen loser Blöcke am Abhange und an den Seiten, und bisweilen selbst auf den Gipfeln der Granitberge. Sie versperren manchmal die Thäler so, daß das Wasser sich brausend von Block zu Block stürzt. Gewöhnlich liegen die Blöcke wild und chaotisch durch einander geworfen, oder über einander hingestürzt, und gleichen stellenweise, wo sie aufgethürmt liegen, Burgen und Ruinen.

Das Volk nennt solche Blockansammlungen „Felsenmeere,“

Teufelsmühlen. Man sieht ausgezeichnete Beispiele davon am Ramberge, am Harzgebirge, an mehreren Punkten im Fichtelgebirge, im Schwarzwalde u.s.w. Diese Felsenmeere sind nicht eine Folge der Verwitterung; die Blöcke sind so frisch, eckig, ohne alle Beimengung von Grus und kleinerem Geschiebe, daß man ihre Entstehung nicht der Verwitterung zuschreiben kann. Auch ist nicht begreiflich, wie da, wo sie nur auf den Gipfeln der Berge angetroffen werden, nur an solchen Stellen gerade die Verwitterung gewirkt haben soll, oder wie sie über einander aufgehäuft werden konnten, wo kein Herabfallen von höhern Punkten möglich war.

Die Ursache der Entstehung dieser Felsenmeere ist, nach Leopold v. Buch, in der gewaltsamen Erhebung des Granits zu finden, wobey sie sich durch die heftige Erschütterung und durch Reibung und Stoß gegen die Ränder, von der festen Masse losgetrennt haben. Die Blöcke liegen auch vorzüglich an den Rändern der Granitmasse, in der Nähe tiefer, spaltenförmiger Thäler, die den Granit an seinem tiefen Abfall durchschneiden. Dieses Verhältniß zeigt sich am Ramberge, dem gegenüber die Rosttrappe-Kluft. Auch die Granitblöcke am Rehberge, an der Achtermannshöhe, so wie diejenigen zwischen Braunlage und Schierke, liegen am Rande des Granitgebirges, und unter ähnlichen Umständen sieht man Teufelsmühlen im Fichtelgebirge und im Schwarzwalde.

Der Granit erscheint in Europa in allen Höhen, vom Meerespiegel an, bis zu den größten Höhen, zu welchen die Gebirge in diesem Welttheile ansteigen. Am Montblanc erreicht er die größte Höhe (15,000 Fuß), bis zu welcher das europäische Gebirge ansteigt. Seine Verbreitung ist ganz allgemein, wie wir schon im Eingange bemerkt haben. Er bildet, jedoch nicht in ganz zusammenhängenden Massen, die Centrakette der Alpen, ist am Schwarzwalde, in den Vogesen, im Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Harz, Erzgebirge, Riesengebirge entwickelt und bereits in allen andern, europäischen und außereuropäischen, Gebirgen, wie am Ural, Altai, in Nord-America, Brasilien, in Central-America, in Aegypten, Süd-Africa, am Himalaya u.s.w.

Syenit.

Der Syenit zeigt im Wesentlichen dieselben Verhältnisse, wie der Granit. Nimmt dieser Hornblende auf, so wird er syenitartig, und nimmt dabey der Quarz ab, so geht er so allmählich in wahren Syenit über, daß man keine scharfe Gränze angeben kann. Der Syenit erscheint in Stöcken, Keilen und Gängen in geschichteten und ungeschichteten Gebirgsbildungen, und an seinen Gränzen nimmt man dieselben Contact-Bildungen wahr, welche bey dem Granit beschrieben worden sind. Eine der ausgezeichnetsten Localitäten für die Beobachtung dieser Verhältnisse ist der Monzoniberg in Süd-Thyrol, allwo an der Stelle, welche „Le Selle“ heißt, der Syenit mit Kalkstein in Berührung steht. Der Kalk ist körnig, und in der Zone, in welcher Syenit in den Kalk eingebrungen und damit verschmolzen ist, liegen ausgezeichnete Crystalle von Granat, Vesuvian, Spinell und Augit. Ein Lagerungsverhältniß zwischen Syenit und Sedimentschichten, denjenigen zwischen Granit und dem Felsgebirge bey Hohenstein analog, ist durch Fig. 42 repräsentiert. Sie stellt den großen Steinbruch bey Wetzböhl, unfern Dresden, dar. Hier liegt der Syenit weithin auf dem Plänerkalk, den man seit mehr als 20 Jahren darunter hervorarbeitet, wobey der untergrabene Syenit immer nachstärzt. Der bereits eingebrochene Theil desselben mag schon über 50 Fuß betragen *).

Sehr oft steht man den Syenit in Berührung mit kalkigen Gesteinen im südlichen Norwegen, wo er in der Gegend von Frederiksdal und Laurvig, sodann in den Umgebungen von Christiania und Brevig, eine Reihe interessanter Contactverhältnisse darbietet.

In vielen Fällen beobachtet man den Syenit in Gesellschaft von Granit, Gneis, Felssteinsporphyr und verschiedenen amphibolischen Gesteinen, und sein Auftreten in den Schieferungen des Uebergangsgebirges ist vielfältig wahrzunehmen. Grünschiefer, Porphyre, Basalt durchsetzen ihn bisweilen in Gängen.

Erzgänge kommen selten in ihm vor. Es gehören hieher

*) Vergleiche die oben angeführte Schrift von B. Cotta.

die silberführenden Gänge von Comanja und Quebradoma in Mexico, die goldführenden Brauneisensteingänge zu Santa rosa de los Osos u. dgl.

Seine Verbreitung ist weit geringer, als die des Granits. Im südlichen Norwegen, in Schweden, am Ural, auf Grönland schließt er Zirkon-Erythrae ein (Zirkon-Syenit). In Deutschland kann man ihn in den Elbegegenden Sachsens, in den Umgebungen von Weinheim und Auerbach an der Bergstraße, im oberen Innthal beobachten. Stärker entwickelt tritt er in Schottland und in Nord- und Süd-America auf.

Feldstein-Porphyr.

Der Porphyr, mit einer Grundmasse von dichtem Feldstein, tritt häufig in Gängen und Stöcken im crystallinischen Schiefergebirge, namentlich im Gneis, auf, und zeigt sich oft in naher Verbindung mit porphyrtartigem Granit, in welchen er auch zu verlaufen scheint. Er ist ausgezeichnet durch in ihm liegende Zinnerzlagerstätten. Es liegen namentlich darinn die Zinnerze von Altenberg, Zinnwald und der Sierra de Guanajuato. Im Schwarzwalde kommt dieser Porphyr vielfältig in der Nähe von Erzgängen vor, die im Gneis liegen, und die Gänge durchsetzen selbst den Porphyr, so daß er in einer näheren Beziehung zu mehreren schwarzwäldischen Erzlagerstätten zu stehen scheint. Ausgezeichnete Abänderungen dieses Porphyr sind der Elfbader, der Altaische und der antike, rothe Feldsteinporphyr, welche wir zu prachtvollen Basen verarbeitet sehen. In Cornwallis, wo er „Elvan“ genannt wird, durchsetzt er vielfältig das erzführende Thonschiefergebirge.

Da die Grundmasse dieses Porphyr sehr fest ist, und der Verwitterung lange widersteht, so ragt er häufig in Felsen, die nackt, schroff, grotesk sind, hervor. Eine der interessantesten Stellen dieser Art ist der Iffenberg, im Regierungsbezirk Arnsberg in Westphalen. Dort ragen, am nördlichen Abhange des genannten, bewaldeten Bergrückens, 5 isolirte Porphyrmassen, bekannt unter dem Namen der „Bruchhauser Steine,“ hoch aus dem Thonschiefergebirge hervor. Ihr Anblick ist überraschend, wenn man sie vom nahen Giersbach-Thal aus gewahrt wird.

Unzählbare Blöcke, die sich von den mauerartigen Porphyrfelsen abgelöst haben, bedecken den untern flächern Abhang des Iffenberges. Einer dieser Porphyrfelsen, der Feldstein, beherrscht den Gipfel des Berges. Der Thonschiefer ist in der Nähe des Porphyr verändert, und namentlich sind in den Porphyr hineinragende Thonschieferkeile sehr fest, hart, und der Grundmasse des Porphyr ähnlich.

Quarzführendes Thon-Porphyr.

Die Grundmasse dieses Porphyr ist jederzeit thonig, und in derselben liegen immer kleine, wohlausgebildete Quarzcrystalle. Niemals sehen wir diesen Porphyr in die crystallinisch-körnige Granitmasse verlaufen, dagegen häufig in eine unreine, erdige Thonsteinmasse, in einen rothen, schweren Eisenthon. Sehr oft wird er bläsig, mitunter selbst schlackenartig, und gar nicht selten verläuft er in einen achatsführenden Mandelstein. Die Farbe seiner Grundmasse ist vorherrschend roth. Doch kommen häufig unreine, graue, weiße, violette Färbungen vor.

Was nun diesen Porphyr ganz besonders auszeichnet, das ist seine innige Verbindung mit Sandstein- und Conglomeratmassen, die man so ganz gewöhnlich um ihn gelagert sieht, und die so häufig Bruchstücke seiner Masse einschließen, daß man dadurch auf die nahe Beziehung des Porphyr zu jenen Trümmergesteinen aufmerksam gemacht wird. Liegen die Trümmergesteine im Innern der Porphyrmassen, in den Thälern zwischen denselben, so zeigen sie gewöhnlich alle Eigenschaften der Reibungs-Conglomerate. An der Außenseite der Porphyre sind die Conglomerate gewöhnlich deutlich geschichtet, und offenbar unter Einfluß des Wassers gebildet worden. Wo geschichtete Bildungen mit diesem Porphyr in Berührung stehen, da zeigen sie ganz dieselben Veränderungen, die sie im Allgemeinen an Stellen wahrnehmen lassen, wo von unten heraufsteigende, plutonische Gesteine auf sie eingewirkt haben. Sehr oft sieht man diesen Porphyr in den Bildungen des Rothliegenden, und an sehr vielen Orten auch in naher Beziehung zum Steinkohlengebirge, wie in der Gegend von Halle, bey Waldburg in Schlessien, im Saarbrückenschen u.s.w., so daß man längere Zeit der Meynung

war, er gehöre wesentlich zum Steinkohlengebirge. Sein späteres Eindringen in seine Schichten, das sich so vielfach durch Veränderungen ihrer Stellung zu erkennen gibt, läßt jedoch keinen Zweifel übrig, daß zwischen diesem Porphyr und dem Steinkohlengebirge keine andere Beziehung vorhanden sey, als die allgemeine der plutonischen Massen gegen die neptunischen. Bisweilen verschwindet der Quarz, und statt dessen erscheint Hornblende oder Augit in der Grundmasse. Dadurch nähert sich dieser Porphyr dem Melaphyr. Das ist namentlich mehrfältig bey dem niederschlesischen Porphyrgebirge der Fall. Die Structur dieses Porphyr's ist bald plattensförmig, bald säulenartig. Als untergeordnete Massen liegen in demselben öfters Stücke von Thon, wie z. B. in der Gegend von Halle und bey Oberkirch im Schwarzwalde. Erzvorkommnisse sieht man darinn selten. Einige sind in Schlesien, in der Nähe von Gottesberg, bekannt. An der Bergstraße sieht man bey Schriesheim Trümmer von Eisenglanz und Rotheisenstein darinn.

Die Formen dieses quarzführenden Thonporphyr's sind im Ganzen weniger rauh und mehr gerundet, als die des Feldsteinporphyr's. Er tritt weit öfter, als dieser, in größeren Massen und in mehr gruppirten Bergen auf. Diese sind häufig Kegel, Dome, und in der Regel steil. Aus der Ferne schon vermuthet man, wo man die schnell aufsteigenden, kegelförmigen oder gewölbten Berge in isolirter Stellung sieht, diesen Porphyr anzutreffen. Die Thäler dazwischen sind enge, tief, und oft nichts anderes als aufgebrochene Spalten.

Die Verbreitung dieses Porphyr's ist beträchtlich, er tritt namentlich an der Südseite der Alpen auf, vom Fassathal an ostwärts bis Reichenhall, und weiter fort durch Kärnthén und Krain, und durchaus in naher Beziehung zu dem dortigen großen rothen Sandsteingebilde. Man sieht ihn ferner, und zwar vorzüglich aus den Bildungen des Rothliegenden oder des Steinkohlengebirges hervorstechend, am Thüringerwalde, am südlichen Harzrand, in Niederschlesien, im Saarbrückenschen, im Schwarzwalde, wo er durch Granit, Gneis, Thonschiefer, Steinkohlengebirge und Rothliegenden

durchgebrochen ist. Ferner sieht man ihn in Schottland, Island, in America.

Grünstein.

Dieses, aus Albit und Hornblende bestehende Gestein hat das Unglück mehrfältiger Tausen gehabt, und dabey die Namen Diorit, Diabase, Aphanit erhalten. Seit langer Zeit nennt es der Schwede „Trapp,“ was so viel heißt als Treppe, und sich auf das treppenförmige, abgestufte Ansehen seiner Felsen bezieht. Wir wissen aus den lehrreichen Untersuchungen von G. Rose, daß viele Grünsteine, namentlich diejenigen des Urals, den Doleriten und Melaphyren nahe stehen.

Dieses Gestein durchseht in mannfaltigen Abänderungen, in Trümmern, Gängen, Keilen, Stöcken, das crystallinische Grundgebirge und das Uebergangsschiefergebilde in allen Ländern. Nicht selten sieht man es in plattenförmigen Lagen zwischen den Schichten, und kuppenförmig über denselben. Dieß hat zu der lange vertheilten Ansicht geführt, daß der Grünstein dem Schiefergebirge als besonderes Glied angehöre, oder nach dessen Bildung auf dasselbe abgesetzt worden sey; allein genauere Untersuchungen stellten in neuerer Zeit seine Analogie mit den plutonischen Massen in das klarste Licht.

Das Fichtelgebirge bietet in dieser Beziehung besonders interessante Verhältnisse dar. Die Conglomerate, aus vorherrschenden Trümmern von Grünstein, Feldstein und Granit zusammengesetzt, welche dort die Grünsteinkuppen mantelförmig umziehen, erscheinen als wahre, ohne alle Mitwirkung des Wassers gebildete Reibungs-Conglomerate, und zeigen gar deutlich, wie der Grünstein, gleich den übrigen plutonischen Gesteinen, aus dem Erdinnern emporgestiegen, und durch die vorhandenen Bildungen herausgebrochen ist. Dabey konnte sich die weiche Masse gar leicht etwas über die Oberfläche verbreiten. Wenn nun das durchbrochene Gebirge leicht verwitterte, so mußte mit der Zeit die Grünsteinmasse, welche aus der Spalte herausgetreten war, den Anschein einer aufgesetzten Kuppe erhalten.

Etwas ganz eigenthümliches ist der Eisengehalt des Grünsteines, der in manchen Gebirgen sich darinn so groß zeigt,

daß das Gestein wie ein Eisen Erz benutzt werden kann. Das großartigste Beispiel gibt in dieser Beziehung der Taberg in Småland. Er steigt 400 Fuß über den umliegenden See hervor, enthält 21—32 Procent Eisen, und besteht aus südlichen Rhön Abstrich, nach Hausmann, aus einer beynahe soliden Magneteisensteinmasse. Dieser Eisenerz versorgt alle Hütten des nach ihm benannten Bergbezirks, und wird noch Jahrhunderte lang reiches Material geben.

Nach Zinken sind viele Gränsteine des Harzes, ihrer ganzen Masse nach, von Eisenerz durchdrungen, und einige enthalten einen constanten Eisengehalt von 12—15 Procent. Wie so ganz das Eisen an den Gränstein gebunden ist, das zeigen vornehmlich die vielen Eisengänge im Zorger Grubenrevier, welche zum größten Theil darin liegen, und nur in ihm erzführend, im umliegenden Thonschiefer dagegen taub sind. Auch auf der Grube Neuerglockenklang, im Fichtelgebirge, kann man sich überzeugen, wie der Eisenstein an den Gränstein gebunden ist. Die Gebirgsart besteht hier aus concentrisch-schaligen Kugeln, und viele derselben sind aus abwechselnden Schalen von thonigem Brauneisenstein und Gränstein zusammengesetzt.

Auch andere Erze, namentlich Kupfererze, kommen im Gränstein, oder in seiner unmittelbaren Nähe, vor. Das große Gränsteingebirge im Norden von America hat, wegen seines Kupferreichthums, den Namen Kupfergebirge (Copper mountains) erhalten, und am Ural kommen zu Bogoslawsk, an der Gränze zwischen Uebergangskalkstein und Gränstein, Granatfels und Thonmassen vor, in welchen letztern reiche Kupfererze liegen.

Auch wahre Erzgänge liegen mehrfältig in Gränstein. So die mehrsten Silbergänge in Siebenbürgen und Ungarn, welche auch Gold- und die interessanten Tellurerze führen. In Nord-America liegen, in Nord-Carolina, Golderge darin.

In selbstständigen, größeren Gebirgsmassen tritt der Gränstein seltener auf. Er ist in der Regel mit Syenit, Feldsteinporphyr, Hornblendeschiefer und Melaphyren vergesellschaftet. Sehr häufig aber durchsetzt er in Gängen alle Gebirgsbildungen bis herauf zu den tertiären. Seine Formen sind gewöhnlich kuppig und gerundet. Größere Gränsteinberge

erheben sich schnell, und zeigen häufig jähe, öfters beynahe senkrechte Felsabstürze. Die Abhänge sind meistens abgestuft, treppenförmig. Seine Verbreitung kann man allgemein nennen, da er beynahe in keinem Gebirge gänzlich fehlt. In großer Ausdehnung erscheint er am Ural und in Nord-America. In kleineren Massen in allen deutschen Gebirgen, sodann in Scandinavien, in England, und hier namentlich vielfältig im Steinkohlengebirge.

Serpentin und Sabbro.

Diese beiden Gesteine kommen sehr oft mit einander vor, und werden auch manchmal von Hypersthensfels begleitet oder repräsentiert. Alle diese Gesteine stehen auch in naher Beziehung zum Syenit und zu den übrigen amphibolischen Gesteinen. Sie erscheinen gewöhnlich mit ihnen in Gängen und Stöcken im Granit, im Gneis und in den verschiedenen Bildungen des Sedimentgebirges.

Der Serpentin ist das Hauptgestein; man findet ihn in allen Bildungen, und vielfältig in großen Massen, namentlich in den Alpen und hier durch das Kreibitzgebirge herausgebrochen. Zuweilen findet man an seinen Rändern Reibungs-Conglomerate. Mehrfältig liegen Erze darin, Schwefelkies, Chromeisen, Magnet Eisen, und nach den im Ural gemachten Beobachtungen bilden Serpentinstücke in Gold- und Platin Eisen mehrfältig die Basis des Sandes, so, daß diese Metalle ihre ursprüngliche Lagerstätte wenigstens theilweise in Serpentinmassen zu haben scheinen.

Auf Klüften trifft man im Serpentin häufig Asbest, Magnesit, Opal, Chalcedon, Chrysopras.

Was die Verbreitung betrifft, so findet der Serpentin den meisten plutonischen Gesteinen nach. In großen Massen erscheint er in den Alpen, namentlich in den südlichen und in den östlichen, zumal in Graubünden, am Septimer- und Julierpaß und im Davos. In ansehnlicher Entwicklung erscheinen Serpentin und Sabbro auch in Süd-Ligurien, auf Corsica, im Frankensteiner- und Jostener-Gebirge, am Cap Lizard in Cornwall, in Nordamerica, Norwegen, auf den Shetlandsinseln u. s. w. Den Hypersthensfels hat man

welche einander parallel streichen, haben öfters eine gleiche Ausfüllungsmasse, und verhalten sich, wenn sie mit Gängen einer andern Richtung zusammentreffen, gegen diese im Allgemeinen gleich. Daraus läßt sich abnehmen, daß sie unter denselben Umständen gleichzeitig entstanden seyn müssen. Solche in Streifen und Ausfüllung übereinstimmende Gänge begreift man unter dem Namen einer Gangformation.

Von der Hauptmasse eines Ganges gehen häufig kleinere Gänge, sogenannte Erämmer, ab, die sich entweder nach einiger Erstreckung arsteilen, oder in Bogen wiederum zurücklaufen. Das Nebengestein ist in der Nähe der Gänge meistens verändert. Festigkeit und Härte sind verändert, und die Beschaffenheit wird gewöhnlich erdig oder thonig. Nicht selten ist es noch mit Erzkernen mehr oder weniger imprägniert.

Vielfältig sieht man, zumal in den oberen Theilen der Gänge, sowohl die Erze, als auch die Gangarten, in einem Zustande, der von ihrem ursprünglichen oft sehr verschieden ist. Die Erze sind gewöhnlich oxydirt und gesäuert. Die verschiedenen mineralischen Metallsalze, die kohlensauren, schwefelsauren, phosphorsauren, arseniksauren Blei- und Kupfererze, werden vorzüglich in den oberen Theilen der Gänge gefunden, wohin die Einwirkung der Atmosphäre bringen konnte. Gänge, welche in der Tiefe Spatheisenstein führen, zeigen in den obersten Theilen gewöhnlich Brauneisenstein, und häufig in stalactitischen Gestalten.

Befinden sich Erze zwischen den Schichten des Flözgebirges oder den Schieferen des crystallinischen Grundgebirges, so daß ihre Lage und Ausdehnung nach derjenigen der Schichten oder Schiefer bestimmt wird, so heißt man ein solches Erzvorkommen ein Lager. Diese unterscheiden sich also von den Gängen dadurch, daß sie die Schichten nicht durchschneiden. In den meisten Fällen, und namentlich da, wo sie mit plutonischen Gesteinen in Verbindung stehen, ist es sehr wahrscheinlich, daß sie, nach der Bildung der Massen, worinn sie jetzt liegen, eingebrungen sind. Ein Lager, im wahren Sinn des Wortes, muß alle Kennzeichen an sich tragen, daß es gleichzeitig mit dem einschließenden Gestein gebildet worden ist.

Durchsetzen viele kleine Gänge eine stockförmige Gesteinsmasse,

z. B. von Granit, Porphyr, so nennt man dieses Erzvorkommen Stöckwerk. Nester und Nagen nennt man Erzvorkommnisse, welche unabhängig von der Structur des einschließenden Gebirges, und mehrentheils mit sphäroidischer Gestalt darinn liegen.

Emporhebung der Gebirgsketten.

Am Rande beynahe aller Gebirgsketten sieht man Sedimentschichten sich in horizontaler Lage bis zum Fuße der Berge erstrecken. In der Nähe des Gebirges aber zeigen sie sich mehr oder weniger aufgerichtet, an die Abhänge angelehnt, und nicht selten steigen sie stark aufgerichtet bis zur Höhe des Gebirges hinauf. Gewöhnlich zeigt aber nur ein Theil der Flößgebirgsschichten diese Aufrichtung, ein anderer nicht, und man kann daher bey jedem Gebirge Flößschichten unterscheiden, die aufgerichtet sind, und solche, die in ihrer ursprünglichen horizontalen Lage sich am Fuße desselben befinden. Die aufgerichteten Schichten zeigen nun ganz unzweydeutig die Emporhebung der crystallinischen, schieferigen oder massigen Gesteine an, gegen welche die Flößschichten angelehnt sind. Das geognostische Alter derjenigen Schichten, die horizontal am Fuße eines Gebirges liegen, dienen zur Bestimmung des Alters der erhabenen Bildungen, denn es ist klar, daß die Zeit des Heraufsteigens einer Kette nothwendig zwischen die Ablagerungszeit der daran aufgerichteten, und der bis zu ihrem Fuße horizontal fortliegenden Schichten fallen muß. Die Schichten, welche wir aufgerichtet sehen, waren schon vorhanden, als die crystallinischen und massigen Bildungen heraufgestiegen sind; die horizontalen Schichten dagegen haben sich erst später abgelagert. Da die aufgerichteten und die horizontal liegenden Schichten scharf von einander geschieden sind, so müssen wir annehmen, daß die Emporhebung nicht allmählich während eines langen Zeitraums erfolgt ist, sondern daß sie zwischen den Ablagerungszeiten zweyer auf einander folgenden Formationen schnell eingetreten ist, und von kurzer Dauer war. Es wird immer wahrscheinlicher, daß die Gebirgsketten durch ungeheure Spalten heraufgestiegen sind, welche sich in der Erdrinde, in Folge ihrer Abkühlung, gebildet haben. Die Richtung der gehobenen Schichten ist auch die Richtung der Spalten. Man weiß,

mit welcher Beständigkeit und Unveränderlichkeit das Streichen der Schichten auf außerordentlich große Strecken gleichförmig anhält, und wie auch kleinere Spalten, die Gangspalten, so häufig in einem Districte mit einander parallel laufen, und wie die parallelen Gänge in ihren übrigen Verhältnissen viele Uebereinstimmung zeigen. Leopold v. Buch hat diese Verhältnisse ihrer Allgemeinheit aufgefaßt und auf die Richtung der Gebirgsketten ausgedehnt. Er zeigte vor langer Zeit schon, daß die Gebirge von Deutschland in vier scharf geschiedene Systeme zerfallen, welche sich durch die darinn vorwaltenden Richtungen unterscheiden. Elie de Beaumont hat diese Verhältnisse in noch weiterer Ausdehnung erforscht und gezeigt, daß die Aufrichtungen von gleichem Alter, im Allgemeinen auch in derselben Richtung erfolgt sind. Mit Zugrundlegung der Sätze: daß die geneigten Sedimentschichten durch Emporhebung crystallinischer Gesteine auferichtete Schichten sind, und daß in jedem Gebirgsdistricte alle gleichzeitig auferichteten Schichten auch allgemein eine gleiche Richtung haben, hat Beaumont in Europa bereits 12 Gebirgssysteme unterschieden, und wahrscheinlich kann man noch deren mehrere unterscheiden. Dabey zeigt sich sehr schön, in wie sehr verschiedenen Zeiten die Gebirgsketten erhoben worden sind, und wie gerade mehrere der bekannten, höchsten und größten, die Kette der Alpen und der Anden, zu den jüngsten gehören.

E n d e.

R e g i s t e r

der

M i n e r a l o g i e.

(Band I.)

A.

Adrazit, S. 173.
 Absatz aus Seen, 612.
 Abfälle, 552.
 Achat, isländischer, 145.
 Achatjaspsid, 145.
 Ackererde, 526. 568.
 Adlerstein, 332.
 Adular, 189.
 Agalmatolith, 197.
 Almit, 262.
 Altinot, 265.
 Alabaster, 246.
 Alann, 283.
 Alaunfels, 286.
 Alaun, römischer, 286.
 Alaunsalz, octaedrisches, 283.
 Alaunschiefer, 512.
 Alaunstein, 285.
 Albin, 276.
 Albit, 191.
 Albitgranit, 485.
 Alunit, 200.
 Alodroit, 160.
 Alopban, 206.

Alluvial-Debitus, S. 601.
 Alluvium, 580.
 Alluvium, altes, 631.
 Alluvium, neues, 580.
 Almandin, 159.
 Alpengebirge, 547.
 Alpenland, 547.
 Aluminat, 285.
 Alumiera ist Alaunfels, 286.
 Amalgam, 463.
 Amazonenstein, 190.
 Amblygonit, 187.
 Amethyst, 139.
 Amianth, 269.
 Ammoniak-Alaun, 284.
 Ammonium-Eisenchlorid, 306.
 Amphibol, 262.
 Amphigen, 180.
 Analcim, 171.
 Anatas, 344.
 Andalust, 196.
 Andesit, 493.
 Anglarit, 360.
 Anhydrit, späthiger, 248.
 Anhydrit, strahliger, 249.
 Annagang der Feisen, 599.

Anorthit, S. 194.
 Anthophyllit, 266.
 Anthophyllit, blättriger, 266.
 Anthophyllit, strahliger, 266.
 Anthracit, 306.
 Anthrafolith, 233.
 Antiklinallinie, 569.
 Antimonblende, 440.
 Antimonblüthe, 345.
 Antimonglanz, 435.
 Antimonglanz, axotomer, 437.
 Antimonglanz, prismatoëdriſch., 435.
 Antimonglanz, prismatiſcher, 434.
 Antimonſalze, 345.
 Antimonnickel, 409.
 Antimon-Ocker, 349.
 Antimon, rhomboëdriſches, 461.
 Antimonſilberblende, 445.
 Anvir, 292.
 Apatit, 254.
 Aphanit iſt Grünſtein, 428.
 Aphthaleſe, 298.
 Apophyllit, 270.
 Apyrit, 165.
 Aquamarin, 155.
 Argile de Dives, 698.
 Argile plastique, 665.
 Argile Veldienne, 686.
 Arragon, 237.
 Arſenitblende, gelbe, 440.
 Arſenitblende, rothe, 450.
 Arſenitblüthe, 346.
 Arſenit, gediegenes, 462.
 Arſenitſtes, 406.
 Arſenitſtes, axotomer, 408.
 Arſenitſtes, prismatiſcher, 406.
 Arſenitnickel, 409.
 Arſenit, rhomboëdriſcher, 462.
 Arſenitſilberblende, 445.
 Arteſiſche Brunnen, 683.
 Aſbeſt, 268.
 Aſche (im Sechſtein), 723.
 Aſche, vulka niſche, 788.
 Aſchenausbruch, 783.
 Aſchenſieber, 166.
 Aſphalt, 315.
 Atacamit, 390.
 Aufgeſchwemmtes Gebirge, 579.
 Aufreißen der Gebirgsmaſſen, 564.
 Augit, 256.
 Augitconglomerat, 522.
 Augitfels, 280. 501.
 Augitporphyr, 505.
 Auripigment, 449.
 Ausbruch eines Vulcans, 789.

Ausbede der Loſfmoore, S. 591.
 Ausgehendes, 562.
 Auswaſchung der Gebirgsmaſſe, 564.
 Auswürflinge der Vulcane, 790.
 Außenthäler, 552.
 Automolit, 270.
 Avanturin, 140.
 Axinit, 166.

B.

Bach, 555.
 Backſtohle, 308.
 Baitalit, 259.
 Bänke, 592.
 Ballasrubin, 216.
 Ballons, 549.
 Bandjaſpis, 144.
 Barren, 605.
 Baryt, 272.
 Baryt-Garnet, 173.
 Baryt-Calcit, 277.
 Barytkreuzſtein, 173.
 Baſalt, 502.
 Baſaltconglomerat, 523.
 Baſaltdurchbrüche, 805.
 Baſaltgebilde, 805.
 Baſaltmandelſtein, 504.
 Baſalttuff, 523.
 Baſanit, 506.
 Bay, 547.
 Beilſtein, 227.
 Beinbruch, 234.
 Berg, 543.
 Bergcompaß, 502.
 Bergcrpſtall, 137.
 Bergfälle, 586.
 Bergflachs, 269.
 Berggruppe, 546.
 Bergholz, 270.
 Bergkette, 546.
 Bergkorf, 269.
 Bergkalt, 745.
 Bergleder, 269.
 Bergmilch, 234.
 Berggräben, 544.
 Bergſchlüſſe, 587.
 Bergſeife, 213.
 Bergſtürze, 586.
 Bergtal, 317.
 Bergthäler, 552.
 Bergtheer, 318.
 Bernſtein, 312.
 Berthierit, 439.
 Berzli, 154.

Bendantit, *G.* 184.
 Bildstein, 197.
 Bildung, keramische, 596.
 Bildung der Gefäße, 596.
 Bildung, gegenwärtige, von Conglomeraten und Sandsteinen, 606.
 Bimsstein, 204, 494.
 Bimsstein-Conglomerat, 522.
 Binärkies, 402.
 Bitterfalk, 241.
 Bitterfalk, prismatisches, 299.
 Bitterspath, 242.
 Bitterwasser, 300.
 Blättererz, 433.
 Blätterkoble, 308.
 Blätterstein, 499, 512.
 Blättertellur, 433.
 Blätterzeolith, 170.
 Blattkoble, 310.
 Blaubleierz, 426.
 Blau-eisenstein, 357.
 Blauspath, 165.
 Blepantimonerz, 436.
 Blep, arseniksaures, 377.
 Blepchloroxyd, 382.
 Blepchromat, 380.
 Bleperde, 384.
 Bleperz von Mendip, 383.
 Blep, gediegenes, 460.
 Blepglanz, 426.
 Blepglanz, hercynischer, 426.
 Blepgummi, 382.
 Blephornerz, 382.
 Blep, kohlen-saures, 372.
 Blep-molybdat, 378.
 Blep-oryd, natürliches rothes, 350.
 Blep, phosphor-saures, 377.
 Blep, rhomboidisches, 374.
 Blepscheelat, 381.
 Blep, schwefel-saures, 375.
 Blepschweif, 427.
 Blep-Tricarbonat, 374.
 Blepsitriol 373.
 Blepsitriol, kupferhaltiger, 375.
 Blendes, 440.
 Blöcke, erratiche, 637.
 Blutstein, 329.
 Boden, 536.
 Bodeneis, 619.
 Bohnerz, 332.
 Bohnerzgebilde, jurassisches, 697.
 Borsäure, 212.
 Bol, 214.
 Bolus, 214.

Bologneserspath, *G.* 374.
 Bomben, vulcanische, 790.
 Boracit, 225.
 Borax, 293.
 Boraxsäure, 292.
 Botryogen, 303.
 Botryolith, 281.
 Bourbonit, 438.
 Bonteillenstein, 208.
 Bradford-Thon, 700.
 Brandschiefer, 511.
 Brauneisenstein, 331.
 Braunit, 336.
 Bräunfalk ist Dolomit, 241.
 Braunkoble, 309.
 Braunkoble in der Grobkalkformation, 663.
 Braunkoble in der Kreideformation, 678.
 Braunkoble in der Molasseformation, 658.
 Braunnanganerz, 336.
 Braunmenakerz, 279.
 Braunspath, 241.
 Braunsstein, 334.
 Braunssteinkies, 160.
 Braunssteinkiesel, 365.
 Braunsstein, rother, 364.
 Breuze, 306.
 Breunerit, 224.
 Brochantit, 390.
 Bröckeluff, 525.
 Bronquartit, 298.
 Bromjink, 386.
 Bronzit, 261.
 Brunnen, artesische, 682.
 Bucholzit, 199.
 Bucht, 547.
 Buntbleierz, 326.
 Buntkupfererz, 415.
 Bunter Sandstein, 722.

C.

Cacholong, 141, 147.
 Calcaire à Gryphées virgules, 690.
 Calcaire de Blangy, 692.
 Calcaire à polypiers, 690.
 Calcaire grossier, 661.
 Calcaire moëllon, 667.
 Calcaire siliceux, 663.
 Calcareons grit, 692.
 Caledonit, 357.
 Candle-Coal, 308.
 Cancerstein, 159.

Cannelkohle, C. 303.
 Cap, 547.
 Carbonbleyspath, 370.
 Carboniferous limestone, 745.
 Carboniferous Group, 738.
 Caracol, 142.
 Cascalhao, 149.
 Cavolinit, 184.
 Cementwasser, 304.
 Centralkette, 548.
 Centralvulcan, 798.
 Cericit, 366.
 Cerin, 200.
 Cerinstein, 366.
 Cerit, 366.
 Cerium, kussaures, 367.
 Cerium, basisches, 367.
 Ceroryd, kussaures mit kussaures
 Utererde, 367.
 Cerorydul, kohlensaures, 366.
 Ceylonit, 210.
 Chabasit, 171.
 Chalcedon, 141.
 Chalcedonyx, 141.
 Chale lower, 675.
 Chale upper, 675.
 Chalkolit, 397.
 Chialtolith, 184.
 Chimso, 202.
 Chlorbley, 383.
 Chlorit, 177.
 Chloritschiefer, 177. 496.
 Chlorokalum, 289.
 Chlorophan, 253.
 Chloraphalt, 355.
 Chondroit, 219.
 Christianit, 194.
 Chromeisen, 222.
 Chromeisenstein, 222.
 Chromery, prismatisches, 222.
 Chromocher, 340.
 Chromoryd, 350.
 Chrysoberyll, 157.
 Chrysolith, 217.
 Chrysopras, 142.
 Cimolit, 211.
 Citrin, 127.
 Clay, Weald-, von Montell,
 686.
 Coal measures, 730.
 Celestin, 275.
 Cellurit, 212.
 Celopponit, 161.
 Celu, 549.
 Columbit, 327. 328.

Condurit, C. 306.
 Conglomerate, 520.
 Conglutinate, 479.
 Conglutinat-Struktur, 479.
 Congregate, 531.
 Coralleninseln, 608.
 Corallenfalk, 691.
 Coral-rag, 691.
 Cornbrash, 699.
 Gottunit, 383.
 Crag, 651.
 Crale, 673.
 Crale blanche, 675.
 Crale tufan, 675.
 Cronstedtit, 356.
 Crystall, 32.
 Espanit, 198.
 Eymophon, 158.
 Eypria, 162.

D.

Dachschiefer, 510.
 Datholith, 280.
 Daryn, 184.
 Delsabildung, 556.
 Demant, 148.
 Demantseifen, 626.
 Demantspath, 153.
 Desmin, 170.
 Diallag, 280.
 Diallage metalloide, 261.
 Diamant, 148.
 Diaspor, 205.
 Dichroit, 162.
 Digestinsalz, 280.
 Diluvial-Ablagerungen, 622.
 Diluvialeis, 646.
 Diluvialeisenerze, 639.
 Diluvialmergel, 647.
 Diluvialnagelschub, 655.
 Diluvialtorf, 646.
 Diluvialtuff, 647.
 Diluvium, 631.
 Diopsid, 269.
 Dioplas, 289.
 Diorit, 498.
 Diplois, 197.
 Dippre, 182.
 Disthen, 198.
 Dogger, 701.
 Dolerit, 502.
 Dolomit, 241.
 Demit, 492.

Drusen, S. 66.
 Druckstein, 234.
 Dünen, 603.
 Dupplicatsalz, 298.
 Dyclastit, 271.

E.

Ebenen, von den, 458.
 Edelsteinseifen, 627.
 Egeran, 162.
 Einsenkung des Bodens, 612.
 Eisen-Antimonerz, 429.
 Eisenblau, 360.
 Eisenblau, erdiges, 360.
 Eisenbläthe, 241.
 Eisenschlar, 305.
 Eisenchrysolith, 218.
 Eisenconglomerate, 522.
 Eisenepidot, 167.
 Eisenerde, blaue, 360.
 Eisenerde, grüne, 359.
 Eisenerz, axotomes, 323.
 Eisengebilde des Dyfordthones, 608.
 Eisengebilde, rogensteinartiges, 608.
 Eisen, gebiegenes, 451.
 Eisengesteine, 518.
 Eisenglanz, 328.
 Eisenglimmer, 329.
 Eisenglimmerschiefer, 518.
 Eisengranat, 160.
 Eisengranat, 160.
 Eisensaloid, 305.
 Eisenties, heratdrischer, 320.
 Eisenties, rhombodrischer, 402. 405.
 Eisentiesel, 142.
 Eisenerze, 322.
 Eisenofer, rother, 320.
 Eisenspal, 147.
 Eisen, oxalsaures, 301.
 Eisenoxyd, schwefelsaures, 302.
 Eisenoxyd, 361.
 Eisenrahm, rother, 320.
 Eisensalmiak, 306.
 Eisensand, 518. 534.
 Eisenschiefer, 518.
 Eisensinter, 362.
 Eisenspath, 351.
 Eisenspinell, 216.
 Eisenthon, 210.
 Eisenthon-Conglomerat, 527.
 Eisenthon-Mandelstein, 509.
 Eisenthon-Sandstein, 519.
 Eisensitziol, 302.
 Eissteller, 616.

Eislicher, S. 617.
 Eismassen, 615.
 Eispfath, 189.
 Eklogit, 266. 501.
 Eklolith, 184.
 Elaterit, 316.
 Electrum, 468.
 Elvan, 330.
 Encrinal limestone, 745.
 Engpässe, 551.
 Endhydrite, 141.
 Entblösungsthaler, 467.
 Epidot, 167.
 Erbsenstein, 235.
 Erdbeben, 780.
 Erdbrände, 819.
 Erdbrenze, 399.
 Erde, lemnische, 214.
 Erden, 125.
 Erdharz, gelbes, 312.
 Erdkobalt, 350.
 Erdkoble, 310.
 Erdöl, 318.
 Erdpech, 315.
 Erdpech, elastisches, 316.
 Erdsalze, 282.
 Erhebung der Gebirgsketten, 829.
 Erhebungsgrate, 792.
 Erhebungssthaler, 565.
 Erhöhung des Bodens, 596.
 Ercinit, 304.
 Eruption eines Vulcans, 780.
 Eruptionskegel, 802.
 Erythronbleyerz, 382.
 Erzbrenze, 319.
 Erze, gesäuerte, 351.
 Erzführung des bunten Sandsteins, 725.
 Erzführung des Granits, 826.
 Erzführung des Grundgebirges, 772.
 Erzführung des Grünsteins, 822.
 Erzführung des Kupfers, 711.
 Erzführung des Kohlentalks, 746.
 Erzführung der Kruste, 678.
 Erzführung des Lias, 704.
 Erzführung des Melaphyrs, 812.
 Erzführung des Muschelkalks, 718.
 Erzführung des Porphyr, 830.
 Erzführung des Spinitz, 829.
 Erzführung des Todtliegenden, 727.
 Erzführung des Steinkohlengebirges, 742. 744.
 Erzführung des Trachyts, 812.
 Erzführung des Uebergangsschiefergebirges, 761.

Ergführung des Reithelmes, S. 734.
 Erglager, 838.
 Euchlormalachit, rhomboidrischer,
 395.
 Euchlormalachit, 395.
 Euchlormalachit, pyramidal, 396.
 Eudroit, 393.
 Eugenglanz, axotomer, 412.
 Eufairit, 418.
 Eurit, 486.
 Euritporphyr, 486.
 Exterconglomerat, 736.

F.

Fablers, 423.
 Fall der Gebirgsschichten, 561.
 Faserkalk, 234.
 Faserkiesel, 199.
 Faserkoble, 308.
 Faserquarz, 141.
 Fasertorf, 535.
 Faserzolith, 169.
 Fassait, 259.
 Federerz, 437.
 Federweiß, 246.
 Feldspath, 187.
 Feldspath apyre, 196.
 Feldspathgesteine, 484.
 Feldspath, gläser, 191.
 Feldspath, orthotomer, 187.
 Feldstein, 199.
 Feldsteinporphyr, 490.
 Felsenbecken, 584.
 Felsblöcke, 637.
 Felsstürze, 586.
 Feltbrenze, 317.
 Feltquarz, 140.
 Feltstein, 184.
 Feuerbrunnen 800.
 Feueropal, 146.
 Feuerstein, 142.
 Fibrolit, 199.
 Filtrirsandstein, 607.
 Findlinge, 637.
 Fiorit, 145.
 Firne, 615.
 Flinh, 353.
 Flöhdolomit, 234.
 Flöhsgebirge, 670.
 Flöhsere Sandstein, 744.
 Fluolith, 203.
 Fluorcerium, 367.
 Fluß, dichter, 253.
 Flußerde, 253.

Fluß, erdiger, S. 253.
 Flußgebiet, 555.
 Flußspath, 251.
 Fluß, spätiger, 252.
 Flusid, 679.
 Forest Marble, 699.
 Formationen, 571.
 Formationen, allgemeine, 572.
 Formationen, geschichtete, 578.
 Formationen, locale, 572.
 Formationen, massive, 578.
 Formationen, parallele, 573.
 Formationenreihe, jurassische, 684.
 Formationenr., thuringische, 710.
 Fortschaffung des Detritus ins
 Meer, 602.
 Franklinit, 326.
 Frauenis, 246.
 Fucoidensandstein, 680.
 Fullers earth, 700.
 Fuß der Berge, 644.

G.

Gabbro, 500.
 Gadolinit, 200.
 Gagat, 310.
 Gahnit, 370.
 Galena striata, 488.
 Gallienstein, 308.
 Galmel, 368.
 Gänge, 570.
 Gangart, 570.
 Gault, 676.
 Gey-Läsit, 292.
 Gebilde, postdiluvianische, 580.
 Gebirge, aufgeschwemmtes, 579.
 Gebirge, pluvialisches, 820.
 Gebirge, secundäres, 670.
 Gebirge, tertiäres, 648.
 Gebirge, vulcanisches, 777.
 Gebirgsabfall, 548.
 Gebirgsäule, 546.
 Gebirgsarme, 547.
 Gebirgsart, 476.
 Gebirgsbelschen, 549.
 Gebirgsbusen, 547.
 Gebirgsfuß, 548.
 Gebirgsapfel, 549.
 Gebirgsarath, 548.
 Gebirgsfisch, 549.
 Gebirgsflamm, 548.
 Gebirgsnoten, 552.
 Gebirgstöpfe, 549.
 Gebirgstopp, 549.

Gebirgslager, S. 568.
 Gebirgsmassen, 476.
 Gebirgsmassenlehre, 476.
 Gebirgspässe, 549.
 Gebirgspforten, 549.
 Gebirgsrücken, 548.
 Gebirgshöhe, 552.
 Gebirgsschutt, 557.
 Gebirgsseen, 557.
 Gebirgshöhe, 547. 549.
 Gebirgsgerassen, 549.
 Gebirgstäler, 553.
 Gebirgswenige, 546.
 Gebirgs-Ärten, 462.
 Gebirgs-Blau, 460.
 Gebirgs-Eisen, 451.
 Gebirgs-Eisen, terrestrisches, 458.
 Gebirgs-Gold, 457.
 Gebirgs-Iridium, 473.
 Gebirgs-Kupfer, 459.
 Gebirgs-Nickel, 454.
 Gebirgs-Osmium-Irid, 473.
 Gebirgs-Palladium, 473.
 Gebirgs-Platin, 470.
 Gebirgs-Durchsicht, 463.
 Gebirgs-Silber, 454.
 Gebirgs-Spießglanz, 461.
 Gebirgs-Zellur, 451.
 Gebirgs-Wismuth, 460.
 Gebirgsstein, 249.
 Gelbblerz, 378.
 Gelberde, 215.
 Gelberz, 434.
 Geoquiste, 475.
 Geologie, 475.
 Geröllablagerungen, 635.
 Gerölle, 596.
 Geschiebe, 603.
 Geschiebende, 603.
 Gesteine, 476. 477.
 Gesteinsgänge, 570.
 Gesteinslehre, 476.
 Gesteinssteine, 496.
 Gibbst, 207.
 Giesbäche, 556.
 Giesefit, 179.
 Giltigkeit, 355.
 Giltstein, 179.
 Givertit, 324.
 Gipfel, 543.
 Gismundin, 173.
 Glanzblende, hexaedrische, 441.
 Glanzblei, 329.
 Glanz, 418.
 Glanzkohl, 423.

Glanzkohl, S. 306. 308.
 Glanzmanganerz, 336.
 Glaserz, 418.
 Glaslopf, brauner, 381.
 Glaslopf, rother, 329.
 Glasopal, 146.
 Glasur, 427.
 Glauberit, 298.
 Glauberit, natürliches, 298.
 Gletscher, 619.
 Gletschertische, 619.
 Glimmer, 178.
 Glimmer, edelstein, 176.
 Glimmer, gemeiner, 176.
 Glimmergesteine, 495.
 Glimmerschiefer, 495.
 Glimmer, zwischlicher, 176.
 Gneis, 489.
 Gold, gediegenes, 467.
 Goldblei, 535.
 Golt, 547.
 Goltit, 323.
 Grabt, 548.
 Grammatit, 204.
 Granat, 158.
 Granatblende, hexaedrische, 442.
 Granat, böhmischer, 161.
 Granat, hexaedrischer, 162.
 Granat, edler, 159.
 Granat, gemeiner, 160.
 Granat, gelber, von Langbanshöfen
 und Altdorf, 160.
 Granat, occidentalischer, 161.
 Granat, orientalischer, 159. 161.
 Granat, pyramidal, 161.
 Granat, tetraedrischer, 441.
 Granat von Vesuv, 160.
 Grand, 533.
 Granit, 821.
 Granitconglomerat, 527.
 Granitgänge, 824.
 Graphit, 319.
 Graubraunerz, 334.
 Graugültigerz, 425.
 Graumanganerz, 334.
 Grauspießglanz, 435.
 Graustein ist Dolomit, 502.
 Grauwacke, 528.
 Grauwackengebirge, 753.
 Grauwackenschiefer, 529.
 Great Oolithe, 698.
 Greensand, 676.
 Greensand upper, 676.
 Greisen, 486.
 Grès marin inférieur, 602.

Gried, E. 533.
 Grobkalk, 661.
 Grobkalkformation, 661.
 Grobkohle, 308.
 Grobkular, 159.
 Gränbleyerz, 376.
 Gränfeinstein, 359.
 Gränerde, 357.
 Grundgebirge, 706.
 Grundgebirge, massiges, 820.
 Grundschiefergebirge, 708.
 Grünsand, oberer, 676.
 Grünsand, unterer, 676.
 Grünslein, 498.
 Grünsleinschiefer, 492.
 Grünsleinsporphyr, 492.
 Grus, 532.
 Gropfentalk, 702.
 Gufferlinien, 612.
 Gyps, 246.
 Gyps, blättriger, 246.
 Gypsboden, 542.
 Gyps der Kreide, 678.
 Gyps der Lettenkohle, 715.
 Gyps des bunt. Sandst., 722. 725.
 Gyps des Keupers, 712.
 Gyps des Lias, 704.
 Gyps des Muschelkalks, 719.
 Gyps des tertiären Gebirges, 663.
 Gyps des Becksteins, 732.
 Gyps, dichter, 246.
 Gypso à ossements, 664.
 Gypserde, 247.
 Gyps, erdiger, 247.
 Gyps, faseriger, 246.
 Gypsgesteine, 516.
 Gypsalsoid, diatomes, 250.
 Gyps, körniger, 246.
 Gyps, schuppiger, 247.
 Gyps, spärlicher, 246.

H.

Haarfies, 408.
 Haarfalz, 300.
 Haatronen-Malachit, hemiprismatischer, 394.
 Hämatit, 329.
 Hafnererz, 427.
 Haideboden, 541.
 Haide, 559.
 Haideingerit, 439.
 Halbopal, 147.
 Halloysit, 207.
 Haloide, 205.

Hangendes, E. 503.
 Hartotom, 172.
 Hartmanganerz, 328.
 Hartbrenze, 311.
 Hartingsand, 687.
 Hatchedin, 317.
 Hauptfette, 546.
 Haupttrogenstein, 700.
 Hauptthal, 553.
 Hausmannit, 237.
 Haun, 180.
 Haun, deutscher, 181.
 Haun, italienischer, 181.
 Hebungen des Bodens, 612.
 Hebenbergit, 269.
 Heddyphan, 377.
 Heliotrop, 142.
 Helmintholith, 222.
 Helvin, 441.
 Hepatit, 273.
 Heterozit, 362.
 Henlandit, 170.
 Hilsthon, 685.
 Hisingerit, 355.
 Hochebenen, 552. 553.
 Hochgebirge, 547.
 Hochländer, 552.
 Höhenmessen, barometrisches, 545.
 Höhenmessen, trigonometrisch., 545.
 Höhenzüge, 552.
 Höhlen, 640.
 Hohlspat, 184.
 Hörner, 549.
 Holzabst, 270.
 Holz, bituminöses, 210.
 Holzkohle, mineralische, 202.
 Holzopal, 147.
 Holzstein, 143.
 Holzstein, 341.
 Honigstein, 300.
 Horizont, geognostischer, 572.
 Hornblende, 258. 262.
 Hornblende, basaltische, 265.
 Hornblende, gemeine, 265.
 Hornblendegesteine, 497.
 Hornblendegranit, 498.
 Hornblende, labradorische, 262.
 Hornblendeschiefer, 497.
 Hornbleyerz, 382.
 Hornerz, 384.
 Hornfels, 484.
 Hornquarzsilber, 385.
 Hornsilber, 384.
 Hornstein, 143.
 Hornsteinporphyr, 482.

Hügel, S. 543.
 Hügeland, 552.
 Hügelverbindung, 552.
 Humboldtit, 301.
 Humusboden, 541.
 Härcanilit, 362.
 Hyalith, 146.
 Hyalostidrit, 218.
 Hyazinth, 151.
 Hydrargilit, blättriger, 185.
 Hydroboracit, 226.
 Hydrochalcodon, 141.
 Hydromagnetit, 224.
 Hydrophan, 147.
 Hypersthen, 261.
 Hypersthenfels, 400.

J.

Jamesonit, 437.
 Jaspis, 144. 484.
 Jaspopal, 147.
 Jachthioptthalm, 270.
 Jodcras, 161.
 Jodrialin, 449.
 Jilmenit, 323.
 Jlvait, 354.
 Imprägnationsprozeß, 630.
 Incrustationen, 609.
 Infusorien, versteinerte, 575.
 Inselbildung in den Flußbetten, 597.
 Inseln, Corallen-, 608.
 Inseln, Erhebungs-, 793.
 Jodqued Silber, 386.
 Jod Silber, 385.
 Jodzink, 386.
 Jolith, 386.
 Jridium, gebiegenes, 473.
 Jrrblöcke, 637.
 Jserin, 325.
 Jtabirit, 518.
 Jtacolumit, 497.
 Junderit, 353.
 Jurabildung, 672.
 Jurakalk, corallenführender, 692.
 Jurassische Formationenreihe, 684.
 Jurassisches Bohnergebilde, 697.

K.

Kannelkohle, 308.
 Katozen, 358.
 Kalait, 186.
 Kalialaun, 284.
 Kaliglimmer, 176.

Kali-Harmotom, S. 173.
 Kali-Natron, 181.
 Kalitronstein, 173.
 Kalisalpeter, 294.
 Kali, schwefelsaures, 298.
 Kalitormalin, 165.
 Kalkboden, 539.
 Kalk, 228.
 Kalk, blättriger, 232.
 Kalkconglomerat, 521.
 Kalk der Gaslösen, 691.
 Kalk der Stochornkette, 691.
 Kalkeisenstein, 330.
 Kalk-Epidot, 167.
 Kalk, flüssiger, 261.
 Kalkgesteine, 513.
 Kalk, groberdiger, von Paris, 662.
 Kalk, hydraulischer, 237.
 Kalk, kohlensäurer, 228.
 Kalk, körniger, 232.
 Kalkmergel, 515.
 Kalnatron-Scolith, 169.
 Kalksalpeter, 295.
 Kalksandstein, 519.
 Kalkschiefer, 233.
 Kalkschlotten, 732.
 Kalk, schwarzer, 244.
 Kalksinter, faseriger, 236.
 Kalkspath, 232.
 Kalkspath, bituminöser, 232.
 Kalkspath, quarziger, 232.
 Kalkspath, stänglicher, 232.
 Kalkstein, 513.
 Kalkstein, dichter, 233.
 Kalkstein, stänglicher, 233.
 Kalkstein von Denningen, 659.
 Kalktalkspath, 241.
 Kalkthonschiefer, 511.
 Kalktuff, 234.
 Kalk-Uranglimmer, 397.
 Kalk-Scolith, 169.
 Kammfels, 404.
 Kaolin, 210.
 Karinthin, 266.
 Karpathensandstein, 680.
 Karstenit, 248.
 Katavothra, 629.
 Katzenauge, 140.
 Katengold, 176.
 Katensilber, 176.
 Regelgebirge, 547.
 Kelloway-Rock, 698.
 Kettengebirge, 546.
 Keuper, 711.
 Kies, 533. 635.

Kieselbreccie, S. 521.
 Kieselconglomerat, 520.
 Kieseisenstein, rother, 330.
 Kieselgalmey, 309.
 Kieselkupfer, 397.
 Kieselmalachit, 387.
 Kieselmangan, 365.
 Kiesel sandstein, 519.
 Kieselstiefer, 144. 483.
 Kieselstinter, 145.
 Kieselspath, 191.
 Kieselstuf, 145.
 Kieselstuf, 369.
 Killas, 824.
 Kimito-Tantalit, 327.
 Kimmeridge-Thon, 690.
 Klassification der Gebirgsarten, 577.
 Klingstein, 491.
 Klingsteinconglomerat, 524.
 Klingsteingebilde, 810.
 Klüfte, 561.
 Knochenbreccie, 640.
 Knochenconglomerat, 531.
 Knochenquers, 664.
 Knochenhöhlen, 640.
 Kobaltbleyerz, 428.
 Kobaltblüthe, 397.
 Kobaltglanz, 412.
 Kobaltkies, 411.
 Kobaltkies, dodecaëdrischer, 412.
 Kobaltkies, hexaëdrischer, 410.
 Kobaltkies, isometrischer, 411.
 Kobaltkies, octaëdrischer, 410.
 Kobaltdoer, 350.
 Kobaltvitriol, 305.
 Kohlen, 306.
 Kohlenblende, 306.
 Kohlengebirge, 738.
 Kohlenkalk, 745.
 Kohle von Boltigen, 690.
 Kohlenvitriolbley, 375.
 Kollolith, 260.
 Kollorit, 212.
 Kopolithe, 704.
 Kornähren, frankenberger, 736.
 Kornitencalk, 755.
 Korund, 152. 153.
 Korund, dodecaëdrischer, 152.
 Korund, octaëdrischer, 152.
 Korund, prismatischer, 152.
 Korund, rhombödrischer, 152.
 Krater, 778.
 Kreide, 234.
 Kreideformation, 672. 673.
 Kreidegebirge, 673.

Kreidegruppe, S. 673.
 Kreidemergel, 675.
 Kreide, spanische, 220.
 Kreidetuff von Westrich, 673.
 Kreide, weiße, 675.
 Kreuzstein, 173.
 Krochdolich, 357.
 Kryptolith, 187.
 Kryptalkeller im Granit, 826.
 Kryptalinsche Schiefer, 708.
 Kugelsapir, 144.
 Kupferchrombley, 381.
 Kupferbleyspath, 375.
 Kupferbleyvitriol, 374.
 Kupferchlorid, 306.
 Kupferfablerz, 424.
 Kupfer, gediegenes, 459.
 Kupferglanz, 416.
 Kupferglanz, diprismatischer, 428.
 Kupferglanz, prismatödrischer, 426.
 Kupferglanz, tetraëdrischer, 423.
 Kupferglas, 416.
 Kupferglimmer, 395.
 Kupferhaloid, 306.
 Kupferindig, 417.
 Kupferkalk, 346.
 Kupferkies, 413.
 Kupferkies, octaëdrischer, 415.
 Kupfer, kohlensaures, 386.
 Kupferlasur, 388.
 Kupfermanganerz, 339.
 Kupfernickel, 408.
 Kupfer, octaëdrisches, 459.
 Kupferoxyd, klinorhombisches, 391.
 Kupferphyllit, 395.
 Kupfersammetz, 389.
 Kupferschaum, 395.
 Kupferschiefer, 734.
 Kupferschiefergebirge, 672.
 Kupferschwärze, 247.
 Kupfersteinbergglanz, 419.
 Kupferstern, 388.
 Kupferultrarglimmer, 397.
 Kupfervitriol, 304.
 Kupferwismutherz, 430.
 Kuppe, 543.
 Kupsteine, 635.
 Küstengebilde, 608.

L.

Labrador 193.
 Lager, 828.
 Lagerung, von der, 568.
 Land, bergiges, 546.

Sand, bündiges, S. 546. 552.
 Sandstierreste, 576.
 Sängenthüler, 553.
 Lapis lazuli, 181.
 Lapis ollaris, 179.
 Lapis quadratus, 525.
 Lastonit, 186.
 Lasurstein, 181.
 Latrobit, 197.
 Laugenfalte, 287.
 Lammontit, 172.
 Lava, 785.
 Laveststein, 179.
 Lawinen, 185.
 Lazulith, 185.
 Leberfies, 404.
 Lehm, 208.
 Lehmlagerungen, 633.
 Lehm Boden, 537.
 Leimen, 208.
 Lepidokrokit, 233.
 Lepidolith, 176.
 Letten, 208.
 Lettenablagerungen, 633.
 Lettenkohle, 714.
 Lencit, 180.
 Leucitophyr, 506.
 Leucitgestein, 506.
 Leucitoeder, 180.
 Lencomelan, 506.
 Lherzolith, 200.
 Lias, 702.
 Libethenit, 391.
 Liegendes, 568.
 Lievrit, 354.
 Lignit, 309.
 Limonit, 362.
 Linsenerz, 393.
 Lithonmalachit, heratzeischer, ist
 Bärfelz, 360.
 Lithonmalachit, prismatischer, 393.
 Lithon-Glimmer, 176.
 Lithon-Turmalin, 165.
 Lithorylon, 143.
 Litoralgebilde, 608.
 Llanos, 559.
 London-clay, 667.
 London-Thon, 667.
 Löss, 634.
 Luchsaphyr, 163.
 Lucullan, 232.
 Ludus Helmontii, 234.
 Lumarhelle, 232.

Al.

Macigno, S. 675. 680.
 Macle, 184.
 Magnesia alba, 224.
 Magnesia-Glimmer, 177.
 Magnesiadhydrat, 219.
 Magnesian limestone, 737.
 Magnesit, 223.
 Magnesit, dichter, 224.
 Magnesit, späthiger, 224.
 Magnesitspath, 224.
 Magneteisen, 320.
 Magneteisenstein, 320.
 Magnetfels, 518.
 Magnetfies, 405.
 Malachit, 386.
 Malacolith, 259.
 Maltha, 218.
 Mandelstein, 478.
 Mandelsteinstructur, 478.
 Manganeblende, 441.
 Manganepidot, 168.
 Manganlang, 336.
 Mangangranat, 160.
 Manganhyperoxyd, 336.
 Mangankiefel, 365.
 Manganit, 336.
 Manganspath, 364.
 Marcasit, 203.
 Marienglas, 176.
 Markasit, 399.
 Marmo cipollino, 513.
 Marmolith, 221.
 Marmor, 232.
 Marmor, salinischer, 232.
 Marschboden, 542.
 Mascagnin, 300.
 Massengebirge, 547.
 Mauerfalspeter, 295.
 Meerbusen, 547.
 Meerschamm, 223.
 Mejonit, 182. 183.
 Melanglang, prismatischer, 421.
 Melanit, 160.
 Melaphyr, 505.
 Mellilit, 300.
 Menacan, 234.
 Menakerz, 279.
 Menillit, 147.
 Rennige, 350.
 Menschentnochen in Höhlen, 645.
 Mergel, 234.
 Mergelablagerungen, 633.
 Mergelboden, 539.

Mergelerde, S. 224.
 Mergelsandstein, 520.
 Mergelschiefer 515.
 Mergelstein, 234.
 Mergelstuf, 510.
 Merkurblende, 448.
 Merkur, flüssiger, 463.
 Metastinspath, 225.
 Mesol ist Scolith, 168.
 Mesolin ist Chabasit, 171.
 Mesolith, 169.
 Mesotyp, 168.
 Metalliferous limestone, 747.
 Meteoreisen, 452.
 Meteorsteine, 452.
 Mica ist Glimmer, 175.
 Micasciste, 495.
 Miemit, 243.
 Milchquarz, 140.
 Milchglanzerz, 422.
 Millstone grit, 744.
 Mimose ist Dolerit, 502.
 Mineralalkali, 290.
 Miocene Bildungen Speiss, 653.
 Mispickel ist Arsenkies, 400.
 Mittelgebirge, 547.
 Mittellauf, 556.
 Rochhasteine, 141.
 Mosetten, 784.
 Molasse, 657. 658.
 Molasseformation, 650.
 Molassegruppe, 650.
 Polypbänglang, 429.
 Polypbänoder, 348.
 Polypbänsilber, 432.
 Mondstein, 189.
 Mondmilch ist Bergmilch, 234.
 Moo dolce, 292.
 Moorboden, 542.
 Moortohle, 510.
 Moosboden, 542.
 Morainen, 618.
 Morasterz, 363.
 Morion, 337.
 Mountain limestone, 746.
 Mopa, 789.
 Mulde, 560.
 Mündung der Ströme, 556.
 Murchisonit ist Feldspath, 179.
 Muriacit, 248.
 Muriacit, würfelig, 248.
 Muschelconglomerat, 530.
 Muschelmarmor, opalisirender, 233.
 Muschelmassen über dem Meeresspiegel, 612.

Muschelmergel, S. 650.
 Muschelmolasse, 658.
 Muschelsandstein, 658.
 Nargarit, 447.

N.

Nadeleisenerz, 333.
 Nadelers, 431.
 Nadeln, 549.
 Nadelporphyr, 505.
 Nadelzeolith, 169.
 Nadelzinnerz, 241.
 Naphthentodalt, 462.
 Nagelsalz, 529.
 Nagelsalt, 233.
 Naphthaline, natürliche, 247.
 Naphthalit, 212.
 Naphthaquellen, 319.
 Natrolith, 169.
 Natron, 290.
 Natronalun, 285.
 Natronbanon, 181.
 Natronsalz, tablenförmig, 292.
 Natronsalpeter, 295.
 Natronsalz, hemiprismatisches, 290.
 Natronspodumen ist Nigellat, 195.
 Natron, strahliges, 291.
 Natronurmalin, 165.
 Natronzeolith, 169.
 Nebengestein, 570.
 Nebentetten, 546.
 Needle-Tin, 341.
 Néocomien, 677.
 Nephelin, 183.
 Nephrit, 227.
 Nester, Erzester, 839.
 New Red-Sandstone, 728.
 Nickelbläthe, 392.
 Nickelers, weisses, 412.
 Nickelglanz, 412.
 Nickelgrün, 398.
 Nickelkies, prismatisches, 408.
 Nickeloder, 398.
 Nickelpiesglanzerz, 412.
 Niederungen, 558.
 Niederungen, negative, 558.
 Nigrin, 324.
 Nitrum, 290.
 Noëan, 180.
 Nummulitenkalk, 680.

O.

Oberlauf, 556.
 Obsidian, 203. 494.

Ocker, Sippschaft der, S. 348.
 Ockergelb, 215.
 Octadrit, 344.
 Oelbrenze, 317.
 Olenit, 271.
 Old Red-Sandstone, 747.
 Oligotlas, 195.
 Olivenerz, 392.
 Olivenmalachit, 391.
 Olivinit, 392.
 Olstern, 217.
 Omphacit, 266.
 Onyx, 141.
 Oolith, 235.
 Oolite de Mortagne ist Coralliten-
 kalk, 691.
 Oolite ferrugineux, 701.
 Oolite great, 700.
 Oolite inférieur, 701.
 Oolite inferior, 701.
 Oolite lower ist Dogger, 701.
 Oolite under ist Dogger, 701.
 Opal, 146.
 Opal, edler, 146.
 Opal, gemeiner, 146.
 Opaljaspis ist Jaspopal, 147.
 Opalmutter, 147.
 Opment, 449.
 Ophit, 221.
 Ophites der Alten, 508.
 Organische Ueberreste, 620.
 Organische Ueberreste des bunten
 Sandsteins, 723.
 Organische Ueberreste des Coral-
 rag, 691.
 Organische Ueberreste des Crag, 650.
 Organische Ueberreste des Diluvi-
 ums, 631.
 Organische Ueberreste des Dogger,
 702.
 Organische Ueberreste des Glimme-
 gebirges, 671.
 Organische Ueberreste des kühleren
 Sandsteins, 745.
 Organische Ueberreste des Kalks, 686.
 Organische Ueberreste des Kalks, 682.
 Organische Ueberreste des Haupt-
 rogensteins, 699.
 Organische Ueberreste des Keupers,
 711 u. f.
 Organische Ueberreste des Kämme-
 ridgethons, 690. 691.
 Organische Ueberreste des Kalken-
 kalks, 745.

Organische Ueberreste der Kreide,
 S. 673 u. f.
 Organische Ueberreste des Lias, 703,
 704.
 Organische Ueberreste der Molasse,
 653. 658.
 Organische Ueberreste des Muschel-
 kalks, 716 u. f.
 Organische Ueberreste des Old red-
 sandstone, 748.
 Organische Ueberreste des Oxford-
 thons, 698.
 Organische Ueberreste des plastischen
 Thons, 664. 665.
 Organische Ueberreste des Portland-
 kalks, 690. 691.
 Organische Ueberreste des Rothen
 Todtliegenden, 736.
 Organische Ueberreste des Sandsteins
 von Fontainebleau, 662.
 Organische Ueberreste des Sohlen-
 hofer Schiefers, 694.
 Organische Ueberreste des Stein-
 kohlengebirges, 741.
 Organische Ueberreste des Stones-
 field-Schiefers, 695. 696.
 Organische Ueberreste des Tertiär-
 gebirges, oberen, 650.
 Organische Ueberreste des Tertiär-
 gebirges, unteren, 662.
 Organische Ueberreste des Ueber-
 gangsgebirges, 731.
 Organische Ueberreste des Ueber-
 gangsschieferegebirges, 753 u. f.
 Organische Ueberreste des Wälder-
 thons, 687.
 Organische Ueberreste des Brecksteins,
 733 u. f.
 Orogaphie, 476. 543.
 Orithit, 200.
 Orthotlas, 187.
 Orthose, 187.
 Osmium-Iridium, 473.
 Osteocella, 234.
 Oule de Cavarnie, 554.
 Ouro poudre, 469.
 Overflowing-wells, 683.
 Orallit, 301.
 Oxford-clay, 698.
 Oxford oolite, 698.
 Oxfordthon, 698.
 Oysterit, 317.

p.

Palladium, gediegenes, S. 472.
 Papierkohle (Blattkohle), 310.
 Parallelfetten, 546.
 Paralleltäler, 553.
 Paranthine, 182.
 Pargasit, 266.
 Paulit, 261.
 Pechgranat, 161.
 Pechkohle (Gagat), 310.
 Pechopal, 147.
 Pechstein, 202. 493.
 Pechtorf, 535.
 Pechuran ist Uranpecherz, 344.
 Pegmatit, 486.
 Pelekhyd, 393.
 Pelion ist Dichroit, 162.
 Peperin, 526.
 Peridot, 217.
 Periklin, 192.
 Perlite ist Perlstein, 302.
 Perlmutteropal ist Cacholong, 147.
 Perlstein ist Kieselstein, 145.
 Perlspath ist Braunsparth, 242.
 Perlstein, 202. 494.
 Petalit, 195.
 Petrefacten, 573.
 Petrographie, 478.
 Petroleum, 318.
 Pfeifferstein, 526.
 Pfeifenthon, 208.
 Pharmakolith, 249.
 Pharmakosiderit ist Bärfeleerz, 360.
 Phosphinit, 173.
 Phonolith, 491.
 Phosphatkupfererz, 391.
 Phosphorit, 255.
 Phosphorit, erdiger, 255.
 Phosphorkupfererz, 391.
 Phosphormalachit, 391.
 Phosphormangan ist Triplit, 361.
 Photizit, 366.
 Phyllinsparth, 374.
 Phylolith, 157.
 Pic, 549.
 Pierre meulière, 682.
 Pietra d'Egitto, 228.
 Pitrolith, 221.
 Pitropharmakolith, 250.
 Pitrosmin, 222.
 Pinit, 179.
 Pisolith ist Erbsenstein, 235.
 Pistacit, 167.

Pittizit, S. 362.
 Plänerkalk, 675.
 Plagionit, 438.
 Plasma, 141.
 Plastic-clay, 665.
 Plastischer Thon, 665.
 Plateaus, 552.
 Platineisen, 471.
 Platin, gediegenes, 470.
 Platinseifen, 636.
 Plattformen, was Plateaus, 552.
 Pleonast, 216.
 Pliocene Bildungen, 650.
 Plumbocalcit, 241.
 Polareis, 615.
 Polierschiefer, 532.
 Polybasit, 422.
 Polyhalit, 249.
 Polymignit, 201.
 Polysphärit, 378.
 Porfido verde antico, 499.
 Porphyre, Augit-, 505.
 Porphyroconglomerat, 528.
 Porphyre, Feldstein-, 820.
 Porphyre pyroxenique ist Melaphyre, 505.
 Porphyre, quarzführender, 831.
 Porphyre, schwarzer (Melaphyre), 810.
 Porphyrostructur, 478.
 Porphyre, Thon-, 831.
 Portlandbildung, 690.
 Porzellanerde, 210. 531.
 Porzellansparth ist ein Feldspath, 187.
 Porzellanstein, 525.
 Post-diluvial Detritus, 597.
 Postdiluvianische Gebilde, 590.
 Pozzuolana, 790.
 Prasem, 140.
 Prehnit, 174.
 Prehnit, blättriger, 174.
 Prehnit, faseriger, 174.
 Primary-rocks, 768.
 Protoquarz, 769.
 Pseudochrysolith, 202.
 Pseudomalachit, 391.
 Psilomelan, 328.
 Puddingstein, 521.
 Puls artésiana, 683.
 Puls forés, 683.
 Pannamstein, 227.
 Purbeckschichten, 687.
 Purpurblende, prismatische, 440.
 Pugen, 839.
 Pycnit, 157.
 Pyrrargillit, 205.

Pyrit, S. 392.
 Pyrochlor, 289.
 Pyrolust, 324.
 Pyromerid ist Feldstein, 490.
 Pyromorphit, 376.
 Pyrop, 159.
 Pyrophyllit, 206.
 Pyrophyllith, 157.
 Pyrorthis, 392.
 Pyroßberit, 333.
 Pyrosmalith, 356.
 Pyroxen, 256.

Q.

Quadersandstein, 677.
 Quarz, 136.
 Quarzfels, 492.
 Quarz, gemeiner, 139.
 Quarzsteine, 483.
 Quarzsand, 533.
 Quarz, untheilbarer, 146.
 Quecksilber, gediegenes, 468.
 Quecksilberbornerz, 365.
 Quecksilberlebererz, 449.
 Quellen, 555.
 Quellenabfälle, 609.
 Quellenbezirk, 555.
 Quellen des Grundgebirges, 775.
 Quellen des Muschelkalks, 719.
 Quellen des Uebergangs-Schieferge-
 birgs, 762.
 Quellen, Entstehung der, 555.
 Quellen, heiße, des Vulcanen, 791.
 Quellen, Salz, der Lösskohle, 715.
 Quellen, Salz, des Muschelkalks,
 720.
 Quellen, Salz, im Bockstein, 733.
 Quellen, Salz und Sauer, des
 Todtliegenden, 737.
 Quellen, Sauer, des Bunten Sand-
 steins, 726.
 Quellen, Schwefel, des Lias, 704.
 Quellen, Sool, des Bunten Sand-
 steins, 726.
 Quellen von brennbarer Luft, 800.
 Quellen von Kohlensäure, 784 und
 817.
 Quertbäler, 558.

R.

Rapilli, 788.
 Raseneisenstein, 362.

Rasentorf, S. 535.
 Rastoffit, 253.
 Rauchtöpad, 127.
 Rauchwade, 732.
 Raubfals, 723.
 Rauchgelb, 449.
 Rauchsroth, 450.
 Rautenspath, 242.
 Realgar, 450.
 Red marl, 728.
 Red Sandstone, New, 728.
 Red Sandstone, Old, 747.
 Reihenvulcane, 796.
 Reißbley, 319.
 Resinasphalt, 315.
 Resinit, 315.
 Reste, organische, 573.
 Retinasphalt, 315.
 Retinit, 315.
 Rhabdit, 198.
 Rheinfiesel, 598.
 Rhopalith, 492.
 Ringtbäler, 565.
 Rogenstein, 235.
 Roselit, 250.
 Rosenit, 438.
 Rosenquarz, 140.
 Rothbleyerz, 380.
 Rothcisenocker, 330.
 Rothcisenrahm, 330.
 Rothcisenstein (Blutstein), 329.
 Rothcisenstein, dichter, 330.
 Rothcisenstein, faseriger, 329.
 Röthel, 330.
 Rothcs Todtliegenden, 735.
 Rothgiltigerz, 444.
 Rothkupfererz, 346.
 Rothliegenden, 735.
 Rothmanganerz, 364.
 Rothoffit, 160.
 Rothspießglanzerz, 440.
 Rothstein, 365.
 Rothzinkerz, 348.
 Rubellit, 165.
 Rubin, 153.
 Rubinblende, 444.
 Rubinblende, hemiprismatische, 447.
 Rubinblende, perisome, 448.
 Rubinglimmer, 333.
 Rubinspinell, 216.
 Rubis balais, 216.
 Rüden, 544.
 Rußkohle, 308.
 Rutil, 342.
 Ryapolith, 191.

S.

Sahlit, S. 259.
 Salamstein, 153.
 Salmiak, 289.
 Salpeter, 294.
 Salpeter, kubischer, ist Natriumsal-
 peter, 295.
 Salzen, 799.
 Salzablagerung im Meer, 612.
 Salz im bunten Sandstein, 725.
 Salz im Diluvium, 833.
 Salz im Muschelkalk, 719.
 Salz im tertiären Gebirge, 637.
 Salz im Bockstein, 753.
 Salz in der Kreide, 678.
 Salz in der Leitenkohle, 715.
 Salze, 283.
 Salzgesteine, 517.
 Salzkupfererz, 390.
 Salzseen, 801.
 Salzthon, 720.
 Sand, 533.
 Sand, quarziger, 533.
 Sandablagerungen, 633.
 Sandbank, 603.
 Sand der Wästen, 559.
 Sandkohle, 308.
 Sandmergel, 516.
 Sandstein, 518.
 Sandstein, biegsamer, 497.
 Sandstein, bunter, 722.
 Sandstein, löcherer, 744.
 Sandsteinegebilde, neue, 806.
 Sandstein von Fontainebleau, 662.
 Sandstein, 191.
 Sapphir, 153.
 Sapphyrin, 199.
 Sapphyrquarz, 140.
 Saffolin, 293.
 Saffellinie, 569.
 Saugkalk, 234.
 Sanjurit, 197.
 Scardroit, 207.
 Schalenblende, 443.
 Schalkstein, 512.
 Schaumgyps, 247.
 Scheelbleierz, 381.
 Scheelkalk, 282.
 Scheelsäure ist Wolframsäure, 348.
 Scheererit, 317.
 Scheidek des Gebirges, 551.
 Scherbenkalk, 462.
 Schichten, 561.
 Schichtentöpfe, 562.

Schichtung der Gebirgsmassen, 550.
 Schichtungsfläche, 561.
 Schieferkohle, 308.
 Schieferkalk, 235.
 Schiefertön, 532.
 Schilfgläser, 420.
 Schiffsandstein, 711.
 Schillerquarz ist Rassenauge, 140.
 Schlagende Wetter, 722.
 Schlacht, 553.
 Schmelzstein, 182.
 Schörl, 164.
 Schotter, 635.
 Schrifter, 434.
 Schriftglang, 434.
 Schriftgranit, 496.
 Schrifttellur, 434.
 Schutthalben, 586.
 Schwanstein, 584.
 Schwarzbleierz, 372.
 Schwarzeisenstein, 388.
 Schwarzerg, 424.
 Schwarzglitzer, 424.
 Schwarzkohle, 306.
 Schwarzmander, 327.
 Schwefel, 311.
 Schwefelerz, 392.
 Schwefelsäure, 399.
 Schwefelsäure ist Hartes, 492.
 Schwefelsäure, biegsamer, 492.
 Schwefelsäure ist Bismut, 424.
 Schwefelsäure, 272.
 Schwerstein, 282.
 Sekundäres Gebirge, 579.
 See-Gr., 260.
 Seim, 557.
 Seifenstein, 220.
 Seifenwerke, 635.
 Seifenwerke, Demant, 536.
 Seifenwerke, Gold, 626.
 Seifenwerke, Platin, 626.
 Seifenwerke, Zinn, 626.
 Seiten, 544.
 Seitenkette, 546.
 Seitenthal, 554.
 Selendiez, 497.
 Selendiezkupfer, 428.
 Selentkupfer, 418.
 Selentkupferbley, 428.
 Selenued Silberbley, 429.
 Selensilber, 428.
 Selensilberbley, 428.
 Senkungen des Bodens, 613.
 Septarien, 668.
 Serpentin, 221.

Serpentin, edler, S. 222.
 Serpentin, gemeiner, 222.
 Serpentinfels, 507.
 Siderit, 140.
 Siderit, faseriger, 358.
 Sideroschistolith, 355.
 Siegelerde, 214.
 Siepen sind Seisenwerke.
 Silberblende, 444.
 Silberfablerz, 425.
 Silber, gediegenes, 464.
 Silberglanz, 418.
 Silberglanz, hercynischer, 418.
 Silber, hercynischer, 464.
 Silberhörnierz, 384.
 Silberkupferglanz, 479.
 Silberschwärze, 419.
 Silberwismuthierz, 431.
 Silberwismuthspiegel, 432.
 Silx meulière, 666.
 Sillimanit, 199.
 Sinterkohle, 308.
 Stapolith, 182.
 Stolezit, 169.
 Storobit, 361.
 Smaragd, 154.
 Smaragd, 266.
 Smaragdmalachit, rhomboidischer, 393.
 Smirgel, 153.
 Soap-rock, 321.
 Soda, 290.
 Sodolith, 182.
 Sohle der Steinkohlen, 739.
 Sohlenhofer Schiefer, 694.
 Solfataren, 797.
 Sonnenstein, 189.
 Soufrière, 797.
 Spaltenthal, 464.
 Spargelstein, 355.
 Spathisenstein, 351.
 Speckstein, 220.
 Speerties, 404.
 Speisfabalt, 410.
 Sphärosiderit, 352.
 Sphärosiderit, thoniger, 353.
 Sphen, 279.
 Spiegelglanz, wismuthiger, 432.
 Spießglanzbleierz, 438.
 Spießglanzblende, 440.
 Spießglanz, gediegenes, 461.
 Spießglanznickelfies, 413.
 Spießglanzoder, 349.
 Spießglanzrothgiltigerz, 445.
 Spießglanzsilber, 466.

Spinell, S. 215.
 Spinell, gemeiner, 216.
 Spinellan, 189.
 Spize, 543.
 Spodumen, 196.
 Spröbglanzert, 421.
 Spröbglaserz, 421.
 Stahlstein, 353.
 Stangenkohle, 310.
 Stangenschmelz, 165.
 Stangenpath, 273.
 Stangenstein, 167.
 Staurolith, 163.
 Steinheiligt ist Diarait, 162.
 Steinkohle, 397.
 Steinkohle, hartholz, 398.
 Steinkohlenablagerung, allgemeine
 Bemerkungen darüber, 750.
 Steinkohlenablagerungen, Ent-
 stehung der, 750.
 Steinkohlenablagerung, Haupt, 732.
 Steinkohlenformation, 308.
 Steinkohlengebirge, älteres, 738.
 Steinkohlen im Hauptrogenstein,
 701.
 Steinkohlen im Keuper, 712.
 Steinkohlen im Todtliegenden, 736.
 Steinkohlen im Wälderthon, 688.
 Steinkohlen in der Kreidebildung,
 678.
 Stein, lithographischer, 694.
 Stein, lydischer, 144.
 Steinmark, 212.
 Steinmark, festes, 212.
 Steinmark, zerreibliches, 212.
 Steinöl, 318.
 Steinöldrinnen, 319.
 Steinsalz, 287.
 Steintuff, 524.
 Steppen, 559.
 Sternberger-Kuchen, 669.
 Sternbergit, 420.
 Sternsapphir, 153.
 Stigmatit ist Pechstein, 202.
 Stilbit, 170.
 Stilpnosiderit, 359.
 Stinkapp, 247.
 Stinkfalk, 659.
 Stinkquarz, 140.
 Stinkstein, 234.
 Stodwerke, 838.
 Stonesfieldschiefer, 695.
 Strahlenblende, 443.
 Strahlerz, 394.
 Strahlies, 402.

Strahlstein, S. 265.
 Strahlzeolith, 170.
 Strandgeschiebe, 612.
 Strata, tertiary, Tertiargeb., 648.
 Streichen der Schichten, 561.
 Stream-works sind Hinnseifen, 636.
 Striegisan, 185.
 Strip malm, 427.
 Strom, 555.
 Stromgebiet, 555.
 Stromlauf, 555.
 Stromschnellen, 555.
 Strontianit, 278.
 Strontspath, 275.
 Structur der Gesteine, 478.
 Subappenninenformation, 650.
 Sublimate der Vulcane, 791.
 Succinit, 313.
 Sumpferz, 363.
 Schwefelspeter, 295.
 Säuwasserbildungen, 651.
 Suturbrand, 310.
 Sphenit, 488.

T.

Tafelländer, 552.
 Tafelspath, 256.
 Talk, 178.
 Talkboden, 542.
 Talkchrysolith, 217.
 Talkerden, 215.
 Talkedellsteine, 215.
 Talkerdehydrat, 219.
 Talkspalter, 296.
 Talkschiefer, 178. 496.
 Talkspath, 224.
 Talkspinell, 216.
 Tantalit, 327.
 Tantalit, zimmetbrauner von Ri-
 mito, 327.
 Tegelformation, 653.
 Tellurbley, 433.
 Tellur, gediegenes, 461.
 Tellurglanz, prismatischer, 433.
 Tellur Silber, 433.
 Tellurwismuth, 431.
 Tellurwismuth Silber, 432.
 Tennantit, 426.
 Terndröbberg, 374.
 Terrain houillier, 738.
 Terrains alluvians, 580.
 Terrains intermédiaires, 731.
 Terrains marins supérieurs, 662.
 Terrains plutoniques, 820.

Terrains primitifs, S. 768.
 Terrains tertiaires, 648.
 Terrains de transition ist Uebergangs-
 gebirge, 731.
 Terrains volcaniques, 777.
 Tertiary Rocks, 648.
 Tertiales Gebirge, 648.
 Tetartin, 191.
 Tetradymit, 431.
 Thal, 543.
 Thalanfang, 554.
 Thäler, Bildung der, 553.
 Thalkrenze, 554.
 Thalmündung, 554.
 Theersandschichten, 661.
 Thénardit, 297.
 Thermen, 762.
 Thon, 207.
 Thonboden, 538.
 Thoneisenstein, brauner, 331.
 Thoneisenstein, dichter, 332.
 Thoneisenstein, jaspisartiger, 330.
 Thoneisenstein, rother, 330.
 Thoneisenstein, schaliger, 332.
 Thongesteine, 508.
 Thonmergel, 516.
 Thonmergel, verhärteter, 210.
 Thonsandstein, 519.
 Thonschiefer, 509.
 Thonschiefergebirge, 753.
 Thonstein, 210.
 Thonstein, gemeiner, 210.
 Thonsteinporphyr, 508.
 Thraulit, 355.
 Thüringer Formationenreihe, 710.
 Tiefenbenen, 558.
 Tigate-Forst, 686.
 Tilgatschichten, Versteinerungen der,
 695.
 Tinal, 293.
 Titaneisen, 323.
 Titaneisen sand, 325.
 Titanit, 279.
 Todtlegendes, 735.
 Topas, 155.
 Topas, edler, 156.
 Topasfels, 156.
 Töpfertben, 208.
 Topfstein, 179. 496.
 Torf, 311. 534.
 Torfboden, 542.
 Torferde, 535.
 Torfmoore, 589.
 Trachyt, 492.
 Trachyconglomerat, 523.

Trachytgebilde, S. 812.
 Trachytstuf, 523.
 Trapp, 833
 Trapp-Porphyr, 492.
 Traß, 522.
 Traubenbley, 377.
 Travertino, 334.
 Tremolit, 264.
 Triasgebirge, 672.
 Tripban, 196.
 Triplit, 361.
 Trochitenkalk, 718.
 Trona, 291.
 Tropfstein ist Kalkstener, 235.
 Trovanti, 637.
 Trümmergesteine, 482.
 Turtis, 186.
 Turtis, abendländischer, 186.
 Tufa, 524.
 Tuff, vulcanischer, 521.
 Tungsstein, 282.
 Turmalin, 164.
 Turquoise, 186.
 Turquoise odontolith, 186.

U.

Uebergangsgebirge, 731.
 Uebergangsgebirge, älteres, 763.
 Uebergangsgebirge, jüngerer, 753.
 Uebergangsgebirge, Schiefergebirge, 753.
 Uebergangsgebirge-Kalkstein, älterer, 764.
 Uebergangsgebirge-Kalkstein, jüngerer, 755.
 Ultramarin, 181.
 Umbra, 332.
 Umbra, kölnische, 310.
 Untergrund, 543.
 Unterlauf, 556.
 Untiefen, 556.
 Uralit, 267.
 Uranerz, untheilbares, 344.
 Uranglimmer, 396.
 Uranit, 397.
 Uranocer, 349.
 Uranpacherz, 344.
 Uranpyrit 396.
 Uranvitriol, 305.
 Urao, 291.
 Urgebirge, 768.
 Ursache der vulcanischen Erscheinungen, 814.
 Urschiefergebirge, 768.

V.

Vanadinbleyerz, S. 383.
 Variolit, 499.
 Vanquellint, 381.
 Versäuerung, 544.
 Verde antico, 506.
 Verde di Corsica duro, 501.
 Versenkung, 558.
 Versteinernungen, wie sie eingeschlossen werden, 623.
 Verwerfungen, 570.
 Vesuvian, 161.
 Vitriolbleyerz, 373.
 Vitriolites ist Bindrities, 402.
 Vitriolites, blauer, 304.
 Vitriolites, cyprischer, 304.
 Vitriolstorf, 591.
 Vitriol, weißer, 305.
 Vivianit, 359.
 Vorberge, 548.
 Vorgebirge, 547.
 Vulcane, 778.
 Vulcane, Central-, 707.
 Vulcane, erloschene, 802.
 Vulcane, Reichen-, 707.
 Vulcanische Erscheinungen, Ursachen der, 814.
 Vulcanische Producte, 783.
 Vulcanisches Gebirge, 777.
 Vulpinit, 249.

W.

Wachsopal, 147.
 Wad, 339.
 Wagnersitz 227.
 Walderthon, 686.
 Wälder, untermeerische, 592.
 Waldungen, untermeerische, 592.
 Walterde, 213.
 Wärme der Erde, 814.
 Wachsgold, 469.
 Wasserbley, 429.
 Wasserfall, 556.
 Wasserfies, 402.
 Wasserfophyr, 163.
 Wasserheiler, 541.
 Wavellit, 185.
 Weald clay, 686.
 Weichmanganerz, 334.
 Weichmanganerz, blättriges, 335.
 Weichmanganerz, dichtes, erdiges, 335.